



BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele II

XXXIV

F

4

NAPOLI

28

xxxiv

7.

4

EVCLIDÈ RESTITVTO

O V E R O

GLI ANTICHI ELEMENTI GEOMETRICI
Ristaurati, e facilitati

D A

VITALE GIORDANO
DA BITONTO.

Lettore delle Matematiche nella Reale Accademia.
stabilita dal RE CRISTIANISSIMO in Roma.



LIBRI XV.



Ne i quali principalmente si dimostra la compositione delle
proportioni secondo la definitione datane
dal suo antico Autore.



IN ROMA, Per Angelo Bernabò. M. DC. LXXX.

Con Licenza de' Superiori.



ALLA SACRA, E REAL MAESTA'
CHRISTIANISSIMA
D I
LODOVICO XIV.
RE' DI FRANCIA, E DI NAVARRA

S I R E.



VELLA vaghezza, che trà le ro-
uine delle paterne Scuole de' Pittagorici mi
venne già di applicare alle Matematiche, spen-
ta senz'alcun dubbio da vna peruerfa fortuna in
me stata farebbe, se la Maestà Vostra, intenta ad
arricchire colle buone arti il Mondo tutto, agio
dato non mi hauesse di mantenerla sempre più
viua á beneficio della giouentù Francese in que-
sta

sta sua Reale Accademia. Nella quale perciò, dopo molte fatiche da me sostenute, non solo per ageuolar le materie con chiaro metodo, e breue, all'intelligenza de' discepoli poco esperti dell'Italiana fauella; ma per dar'anche fuori qualche mia particolare inuentione, mi è non sò come riuscito di comporre alcune Opere, che partitamente la Machina tutta di così alta scienza discuoprono. Contiene la Prima, in cui le fondamenta si gettano, gli Elementi di Euclide, da me nella primiera lor giacitura restituiti, e confermati con quelle pruoue, di che specialmente i principij delle Parallele, e delle Proportioni hauer bisogno fin qui si è creduto, ancorche la pruoua dependesse dagli antecedenti, e noti principij, non sò in che modo da tanti celebrati Scrittori non mai auuertita, non senza qualche scherno di Euclide, che per questo difetto in più forme, che il fauoloso Proteo, si è lasciato vedere. Hora questi Elementi, che primi nell'ordine sono, e primi parti del mio debile ingegno, consacro humilmente al Nome sempre Inuitto di V.M. ed à i raggi del suo profondo intendimento gli espongo. ch'è quan-

to dire gli espongo alla publica luce, quando dal suo gradimento quello anche dipende dell' Vniuerso . Con questo così tenue tributo io non presumo però di satisfare, ne pure in picciola parte all'infinito debito, in che mi veggio costituito dalla sua Regia Beneficenza; sapendo io bene, che appresso la M.V. la stessa satisfactione, se sia gradita, riceue tanto di grazia, che si conuerte in debito, e che il debito stesso è così prezioso, che di qualunque satisfactione è maggiore . Ma poiche la presente Opera quanto fa più apparire la sua Verità per la mia poca industria, tanto può esser più esposta all'odio altrui, ed all'inuidia, io solamente intendo di stabilirla sotto il potentissimo Patrocinio della M.V. che coll'eccelsa prerogatiua di Primogenito della Chiesa, e di Promotor zelantissimo della Religione, quella ben giustamente vanta frà l'altre di perpetuo Difensore della Verità . Difenderà ella nel tempo stesso la Matematica tutta, la quale dalla Verità de' suoi principij appunto questo nome à tutte l'altre discipline commune meritare hà potuto . E difenderà con merauiglia vniuersale lo stesso Euclide,

quasi

quasi dalle tombe di Megara risorto , non tanto forse per vendicar le proprie offese, quanto ambizioso di viuere anch'egli con tanti Eroi Letterati sotto gli auspicj di V. M: che il presente secolo hà reso già co'suoi fatti egregij sopr'ogn'altro memorabile à posterì, e gli angoli più remoti della terra , hà con gli applausi empiuto delle sue glorie immortali. Si degni dunque la M. V. di accoglier con lieto ciglio , questa ancorche lieue dimostrazione del mio riuerentissimo ossequio; giachè (se grata non le fia, come al comodo della guerra insieme, e della pace ordinata) il riflettere in mezzo alle sue più alte occupationi alle cose più humili, non è disdiceuole à quella fortezza, che vnicamente risplende nell'animo suo, e che sola per eccellenza, fù dagl' Antichi appellata Virtù. Ed à V. M. profondissimamente m'inchino.

DI VOSTRA MAESTA'.

Humilissimo, e diuotissimo Seruo.

Vitale Giordani.

SEBASTIANO MATTEI

A L LETTORE.



L *Matematica, che Platone annouerò frà le parti primarie della sua Philofia, hebbe in ogni fecolo quella prima Veneratione, con la quale i Sacerdoti antichi dell' Egitto s' eleuarono alle supreme dignità della Republica, mentre nell' Oriente, e nell' Oltro s' apprezzaua la razionalitè, ed erano tenuti, e reputati Sauj, Maghi, Bragmani, e Gimnofophifti quegli huomini, che dimoftrauano le cife per le loro caufe formali, come de' Matematici diffe Auerroe; e però quefta fcienza appreffo i Greci s' inalzò col nome di Dottrina, e Difciplina, quafi per Antonomafia, che altro non voglion fignificare le voci Mathefis, e Matbema. Effa lafciate le confiderationi di buono, e male appartenenti alla morale, e gli eftremi di materialità, ed aftrazione proprij della Fifica, e Metafifica, fi contentò della ftrada media per dedurre, e dimoftrare le paffioni più importanti del fuo obietto, cò'è la quantità, non da primi generi, ne dall' ultime formalità, fecondo Proclo, ma da mezzj così proportionati, che le dimoftrazioni Matematiche non poffono contradirfi per la loro euidenza; e fù forzato Platone à dire, che bauena quefta Dottrina fortito una ottima, e perfetta natura; ed Aristotele, emulo della fetta Megarenfe, quando volle ridurre à perfezzione la fua Philofofia rationale, altro non fece, che una Matematica delle operazioni intelleffiuè, dirette, e refleffè; e mentre procuraua sfuggire la materia, inciampò nella forma della fcuola contraria, per verifarfi la dottiffima cenfura di Filone, qui Mathematicam appellauit fcientiam vniuerfalem, quod hæc rerum intelligibilium imagines, verique veltigia tanquam in Polyteffimo Speculo demonffret, nientemque purgatam paulatim abducatur à fenfu. Quindi è, che gli Affrij colle figure Geometriche, e Pitagora co' i numeri, procurauano fciogliere i Fenomeni più difficili, e gli arcani della natura; e Platone fcriffe in modo Matematico la fua Philofofia; anche la parte Morale, e Politica, e i libri della Republica.*

L' origine di quefta fcienza fù creduto nell' Egitto, ed è fama, che Talete Milefio la trasportaffe in Grecia da quella celebre Prouincia,

doue

Auer. 1.
phil.com. 1.

Lib. 1. cap.
1. fup. 1. Eucl.

Erafm. in
Adag.

1. de Cel.

Socr. in
Memnone.

Hypoc. sec.
1. sph. 1.

Iosep. lib. 1.
ant. q. Iud.
cap. 3.

P. Ramus
lib. 1. procem.

Pier. Valer.
lib. 10. pag.
mhi 90.

doue ò per la potenza della Monarchia, ò per l'inclinazione de' Principi, che sauioriuano i Matematici con bonori, e stipendij, ò sia per la necessit  de' Popoli costretti   professare la Geometria per l'inondationi del Nilo, fiori pi  che in nessuna altra parte del Mondo; per  il Filosofo di Stagira credeua, non senza improbabilit , che anco le scienze, come le pi  cose dell' Vniuerso, si riuolgeressero col moto del primo mobile, e gli parue facile sapere le loro vltime digressioni, e difficilissimo affermare cosa di certo nelle sue prime progressioni, quantunque molti habbiano scritto degl' inuentori dell' arti, e delle scienze; quasi nel suo senso disse, che ebbero principio, e col Mondo, e col moto. E s  sentenza di Socrate, poiche tutte le Dottrine, principalmente le Matematiche risiedono nella parte cogitativa dell' anima, se   vera la Filosofia Pitagorica, e Platonica, che il sapere sia ricordarsi l'buomo delle sue ragioni, e cos  sempre, ch' il Mondo s  popolato d'buomini,   credibile fosse anche adornato, ed arricchito di scienze, le quali sono, senza dubio, proportionate all' intelletto, perche la Verit  consiste in una sola conformit  indiuisibile dell' atto all' obbietto, ancorche il modo sia lungo, e diffuso, comparato alla breuit  della nostra vita. N  discorda questa Dottrina dalle comuni opinioni, mentre tutti i Dottori di Santa Chiesa, e pi  interpreti delle sacre carti affermano, ch' il nostro primo Padre s  dottissimo in qualunque scienza, dal quale si trasfuse ne i successori, tanto che i figlioli di Seth, nepoti di Adamo, lasciarono le figure Astronomiche auanti del diluuio impresse in due colonne, e rimasero le vestigia fino   tempi di Giosepe Hebreo. Da qu    che i Chaldei, Mesopotamij, ed Assirij furono nelle Matematiche peritissimi in guisa tale, che Aristotele altro non impose   Callistene suo familiare, il quale diede per compagno ad Alessandro mentre partiu  per l' Asia, se non che gli trasmettesse dagli Archiuij di Babilonia, quando fosse espugnata quella Citt , tutte le Astronomiche offeruazioni de' Chaldei, che si trouarono fatte per lo spatio di tr  mila nouecento, e tr  anni. Gli Egizij finalmente nell' Africa si conobbero deuoti, ed in un certo modo superstitiosi de' Matematici, ne contenti delle dimostrazioni de i Reinalzarono ne i tempj, ed altri luoghi publici,   scolpito,   dipinto l' animale Orige, ch' era figura del Matematico.

Ne pare improbabile, che dall' Asia, e dall' Africa si transfondesse nell' Europa, doue similmente questa scienza s  venerata come Diuina, non che professata, e seguita come humana; ed i Matematici stimati felici, e pi  che buomini, cant  Ouidio nel primo de' fasti.

Feli-

Felices animæ, quibus hæc cognoscere primis;

Inque domos superas scandere, cura fuit.

Credibile est, illos pariter vitijſque, iocifque

Alius humanis exſeruiſſe caput.

Ma che Talete Mileſio foſſe il primo Geometra frà gli Aſſirij mi pare difficiliſſimo, ed improbabile, perche Euforbo Frigio, e Palamede Greco, che fioriuano nel tempo della guerra Troiana, laſciarono in carte non poche opere piene di figure Geometriche; e Talete viſſe dopo centenaſa d'anni intorno al 580. auanti la noſtra redentione; e ben vero che de i primi, ò per l'ingiuria de' tempi, ò per l'incuria de i Scrittori, non ſi legge, che hauueſſero ſeguaci, come Talete, il quale fù imitato da Pitagora Samio, Anaſſagora, Clazomene, e ſucceſſiuamente da i migliori Filoſofi del Peloponeſſo fino al ſecolo d'Euclide, che riduſſe la Matematica à tutta perfectione.

Di queſto Autore dubitano, ed anco ne fanno lunghe diſcuſſioni i Commentatori, ſe fù il Principe della Setta Megarenſe, ò altro Geometra celebre negli anni ſeguenti, perche del Megarenſe ſi ſa, che nell'infanzia d'Aleſandro occupò la Catedra ad Ariſtotele, quando paſſaua legato degli Atenieſi in Perſia, e del Matematico ſi legge, che fù familiare à Tolomeo primo Rè d'Egitto. ma in venticinque, ò trenta anni ſoli di differenza non sò per qual ragione non poſſa eſſere il medefimo giouane nel tempo d'Aleſandro, ed antiano in quel di Tolomeo; in qualunque modo, eſſo fù il Geometra più inſigne frà tutti quelli, de quali rimane la memoria nella noſtra età. S'accorſe che Socrate Geometrijm diſcendam eſſe aiebat, donec quis poſſit, & vſus ita ferat; che Platone non accettaua diſcepolo alcuno nell'Accademia auanti d'hauer inteſo i principj Geometrici, per li quali paſſauano tutti i Filoſofi della Grecia come per conſuetudine antica, e compreſa la neceſſità della Matematica, ò moſſo dal delectabile della parte ſpeculatiua, e dall'vtile della prattica, s'affaticò à cercare un modo, che nè la rendeſſe oſcura per la breuità, nè improporcionata per la diſfuſione, e lo trouò tale, che domandato dal Rè Tolomeo ſe vi era altra ſtrada più breue, e più facile, riſpoſe, Nullam eſſe aliam viam regiam. Conobbe che l'Aritmetica, e la Geometria ſono le parti principali della Matematica, e che per meritar nome di Matematico è neceſſario eſier buon Geometra, e dimoſtrare geometricamente tutte le coſe, che cadono nell'arte, e però ſenſa ſparmiar fatica ſcielſe quelle dimoſtrazioni, che conduceuano al ſuo fine, con tale artificio, che ſe vna ſola ne mancaſſe, preci-

più-

Proc. sup. 1.
Eucl. cap. 5.
lib. 2.

pitarchbe il bello, ed ammirabile di questo Colosso, mentre si scorgono le susseguenti cose concatenate con l'antecedenti, che mal potrebbe la terza senza la seconda, e questa senza la prima dimostrarsi.

E ancorche quasi tutti dopo d'Euclide studiarono di trouare noui modi, d'inuertendo l'ordine de' libri, o tralasciando alcune proposizioni, e reducendole a Corollarij, o aggiungendone delle noue, non ostante è certissimo, che questi buomini insigni hanno arricchito di bellissimi pensieri le buone lettere, ma non sò se apportano utile sì grande agli studiosi, come s'esperimenta dagl'Elementi d'Euclide. Essi ritengono quella ammirabile disposizione, che nota Proclo, le di cui parole sono: Elementaris verò iplius perita: Geometricarum rerum contemplationis institutio inuincibilem, perfectamque habet enarrationem, dalle definitioni, da i Postulati, e dagli Assumi, che sono quei semplicissimi principij, ne i quali si fonda tutta la struttura Matematica, procede alla proua di proposizioni semplici, che chiamaua Elementi, e seruuono come di mezzj termini per dimostrare le cose più difficili, e più composte; diuise tutta l'opera in quindici Elementi, nel primo de' quali tratta della generatione de' triangoli, e parallelogrammi, dell'ugualità degli angoli, de' lati, e loro superficie; nel secondo dimostra le passioni, e proprietà, che accadono alla retta linea Variamente diuisa, ed assegna la differenza di quanto il quadrato d'un lato del triangolo obliquangolo supera, o manca da i quadrati degli altri due lati; nel terzo manifesta le passioni delle rette tirate nel circolo, e degli angoli, ed archi, che contengono; nel quarto s'espongono l'inscrizioni, e circoscrizioni de' Poligoni regolari nel circolo; nel quinto compara le proportioni, che cadono frà le grandezze in genere; nel sesto dimostra le proportioni de' piani rettilinei, e loro lati, introduce la compositione delle proportioni, e dichiara la proportion de' archi, ed angoli ne i circoli uguali; nel settimo parla delle passioni, e proportioni de' numeri primi, e composti secondo i varij modi di misurarsi; nell'ottauo proua varie passioni de' numeri proportionali, simili, e de' loro lati; nel nono manifesta le passioni de' numeri continui proportionali, pari, e dispari; nel decimo le passioni delle quantità rationali, ed irrationali; nell'undecimo spiega la generatione de' corpi solidi, loro similitudine, e la proportionalità de' parallelepipedi; nel duodecimo fa la comparatione della proportion de' circoli a quella, che cade frà i quadrati de' loro diametri, de' simili Poligoni inscritti in essi, e la proportionalità delle sfere, Piramidi, Coni, e Cilindri; e nel decimoterzo assegna varie passioni, che acca-

dono

dono alla linea diuisa secondo l'estrema, e media proportione, fa la generazione di cinque corpi regolari, li comprende nella data sfera, compara il diametro della sfera à i lati de' corpi regolari iscritti, e i medesimi lati frà di loro. L'Elemento decimoquarto, col seguente, alcuni ò per la consonanza della materia, ò per la similitudine della forma, l'attribuiscono ad Euclide, altri ad Ipsicle Alessandrino, di che si parla nel principio d'esso libro, e nel discorso si legge la comparatione del Dodecaedro all'Icosaedro tanto in solidità, quanto in superficie; e finalmente nel decimoquinto si vede la scambieuole iscrizione de i corpi regolari frà di loro.

Sò che si potrebbe auanti ogn'altra cosa trattare delle proportionalità, cioè similitudini delle proportioni nelle grandezze in genere facendone il primo Elemento, quasi indipendente dagl'altri, ma se si considera bene la disposizione data da Euclide à questi Elementi, in nessun altro luogo fuorchè nel quinto poteuano meglio collocarsi, stante che la proportionalità è del genere de' relatiui, mentre risulta dalla comparatione di due, ò più proportioni frà loro; on le prima di superfi, che cosa è quantità, e che cosa è figura, e prima di concepirsi il modo della comparatione, e la relatione frà due sole grandezze, mal potranno scorgersi le proportionalità, che frà più di due quantità accadono; e perciò con grande artificio Euclide, conoscendo che l'intelletto humano procede da i noti à i men cogniti, da i principij alli principjati, da semplici à composti, e dagl'assoluti à i relatiui, prima d'ogn'altra cosa, spiega la generatione della quantità, e delle figure più semplici, e comparandone due per volta, come fa ne i primi quattro Elementi, con le voci d'uguale, duplo, triplo &c. insinua il modo della comparatione, con che viene ad introdurre una certa abilità à potersi poi più facilmente concepire la natura delle altre relationi meno semplici, come sono le comparationi delle proportioni frà loro spiegate nel quinto Elemento; e ritenendo sempre il medesimo ordine, nel sesto Elemento introduce la compositione delle proportioni, ed in questa forma dalla comparatione frà due sole quantità, che è la semplicissima, passa alla comparatione delle proportioni frà loro, che è la meno semplice, e da questa s'inoltra alla compositione delle proportioni, che è la composta. Del medesimo modo il settimo Elemento, che pare si regga da per se, non poteua occupar altro luogo, ò perche regge i seguenti Ottauo, Nono, e Decimo, ò perche i numeri, che posson considerarsi come linea, superficie, e corpo, sono medij di participatione frà piani, e solidi, e doucuano frà essi con-

stittuir-

stituirsi, e collocarsi; quindi è che l'Vndecimo, e Duodecimo; ancorche dipendano da i primi sei, e non da i quattro intermedi, si serbarono all'ultimo, e riuscì felicemente per la commodità di continuare il trattato de' solidi ne i libri consecutui.

Procl. sup. 1.
Eucl. lib. 2.
cap. 5.

E però il Signor Vitale Giordano, Autore di quest'Opera, Geometra celebre fra i migliori della nostra età, dopo lunghe fatiche fatte nello spatio di ventiquattr'anni, hauendo aggiustato vn Corso Matematico,oue pienamente si tratta non solo la parte Teorica, però anche la pratica utilissima alle indigenze della vita humana, gli parue in questo primo Tomo degli Elementi seguitare il bell'ordine d'Euclide, col quale il Megarense si rese ammirabile al Mondo, come disse Proclo: *Præcipue verò circa Geometricam elementorum institutionem eum quispiam admirabitur propter ordinem, & electionem eorum, quæ per elementa distribuit theorematum, atque problematum; etenim non ea assumpsit omnia, quæ poterat dicere, sed ea dumtaxat, quæ elementari tradere potuit ordine.* E perche ne anche nel nome discrespasse dal suo Antefignano, volle al volume dargli quello d'Euclide restituito, hauendolo restituito al suo pristino splendore, e con tal chiarezza, e facilità spiegato, che ogni principiante potrà goderlo senza interpretatione di Maestro alcuno. Del Signor Vitale, senza adulazione può dirsi, Quod totam artem prudentissimè, ac planissimè tractatam, admirabili, ac penè diuina demonstrandi facilitate completatur. Vedonsi spessi luoghi appartenenti ad altre parti della Filosofia addotti con ogni grauità, ornati d'elganza, sfugge sempre la temeraria consuetudine di biasimare i Scrittori, anzi loda i celebri, e compatisce i deboli, e adducendo le sue ragioni, persuade colla verità più tosto, che con artificio; non dice tutto quello, che poteua dire, ne tralascia tutto ciò, che altri hanno tralasciato, ma ben si adduce quel che appartiene alla materia d'Elementi. Rimoue affatto tutti i principij, che non sono per se noti, ò che non possono senza immensa fatica dimostrarsi, come improprij dell'istituto Matematico; commuta la definizione delle parallele in altra atta à spiegare la loro propria natura; dimostra qual positione debbano hauere le rette, che distese in vn medesimo piano, e continuate in infinito mai scambievolmente s'auuicinano, ne si scostano, e dopo la proposizione 26. del primo Elemento, comparando la linea retta alla curua, e conoscendo esser impossibile, che vna retta sia parallela ad vna curua, senza turbare in cosa alcuna l'ordine d'Euclide, con quel solo principio dimostra tutti gli Elementi delle

paral-

parallele, proua il postulato, ch'è quinto in Procla, Campano, e Com-
mandino, ed assuma 13. nel commento di Clauio. Conuince le oppo-
sizioni fatte ad Euclide sopra i principj della proporzione, e sostenendo
la 6. definizione del quinto Elemento, dimostra, che si danno quattro
grandezze in natura, delle quali presi gli uguali multipli della pri-
ma, e terza, secondo qualunque multiplicazione, e presi gli uguali mul-
tiplici della seconda, e quarta, parimente secondo qualunque multipli-
cazione, sempre gli uguali multipli della prima, e terza, o superano,
o sono uguali, o minori degli uguali multipli della seconda, e quarta;
e riuoltosi al principio, che riguarda la composizione delle proporzioni,
materia, o non toccata o infelicamente trattata dagli altri, dopo la de-
cima ottaua proposizione del sesto Elemento, dimostra, che di quante
grandezze si vogliano la proporzione della prima all'ultima è compo-
sta delle proporzioni intermedie, e dopo facilmente conuince, che di
quante grandezze si vogliano continui proporzionali, la proporzione
della prima all'ultima è multiplice della proporzione della prima alla
se conda per uno meno il numero de i termini continui proporzionali.

Alla pubblicazione di questa utilissima opera resistea inuincibilmen-
te la naturale modestia dell'Autore, ma non meno le di lui gravissime
occupazioni cagionateli dalla quotidiana lettura priuata in sua casa, e
pubblica nella Reale Accademia stabilita dal Rè Cbristianissimo in Ro-
ma, le quali non lasciandolo un momento di tempo respirare, non che
a potersi impiegare in altra cosa di rilievo, giustificauano la sua impos-
sibilità di attender alla perfezione di quest'opera necessaria, come esso
diceua, per poter uscir alla stampa. Ma non cessando io di combattere
colla mia importunità la di lui renitenga, l'indussi alla fine a cedere al
mio desiderio, anzi al publico beneficio; l'ottenni però con una condi-
zione a me indispensabile da lui prescritta, di douermi io precisa-
mente prender la cura, ed il peso di darle quell'ultima perfezione, la
quale esso stimaua necessaria per la stampa, e per la quale si dichiaraua
inabilitato dalle predette sue occupazioni. Conoscendo però io essere
quest'opera già ridotta dall'Autore a segno, che poco, anzi nulla vi
mancava per quella perfetta forma, che esso richiedea, accettai di
buon animo l'incumbenza, la quale perciò da me facilmente adempiu-
ta, stabili in poco tempo la pubblicazione di quest'opera; questa, o Cor-
tese Lettore, per tuo maggior utile, e minor incomodo, volli aggiun-
gere del mio la presente prefazione per renderti con essa instrutto (pri-
ma di obligarti a tutta la lettura del Volume) dell'ordine, e qualità

delle

delle materie, ch' in essa si trattano, credendo io di poter ciò fare, se non più elegantemente, almeno più esattamente d'ogni altro, sì per esser à quest' hora sopra venti anni, che come discepolo, e amico godo familiarmente della conuersazione de' suoi pensieri, e de' suoi studi, come ancora per il dett' obbligo dall' Autore impostomi, e da me religiosamente adempito, di hauarla à riuedere attentamente più volte prima di consegnarla alla stampa; intorno alla quale, con l'aiuto di molti amici, ottenni ancora dall' Autore; per lo stesso fine di seruire alla maggior tua commodità, ed utilità, che te la concedesse nel nostro volgare idioma Italiano, perche essendo questo copiosissimo, e bastante à spiegare in qualunque scienza con somma facilità, e felicità tutt'i concetti del nostro intelletto; già nell' auuenire non parrà necessità miserabile, ma più tosto consuetudine antica, d' assuefazione degli huomini quella di fraudare gli anni migliori della vita allo studio della Filosofia, per impiegargli nella grammatica delle lingue Greca, e Latina.

Io non saprò spiegare l'utile grande, che apporterà quest' opera à tutti gli affectionati alla facoltà Matematica meglio, che con le parole di Dionisio Lambino, parlando di Cicerone à Carlo Rè Christianissimo: Quantum autem ex omnibus operibus fructum percepturi sumus ex eo cognoscere licet, quod ex hoc volumine tantam ad litterarum studiosos utilitatem peruenire videamus. Da per sè medesimo dichiara questo primo Tomo il comodo grande, che deuono apportare gli altri, quali sono già in ordine per seguire la stampa, se tu gradirai, e la buona intentione dell' Autore, e la mia passione di giouarti, e seruirti, la quale douera scusarmi, o farmi compaire di qualunque eccezione, che per qualsiuoglia riguardo possa mai trouarsi in quest' opera, come prouenuta per mio solo difetto, sì come deuetsi alla gloria dell' Autore tutto ciò, che vi trouerai di buono. Viui felice.

Imprimatur,

Si videbitur Reuerendis. Patri Magistro Sacri Palatij Apostolici.

I. de Ang. Archiep. Vrb. Viceg.

Imprimatur,

Fr. Raimundus Capifuccus, Sacri Palatij Apost. Mag. Ord. Præd.

CHE

CHE COSA SIA MATEMATICA,

E quali sieno le sue parti.



MATEMATICA chiamiamo tutta quella parte di Filosofia, che riguarda la quantità.

Due generi di quantità hà per oggetto la Matematica, cioè la quantità continua, e la quantità discreta.

Qualunque estensione si chiama quantità continua, ed ogni moltitudine si dice quantità discreta.

La quantità continua si divide in tre generi d'estensioni. La prima è quell'estensione, che costituisce lo spazio. La seconda è la duratione, che volgarmente vien chiamata tempo; e la terza è il moto successivo, che si dice moto perenne.

Quindi è, che la quantità continua cade sotto la nostra cognizione, alle volte come cosa mobile, ed altre volte come cosa immobile; cioè la consideriamo immobile quando ci forma lo spazio, e mobile, quando la consideriamo come tempo, o moto successivo. Li Matematici però, benché intendano per quantità continua l'estensione materiale, contuttociò la considerano astratta, cioè disgiunta, da ogni materia.

La quantità discreta si considera, o assoluta per se, ouero comparativa ad altra cosa.

Assoluta per se s'intende, quando quella moltitudine o è considerata in astratto, come se si proferisse cento, mille &c. senz' altra espressione; ouero è considerata in concreto, cioè applicata à qualche oggetto, come se dicessimo, trenta Navi, mille huomini &c.

Comparativa ad altro s'intende, quando quella moltitudine è comparata al suono, o voce &c. come succede nelle cose della musica.

Finalmente la quantità si divide in quantità razionale, ed irrazionale.

Razionale si dice quella quantità, della quale, rispetto à qualche misura, se ne possono esprimere le parti; e quella quantità, della quale, in riguardo à qualche misura, non se ne possono esprimere le parti, si chiama irrazionale.

La Matematica si divide in quattro generi di Dottrine, cioè Geometria, Aritmetica, Armonica, ed Astronomia.

La Geometria è scienza, la quale, col mezzo d'alcuni notissimi principij, dimostra tutte le passioni, o proprietà, che accadono alla quantità continua immobile; onde insegna anco à misurare la grandezza della Terra, e di tutte l'altre cose materiali.

L'Aritmetica è scienza, che riguarda la quantità discreta, cioè la moltitudine assoluta per se, si rivolge intorno alle passioni numeriche, ed esplica l'arte di ben coneggiare.

L'Armonica è scienza, che riguarda la quantità discreta, cioè la moltitudine comparatiua ad altro, considera, ed esplica l'Armonia, ò concento sonoro.

L'Astronomia è scienza, che considera le passioni della quantità continua mobile, esplica, e dimostra l'apparenze, e moti de' Corpi Celesti.

Annotatione.

Perchè, come s'è detto, la quantità si diuide in quantità continua, e discreta, delle quali la continua si distingue in mobile, ed immobile, e la discreta in assoluta per sè, e comparatiua ad altro; hauendo gl'Antichi Matematici considerato nella quantità questi quattro accidenti, vollero, che la Matematica si diuidesse in quattro soli membri; cioè, in Geometria, che riguarda la quantità continua immobile; in Aritmetica, che riguarda la quantità discreta, ò moltitudine assoluta, per se; in Armonica, ò Musica, che riguarda la quantità discreta comparatiua ad altro; ed in Astronomia, che considera la quantità continua mobile: Questi quattro membri, ò parti (ciascuna delle quali riceue altre subdiuisioni, come à suo luogo si dirà) si diuidono in speculatiua, e pratica.

La speculatiua è quella, che riguarda solamente la dimostrazione delle cose; e la pratica è quella, che riguarda semplicemente l'operatiua.

La Dimostrazione ò è Theorematica, ouero Problematica.

La Dimostratione Theorematica è quella, che ne certifica delle passioni, ò proprietà d'vna, ò più quantità in qualche modo esposte, ò scambievolmente adattate; laonde il Theorema non è altro, se non, che la dimostrazione da farsi in qualche cosa proposta, secondo vna data Ipotesi.

La Dimostratione Problematica è quella, che ci rende certi della possibilità di costruire qualche cosa proposta, e perciò il Problema è quello, che c'insegna à soluere, per alcune quantità date, qualche cosa proposta.

Delli Theoremi, e Problemi, alcuni si dicono elementi, altri elementari, ed altri ve ne sono separati dalla forza, e significato di questi.

Elementi si dicono quei Theoremi, e Problemi, che seruono per la costruzione, e dimostrazione dell'altre cose, cioè che sono come principij ordinati à dimostrare, e costruire altri Theoremi, e Problemi, e che, senza quelli, tutte le altre cose non si potrebbero costruire, e dimostrare.

Quei Theoremi, e Problemi si dicono elementari, li quali seruono alla costruzione, e dimostrazione di molte altre cose, ma non seruono così vniuersalmente per la costruzione di tutte l'altre cose, come si disse degl'Elementi.

Quel-

Quelli poi, che non seruono per la costruzione, e dimostratione di più cose, nè dimostrano qualche cosa di cospicuo, sono fuori di questo nome elementari.

Doppo d'hauer definito, che cosa sia Theorema, e Problema, parmi à proposito, prima che si entri in altro, definire, che cosa sia Lemma, Scolio, Corollario, Porisma, Deduttione, Caso, ed Istanza.

Il Lemma è vn premezzo, che si fa in agiuto alla propositione seguente.

Quando, in agiuto di qualche propositione di materia particolare, si bisogno premettere qualche Theorema, o Problema, che tratti d'altra materia, quel premezzo da Matematici vien chiamato Lemma.

Lo Scolio denota vna breue esposizione, o interpretatione, ed alle volte qualche aggiuntione all'antecedente propositione.

Il Corollario è vna certa conseguenza, che si caua da quel che si è dimostrato nella propositione antecedente, diuersa da quello, che si è concluso in essa propositione.

Porismi, secondo gl'Antichi, sono certe propositioni, che si possono esporre in forma di Problemi, ed anco in forma di Theoremi; non sono assolutamente Problemi, ne meno Theoremi, ma tengono misto significato, che possono denotare, e l'vno, e l'altro.

Secondo i Moderni poi, per Porisma si prende qualche conclusione, che si caua dal problema risoluto, la quale non hà niente di commune con quello, che s'è proposto, e si prende come Theorema certo, e dimostrato.

La Deduttione, nel Problema, è il passaggio, che si fa dal proposto ad vn altro Problema, il quale serue di mezzo per la solutione del Problema proposto.

Il Caso è la traspositione della costruzione, o dimostrazione.

Nè i Problemi, e Theoremi, qualche volta vna cosa può accadere in varij modi, e perciò, secondo vn modo, si fa la costruzione, e dimostrazione, che si richiede, come à suo luogo si dirà; e di nuouo, per ogn'altro modo, si fa parimente la costruzione, e dimostrazione, che per lo più è differente dall'altra, e così verrà dimostrato quanto s'è proposto, secondo tutti i varij modi, e questi modi varij sono quelli, che si chiamano casi.

L'Istanza è quella, che impedisce tutt' il corso dell'oratione, opponendosi o alla costruzione, ouero alla dimostrazione, la quale non deue essere riceuuta per vera, ma bisogna rifiutarla, e dimostrare, che sia falsa.

Premezza la cognitione di quanto s'è detto, parmi tempo di dare principio alla spiegatione degl'Elementi d'Euclide, per esser quelli la base di tutto questo nostro corso di Matematica; e per procedere coll'ordine del medesimo Euclide, spiegheremo prima tutti li principij necessarij per l'intera cognitione di questi Elementi, i quali si diuidono in tre generi, cioè, Definitioni, Postulati, & Assiomi.

Definitioni si chiamano, in Matematica, quei principij, che spiegano la natura delle cose, e li vocaboli dell'Arte.

4
Quei principij, li quali sono per sè tanto noti, e chiari, che non hanno bisogno d'alcuna dimostrazione, si che sono conceduti da tutti per veri senz'alcuna dubitatione, si dicono Postulari.

Gli assiomi, ò comuni sentenze, sono certe cognitioni dell'animo, che non solo in Marematica, ma in tutte l'altre Dottrine, sono talmente manifeste, & euidenti, che, chiunque ne concepisce rettamente i vocaboli, per nissuna ragione può dissentire, e non riccuerli come veri, e reali,



EVCLIDE RESTITVTO

DA

VITALE GIORDANI

ELEMENTO PRIMO.

DEFINITIONI.

I.



IL PVNTO è quello, che non hà parte alcuna, cioè, che non occupa spatio alcuno.

I I.

La linea è vna lunghezza senza larghezza.

I I I.

Gli estremi della linea sono punti, cioè, la linea terminata comincia dal punto, e finisce nel punto.

I V.

Di tutte le linee, che si possono stendere da punto à punto, la breuissima si chiama linea retta.

Quella poi, che non è la breuissima, si chiama linea curua.

V.

Superficie si chiama quella, che hà solamente lunghezza, e larghezza, ouero il flusso laterale della linea si chiama superficie.

V I.


Gli estremi della superficie sono linee.

Perche la superficie è il flusso laterale, ò trasuersale della linea, perciò la superficie comincia dalla linea, e finisce nella linea; onde gli estremi della superficie sono linee.

V I I.

Quando vna retta linea è distesa; secondo tutte le positurè, sopra d'vna superficie, ed in ogni positura giace con tutte le sue parti in essa superficie, quella superficie, secondo Herone, la chiameremo superficie piana.


S'intenda qualsivoglia retta linea AB , distesa sopra la superficie Z , secondo qualunque positura; se tutte le parti della retta AB , sempre, ed in ogni positura saranno nella superficie Z , all'ora la superficie Z la chiameremo superficie piana.



VIII.

La scambievole inclinazione di due linee, poste in vn medesimo piano, e concorrenti frà di loro in modo, che nō siano nella medesima dirittura, si chiama angolo piano.

Siconcepiscano le due linee, BA , CA , poste in vn medesimo piano, e concorrenti in qualche punto A in modo, che non facciano una sola linea, ma l'una



sia inclinata all'altra: Hor quella scambievole inclinazione, cioè quell'apertura, che le linee BA , CA costituiscono nel punto A , si chiama angolo piano.

Quindi è, che la quantità dell'angolo non consiste nella lunghezza delle linee BA , CA , ma nella scambievole inclinazione, ò apertura, che costituiscono nel concorso A . Et è d'auuertirsi, che qualunque angolo piano si nota con tre lettere, come si vede nella figura, e quando si nomina, si fa col mezzo di quelle tre lettere, ponendo nel secondo luogo quella lettera, doue le linee fanno il concorso, cioè doue sia l'angolo, e così, volendo nominare vno dell'i notati angoli, si dirà l'angolo BAC , ò vero l'angolo CAB .

E anco da notarsi, che l'angolo non è lunghezza, né superficie, né meno corpo, ma è solamente il modo, col quale due linee sono scambievolmente inclinate; e l'angolo piano si dice essere maggiore, ò minore, secondo che l'inclinazione, ò apertura di quelle linee, che lo contengono, è maggiore, ò minore; e così diremo, che quanto la linea AC è più inclinata alla linea AB , tanto l'angolo si dirà essere minore; e, quanto sarà meno inclinata, tanto l'angolo BAC si dirà essere maggiore.

Oltre à ciò intendasi tirata la retta AD in modo, che faccia qualche angolo con la retta AC , la medesima retta AD farà angolo con la retta AB , donde è manifesto, che la retta AC , diuide l'angolo DAB nelli due angoli


li BAC , CAD , e perciò l'angolo di natura sua è divisibile; hor se l'angolo è divisibile per necessaria conseguenza sarà ancora quantità, e stimo tanto difficile a poter si concepire, che il divisibile non sia quantità, per quanto è difficile ad intendere, che l'indivisibile sia quantità: concludiamo dunque, che l'angolo benché non sia lunghezza, non superficie, né corpo; con tutto ciò essendo cosa divisibile non può lasciare di non essere quantità.

I X.

Quell'Angolo, ch'è contenuto da linee rette, si chiama angolo rettilineo.

Quello ch'è contenuto da linee curve, si dice angolo curvilineo; e quello, ch'è contenuto da una retta, e da una curva, si chiama angolo misilineo.

Nella figura seguente, l'angolo BAC , contenuto dalle rette BA , CA , si chiama angolo rettilineo, l'angolo DEF , contenuto dalle curve DE , FE , ouero DA , FA , si dice angolo curvilineo; e l'angolo GHI , contenuto dalla




retta HI , e dalla curva GH , si chiama angolo misilineo. Oltre a ciò, quando l'angolo è contenuto da una linea curva, e da una linea retta, e la retta continuata non sega in modo alcuno la linea curva, quell'angolo si dice angolo del contatto, come l'angolo GHI della figura Z , ed il punto H si chiama punto del contatto.

X.

Se vna retta linea cade sopra d'vn'altra linea retta, e gli angoli, che fa dall'vna, e l'altra parte, sono frà di loro vguali, quelli si chiamano angoli retti; e la linea, che cade, si dice essere perpendicolare a quella, sopra la quale cade.

Cada la retta AB sopra la retta CD , e fa l'angolo ABD uguale all'angolo ABC , in tal caso gli angoli ABD , ABC , si chiameranno angoli retti, e la linea retta AB , si dirà essere perpendicolare alla retta CD .



Ango-


X I.

Angolo ottuso si chiama quello, ch'è maggiore del retto.

X I I.

Quell' angolo, ch'è minore del retto, si chiamerà angolo acuto.

Cada la retta AB sopra la retta CD , e faccia gli angoli ABD , ABC , fra di loro ineguali, cioè l'angolo ABD maggiore dell'angolo ABC ; se l'angolo ABD sarà maggiore d'un'angolo retto, lo chiameremo angolo ottuso; e se l'angolo ABC è minore d'un'angolo retto, quello si chiamerà angolo acuto.



X I I I.

Termine è quello, ch'è estremo di qualche cosa.

Il punto, ch'è estremo della linea, si dice esser termine della linea; la linea, che è estremo della superficie, si dice esser termine della superficie: ed il medesimo s'intende d'ogn'altra cosa.


X I V.

Figura si chiama quella, ch'è contenuta da vno, o più termini.

Non tutte le cose, che hanno termini, si ebiamano figure; ma solo quelle, che sono circondate, e totalmente racchiuse dentro à i suoi termini.

o. g. la linea AB , è terminata dalli pun-

ti A , & B ; e perche questi non hanno estensione alcuna, perciò non possono circondare, e racchiudere la linea AB ; e, secondo il senso della definizione, la linea AB non è figura. Similmente, la superficie ABC non è figura, stante che non è racchiusa tutta dentro alli suoi termini, ma è indeterminata verso AC . Figura, secondo Euclide, si chiama la notata Z , la quale è totalmente racchiusa dalla sola linea $GHJK$; come anco si chiama figura la notata X , la quale è totalmente racchiusa dentro i termini DE , EF , FD .




X V.

Il circolo è vna figura piana, contenuta da vna sola linea, che si chiama circonferenza, alla quale tutte le rette linee, che dal punto di mezzo vi cadono, sono frà di loro vguali.

In questa definizione Euclide c'insegna, che cosa dobbiamo intendere per circolo, e dice; ch'ogni qual volta s'hauerà vna figura piana, contenuta da vna sola linea, ebe chiameremo circonferenza, e tutte le rette linee, tirate dal punto di mezzo alla circonferenza, saranno frà di loro vguali, quella figura si chiamerà circolo: laonde, acciò che quella figura sia circolo, è necessario ebe habbia tre conditioni, cioè; la prima, ebe sia figura piana; la seconda, che sia contenuta da vna sola linea, come la notata ABC , la quale si chiama circonferen-

za; e la terza, ebe tutte le rette linee, come DA , DB , DC , tirate dal punto di mezzo D , alla circonferenza, siano frà di loro vguali. Quando si trouerà dunque vna figura, che habbia le tre antedette conditioni, quella si chiamerà circolo.



Il Signor Gio: Alfonso Borelli, imitando Euclide nella definizione della Sfera, pone la definizione del Circolo nel seguente modo.

La figura piana descritta dalla reuolutione d'vna terminata retta linea, intorno ad vno delli suoi estremi fissa immobile, fin che ritorna nel luogo d'onde parti, si chiamerà circolo, e la linea descritta dall'estremo mobile di quella retta linea, si chiamerà circonferenza di circolo.

Cioè, se concepiremo immobile vno degli estremi di qualunque retta DC , come l'estremo D , intorno al quale, nel piano $FGHI$, si reuolue la retta DC , fin che ritorna nel luogo, d'onde parti, sarà descritta la figura piana $ABCE$, la quale ha le tre conditioni antedette, cioè; sarà figura piana, stante che la reuolutione è fatta nel piano $FGHI$, sarà contenuta dalla sola linea $ABCE$, disegnata dall'estremo C , ebe si ebiam circonferenza, e tutte le rette DC , DA , DB &c. sono frà di loro vguali, poiche rappresentano la longhezza della retta DC in tutti i siti del piano $FGHI$, mentre nella sua reuolutione descrisse il circolo ABC .


X V I.

Quel punto, intorno al quale si riuolse quella retta linea, che descrisse il circolo, si chiama centro del medesimo circolo, che, nella figura antecedente, sarà il punto D .

XVII.

Ogni retta linea, che passa per il centro del Circolo, e termina con ambo gli estremi nella circonferenza del medesimo circolo, si chiama diametro del Circolo.

Per il centro E, del circolo ABCD, passi qualunque retta BED, e concorra con la circonferenza del circolo da ambe le parti in B, & D, sarà la retta BD quella, che chiameremo diametro d'esso circolo.



XVIII.

Il mezzo circolo ouero semicircolo è la figura piana, contenuta dal diametro, e da quella parte di circonferenza, detratta dal diametro.

Nella figura sopra notata, la figura piana contenuta dal diametro BD, e dalla linea BAD, ch'è parte della circonferenza, ouero quella, ch'è contenuta dal diametro BD, e dalla linea BCD, si chiama mezzo circolo.

In questa definizione tacitamente si suppone, ch' il diametro BD diuisa il circolo ABCD in due parti uguali, il che facilmente si potrebbe dimostrare in questo luogo, ma non essendosi per anco parlato della dimostrazione, per non turbare l'ordine d'Euclide, nell' esporne qui la definizione, che sopra s'è spiegata, se ne trasporta la dimostrazione dopo la terza proposizione del primo libro.

XIX.

Le figure, che sono contenute da linee rette, si dicono rettilinee; quelle, che sono contenute da linee curve, curuilinee; e quelle, che sono contenute da linee rette, e da linee curve, si dicono mistilinee.

Nella figura seguente, le notate A, B, & C, che sono contenute da linee rette, si dicono rettilinee; le notate D, E, & F, che sono contenute da linee curve, e rette, si chiama mistilinee.



X X.

Delle figure piane quella, ch'è contenuta da tre sole linee, si dice trilatero, ouero triangolo; come le notate *A, D, E*.

X X I.

Quella, ch'è contenuta da quattro linee, si chiama quadrilatero, o quadrangolo; come le notate *B, F*.

X X L I.

E se sarà contenuta da più di quattro linee, si chiamerà multilatero; come la notata *C*.

X X I I L.

Delle figure trilatero quella, che hà tre lati vguali, si chiama triangolo equilatero, come la notata *A* della figura seguente.


X X I V.

Quella che hà due lati vguali, si chiama isoscele, come le notate *R M Z*.

X X V.

E quella, che hà tutti tre i lati ineguali, si chiama scaleno, come le notate *X, ed E*.

Sin qui Euclide hà definito i triangoli per la comparatione de' lati, e conseguentemente li definisce per la comparatione degl'angoli.



X X V L.

Ogni triangolo, che haurà vn'angolo retto, si chiama triangolo rettangolo, come li notati *X, Z*.

X X V I L.

Se hauerà vn'angolo ottuso, si dirà ambliogonio, come il notato *E*.

B 2

E sc


X X V I I I.

E se tutti tre gli angoli faranno acuti, si chiamerà triangolo ossigonio, *come li notati A, R, M.*

D'onde è manifesto, ch'il triangolo scaleno può essere rettangolo, ed ambigonio; il triangolo isoscele può essere ambigonio, ed ossigonio.

X X I X.

Delle figure quadrilatera quella, che hà i quattro lati vguali, e tutti gli angoli retti, si chiama quadrato, *come la notata A.*



X X X.

Chiamasi quadrilungo quel quadrilatero, che hà gli angoli retti, e non tutti quattro i lati sono fra di loro vguali, *come la notata B.*

X X X L.

La figura quadrilatera, che hà tutti quattro i lati vguali, e non hà gli angoli retti, si chiama Rombo, *come la notata C.*

X X X I I.

Romboide si chiama la figura quadrilatera, che hà i lati opposti vguali, e gli angoli opposti vguali, non è equilatera, ne meno hà gli angoli retti, *come la notata D.*

X X X I I I.

Tutte l'altre figure quadrilatera, che non hanno le condizioni delle quattro antecedenti, si chiamano trapetij, *come le notate E, F.*

X X X I V.

Due rette linee, che sono in vn medesimo piano, e continuate dall'vna, e l'altra parte in infinito, in luogo alcuno mai scambievolmente s'auuicinano, ò allongano, le chiameremo Rette linee parallele.

Spiega Euclide la natura delle rette parallele, per la negatiua del loro scambieuolo concorso, come è manifesto da quel, che definisce con le seguenti parole.

Due

Due rette linee, che distese in vn medesimo piano, e continuate in infinito dall'vna, e l'altra parte non concorrono, si chiameranno rette linee parallele. *Ma perche si trouano alcune linee, le quali distese in vn medesimo piano, e, continuate in infinito, sempre scambievolmente s'auuicinano, e mai concorrono, benché queste ò sono due linee eurve, ouero vna linea retta, ed vna ecurua, come à suo luogo si dimostrerà, e le linee delle quali parla Euclide, sono linee rette; con tutto ciò, dandosi in Natura due linee in vn medesimo piano, le quali, continuate in infinito, sempre s'auuicinano, e mai concorrono, cade in dubio, se due rette linee distese in vn medesimo piano, e continuate mai concorrono, habbiano questa passione d'auuicinarsi, ò discostarsi scambievolmente nella loro infinita estensione, il che succedendo bisognarebbe fare concetto diuerso da quello, che habbiamo delle rette parallele: hor, ucciòche la definizione delle rette parallele non sia mancante, è necessario spiegarui la loro propria natura, che è di non auuicinarsi, ne scostarsi in nessun luogo della lor'estensione, e, secondo tal disposizione, diriggere il metodo alle dimostrazioni, attinenti agl'elementi di esse parallele; ed à quest'effetto, seguendo la sentenza di Posidonio, Gemini, e Proclo, ho stimato necessario mutare la definizione d'Euclide, ed, in suo luogo, porui la seguente. Due rette linee, che sono in vn medesimo piano, e, continuate dall'vna, e l'altra parte in infinito, in luogo alcuno mai scambievolmente s'auuicinano, ò allontanano, le chiamaremo rette linee parallele; se poi sia possibile, che si diano in Natura due rette linee come A B, C D le quali poste in vn medesimo piano, e continuate in infinito, in luogo alcuno della loro infinita estensione scambievolmente s'auuicinino, ne s'allontanino, lo dimostreremo à suo luogo.*


A ————— B

C ————— D

X X X V.

Ogni quadrilatero, che hauerà i lati opposti paralleli, si chiamerà Parallelogrammo.


Nel quadrilatero X, se i due lati opposti A B, C D, sono frà di loro paralleli, ed ancora gli altri due lati opposti A C, B D, sono frà di loro paralleli, il quadrilatero X, si chiamerà parallelogrammo.



X X X V I.

Quando in vn parallelogrammo è tirato il diametro, ò diagonale, e due rette linee, parallele à due lati di esso parallelogrammo, si segano scambievolmente in vn sol punto col diametro, in modo che sia diuiso il detto parallelogrammo in quattro parallelogrammi, de' quali i due, che sono segati dal diametro, si dicono stare intorno al diametro, e gli altri due, per li quali non passa il diametro, si chiamano complementi.


In ogni quadri-
latere, la retta ti-
rata da un angolo
all'angolo opposto,
si chiama diame-
tro, ouero diago-
nale, e consideran-
do il parallelo-
grammo ABCD, il
di cui diametro




AC, nel quale si concepiscano tirate le rette EF, GH, cioè EF parallela al lato BC, e la retta HG, parallela al lato CD, le quali si seghino scambiuolmente col diametro AC nel solo punto I in modo, che tutto il parallelogrammo ABCD sia distribuito in quattro parallelogrammi AEIG, IHCF, EBHI, GIFD, li due AEIG, IHCF, che sono segati dal diametro AC, si diranno stare intorno al diametro AC, e gli altri due EBHI, GIFD, i quali non sono segati dal diametro AC, si chiameranno complementi.

ANNOTATIONE.

1. Ogni lato di qualunque triangolo si può chiamare base di quel triangolo: si che, se le rette AB, BC, si chiameranno lati, la retta AC si chiamerà base; se i lati AC, CB, si chiameranno lati, la retta AB, sarà la base &c.



2. In qualunque triangolo, l'angolo opposto alla base si chiama angolo verticale; cioè, se la retta BC, la chiameremo base, l'angolo verticale sarà il notato A; e se la retta AB verrà chiamata base, sarà C l'angolo verticale.



Prolun-

3. Prolungato un lato di qualunque triangolo DEF , come il lato ED , verso G , l'angolo GDF si chiamerà angolo esterno, e li due angoli DEF , DFE , si diranno angoli interni, ed opposti, rispetto all'angolo esterno GDF .


4. Se due rette linee, come AB , CD , sono segate in qualunque modo da un'altra retta EF , tutto quello, che si vede dalla retta EF verso X , si dice essere da una medesima parte; e tutto quello, ch'è dalla retta EF verso Z , similmente si dice essere da una medesima parte.

Oltre à ciò, gli angoli CHG , BGH si dicono essere alterni: e similmente gli angoli AGH , DHG si dicono angoli alterni: l'angolo poi EGB , si chiama angolo esterno; e l'angolo GHD , interno, ed opposto, rispetto all'esterno EGB ; come anco gli angoli FHD , FHC sono esterni; e gli angoli HGB , HGA si dicono interni, ed opposti. Finalmente gli angoli BGH , DHG , si dicono interni, e dalla medesima parte X : come anco gli angoli AGH , CHG , sono interni, e dalla medesima parte Z .

5. Quando due linee rette, come AB , CD , si segano scambievolmente, in qualche punto E , gli angoli AEC , DEB , si dicono al vertice; e similmente gli angoli AED , CEB si chiamano angoli al vertice.

6. I cerchi, e circonferenze de' cerchi, si dicono segarsi scambievolmente, quando qualche parte dell'uno cade dentro dell'altro in modo, che habbiano una comune parte.

Si concepiscano i cerchi BFC , $DBEC$, talmente collocati in un medesimo piano, che qualche parte $BECF$ del circolo $DBEC$, cada dentro del circolo BFC in modo, che la porzione BFC sia parte comune; in tal caso i cerchi, e loro circonferenze BFC , $DBEC$, si diranno segarsi scambievolmente.



POSTULATI.

I.

Ci si conceda poter tirare vna retta linea da qualunque punto à qualsiuoglia altro punto.

II.

Chè vna retta linea terminata si possa continuamente, e direttamente prolungare.

III.

Che intorno à qualsiuoglia centro, e con qualunque interuallo, si possa descrivere vn circolo.

IV.

Che di qualunque quantità proposta sia possibile poterne immaginare, o prendere vn'altra maggiore, o minore.


ASSIO-

ASSIOMI.

I.

Quelle cose, che sono vguali ad vna terza, sono ancora frà di loro vguali; e se vna delle vguali è maggiore, ò minore d'vna terza, l'altra delle vguali sarà maggiore, ò minore di quella medesima terza.

Siano esposte le quantità A, B, C; se A sarà vguale à C, e la quantità B sarà vguale alla medesima C, sarà manifesto, che le quantità A, & B, sono fra di loro vguali. In oltre, se le



quantità A, & B, sono fra di loro vguali, ogni qual volta la quantità A sia maggiore di C, ancora B sarà maggiore di C; se A sarà minore di C, ancora B sarà minore di C.

I I.

Se à cose vguali s'aggiunghino cose vguali, ouero vna medesima cosa, gli aggregati, che ne vengono, sono frà di loro vguali.

I I I.

Se da cose vguali se ne detraggono cose vguali, i rimanenti sono frà di loro vguali.

I V.

Se à cose ineguali s'aggiungono cose vguali, gli aggregati sono ineguali.

V.

Se da cose ineguali se ne detraggono cose vguali, i rimanenti sono ineguali.

V I.

Le cose, che sono il doppio d'vna medesima cosa, sono frà di loro vguali.

V I I.

Quelle cose, che ogn'vna da per se è la metà d'vn'altra cosa, sono fra di loro vguali.

V I I I.

Le cose, che scambievolmente congruono insieme, sono frà di loro vguali.

I X.

Il tutto è maggiore della sua parte.


X.

Tutti gli angoli retti sono frà di loro vguali.

X I.

Se due rette linee sono segate da vn altra retta linea , e gli angoli interni da vna medesima parte sono minori di due angoli retti, quelle continuate concorreranno da quella parte, doue sono gli angoli minori di due retti.


Nella figura seguente, siano le rette AB , CD , segate dalla retta EF , e li due angoli BGH , DHG , insieme giunti, siano minori di due angoli retti, vuole Euclide per concesso, che le rette AB , CD , continuate vadano a concorrere verso X . E benché questo assioma habbia di bisogno d'esser dimostrato, con tutto ciò l'hò posto in questo luogo, per non turbare l'ordine d'Euclide, e la dimostrazione si può vedere dopo la proposizione 31. di questo Libro.



X I I.

Due rette linee non possono chiuder figura.

Le due rette AB , CB concorrenti in B non possono chiudere figura verso le note A , & C , senza distruggere il concetto delle rette linee: e benché questo assioma sia assai chiaro, con tutto ciò, per leuare ogni dubbio, se ne pone la dimostrazione dopo la terza proposizione di questo.



X I I I.

Vna medesima retta linea non può essere parte commune di due rette linee, che scambievolmente concorrono, e non sono nella medesima dirittura.

S'intendano le rette CB , DB , non nella medesima dirittura, le quali concorrono scambievolmente in qualche punto B ; se saranno continuate verso B , le loro continuationi non costituiranno la sola retta AB , in modo che AB sia parte di AC , e sia ancora parte della retta ABD ; il che tutto si dimostrerà dopo la terza proposizione di questo primo Libro.

Delle Parti, che compongono il Theorema, e Problema.

TVtti questi Elementi d'Euclide sono diuisi in Theoremi, e Problemi, de' quali i Theoremi riguardano la sola dimostrazione delle cose, ed i Problemi l'operatiua, e dimostrazione dell'operato, come à suo luogo fu definito.

tor accio che il Theorema, e Problema sia perfetto, deue costare di cinque parti; cioè Proposizione, Esposizione, Costruzione, Dimostrazione, e Conclusione.

Nella proposizione si propone in genere quello, che si vuol fare, e dimostrare.

Nell'Esposizione s'espone in specie quello, che in genere fu proposto nella proposizione.

La costruzione, nel Problema, è l'operazione, o descrizione di quella figura, che solue il proposto, o lo prepara alla dimostrazione da farsi; e, nel Theorema, è l'aggiunzione di quelle quantità, che bisognano per la dimostrazione di quello; che si è proposto.

La dimostrazione è un ordinato discorso, col quale, mediante li primi, ed infallibili principj, o altre cose già dimostrate, per continuati sillogismi, si perviene alla verità di quello, che si è proposto fare, e dimostrare.

Conclusione è l'artificioso ritorno, che si fa alla proposizione, col quale si conferma tutto quello, che si è fatto, e dimostrato.

Succede solamente, nel Problema, che qualche volta, oltre le cinque sopranotate parti, sia necessaria la determinazione, la quale dichiara quando, e per qual ragione, come anco in quanti modi si può soluer il Problema, e di questa se ne parlerà à suo luogo.

Nota, che non sempre in ogni Theorema, o Problema, si trouano queste sei parti; poiche alle volte può mancare l'esposizione, e determinazione, ed altre volte la costruzione; è ben vero però, che pochissimi sono quei Problemi, à i quali manchi totalmente l'esposizione, e determinazione; e pochissimi ancora sono quei Theoremi, à quali manchi la costruzione: è necessario però, che in tutti sempre si troui la proposizione, la dimostrazione, e la conclusione, stante che in tutti li Theoremi, e Problemi, è necessario prima conoscere quello, che si cerca; secondo dimostrare il medesimo, mediante li primi principj, o altre cose dimostrate; e finalmente concludere quello, che si è fatto, e dimostrato.

La Dimostrazione poi, è affirmatiua, ouero negatiua.

La Dimostrazione affirmatiua è quella, con la quale, mediante li primi principj, o altre proposizioni dimostrate, si perviene direttamente alla conclusione di quello, che fu proposto fare, e dimostrare.


La Dimostrazione negatiua (che si dice procedere per impossibile) è quando, si prende il contrario di quello, che si vuole dimostrare per vero, e secondo tal Ipotesi, procedendo per le cose concesse, si perviene à qualche impossibilità, mediante la quale conosciamo quell'Ipotesi presa per vera essere falsa. E perche la verità, nelle dimostrazioni Geometriche, o sta nella cosa, che si propone, ouero nel contrario della cosa proposta, ritrouato che il contrario della cosa proposta sia falso, si conclude, che la cosa proposta necessariamente sia vera.

PROBLEMA I. PROPOSITIONE I.

Sopra di qualunque data retta linea terminata, descriver vn triangolo equilatero.

Sia data qualsivoglia retta linea terminata AB , sopra la quale si voglia descriver vn triangolo equilatero.

Si faccia centro in vno degli estremi della retta data AB , come in A , e coll'intervallo AB , per il terzo postulato, si descriva il circolo CBD : di nuovo si faccia centro nell'estremo B , e col medesimo intervallo BA , per il terzo postulato, si descriva il circolo CAD . Perche AB è semidiametro del circolo CB , ed ancora del circolo CA , perciò cade dentro dell'vno, e l'altro circolo; per la qual cosa parte d'un circolo cade dentro dell'altro, e per l'annotatione dopo la 36. definitione, i circoli, e loro circonferenze si segano scambievolmente. Sia dunque la loro interseguazione done si voglia, come in C , & D , dal punto C alli centri A , & B , per il primo postulato, si tirino le rette CA , CB . Dico che il trilatero ABC è triangolo equilatero.



Perche nell'antecedente costruzione, intorno al centro A , s'è descritto il circolo CB , e le rette linee AB , AC , sono tirate dal medesimo centro A alla medesima circonferenza CB , per la decimaquinta definitione, la retta AC è vguale alla retta AB . Similmente, perche il punto B , nella costruzione, è fatto centro del circolo CA , e le rette linee BA , BC sono tirate dal medesimo centro B alla medesima circonferenza CA , per la decimaquinta definitione, sarà la retta BC , vguale alla retta AB ; mà fu dimostrata la retta AC vguale alla medesima AB , sarà, per il primo assioma, AC vguale alla retta BC ; e tutti trè i lati AB , BC , CA sono frà di loro vguali. Quel triangolo, che hà trè lati vguali, per la vigesimaterza definitione, è triangolo equilatero; mà il triangolo dunque ABC è triangolo equilatero.

Per la qual cosa, sopra qualunque data retta linea terminata, si può descriver vn triangolo equilatero, ch'era da farsi, e dimostrarsi.

PROBLEMA II. PROPOSITIONE II.

Dato vn punto, e data vna retta linea terminata, si può dal dato punto tirare vna retta linea vguale alla retta data.

Sia dato il punto A , e la retta linea terminata BC , si vuole dal dato punto A tirare vna retta linea vguale alla retta data BC .

Proposizione.

Esposizione

Costruzione.

Dimostrazione.


Conclusione.

Proposizione.

Esposizione

Costruzione.

Si faccia centro in vno degli estremi della retta data BC , come nel punto B , e coll'intervallo BC , per il terzo postulato, si descriva il circolo EC ; dal centro B , al dato punto A , per il primo postulato, si tiri la retta BA , sopra la quale, per



l'antecedente proposizione, si descriva il triangolo equilatero DAB ; si prolunghino, per il secondo postulato, i lati DB , DA , cioè DB , che passa per il centro B , fino alla circonferenza in E , ed il lato DA , che passa per il punto dato, si prolunghi indeterminatamente, verso F ; e, fatto centro in D , coll'intervallo DE , per il terzo postulato, si descriva il circolo EGH , la di cui circonferenza segnerà la retta indeterminata in qualche punto G . Dico che la retta AG è vguale alla data retta BC .

Dimostrazione.

Essendo per costruzione, il punto D centro del circolo EGH , e le rette linee DE , DG , sono tirate dal centro D alla medesima circonferenza EGH , per la decimaquinta definizione, la retta DE sarà vguale alla retta DG . In oltre, perche i lati DB , DA sono vguali (stante che sono lati del triangolo equilatero) detratto dalle vguali rette DE , DG , le vguali DB , DA , resta, per il terzo assioma, la retta AG , vguale alla retta BE . Finalmente, perche il punto B , per costruzione, è centro del circolo EC , e le rette BE , BC , sono tirate dal centro B , alla medesima circonferenza EC , per la decimaquinta definizione, la retta BC sarà vguale alla retta BE ; ma fù mostrata la retta AG vguale alla medesima retta BE , per il primo assioma, la retta AG sarà vguale alla retta BC .

Conclusione.

Per la qual cosa, dal dato punto A si è tirata la retta AG vguale alla data retta BC , ch'era da farsi, e dimostrarsi.

PROBLEMA III. PROPOSITIONE III.

Proposizione.

Date due rette linee ineguali, dalla maggiore tagliarne vna parte vguale alla minore.


Esposizione.

Sia la minore delle rette date A , e la maggiore BC ; Dico esser possibile dalla maggiore BC ragliarne vna parte vguale alla minore A .

Costruzione.

Da vno delli estremi della maggiore data BC , come dal punto B , possiamo, per l'antecedente proposizione, tirare vna retta linea, vguale alla

alla data minore A; se dunque in questo luogo concepiremo fatto quanto s'è detto nell' antecedente proposizione, e la retta tirata dal punto B, vguale alla minore A, sia B D, fatto centro in B, coll'intervallo B D, si descriva il circolo D E, il quale segará la maggiore B C in qualche punto E. Dico, che la retta B E sarà vguale alla data minore A.



Per la definizione del circolo, la retta B E è vguale alla retta B D, ma, per costruzione, la retta A è vguale alla medesima B D, farà, per il primo assioma, la parte B E vguale alla minore A.

Per la qual cosa dalla maggior retta B C, si è tagliata la parte B E, vguale alla minore A, ch'era da farsi, e dimostrarli.

Dimostrazione.

Conclusione.

ANNOTATIONE.


Per non lasciare indietro cor' alcuna, che non sia esattamente dimostrata, come ancora per facilitare la quarta proposizione, premetto le seguenti dimostrazioni.

I.

Ogni diametro fega il circolo, e circonferenza di quello, in due parti vguali.

Sia qualunque circolo A B C D, il di cui centro E, ed il diametro A C. Dico che il Diametro A C divide il circolo, e la circonferenza A B C D in due parti vguali.

Intorno al Diametro A C s'intenda rivolta la parte A B C E in modo che cada sopra del rimanente A D C E: o il piano A B C E cade dentro alla figura A D C E, come fà la notata A G C, o vero cade fuori, come la notata A F C, o pure congrue con la figura A D C. Supposto prima, che cada fuori; si prenda nell'arco A F C qualunque punto F, e nell'arco A B C qualunque punto H, e dal centro E alli punti F, H, per il primo postulato, si tirino le rette E H, E F; la retta E F, segará la circonferenza A D C in qualche punto D, e per la decima quinta definizione, le rette E D, E H, che sono tirate dal centro E alla circonferenza B C D, sono frà di loro vguali; e perche tutte le rette, tirate dal centro E alla circonferenza A B C, per la decimaquinta definizione, sono frà di loro vguali, e la figura A B C rivolta occupa il sito A F C, in conseguenza le rette E F, E H sono frà di loro vguali; ma la retta E D è dimostrata vguale alla medesima retta E H, per il primo assioma, la retta E D sarà vguale alla retta E



Questa dimostrazione è di Talete Mileso, e prova quel, che si suppone, nella decimaquinta definizione.

F, la

F, la parte sarebbe uguale al tutto, che per il nono assioma è impossibile; non dunque cade fuori. Supposto di nuovo, che cada di dentro come la notata AG CE; sarà E G uguale ad E H; ma la retta ED è stata dimostrata uguale ad E H; sarà, per il primo assioma, la retta E G uguale ad ED, la parte uguale al tutto, che per il nono assioma, è impossibile; non dunque cade di dentro, per la qual cosa rivoluta la figura ABCE, intorno al diametro AC, congruerà con la figura ADCE, dal che l'arco ABC congruerà con l'arco ADC; ma quelle cose, che congruono insieme, per lottavo assioma, sono fra di loro uguali, sarà il piano ABCE uguale al piano ADCE, e l'arco ABC uguale all'arco ADC: Per la qual cosa il diametro AC divide il circolo ABCD, e sua circonferenza in due parti uguali, ch'era da dimostrarsi.

I 1.

Vna medesima retta linea non può essere parte comune di due rette linee, che scambievolmente concorrono, e non sono nella medesima dirittura. Di Proclo.

Concorrano le rette AD, CD, in qualche punto D, e continuate ambedue verso B, la loro continuazione, s'è possibile, sia la medesima retta BD, in modo che DB sia parte di AB, e sia ancora parte della retta BDC.

Si faccia centro nel concorso D, ed all'intervallo BD, per il terzo postulato, si descriva il circolo BEG, segnerà le rette BA, BC, come in G, ed F, e, se non le segna, si prolunghino finché concorrano con la circonferenza in G, & F.


Perche la retta BDA passa per il centro D, e concorre con la circonferenza in B, & G, per la decimasettima definizione la retta BG sarà diametro del circolo BEGH, e, per l'antecedente dimostrazione, divide il circolo BEGH in due parti uguali, dal che la figura BEGD sarà la metà del circolo BEGH. Similmente, perche la retta BDF passa per il centro D, e concorre con la circonferenza in B, ed F, per la decimasettima definizione, la retta BDF è diametro del circolo BEFH, e per l'antecedente dimostrazione, divide il circolo in due parti uguali; per la qual cosa la figura BEFD sarà la metà del circolo BEFH: ma si disse, che la figura BEGD è metà del medesimo circolo, sarà per il settimo assioma, la figura BEFD uguale alla figura BEGD, la parte sarebbe uguale allutto, che per il nono assioma, è impossibile; non dunque la retta BD è parte comune delle rette BG, BDF, ed in conseguenza due rette, che concorrono, e non sono nella medesima dirittura, non è possibile, che habbiano una parte comune, come si propose dimostrare.

COROLLARIO.

Da quel che s'è detto, è manifesto, che due rette linee, le quali scambievolmente concorrono, e non sono nella medesima dirittura, continuate si segaranno nel punto del concorso.

Per-


Si dimostra
il decimo-
terzo assi-
oma.



Perche se le rette AB, CB , concorrenti in B , continuate non si segassero in B , la loro continuazione sarebbe una sola retta, come BD , ed all'ora la retta DB sarebbe parte di DA , ed anco della retta DBC , ch'è contro l'antecedente dimostrazione.

Due rette linee, che scambievolmente concorrono, è impossibile, che possano chiudere figura. Di Proclo.

Concorrano le rette linee AB, CB , in qualche punto B . Dico, che non possono chiudere figura verso A , & C , cioè, che continuate le rette AB, CB , verso A , & C , quelle non concorrano insieme.



Concorrano s'è possibile, in qualche punto D , e fatto centro in D , coll'intervallo DB , per il terzo postulato, si descriva il circolo BGF , si prolunghino, per il secondo postulato, le rette BAD, BCD , fino alla circonferenza in E , ed F .

Perche la retta $BADF$ passa per il centro D , per la decimasettima definizione, sarà diametro del circolo BFE , e, per la prima delle antecedenti dimostrazioni, divide la circonferenza del circolo in due parti uguali, dal che l'arco $BGEF$ sarà la metà di tutta la circonferenza. Similmente, perche la retta $BCDE$ passa per il centro D , e concorre con la circonferenza in B , ed E , per la decimasettima definizione, la retta $BCDE$ sarà diametro del medesimo circolo, e per la prima delle antecedenti dimostrazioni, divide la circonferenza del circolo $BGEF$ in due parti uguali; per la qual cosa l'arco BGE sarà la metà di tutta la circonferenza del circolo BFE , ma l'arco $BGEF$ per quel che s'è dimostrato, è la metà della medesima circonferenza, per il settimo assioma, sarà l'arco BGE uguale all'arco $BGEF$, la parte uguale al tutto, che per il nono assioma, è impossibile; non dunque due rette linee possono chiudere figura, ch'era da dimostrarsi.

Il P. Chiuso rigetta una nuova istanza, ed è, che le rette BAO, BCO , continuate possono andare ad unirsi in qualche punto K , nella circonferenza del circolo BLK , ed il modo da rigettarle è il seguente.

Si prenda nella retta BCO qualunque punto D ; essendo la retta BCO , per la decimaquinta definizione, uguale alla retta OHK , sarà BD minore di DHK ; si prenda, fatto centro in D , e coll'intervallo DB , si descriva il circolo BGF , segnerà le rette AOI, COH , nelli punti, come E , ed F ; e, ripetendo le medesime parole dell'antecedente dimostrazione, si dimostrerà, che le rette

$BA,$


BA, BC, continuate non concorrono verso O, per la qual cosa non possono racchiudere figura, ch'era da dimostrarsi.

I V.

Se di due rette linee, vna sia sopraposta all'altra, e gl'estremi dell'vna cadono sopra gl'estremi dell'altra, quelle due rette linee congrueranno insieme.

Siano le due rette linea AB, CD, e sia la retta AB sopraposta alla retta CD, e supposto che l'estremo A cada sopra l'estremo C, e l'estremo B cada sopra l'estremo D. Dico che la retta AB congrue con la retta CD.

Se la retta AB non congrue con la retta CD, ò quella passerà sopra verso E, ouero passerà di sotto verso F: passi prima di sopra, come si fa la linea CED; perche la linea CED stà



in luogo della linea AB, cioè rappresenta la linea AB, e la linea AB, è supposta linea retta, sarà la linea CED linea retta; ma, per ipotesi, i suoi estremi congruono con gli estremi CD, della retta CD, in conseguenza, le due rette linee CED, CD chiudono figura, ch'è contro all'antecedente dimostrazione; non dunque la retta AB sopraposta, come si disse, alla retta CD, passa di sopra. Nell'istesso modo si dimostrerà, che non passa di sotto, e perciò congrue con la retta CD, ch'era da dimostrarsi.

COROLLARIO.

Da quel, che s'è dimostrato, è manifesto, che se le rette AB, CD sono frà di loro vguali, sopraposta l'vna all'altra in modo, che il punto A cada nel punto C, ed il punto B nel punto D, la retta AB congruerà con la retta CD.


V.

Se di due vguali angoli rettilinei ABC, DEF, vno sarà sopraposto all'altro, come l'angolo ABC sopra l'angolo DEF, in modo che la retta BA cada sopra la retta ED, ed il punto B nel punto E. Dico che la retta BC cade sopra la retta EF, e l'angolo ABC congrue coll'angolo DEF.

Se la retta BC non cade sopra la retta EF, ò caderà dentro all'angolo DEF, ouero fuori. Cada prima fuori, come si fa la retta EH, per quel, che si disse nel fine dell'ottava definizione, l'angolo DEF sarà minore dell'angolo DEH, ma l'angolo DEH rappresenta l'angolo ABC, sarà l'angolo DEF minore dell'an-

golo

golo ABC , ch'è contro all'ipotesi, mentre fu supposto l'angolo DEF uguale all'angolo ABC : non dunque la retta BC cade fuori dell'angolo DEF . Nell'istesso modo si dimostrerà, che non cade dentro, come fa la retta EG , e perciò la retta BC cade sopra la retta EF . Per la qual cosa gli angoli ABC , DEF , sopraposti l'uno all'altro, congrueranno insieme, ch'era da dimostrarsi.




THEOREMA I. PROPOSITIONE IV.

Se due lati d'un triangolo rettilineo sono vguale à due lati d'un altro triangolo rettilineo, ogn'vno al suo relativo, e l'angolo contenuto dalli due lati dell'vno, sia vguale all'angolo contenuto dalli due lati dell'altro; farà la base dell'vno vguale alla base dell'altro, li rimanenti due angoli dell'vno faranno vguale alli rimanenti due angoli dell'altro; cioè quelli angoli faranno frà di loro vguale, che sono opposti à i lati vguale; ed il triangolo farà vguale al triangolo.

Proposizione.

Siano li triangoli rettilinei ABC , DEF , e sia il lato AB vguale al lato DE , il lato AC vguale al lato DF , l'angolo A , vguale all'angolo D .



Esposizione.

Dico, che la base BC farà vguale alla base EF , l'angolo B vguale all'angolo E , (che sono opposti alli vguale lati AC , DF) l'angolo C vguale all'angolo F (che sono opposti alli vguale lati AB , DE) e che il triangolo ABC è vguale al triangolo DEF .

Si concepisca sopraposto il triangolo ABC al triangolo DEF in modo che il lato AB cada sopra del lato DE ; perche l'intervallo delli estremi A , B , si suppone vguale all'intervallo delli estremi D , E , posto il punto A nel punto D , e l'estremo B nell'estremo E , la retta AB , per il numero 4. dell'antecedente annotatione, congruerà col lato DE ; ed essendo l'angolo A vguale all'angolo D , per il numero 5. della citata annotatione, la retta AC caderà sopra la retta DF , e l'angolo A congruerà coll'angolo D : e perche la retta AC è posta vguale alla retta DF , il punto C ca-

Costruzione. Dimostrazione.

D

derà

derà nel punto F. Hor perche il punto B cade nel punto E, ed il punto C cade nel punto F, per il numero 4. dell'antecedente annotatione, la base BC congruerà con la base EF, e per l'ottauo Affioma, la base BC sarà vguale alla base EF; e perche tutti trè i lati AB, BC, CA, che sono estremi del triangolo ABC, congruono con i trè lati DE, EF, FD, che sono estremi del triangolo DEF, tutto il triangolo ABC congruerà col triangolo DEF; l'angolo B congruerà coll'angolo E, e l'angolo C coll'angolo F; ma quelle cose che congruono insieme, per l'ottauo Affioma, sono frà di loro vguali, farà l'angolo B vguale all'angolo E, l'angolo C vguale all'angolo F, ed il triangolo ABC vguale al triangolo DEF.

Conclusio-
ne.

Per la qual cosa, quando due lati d'un triangolo rettilineo sono vguali à due lati d'un altro triangolo rettilineo, e l'angolo contenuto &c. ch'era da dimostrarsi.

ANNO TATIONE.

Nelle cose seguenti sempre che si nominerà il triangolo, senz'altra conditione, si deve intendere triangolo rettilineo.


THEOREMA II. PROPOSITIONE V.

Proposizio-
ne.

Delli triangoli isosceli, gl'angoli sopra la base sono frà di loro vguali, e continuati i lati vguali verso la base, gli angoli sotto la base sono frà di loro vguali.

Esposizione

Sia il triangolo isoscele ABC, cioè che il lato AB sia vguale al lato AC. Dico che gli angoli ABC, ACB, sopra la base BC, sono frà di loro vguali. E continuati i lati vguali AB, AC verso E & D, li angoli DBC, ECB sotto la base sono frà di loro vguali.



Costrutio-
ne.

Nella retta CE sia preso qualunque punto F, e dalla retta AD, per la terza proposizione, si tagli la parte AG, vguale alla retta AF, si tirino le rette GC, BF.

Dimostrat-
ione.

Si considerino i triangoli ABF, ACG; perche il lato AG è fatto vguale al lato AF, ed il lato AC è supposto vguale al lato AB, li due la-

ti FA, AB, del triangolo A B F, sono vguali alli due lati GA, AC del triangolo AGC, l'angolo A dell'vno è vguale all'angolo A dell'altro, stante che è commune à tutti due li triangoli, e per la quarta propositione, la base GC, del triangolo GAC sarà vguale alla base BF, del triangolo ABF, ed i rimanenti due angoli dell'vno saranno vguali alli rimanenti due angoli dell'altro, cioè quelli, che sono opposti à i lati vguali; e perciò l'angolo ABF sarà vguale all'angolo ACG, stante che sono opposti alli vguali lati AG, AF; e l'angolo A G C sarà vguale all'angolo AFB, che similmente sono opposti alli vguali lati AB, AC. Hor se dalli vguali lati AG, AF, se ne leuano gli vguali lati AB, AC, resta il lato B G vguale al lato CF. In oltre si considerino li due triangoli BGC, FCB; perche il lato BG è stato mostrato vguale al lato CF; ed il lato GC vguale al lato BF, i due lati B G, G C, del triangolo B G C, sono vguali alli due lati CF, FB del triangolo FCB, l'angolo BGC fu dimostrato vguale all'angolo CFB, e per la quarta propositione, la base B C dell'vno sarà vguale alla base CB dell'altro, cioè sarà base commune, e li rimanenti due angoli dell'vno saranno vguali alli rimanenti due angoli dell'altro, cioè quelli sono vguali, che sono opposti à i lati vguali, e così gli angoli GBC, FCB saranno fra di loro vguali, stante che sono opposti alli vguali lati GC, FB; e similmente gl'angoli FBC, GCB sono fra loro vguali, che sono opposti alli vguali lati BG, CF. Hor perche gli angoli ABF, ACG furono dimostrati fra loro vguali, se da questi se ne leuano gli vguali angoli GCB, FBC, restano gli angoli ABC, ACB, sopra la base, fra di loro vguali, e perche gli angoli GBC, FCB furono dimostrati vguali, e questi sono angoli sotto la base BC, in conseguenza gli angoli sotto la base sono fra di loro vguali.

Per la qual cosa delli triangoli li scelsi gl'angoli sopra la base sono fra di loro vguali, e continuati i lati vguali sotto la base, gl'angoli sotto la base sono fra di loro vguali, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA III. PROPOSITIONE VI.

Se due angoli d'un triangolo sono fra di loro vguali, i lati opposti à gl'angoli vguali sono fra di loro vguali.

Sia il triangolo A B C, del quale l'angolo A B C sia vguale all'angolo A C B. Dico che il lato AC è vguale al lato AB.

Se il lato AB non è vguale al lato AC, vno delli due sarà maggiore; supposto che il lato AB sia maggiore del lato AC, si può per la terza propositione, dal maggior lato AB tagliarne vna parte vguale al minor lato AC, sia dunque fatto, e sia DB vguale ad AC, si tiri la retta D C.



Conclusione.


Proposizione.

Esposizione.

Costruzione.

Dimostrazione.

Si considerino li due triangoli ABC , DCB ; perche il lato DB , per costruzione, è vguale al lato AC , ed il lato BC è lato commune di tutti due li triangoli, perciò li due lati DB , BC , del triangolo DCB , sono vguali alli due lati AC , CB del triangolo ABC , l'angolo DBC , per ipotesi, è vguale all'angolo ACB , e, per la quarta propositione, il triangolo DCB sarà vguale al triangolo ABC , la parte vguale al tutto, che, per il nono assioma, è impossibile, non dunque il lato AB è maggiore del lato AC , ed in conseguenza i lati AB , AC sono frà di loro vguali.



Conclusione.

Per la qual cosa, quando due angoli d'un triangolo sono frà di loro vguali, i lati opposti alli angoli vguali sono frà di loro vguali, ch'era da dimostrarli.

THEOREMA IV. PROPOSITIONE VII.

Quando dalli estremi d'vna retta linea escono due rette, e concorrono in qualche punto, se dalli medesimi estremi escono due altre rette linee vguali alle prime in modo, che quelle ch'escono dal medesimo punto siano frà di loro vguali, e tutte siano distese dalla medesima parte, le seconde passeranno sopra le prime, e concorreranno nel medesimo punto:

Questa propositione si lascia per non esser necessaria.

THEOREMA V. PROPOSITIONE VIII.

Propositione.

Se due lati d'un triangolo sono vguali à due lati d'un altro triangolo, cioè ognuno vguale al suo corrispondente, e la base dell'vno è vguale alla base dell'altro, gli angoli, opposti alle basi vguali, sono frà di loro vguali.

De i Familiari di Filone.

Esposizione.

Siano i due triangoli ABC , DEF , e sia il lato AB vguale al lato DE , il lato AC vguale al lato DF , e la base BC vguale alla base EF . Dico, che gl'angoli BAC , EDF opposti alle vguali basi BC , EF sono frà di loro vguali.


Si

Si concepisca trasportar il triangolo ABC nel modo, che si vede, norato per le lettere GFE ralmente, che la base BC cada sopra la base EF in modo, che il punto B cada nel punto E, il punto C cada nel punto F, e l'angolo A cada come in G. Perche le basi BC, EF sono supposte vguali, per il Corollariò al numero 4. della passata Annotazione, congrueranno insieme.


Costruzione.

O i lati DF, FG, costituiscono vna sola retta linea, come nella prima figura, ò inclinano fuori, come nella seconda figura, ouero inclinano dentro, come nella terza figura. Supposto prima, che facciano vna sola retta linea, come nella prima figura. Perche il lato EG rappresenta il lato AB, ed il lato DE, per ipotesi, è vguale al medesimo lato AB, per il primo assioma, il lato DE farà vguale al lato EG, ed il triangolo DEG farà isoscele, e, per la quinta proposizione, gli angoli EDG, EGD, sopra la base DG, sono frà di loro vguali; ma l'angolo G rappresenta l'angolo A, farà l'angolo A vguale all'angolo D, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

Dimostrazione.




Inclinino i lati DF, FG di fuori, come nella seconda figura, si riri la retta DG. Perche il lato EG rappresenta il lato AB, ed il lato DE è posto vguale al lato AB, farà per il primo assioma, il lato DE vguale al lato EG, il triangolo EDG farà isoscele, e, per la quinta proposizione, gli angoli EDG, EGD, sopra la base DG, sono frà di loro vguali. Similmente, perche il lato FG rappresenta il lato AC, ed il lato FD, per ipotesi, è vguale al lato AC, farà il lato DF vguale al lato FG, e, per la quinta proposizione, gli angoli FDG, FGD, sopra la base DG, sono frà di loro vguali; à questi s'aggiungano gli vguali angoli EDG, EGD, cioè ad ogni vno il suo contiguo, ne viene, per il secondo assioma, l'angolo EDF vguale all'angolo EGF: ma l'angolo EGF rappresenta l'angolo A, farà l'angolo A vguale all'angolo EDF, ch'era da dimostrarsi nel 2. luogo.



Final-

Finalmente inclinino i lati DF, FG di dentro, come nella terza figura, si tiri la retta DG. Perche il lato GE rappresenta il lato AB, ed il lato DE è posto vguale ad AB, sarà DE vguale ad EG, il triangolo EGD sarà isoscele, e, per la quinta propositione, gli angoli EGD, EDG, sopra la base DG, sono frà di loro vguali. Similmente, perche il lato FG rappresenta il lato AC, ed il lato FD è posto vguale ad AC, sarà il lato FD vguale al lato FG, e, per la quinta propositione, gli angoli FDG, FGD, sopra la base DG sono frà di loro vguali; se dalli vguali angoli EGD, EDG se ne detraggono gli vguali angoli FGD, FDG, restano gl'angoli EGF, EDF frà di loro vguali, mà l'angolo EGF rappresenta l'angolo A, sarà l'angolo A vguale all'angolo EDF, ch'era da dimostrarfi.



A N N O T A T I O N E .

Nelle propositioni seguenti le citazioni non si porranno in corpo alle propositioni, come s'è fatto sin qui, mà si porranno nel margine, con le letterine in testa, che corrisponderanno a quelle, poste nel corpo della propositione, e dinoteranno, che lui deve esser considerata tale citatione; oltre à ciò non si porrà più nel margine quale sia la propositione, e quale l'espositione, e costruzione, perche stimo esser sufficiente bauerle poste nelle propositioni antecedenti.


PROBLEMA IV, PROPOSITIONE IX.

Dato vn angolo rettilineo, diuiderlo in due parti vguali.

Sia dato l'angolo rettilineo, BAC, da diuiderfi in due parti vguali.

Si prenda nella retta AB qualunque punto D, dalla retta AC, * si tagli la parte AE vguale ad AD, e si tiri^b la retta DE; sopra la retta DE si descriva il triangolo equilatero DFE, dal punto F al punto A ** si tiri la retta FA. Dico che la retta FA diuide l'angolo BAC in due parti vguali.

Si considerino i due triangoli ADF, FEA: perche il lato AE è fatto vguale al lato AD, ed il lato AF è lato commune di ambidue i triangoli, perciò i due lati DA, AF, del triangolo ADF, * sono vguali alli due lati EA, AF del triangolo AEF; la ba-



* 3. Propo-
sitione.

b 1. Postul.

c 1. Propo-
sitione.

d 1. Postul.

* 1. Assiom.

sc

fe DF, per costruzione, è vguale alla base EF (stante che sono lati del triangolo equilatero) farà l'angolo DAF, ch'è opposto alla base DF, vguale all'angolo EAF, ch'è opposto alla base FE: per la qual cosa l'angolo BAC è diuiso dalla retta AF in due parti vguali, ch'era da farfi, e dimostrarfi.

§ 8. Proposizione.


PROBLEMA V. PROPOSITIONE X.

Data vna retta linea terminata, diuiderla in due parti vguali.

Sia la data retta linea terminata AB, la quale si voglia diuidere in due parti vguali.

Sopra la retta AB, si descriva il triangolo equilatero ABC; poi si diuida l'angolo ACB in due parti vguali con la retta CD. Dico che la retta CD continuata, sega la retta AB in due parti vguali, come in D.

Si considerino i due triangoli CDB, CDA: perche il lato CA è vguale al lato CB (per esser lati del triangolo equilatero) ed il lato CD è lato commune d'ambidue i triangoli, faranno li due lati AC, CD, del triangolo ACD, vguali alli due lati BC, CD, del triangolo CDB, l'angolo ACD, per costruzione, è vguale all'angolo BCD, farà la base AD vguale alla base DB. Per la qual cosa la retta AB è diuisa in due parti vguali in D, ch'era da farfi, e dimostrarfi.



§ 1. Proposizione.

§ 9. Proposizione.

§ 1. Axioma.

§ 4. Proposizione.


PROBLEMA VI. PROPOSITIONE XI.

Data vna retta linea, ed vn punto in essa, erigere in quel punto vna retta perpendicolare alla data.

Sia data la retta linea AB, ed il punto in essa C, si vuole nel punto C erigere vna retta linea perpendicolare alla data AB.

Si prenda in AC qualunque punto D, dalla retta CB se ne tagli la parte CE vguale alla retta CD; sopra la retta DE si descriva il triangolo equilatero FDE, dal punto F al punto C si tiri la retta FC. Dico che la retta FC è perpendicolare ad AB.

Si considerino li triangoli FCE, FCD: perche il lato CE, per costruzione, è vguale al lato CD, ed il lato FC è commune ad ambidue li triangoli, i due lati EC, CF, del triangolo ECF sono vguali alli due



§ 3. Proposizione.

§ 1. Proposizione.

§ 1. Postulato.

§ 2. Axioma.

lati

8. Propo-
sitione.

lati DC, CF del triangolo DCF, la base FE è vguale alla base FD (stante che sono lati del triangolo equilatero FDE), perciò l'angolo FCE, e opposto alla base FE, farà vguale all'angolo FCD, opposto alla base FD: ma, per la decima definitione, quando vna retta linea cade sopra d'vna altra, e fa gli angoli dall'vna, e l'altra parte vguali, quelli gli habbiamo chiamati angoli retti, e la retta linea, che cade, perpendicolare à quella sopra la quale cade; essendosi dimostrato, che gli angoli FCD, FCE sono vguali, in consequenza sono angoli retti, e la retta linea FC farà perpendicolare alla retta AB, ch'era da farsi, e dimostrarfi.

PROBLEMA VII. PROPOSITIONE XII.

Data vna retta linea indeterminata, ed vn punto fuori di essa, far cadere da quel punto vna retta linea perpendicolare alla data.

Sia data la retta linea AB indeterminata, ed il punto fuori di essa sia C, si vuole dal punto dato C far cadere vna retta perpendicolare alla data AB.

9. Postu-
lato.


10. Propo-
sitione.
1. Postula-
to.

1. Postul.

2. Assoma.

8. Propo-
sitione.

Si faccia centro nel dato punto C, ed à qualunque intervallo, purchè seghi la retta AB, si descriva il circolo DEG; il quale segará la retta AB nelli punti come D, ed E: si diuida la retta DE in due parti vguali in F, dal dato punto C al punto F si tiri la retta CF. Dico che la retta CF è perpendicolare alla data retta AB.



Per dimostrar questo dal punto C alli punti D, E si tirino le rette CD, CE,

Si considerino li due triangoli CFD, CFE, de' quali il lato DF, per costruzione, è vguale all'ato FE, il lato CF è commune ad ambedue; li due lati dunque CF, FD, del triangolo CFD, sono vguali alli due lati CF, FE, del triangolo CFE, la base CD, per la definitione del circolo, è vguale alla base CE, farà l'angolo CFD, opposto alla base CD, vguale all'angolo CFE, opposto alla base CE, e, per la decima definitione, gli angoli CFD, CFE sono retti, e la retta CF è perpendicolare alla retta AB, ch'era da farsi, e dimostrarfi.

THEOREMA VI. PROPOSITIONE XIII.

Se vna retta linea cade sopra d'vn'altra linea retta, gli angoli, che fa dall'vna, e l'altra parte, ò sono angoli retti, ouero insieme giunti sono vguali à due angoli retti.

Cada la retta AB sopra la retta CD, e faccia li due angoli ABC, ABD. Dico che questi due angoli, ò sono angoli retti, ouero presi insieme sono vguali à due angoli retti.

Se la retta AB è perpendicolare alla retta CD, e gli angoli ABC, ABD sono angoli retti. Se poi la retta AB non è perpendicolare alla retta CD, nel punto B, sopra la retta CD, si erigga la perpendico-



lare BE, laonde gli angoli EBD, EBC, e saranno angoli retti. Perche gli angoli EBA, ABD, insieme giunti, sono vguali à tutto l'angolo EBD, che lo compongono, e l'angolo EBD, è retto, in conseguenza gli angoli EBA, ABD, giunti insieme, sono vguali ad vn'angolo retto; se gli aggiughi l'angolo retto EBC, li tre angoli EBC, EBA, ABD, insieme giunti, faranno vguali à due angoli retti.

Di nuouo, perche li due angoli ABE, EBC, giunti insieme sono vguali all'angolo ABC, che lo compongono, tanto all'angolo ABC, quãto alli angoli ABE, EBC, giunti insieme, s'aggiunghi l'angolo ABD, ne verranno li due angoli ABC, ABD e vguali alli tre angoli CBE, EBA, ABD: mà li tre angoli CBE, EBA, ABD, furono dimostrati vguali à due angoli retti; li due angoli dunque ABC, ABD, giunti insieme sono vguali à due angoli retti, ch'era da dimostrarsi.


THEOREMA VII. PROPOSITIONE XIV.

Se da vn punto, preso in qualche retta linea, sono tirate due rette linee, vna da vna parte, e l'altra dall'altra parte, le quali facciano con la prima retta, due angoli vguali à due angoli retti; quelle due rette linee faranno poste in vna medesima drittura e costituiranno vna sola retta linea.

Sia qualunque retta linea AB nella quale sia preso qualche punto C, e dal punto C si concepiscino tirate due rette linee come CE, CD, cioè la retta CE tirata da vna parte, e la retta CD dall'altra in modo, che gli angoli ACE, ACD, insieme giunti, siano vguali à due angoli retti. Dico che le rette CE, CD costituiscono vna sola retta linea.

Se le rette CE, CD non costituiscono vna sola retta linea, continuata la retta EC, e la continuazione ò passerà sopra la retta CD, come la notata CF, ouero passerà sotto, come la notata CG: passi prima di sopra come fà la retta CF.

Perche la linea ECF rap-



E

presen-

a 10. definizione.

b 11. proposizione.

c 10. definizione.

d 2. assioma.

e 2. assioma.

f 1. assioma.

g 2. postulato.

13. proposi-
zione.


10. assioma.

3. assioma.

9. assioma.

presenta vna sola retta li-
nea, sopra la quale cade la
retta AC gl' due angoli
ACE, ACF sono vguali
à due angoli retti, mà per
ipotesi li due angoli ACE,
ACD sono ancora vguali
à due angoli retti, li due
angoli dunque ACE, ACF
sono vguali alli due angoli
ACE, ACD; Se ne le-
ui il comune angolo ACE, resta l'angolo ACF vguale all'angolo ACD,

la parte vguale al tutto, ch'è impossibile; non dunque la continuazione
CF passa sopra della retta CD. Nell'istesso modo si dimostrerà, che non
passa di sotto, come fa la retta CG, in conseguenza, continuata la retta,
EC, quella passerà per la dirittura CD. Per la qual cosa le rette EC,
CD costituiscono la sola retta ECD, ch'era da dimostrarfi.



THEOREMA VIII. PROPOSITIONE XV.

Se due rette linee scambievolmente si segano, gli an-
goli al vertice sono frà di loro vguali.

Si seghino le rette AB, CD, in qualche punto E. Dico che gli angoli
AEC, DEB, al vertice E, sono frà di loro vguali, e che gli angoli AED
CEB al vertice, sono frà di loro vguali.

13. proposi-
zione.

13. proposi-
zione.

10. assioma.

3. assioma.


13. proposi-
zione.

10. assioma.

10. assioma.

3. assioma.

Cade la retta AE sopra la retta CD, e fa gl'an-
goli AED, AEC vguali à due angoli retti.
Similmente cade la retta CE sopra la retta AB
e fa gli angoli AEC, CEB vguali à due an-
goli retti: dal che li due angoli AED, AEC
saranno vguali alli due angoli AEC, CEB;
Se ne leui vgualmente il comune angolo AEC
resta l'angolo AED vguale all'angolo CEB,
al vertice. In oltre, cada la retta BE sopra la
retta CD, e fa li due angoli DEB, BEC vgua-
li à due angoli retti, mà li due angoli AEC, CEB, si disse essere vguali à
due angoli retti; li due angoli dunque DEB, BEC, sono vguali alli due
angoli AEC, BEC; se ne leui vgualmente il comune angolo BEC, re-
sta l'angolo AEC vguale all'angolo DEB al vertice, ch'era da dimo-
strarfi.




THEOREMA IX. PROPOSITIONE XVI.

Continuato vn lato di qualunque triangolo rettilineo,
l'angolo esterno è maggiore di ciascheduno delli angoli
interni ed opposti.

Sia

Sia il triangolo rettilineo ABC, e di quello sia continuato qualunque lato BA verso D. Dico che l'angolo esterno DAC è maggiore dell'angolo ACB interno, ed opposto, & è anco maggiore dell'altro angolo interno, ed opposto ABC.

Si diuidi il lato AC in due parti vguale in E, dal punto B al punto E si tiri la retta BE, la quale si prolunghi verso F, si faccia EF vguale alla retta EB, e si tiri la retta AF.



Si considerino li due triangoli AEF, EBC; perche il lato AE, per costruzione, è vguale al lato EC, ed il lato EF è fatto vguale al lato EB; li due lati AE, EF, del triangolo AEF, saranno vguali alli due lati CE, EB, del triangolo EBC, gli angoli al vertice AEF, CEB sono frà di loro vguali, e per la quarta propositione, la base AF sarà vguale alla base BC, e l'angolo FAE sarà vguale all'angolo ECB, per essere opposti alli vguali lati FE, EB. Hor perche l'angolo DAC è maggiore dell'angolo FAE, che lo contiene, e l'angolo FAE, è dimostrato vguale all'angolo ECB, farà l'angolo esterno DAC maggiore dell'angolo ECB, cioè dell'angolo ACB interno, ed opposto. Di nuouo s'intenda continuato il lato AC verso G, e si prouì, come prima s'è fatto, che l'angolo esterno GAB, è maggiore dell'angolo ABC; cioè si diuidi AC in due parti vguali in H, si tiri la retta CH, la quale si prolunghi verso I, e si faccia IH vguale ad HC, si tiri la retta AI, ed hauremo due triangoli AHI, HBC, de' quali li due lati AH, HI, sono, per costruzione, vguali à li due lati BH, HC, gli angoli AHI, HBC, al vertice, sono frà di loro vguali; dal che la base AI sarà vguale alla base BC, e l'angolo IAH vguale all'angolo HBC; mà l'angolo GAB è maggiore dell'angolo IAH, perche lo contiene, farà l'angolo GAB esterno, maggiore dell'angolo ABC interno, ed opposto. Finalmente perche le rette DB, GC si segano scambiuelemente in A, gli angoli al vertice GAB, DAC, sono frà di loro vguali; mà l'angolo GAB è dimostrato maggiore dell'angolo ABC, l'angolo dunque DAC sarà maggiore dell'angolo ABC; per la qual cosa l'angolo esterno DAC è maggiore dell'angolo interno ed opposto ACB, ed ancora dell'angolo ABC, ch'era da dimostrarsi.

S C O L I O.

Coll' antecedente propositione si può dimostrare il seguente Theorema.

Se farà qualche angolo acuto ABC, e da varij punti A, & D, presi nella retta AB, cadano sopra la retta CB quante si voglia perpendicolari AC, DE; Dico che la più

due angoli ABD, ABC, ma li due angoli ABD, ABC, sono uguali à due angoli retti, perciò i due angoli ABC, ACB sono minori di due angoli retti. Similmente, perche l'angolo DBA esterno è maggiore dell'angolo CAB interno, ed opposto; all'vno, ed all'altro s'aggiunga l'angolo CBA, i due angoli CAB, CBA, e faranno minori de i due angoli DBA, CBA; ma li due angoli DBA, CBA sono uguali à due angoli retti: li due angoli dunque CAB, CBA sono minori di due angoli retti. Nell'istesso modo, continuando il lato CA verso E, si prouerà, che li due angoli BAC, BCA sono minori di due angoli retti, come fù proposto dimostrare.

23. propof.

e 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.


16. propof.

5. 4. 3. 2. 1.

13. propof.

COROLLARIO I.

Dall'antecedente propofitione si caua, che se vna retta linea, come AB, sega qualche altra retta linea, CD, ad angoli obliqui, cioè che l'vno come ABC sia ottuso, e l'altro ABD acuto,



se dal punto A cade vna retta perpendicolare alla retta CD, quella caderà dalla parte dell'angolo acuto, come fa la retta AD; perche, se non cade dalla parte dell'angolo acuto, cada, s'è possibile, dalla parte dell'angolo ottuso, come fa la retta AC; perche l'angolo ACB è retto, e l'angolo ABC è ottuso, i due angoli ABC, ACB, del triangolo ACB; non sono minori di due angoli retti, ch'è contro all'antecedente propofitione; non dunque la perpendicolare cade dalla parte dell'angolo ottuso, ma cade dalla parte dell'angolo acuto, come fa la retta AD.

COROLLARIO II.

Da qualche s'è detto, si caua ancora, che se da qual che punto cade vna retta perpendicolare ad vn'altra retta, quella è la minima di tutte l'altre tirate dal medesimo punto à



quel-

quella retta. Per esempio, se dal punto A cade la retta AD perpendicolare alla retta BC, farà AD la minima di tutte quelle rette, che dal punto A possono esser tirate alla retta BC. Si prenda in BC, fuori del punto D, qualunque punto E, e si tirila retta AE; li due angoli ADE, AED, per l'antecedente proposizione, sono minori di due angoli retti, ma l'angolo ADE è retto, farà l'angolo AED minore del retto, e perciò l'angolo ADE sarà maggiore dell'angolo AED, e, per la 19. proposizione, il lato AE sarà maggiore di AD; e perchè il punto E è preso ad arbitrio, perciò tutte le rette tirate dal punto A alla retta BC sono maggiori di AD, ed in conseguenza AD farà la minima.



THEOREMA XI, PROPOSITIONE XVIII.


L'angolo opposto al maggior lato di qualunque triangolo rettilineo, è maggiore dell'angolo opposto al minor lato.

Nel triangolo rettilineo ABC, sia il lato AC maggiore del lato AB. Dico che l'angolo ABC, opposto al maggior lato AC, è maggiore dell'angolo ACB, opposto al minor lato AB.

Dal maggior lato AC se ne tagli la parte AD uguale al minor lato AB, e si tiri la retta BD.

Perchè il lato AD è fatto uguale al lato AB, il triangolo ABD è isoscele, e gli angoli ABD, ADB, sopra la base DB, sono fra di loro uguali; e perchè, nel triangolo DBC, è continuato il lato DC in A, l'angolo ADB esterno è maggiore dell'angolo C interno, ed opposto, mà l'angolo ADB, è mostrato uguale all'angolo ABD, farà l'angolo ABD maggiore dell'angolo C. Per la qual cosa l'angolo ABC, è opposto al maggior lato AC;

è mag-



a 3. propof.

b 1. postulat.

c 24. defin.

d 5. propof.

e 16. propof.

f 1. affiom.

g 9. affiom.

è maggiore dell'angolo C, opposto al minor lato AB; ch'era da dimostrare.

THEOREMA XII. PROPOSITIONE XIX.


Il lato opposto al maggior'angolo di qualunque triangolo rettilineo, è maggiore del lato opposto al minor'angolo.

Nel triangolo ABC sia l'angolo B maggiore dell'angolo C. Dico che il lato AC opposto al maggior angolo B, è maggiore del lato AB opposto al minor angolo C.

Se il lato AC non è maggiore del lato AB, o sarà minore, ouero vguale.

Supposto prima, che il lato AC sia vguale al lato AB, in tal caso il triangolo ABC sarà isoscele, e gli angoli

ABC, ACB ¹ sopra la base BC, faranno frà di loro vguali, ch'è contro al nostro supposto; non dunque il lato AC è vguale al lato AB. Di nuovo supposto che il lato AC sia minore del lato AB, all'ora l'angolo B, opposto al minor lato AC, sarà minore dell'angolo C, opposto al maggior lato AB; mà si è supposto l'angolo B maggiore dell'angolo C, sarebbe l'angolo B maggiore, e minore dell'angolo C, ch'è impossibile; non dunque il lato AC è minore del lato AB, non è vguale, per quel che s'è dimostrato; in conseguenza il lato AC sarà maggiore del lato AB, come fu proposto dimostrare.



¹ 24. defin.

² 5. propos.

³ 18. propos.


THEOREMA XIII. PROPOSITIONE XX.

Due lati di qualunque triangolo rettilineo, presi come si voglia, sono maggiori del terzo lato.

Sia il triangolo ABC. Dico che li due lati AB, BC, insieme giunti, sono maggiori del terzo lato AC; che li due BC, CA, sono maggiori del terzo AB, e che li due BA, AC sono maggiori di BC.

Si diuidi l'angolo BAC ¹ in due parti vguali con la retta AD, la quale continuata ² concorra col lato BC in qualche punto D.

Si consideri il triangolo ADC, nel quale è continuato il lato CD, verso B, sarà l'angolo BDA esterno, maggiore dell'angolo DAC interno, ed opposto: mà l'angolo DAC, per costruzione, è vguale all'angolo DAB, sarà l'angolo BDA ³ maggiore dell'angolo BAD, e, per l'antecedente propositione, il lato AB, opposto al maggior angolo BDA, sarà maggiore del lato BD, opposto al minor angolo BAD.



Simil-

Di Procl.


¹ 9. propos.

² 2. postul.

³ 16. propos.

⁴ 1. assoma.


Similmente si consideri il triangolo BDA del quale è continuato il lato BD verso C, sarà l'angolo esterno CDA ^a maggiore dell'angolo DAB interno, ed opposto: ma l'angolo DAB, per costruzione è uguale all'angolo DAC, sarà l'angolo CDA ^a maggiore dell'angolo CAD, ed in conseguenza il lato AC ^a sarà maggiore del lato CD: fu dimostrato il lato AB maggiore del lato BD, li due lati, dunque BA, AC, giunti insieme, sono maggiori del lato BC, ch'era da dimostrarsi.



THEOREMA XIV. PROPOSITIONE XXI.

Se dalli estremi d'un lato d'un triangolo escono due rette linee, e concorrono dentro del medesimo triangolo, quelle prese insieme, sono minori degl'altri due lati del triangolo, e contengono angolo maggiore.

Sia il triangolo ABC, e dalli estremi B, & C, del lato BC, escano le rette BD, CD, e concorrino dentro del triangolo in qualche punto D. Dico che le due BD, CD, insieme giunte, sono minori de' i due lati BA, AC, presi insieme, e che l'angolo BDC è maggiore dell'angolo BAC.



Si continui la retta BD ^a fino, che corre col lato AC in qualche punto E.

Nel triangolo ABE i due lati BA, AE, giunti insieme, sono maggiori del terzo lato BE; tanto à i due lati BA, AE, giunti insieme, quanto al lato BE, si aggiunghi la retta EC, ne verranno i due lati BA, AC maggiori delli due lati BE, EC. Di nuovo, nel triangolo CED, i due lati CE, ED, presi insieme, sono maggiori del terzo lato CD; tanto à i due lati CE, ED, giunti insieme, quanto al lato CD s'aggiunga la retta DB, ne verranno i due lati CE, EB ^a maggiori delli due CD, DB. Hor essendosi dimostrato li due lati BA, AC, maggiori de' i due lati BE, EC, e li due BE, EC maggiori delli due BD, DC, i due lati dunque BA, AC presi insieme, sono maggiori delli due BD, DC insieme giunti, il che era da dimostrarsi nel primo luogo.

Nel triangolo DEC è continuato il lato ED verso B, sarà l'angolo BDC esterno, ^a maggiore dell'angolo DEC interno, ed opposto. Similmente nel triangolo EAB è continuato il lato AE verso C, sarà l'angolo CED ^a maggiore dell'angolo CAB, ma fu mostrato l'angolo CDB maggiore dell'angolo CED, in conseguenza l'angolo CDB sarà molto maggiore dell'angolo CAB, come fu proposto dimostrare.

P R O-

PROBLEMA VIII. PROPOSITIONE XXII.

Date tre rette linee, costruire vn triangolo, che habbia i tre lati vguali alle trè rette linee date.


E necessario però, che le tre rette date habbiano questa determinazione, che due, in qualunque modo prese, siano maggiori della terza, stante che s'è dimostrato nella vigesima propositione, che due lati d'un triangolo sono maggiori del terzo lato.

Siano date le tre rette linee A, B, C, in modo che le due A, & B, insieme giunte, siano maggiori della terza C; le due B, & C, siano maggiori della terza A; e le due A, & C, siano maggiori della terza B. Dico esser possibile costruire vn triangolo, che habbia i tre lati vguali alle tre rette date.

S'esponga la retta DE indeterminata verso E, dalla quale se ne tagli la parte DF vguale alla retta A; similmente si tagli FG vguale alla retta B; e si tagli GH vguale alla retta C: poi, centro in F, coll'intervallo FD, si descriva il circolo DIK; e di nouo, fatto centro in G, coll'intervallo GH si descriva il circolo HIK.

Perche la retta A, per costruzione, è vguale ad FD, e la retta FL è vguale alla medesima FD, farà la retta A vguale alla retta FL. Similmente essendo la retta C, per costruzione, vguale alla retta GH, e la retta GM è vguale alla medesima GH, farà la retta C vguale alla retta GM; e così le due rette A, & C saranno vguali alle due FL, GM; mà per ipotesi, le due A, & C, insieme giunte, sono maggiori della terza B, le due dunque FL, GM, sono maggiori della retta B; fù fatta FG, per costruzione, vguale alla retta B, le due rette dunque FL, GM sono maggiori della retta FG. Se dunque da FG se ne detrae FL resta GL minore di GM; dal che il punto M cade dentro del circolo ILK, ed il punto L dentro del circolo IMK, per la qual cosa vn circolo cade dentro l'altro, e, per l'annotazione dopo la 26. definizione, i circoli IMK, ILK, scambievolmente si segano. Siano le loro intersegaioni come in I, & K, dal punto I alli centri F, & G si tirino le rette IF, IG. Dico che il triangolo IFG, ha li tre lati vguali alle tre rette date A, B, C.

Per la definizione del circolo la retta FI, è vguale alla retta FD, mà, per costruzione, la retta A è vguale alla medesima retta FD, farà la retta FI vguale alla retta A. Similmente la retta GI, per la definizione del circolo, è vguale alla retta GH, mà la retta C, per costruzione, è vgua-



Determinazione.

3. propos.

3. propos.

3. propos.

3. postul.

3. postul.

15. defin.

1. assioma

15. defin.

1. assioma

1. assioma

1. assioma

1. assioma

1. postul.

1. postul.

1. assioma

1-800-976-2626

— 2:20pm

le alla retta GH, farà la retta C' uguale alla retta GI; dalche le due A, & C = fono uguali alli due lati FI, IG, la retta FG, per costruzione, è uguale alla retta B, in conseguenza li tre lati FI, IG, FG fono uguali alle tre rette date, ch'era da farli, e dimostrarli.

PROBLEMA IX. PROPOSITIONE XXIII.

Data vna retta linea, ed vn punto in essa, e dato vn'angolo rettilineo, è possibile nel dato punto sopra la retta data, costituire vn'angolo rettilineo vguale all'angolo dato.

Sia la data retta linea AB , ed il punto in essa C , e sia dato l'angolo rettilineo E ; si vuole nel punto C , sopra la retta AB , costruire un'angolo rettilineo, uguale all'angolo E .

Si prendano due qualunque punti nelle rette ED , EF , che sia-

4. 2. 1971

* 3. propof

no i notori D, ed F, e si tiri ^a la retta DF; si faccia poi CG ^b vguale alla retta EF, si tagli CH vguale alla retta ED, e si tagli GI vguale alla retta FD, e per l'antecedente proposizione, sopra la retta CG si deseriuia il triangolo CGK, talmente che il lato CK sia vguale ad HC, ouero ED, ed il lato GK sia vguale ad IG, ouero FD. Dico che l'angolo KCG è vguale all'angolo E.

Si considerino i due triangoli DEF, KCG : perche i due lati KC, CG sono uguali, per costruzione, e i due lati DE, EF, e la base KG è uguale alla base DF, l'angolo KCG sarà uguale all'angolo E, ch'era da farsi, e dimostrarsi.

ε 8. προποσ[


THEOREMA XV. PROPOSITIONE XXIV.

Se due lati d'un triangolo sono vguagli a due lati d'un'al-
tro triangolo, ogn'vno vguale al suo corrispondente, e
l'angolo contenuto da i due lati dell'vno sia maggiore dell'
angolo contenuto da i due lati dell'altro; la base dell'vno,
ch'è opposta all'angolo maggiore, sarà maggiore della ba-
se dell'altro, ch'è opposta all'angolo minore.

Siano i due triangoli ABC , DEF , e sia il lato AB uguale al lato DE , il lato AC uguale al lato DF , e l'angolo BAC maggiore dell'angolo EDF . Dico che la base BC sarà maggiore della base EF .

Nel


Nel punto D, sopra la retta DE, si costituisce l'angolo EDG, vguale all'angolo A, e perche l'angolo A è posto maggiore dell'angolo EDF, sarà l'angolo EDG maggiore



dell'angolo EDF, per la qual cosa la retta DG cade fuori del triangolo DEF; si tagli DG e vguale al lato AC, e si tiri la retta EG. O la retta EG passa sopra del punto F, come nella prima figura, ouero passa sotto al punto F, come nella seconda figura. Passi prima sopra, come nella prima figura, si tiri la retta FG, e si considerino li triangoli ABC, DEG; perche il lato AB, per ipotesi, è vguale al lato DE, ed il lato DG è fatto vguale al lato AC, i due lati BA, AC saranno vguali alli due lati ED, DG, l'angolo EDG è fatto vguale all'angolo A, sarà la base EG vguale alla base BC. In oltre perche DF, per ipotesi, è vguale al lato AC, ed il lato DG è fatto vguale al medesimo lato AC, sarà DG vguale al lato DF, il triangolo DFG sarà isoscele, e gli angoli DGF, DFG, sopra la base FG, saranno frà di loro vguali; ma l'angolo DGF è maggiore dell'angolo EGF, perche lo contiene, sarà l'angolo DFG maggiore dell'angolo EGF, e tutto l'angolo EFG sarà molto maggiore dell'angolo EGF; per la qual cosa il lato EG, opposto al maggior angolo EFG, sarà maggiore del lato EF, ch'è opposto all'angolo minore EGF, e perche il lato EG fu mostrato vguale al lato BC, sarà la base BC maggiore della base EF, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

Di nuouo passi la retta EG sotto al punto F, come nella seconda figura, si tiri la retta FG, e considerando i due triangoli ABC, DEG si mostri, come prima si fece, che la retta EG è vguale alla base BC.

Perche il lato DF è posto vguale al lato AC, ed il lato DG è fatto vguale al medesimo lato AC, sarà il lato DF vguale al lato DG, il triangolo DFG sarà isoscele, e gli angoli sotto la base IGF, HFG, saranno frà di loro vguali; ma l'angolo IGF è maggiore dell'angolo EGF, perche lo contiene, sarà l'angolo HFG maggiore dell'angolo EGF; per il che tutto l'angolo EFG: sarà molto maggiore dell'angolo EGF. Per la qual cosa nel triangolo EFG, il lato EG opposto al maggior angolo EFG, sarà maggiore del lato EF, opposto all'angolo minore EGF; e perche la retta EG fu mostrata vguale alla base BC, sarà la base BC maggiore della base EF ch'era da dimostrarsi.



a 23. prop.

b 1. affom.

c 3. propof.
d 1. poti.

e 1. poti.

f 4. propof.

g 1. affom.

h 24. defin.

i 5. propof.

k 1. affom.

l 19. propof.

m 1. affom.

n 1. poti.

o 1. affom.

p 24. defin.

q 5. propof.

r 1. affom.

s 19. propof.

t 1. affom.

THEOREMA XVI. PROPOSITIONE XXV.

Se due lati d'un triangolo sono vguali à due lati d'un altro triangolo, ciascuno vguale al suo corrispondente, e la base dell'vno è maggiore della base dell'altro, l'angolo opposto alla base maggiore farà maggiore dell'angolo opposto alla base minore.

Siano i due triangoli ABC, DEF, e sia il lato AB vguale al lato DE, il lato AC vguale al lato DF, la base BC maggiore della base EF. Dico che l'angolo A farà maggiore dell'angolo D.

Se l'angolo

A non è maggiore dell'angolo D, d'è farà minore, ouero vguale. Supposto prima, che l'angolo A sia vguale all'angolo D;

a 4. propos.


perche i due lati AB, AC, per ipotesi, sono vguali alli due lati DE, DF, e l'angolo A è posto vguale all'angolo D, farà la base BC vguale alla base EF, ch'è contro all'ipotesi, mentre s'è supposto, che BC è maggiore di EF, non dunque l'angolo A è vguale all'angolo D. Di nuouo sia l'angolo A minore dell'angolo D, perche i due lati DE, DF, per ipotesi sono vguali à i due lati AB, AC, e l'angolo D è maggiore dell'angolo A, farà, per l'antecedente propositione, la base EF maggiore della base BC; fu supposta la base BC maggiore di EF, farebbe BC maggiore, e minore di EF, ch'è impossibile; non dunque l'angolo A, è minore dell'angolo D; non è vguale, per quel che s'è dimostrato; per la qual cosa l'angolo A farà maggiore dell'angolo D, come fu proposto dimostrare.

THEOREMA XVII. PROPOSITIONE XXVI.

Se vn lato d'un triangolo è vguale ad vn lato d'un altro triangolo, e due qualunque angoli dell'vno siano vguali à due corrispondenti angoli dell'altro, i rimanenti due lati dell'vno faranno vguali à i rimanenti due lati dell'altro, cioè ogn'vno vguale al lato corrispondente, ed il restante angolo farà vguale al restante angolo.

Siano

Siano i due triangoli ABC, DEF, e sia nel primo luogo il lato BC vguale al lato EF, l'angolo ABC vguale all'angolo DEF, e l'angolo ACB vguale all'angolo DFE cioè che gli angoli vguali siano sopra gli vguali lati BC, EF.



Dico che il lato AC sarà vguale al lato DF, il lato AB vguale al lato DE, e che l'angolo A è vguale all'angolo D.

Se il lato AB non è vguale al lato DE, vno de' i due sarà maggiore. Supposto che il lato DE sia maggiore del lato AB, dal maggior lato DE se ne tagli la parte GE^a vguale al minor lato AB, si tiri^b la retta GF, e si considerino i due triangoli ABC, GEF; perche il lato GE è fatto vguale al lato AB, ed il lato EF è supposto vguale al lato BC, faranno i due lati GE, EF vguali à i due lati AB, BC, l'angolo GEF è supposto vguale all'angolo ABC, farà^c la base GF vguale alla base AC, l'angolo BAC vguale all'angolo EGF, e l'angolo BCA vguale all'angolo EFG; mà l'angolo BCA è supposto vguale all'angolo EFD, l'angolo dunque EFG^d sarà vguale all'angolo EFD, la parte vguale al tutto, ch'è impossibile^e: Non dunque il lato DE è maggiore del lato AB, mà sono frà di loro vguali. In oltre perche il lato DE è dimostrato vguale al lato AB, ed il lato EF è supposto vguale al lato BC, i due lati DE, EF, del triangolo DEF, sono vguali alli due lati AB, BC, del triangolo ABC, l'angolo E è supposto vguale all'angolo B, farà la base DF^f vguale alla base AC, e l'angolo D vguale all'angolo A.

Supposto di nouo, che il lato BC sia vguale al lato EF, l'angolo B, vguale all'angolo E, e l'angolo A vguale all'angolo D. Dico similmente, che il lato DE è vguale al lato AB, il lato DF vguale al lato AC, e l'angolo C vguale all'angolo DFE.

Si faccia la inedita costruzione di prima, e si mostri, come prima si fece, che l'angolo EGF è vguale all'angolo BAC; mà nel triangolo DGF l'angolo EGF esterno^g è maggiore dell'angolo D interno, ed opposto, farà l'angolo A maggiore dell'angolo D; fù supposto l'angolo A vguale all'angolo D, farebbe l'angolo A maggiore, ed vguale all'angolo D, ch'è impossibile; non dunque il lato DE è maggior del lato AB, mà sono frà di loro vguali.

Finalmente perche i due lati AB, BC, del triangolo ABC, sono vguali à i due lati DE, EF del triangolo DEF, l'angolo B, per ipotesi, è vguale all'angolo E, farà la base AC^h vguale alla base DF, e l'angolo C vguale all'angolo DFE, ch'era da dimostrarsi.

ANNOTATIONE.

Per dimostrare gli Elementi delle parallele con metodo assai chiaro, e facile, premetto le seguenti dimostrazioni.

I.

Se due rette linee, come CA, DB, sono segate da qualche retta

AB,

^a 3. propos.
^b 1. post.

^c 4. propos.

^d 2. assiom.
^e 9. assiom.


^f 4. propos.

^g 16. propos.

^h 4. propos.

AB, e gli angoli DBA, CAB sono frà di loro vguali: Dico che se la retta CA è vguale alla retta DB, le rette DF, CE, che da i punti D, & C, cadono perpendicolari alla retta AB, sono frà di loro vguali, e se la retta CA è maggiore della retta DB, la perpendicolare CE farà maggiore della perpendicolare DF.

Supposto prima che la retta CA sia vguale alla retta DB: Dico che la perpendicolare CE è vguale alla perpendicolare DF. Perché gli angoli in E, ed F sono retti, e gli angoli DBF, CAE sono supposti vguali, i due angoli CEA, CAE del triangolo CAE, ^a saranno vguali alli due angoli DFB, DBF, del triangolo DFB, il lato CA è supposto vguale al lato DB, sarà BF vguale ad AE, e la perpendicolare DF è vguale alla perpendicolare CE ch'era da dimostrarfi nel primo luogo.




Di nouo, supposto che la retta CA sia maggiore della retta DB. Dico che la perpendicolare CE è maggiore della perpendicolare DF. Si faccia GA vguale alla retta DB, dal punto G si faccia cadere la retta GH ^a perpendicolare alla retta AB, ed operando come si fece prima, si mostrerà, che la retta GH è vguale alla retta DF, ma, per lo Scolio alla 16. propositione, la retta CE è maggiore di GH, sarà la perpendicolare CE maggiore della perpendicolare DF, ch'era da dimostrarfi.

I I.

Se due lati opposti d'un quadrilatero sono frà di loro vguali, e fanno angoli vguali con vno degl'altri due lati, i rimanenti due angoli sono frà di loro vguali.

Sia il quadrilatero ABCD, e siano i lati opposti AB, DC frà di loro vguali, come ancora siano frà di loro vguali gl'angoli DCB, ABC. Dico che li restanti due angoli A, & D, sono frà di loro vguali. si tirino ^a le diagonali AC, DB, le quali si segaranno in qualche punto E; e si considerino i due triangoli DBC, ACB, de' quali il lato AB, per ipotesi è vguale al lato DC, il lato BC è commune, e perciò i due lati AB, BC sono vguali alli due lati DC, CB, gli angoli ABC, DCB, per ipotesi, sono frà di loro vguali, sarà la base AC ^b vguale alla base DE, l'angolo ACB vguale all'angolo DBC, e l'angolo BAC vguale all'angolo BDC. In oltre perché gli angoli EBC, ECB sono stati mostrati vguali, sarà ^c EB vguale



ad

ad EC; dalle uguali rette AC, DB, se ne leuano le uguali rette EB, EC, resta EA⁴ uguale ad ED; dal che gli angoli EAD, EDA⁴ sono frà di loro uguali, se le aggiungino gli uguali angoli BDC, BAC, ne viene tutto l'angolo BAD uguale all'angolo CDA, come fu proposto dimostrare.

I I I.


La linea retta chiude figura con la curua, quando la retta termina nella curua con tutti due gli estremi.

Concorra la retta linea DE con tutti due gli estremi D, ed E nella curua ABC. Dico che le linee DFE, DBE chiudono figura; cioè frà la linea curua DBE, e la retta DFE s'interpone spatio. Perche le linee DBE, DFE concorrono insieme negli estremi D, ed E, se frà di loro non si racchiude spatio, l'una congruerà con l'altra, ma quelle cose, che congruono insieme⁴ sono frà di loro uguali, sarà la linea DFE uguale alla linea curua DBE; ma per la definizione 4. la linea curua DBE non è la breuissima di quelle, che si stendono fra i punti D, & E, la linea dunque DFE, ch'è uguale alla linea curua DBE, non sarà la breuissima di quelle, che si stendono dal punto D al punto E; e perciò non sarà linea retta, ch'è contro all'ipotesi, stante che la linea DFE è supposta linea retta; non dunque le linee DBE, DFE congruono, ma frà di loro s'interpone qualche spatio; cioè chiudono figura, ch'era da dimostrarfi.

I V.

Se frà due punti presi in qualche linea curua è tirata vna retta linea, quella passa da quella parte, che riguarda il cauo della curua.

Nella curua ABC, il di cui cauo sia verso X, siano presi due qualunque punti A, & C. Dico che la retta tirata dal punto A al punto C, cade dalla parte X, che riguarda il cauo della curua.



Si concepisca la retta linea DE indeterminata, dall'una, e l'altra parte, si prenda nella curua ABC qualunque punto B, e si concepisca trasportata la curua ABC in modo, che col suo conuesso s'appoggi alla retta indeterminata DE nel luogo B, cioè che la curua ABC concorra col suo conuesso nella retta indeterminata DE, in modo che la curua ABC non segbi la retta DE, la linea curua ABC caderà fuori della retta linea DE; perche, se non cade fuori,

6. propof.
1. affom.
3. propof.
2. affom.

2. affom.

a. 4. defn.


o tutta passa sopra la retta DBE, o ne passa parte; non passa tutta, perché la linea ABC sarebbe linea retta, ch'è contro all'ipotesi, se una parte, come BF passa sopra la retta DE, la parte BF, della curua ABC, non sarebbe curua, ma linea retta, ed in tal caso la parte aggiunta, come FG uguale è minore di FB sarebbe linea retta, presi nelle rette BF, FG due punti I, & K, vicini ad F sarebbe IK per la medesima ragione linea retta, dal che tutta BG sarebbe una sola retta linea; e col medesimo modo d'arguere si dimostrerà, che tutta la linea ABC sarà linea retta, ch'è contro all'ipotesi, mentre la linea ABC è supposta curua: non dunque tutta, ne parte della linea curua ABC passa sopra la retta DE, ma cade tutta fuori; e perciò li punti A, & C cadono fuori della retta DE.

Altra breue dimostrazione.

Dalli punti A, & C alla retta DE si facciano cadere le rette AL, CM, perpendicolari ad ED, e si tirerà la retta AC; perché i punti A, & C distano dalli punti L, M, per le quantità degl'intervalli AL, CM, perciò la retta AC cade fuori della retta LM, ma per l'antecedente dimostrazione, la retta AC comprende figura con la curua ABC, la retta dunque AC cade sotto la curua ABC;

Se tutta la curua, d'una picciolissima parte di essa come BI, congruerà con la retta BI, l'una non chiuderà figura con l'altra ch'è contro alla 3. dimostrazione, e perciò li punti A, & C, cadono fuori della retta DB.

per la qual cosa passa dalla parte, che riguarda il concauo della curua ABC ch'era da dimostrarsi.



V.

Se frà due qualunque punti A, & C presi in qualunque linea curua ABC, il di cui concauo sia verso X, sia tirata la retta linea ADC, se dagl'infiniti punti immaginati nella curua ABC cadono rette linee perpendicolari à qualch'altra retta linea: Dico essere impossibile, che tutte quelle perpendicolari siano frà di loro uguali.


Si prenda nella curua ABC qualunque punto B, dal quale si faccia cadere la retta BD^a perpendicolare alla retta AC, e si continui la retta DB^a verso E; nel punto A sopra la retta AC s'erigga la perpendicolare AG, poi nella prolungazione BE si prenda qualunque punto F, e si faccia AG^a uguale alla retta FD, si tirerà la retta GF. Nel quadrilatero GADF, i lati opposti GA, FD, per costruzione, sono fra di loro uguali, gli angoli GAD, FDA^a sono uguali stante che sono retti, e per la seconda delle antecedenti dimostrazioni, gli an-

a. 11. prop.
b. 2. postul.
c. 11. propos.
d. 3. propos.
e. 1. postul.

f. 10. assoma

goli

goli AGF, DFG sono fra di loro uguali. In oltre perché la retta G A è fatta uguale ad FD, e la retta FD per costruzione è maggiore di FB, tanto che la retta AC per l'antecedente dimostrazione, cade nel concavo della curva ABC, sarà la retta GA maggiore della retta BF: se gli angoli AGF, BFG sono retti, le rette AG, BF, e cadono dalli



punti A , & B saranno perpendicolari alla retta GF ; ma AG è dimostrata maggiore di BF , non tutte le perpendicolari dunque, che cadono dalla curva ABC alla retta GF sono fra di loro uguali, ciò è il nostro proposito; se gli angoli AGF , BFG non sono retti, perché le rette AG , BF sono segate dalla retta GF , e gli angoli AGF , BFG , per quel, che s'è dimostrato, sono fra di loro uguali, per la prima delle antecedenti dimostrazioni; essendo la retta AG maggiore di BF , la retta, che dal punto A cade perpendicolare alla retta GF , sarà maggiore della retta, che dal punto B cade perpendicolare alla medesima retta GF ; non dunque tutte le rette, che dalla curva ABC cadono perpendicolari alla retta GF sono fra di loro uguali.

S'intendano continuate le rette DF, AG indeterminatamente verso P, Q, si facciano FE, GO fra di loro uguali, e si tiri la retta OE; sarà OA uguale ad ED, e procedendosi come prima, si dimostrerà, che non tutte le rette, che cadono perpendicolari dalli punti A, & B alla retta O E sono fra di loro uguali; e nell'istesso modo pigliandosi sempre parti uguali dall'una, e l'altra parte, come E Q, OP, e con quell'ordine in infinito, e tirata la retta P Q, si dimostrerà, che non tutte le rette, che dalli punti A, & B, cadono perpendicolari alla retta P Q, sono fra di loro uguali.

Di nuovo si prendano due qualunque altri punti nella linea ABC , che siano H , ed L , tirata la retta linea HL quella, per l' antecedente dimostrazione, passa per il concavo della curva HML ; preso poi nella curva HML qualunque altro punto M , dal quale si faccia cadere la retta MS perpendicolare ad HL ; nel punto L , si erigga LT perpendicolare ad HL ; si prenda in MN qualunque punto R , si faccia LR uguale ad SR , e si tirino le rette RT ; procedendosi come prima, si dimostrerà, che non tutte le rette, che dalla curva HML cadono perpendicolari alla retta RT ; sono fra di loro uguali; In oltra continuata le rette SR , LT indeterminatamente verso Z , &, si prendano dall'una, e dall'altra, parti uguali, come TT' uguale ad RN , T &, uguale ad NZ , e con quest'ordine in infinito, si tirino le rette NT , T , &, e si mostri come prima, che non tutte le rette, le quali cadono dalla

le 1. Postul.

§ 12. Prop.

11. Prop.

K 4. Prop.

M. 2. Postal.

1. Postul.

curva HML perpendicolari alle rette NT , $Z\phi$, &c. Sono fra di loro uguali. E perche i punti H , M , L , sono presi ad arbitrio nella linea ABC , perciò qualunque posizione habbiano le rette RT , NT , $Z\phi$, le linee rette, che dalla linea curva ABC cadono perpendicolari a quelle, mai faranno tutte fra di loro uguali.

2. postul.

3. Prop.

Finalmente si prolungbino le rette FD , GA indeterminatamente verso IK , si prenda in DK qualunque punto K , si faccia AI uguale ad KD , e si tiri la retta IK ; per la seconda delle antecedenti dimostrazioni, gli angoli DKI , AIK sono fra di loro uguali, e perche BK


per costruzione è maggiore di AI , per la prima delle antecedenti dimostrazioni, la retta che dal punto B cade perpendicolare alla retta KI , è maggiore della retta, che dal punto A cade perpendicolare alla medesima retta KI ; dal che non tutte le rette, che dalla curva ABC cadono perpendicolari alla retta KI sono fra di loro uguali; se poi si prendono le parti Kb , Ia uguali, tirata la retta ab , si dimostrerà come prima, che non tutte le rette, le quali cadono dalla curva ABC perpendicolari a KI , sono fra di loro uguali. Di più si continui MS verso X , & LT verso V , si prenda in SX qualunque punto X , e si faccia LV uguale ad XS , sarà MX maggiore di LV ; si tiri la retta XV , e si mostri come prima, che non tutte le rette, le quali cadono dalli punti ML , perpendicolari ad XV , sono fra di loro uguali; e perche i punti, K , M , L furono presi ad arbitrio, in ogni posizione, che sarà la linea XV , le rette, che dalla curva ABC cadono perpendicolari ad XV , mai faranno tutte fra di loro uguali, come fu proposto dimostrare.

2. Postul.

3. propof.

1. Postul.

Se poi la retta linea, sopra la quale cadono le perpendicolari, continuata concorra con la curva BHC , come fa la retta BD , all'ora da qualunque punto C , preso nella curva BC , si faccia cadere la retta CE perpendicolare alla retta BD , si tiri la retta BC , la quale per l'antecedente dimostrazione, cade dalla parte concava X , si prenda nella retta BC qualunque punto F , e dal punto F si faccia cadere la retta FG perpendicolare alla



retta BD; perche il punto F è più vicino al punto B, che il punto C, per la prima delle antecedenti dimostrazioni, la perpendicolare CE è maggiore della perpendicolare FG, e molto maggiore sarà di H G, ch'era da dimostrarsi.


V I.

Se due rette linee vguali, come AB, CD, sono in vn medesimo piano, e fanno angoli retti con qualch'altra linea retta BD, tirata la retta AC, se dalla retta AC cade qualche retta linea EF perpendicolare à BD, ed vguale ad AB, ouero CD. Dico che ogn vna delle altre rette, che dalla linea A C cadono perpendicolari alla retta BD, sarà vguale ad AB, ouero CD.

Si prenda nella retta AC qualunque punto G, dal quale si faccia cadere la retta GH perpendicolare alla retta BD. Dico che GH è vguale ad AB, ouero CD.

12. Prop.


Perche le rette AB, CD sono frà di loro vguali, e fanno angoli retti con BD per la seconda delle antecedenti dimostrazioni; gli angoli A & C sono frà di loro vguali; nel quadrilatero ABFE i lati opposti AB, EF sono, per ipotesi, frà di loro vguali, e fanno angoli retti con la retta BD, per la citata seconda dimostrazione, gli angoli FEA, BAE sono frà di loro vguali; similmente nel quadrilatero EFDC i lati opposti EF, CD sono, per ipotesi, frà di loro vguali, gli angoli in F, & D sono retti, e per la seconda dimostrazione, gli angoli FEC, DCE sono frà di loro vguali; ma l'angolo C è dimostrato vguale all'angolo A, e l'angolo A vguale all'angolo FEA, sarà l'angolo FEA, vguale all'angolo FEC, dal che gli angoli in E sono retti; ma l'angolo FEC è dimostrato vguale all'angolo C, e l'angolo FEA è dimostrato vguale all'angolo A, gli angoli dunque A, & C sono retti.



1. A. Com.

Se la retta GH non è vguale ad AB, una delle due sarà maggiore; supposto che la retta GH sia maggiore di AB, si faccia HI vguale ad AB, si tirino le rette AI, CI; essendo gli angoli DCA, BAC retti, sarà l'angolo BAI minore del retto, e l'angolo ancora DCI sarà minore d'un angolo retto; nel quadrilatero ABHI i lati opposti AB, HI sono frà di loro vguali, e fanno angoli retti con la retta BD, per la seconda dimostrazione l'angolo BAI sarà vguale all'angolo HIA, ma l'angolo BAI è minore del retto, l'angolo dunque HIA sarà minore del retto, ed il supplemento AIG sarà maggiore d'un angolo retto; similmente nel quadrilatero IHDC il lato IH, per costruzione è vguale al lato CD, gli angoli in H, & D sono retti, e per la seconda dimostrazione, gli angoli DCI, HIC sono frà di loro vguali; ma l'angolo DCI è minore del retto,

3. Prop.



1. Postul.

13. prop.

G 2

sarà

13. prop.

farà l'angolo HIC minore del retto, ed il supplemento à due retti, cioè l'angolo GIC sarà maggiore d'un angolo retto: sù dimostrarò l'angolo AIG maggiore d'un retto; tutto l'angolo AIC sarà maggiore di due angoli retti. Nel triangolo AIC i due angoli AIC , ACI , giunti insieme, sono molto maggiori di due angoli retti, ch'è contro alla decimasestima proposizione: non dunque la retta GH è maggiore di AB ; e perciò le rette GH , AB sono frà di loro uguali; e perche il punto G è preso ad arbitrio, perciò ogn'una dell'altre rette, che dal lato AC cade perpendicolare al lato BD , sarà uguale ad AB , ouero CD ; ed in conseguenza saranno tutte frà di loro uguali, come sù proposto dimostrare.

V I I.


Se due rette linee uguali, come AB , CD , sono in vn medesimo piano, e fanno angoli retti con qualch'altra linea retta BD , tirata la retta AC , dagl'infiniti punti E immaginati in AC , s'intendono cadere le innumerabili rette EF ad angoli retti sopra la retta BD . Dico che ogni retta linea EF è uguale alla retta AB , ouero CD .

Se ogni retta EF non è uguale alla retta AB , ouero CD , niuna di quelle sarà uguale ad AB , perche se qualebed'una fosse uguale ad AB , ouero CD per l'antecedente dimostrazione, tutte sarebbero uguali ad AB , ouero CD , ed uguali frà di loro; bor se niuna sarà uguale ad AB , ouero CD , ogn'una di quelle d'è frà maggiore, o pure sarà minore di AB , ouero CD .

13. prop.

Sia nel primo luogo ogni retta EF maggiore di AB , da ciascuna delle rette EF se ne taglia la parte FG uguale alla retta AB , ouero CD , e per gl'infiniti punti G , notati nelle innumerabili rette EF , si concepisca passare la linea AGC , la quale d'è frà linea retta, o linea curva. Supposto prima, che la linea AGC sia linea retta; perche i punti G cadono fuori della retta AC , le due rette linee AEC , AGC , chiuderanno figura, il che è impossibile; per quel che s'è dimostrato nell'annotatione doppo la quarta proposizione al numero terzo, non dunque AGC , è linea retta. Sia di nouo AGC linea curva; perche la notata AGC , e la retta AEC s'uniscono ne' estremi A , & C , perciò chiudono figura, e per la quinta delle antecedenti dimostrazioni, non tutte le rette AB , GF , CD , che dalla notata AGC cadono perpendicolari alla retta BD , sono frà di loro uguali; mà per costruzione le perpendicolari AB , GF , CD sono tutte frà di loro uguali, sarebbero, e non sarebbero frà di loro uguali, ch'è impossibile, non dunque ciascuna retta EF è maggiore di AB , ouero CD .

Di nouo supposto, ch'ogni retta EF sia minore di AB , ouero CD , si prolungano tutte le rette FE verso H , e si faccia FH uguale ad AB , ouero CD ; si



dimo-

dimostri, come prima si fece, che AHC non è linea retta; ma ch'è linea curva, e per la quinta delle antecedenti dimostrazioni; non tutte le rette AB, HF, CD, che dalla notata AHC cadono perpendicolari alla retta BD sono frà di loro uguali; ma per costruzione le perpendicolari AB, HF, CD sono tutte frà di loro uguali, sarebbero e non sarebbero tutte frà di loro uguali, ch'è impossibile; non dunque ciascuna retta EF è minore di AB, ouero CD, ne meno, per quel che s'è dimostrato, è maggiore, ed in conseguenza tutte le rette AB, EF, CD sono frà di loro uguali, come fu proposto dimostrare.


V I I I.

Se due lati opposti d'un quadrilatero sono frà di loro uguali, e fanno angoli retti con vno degl'altri lati, i due rimanenti angoli sono retti.

Sia il quadrilatero ABCD, del quale i due lati opposti AB, DC siano frà di loro uguali, e facciano angoli retti con la retta BC. Dico che gli angoli BAD, CDA sono angoli retti.

Perche nel quadrilatero ABCD i lati opposti AB, DC sono frà di loro uguali, e fanno angoli uguali con la retta BC, per la seconda delle antecedenti dimostrazioni gli angoli in A, & D sono frà di loro uguali.

Si prenda in AD qualunque puto E, dal quale si faccia cadere la retta EF perpendicolare a la retta BC, sarà EF, per l'antecedente dimostrazione, uguale ad AB, ouero CD, e considerando il quadrilatero ABFE, i di cui lati opposti AB, EF sono frà di loro uguali, e fanno angoli retti con la retta BC, per la seconda dimostrazione, gli angoli FEA, BAE sono frà di loro uguali. Nell'istesso modo, considerando il quadrilatero EFC D si dimostrerà, che l'angolo FED è uguale all'angolo CDE; e perche gli angoli in A, & D furono dimostrati uguali, sarà l'angolo FEA uguale all'angolo FED, e per la decima definizione, gli angoli FED, FEA sono retti; ma l'angolo FED è dimostrato uguale all'angolo CDE, e l'angolo FEA uguale all'angolo BAE, in conseguenza gli angoli in A, & D sono retti, come fu proposto dimostrare.



I X.

Se due rette linee in vn medesimo piano sono segate da vn altra retta linea ad angoli retti, quelle continuate in infinito dall'vna, e l'altra parte mai s'auicinano, o s'allontanano scambievolmente in luogo alcuno della loro estensione, e perciò mai concorreranno insieme, e queste sono quelle rette, che nella 34. definizione habbiamo chiamate, e per l'auuenire chiamaremo rette linee parallele; ouero ugualmente distanti.

Siano le rette linee AB , CD in un medesimo piano, segate dalla retta EF ad angoli retti, come in E ed F . Dico che continuate le rette AB , CD dall'una, o l'altra parte in infinito, mai in luogo alcuno della loro estensione s'auvicineranno, o allontaneranno scambievolmente.

Nella retta AB si prenda qualunque punto G , fuori del punto E , dal quale si faccia cadere la retta GH perpendicolare alla retta CD ; se la retta GH non è uguale alla retta EF , o sarà maggiore, o vero minore di EF ; sia prima GH maggiore di EF , si faccia IH uguale ad EF , e si tirino le rette EI . Si consideri il quadrilatero $EFHI$, del quale i due lati opposti EF , IH sono per costruzione, fra di loro uguali, e fanno angoli retti con la retta CD , e per l'antecedente dimostrazione, gli angoli HIE , FEI sono retti, ma l'angolo FEG è supposto retto, sarà l'angolo FEI uguale all'angolo FEG , la parte uguale al tutto, ch'è impossibile, non dunque la retta GH è maggiore della retta EF .

Di nuovo supposto, che la retta GH sia minore di EF , si faccia FI uguale ad HG , si tirino la retta GI . Nel triangolo GEI l'angolo esterno FIG è maggiore dell'angolo E interno, ed opposto; ma l'angolo FEG è supposto retto, sarà l'angolo FIG maggiore d'un angolo retto.

Si consideri il quadrilatero $IFHG$ del quale i due lati opposti IF , GH per costruzione sono fra di loro uguali, e fanno angoli retti con la retta CD , per l'antecedente dimostrazione li angoli HGI , FIG sono retti, ma l'angolo FIG si è dimostrato maggiore d'un angolo retto, sarebbe l'angolo FIG maggiore ed uguale ad un angolo retto, ch'è impossibile, non dunque la retta GH è minore di EF , ne meno per quel, che s'è dimostrato è maggiore, e perciò le rette EF , GH sono fra di loro uguali: hor essendo le rette GH , EF fra di loro uguali, e fanno angoli retti con la

retta CD , per l'antecedente dimostrazione l'angolo HGE sarà retto; e perché il punto G è preso ad arbitrio nella retta AB , per ciò ogni retta linea, che da ciascuno degl'infiniti pun-

ti immaginati in AB cade perpendicolare alla retta CD fa angoli retti con la retta AB , ed è uguale alla retta EF , dal che tutte sono fra di loro uguali, e perciò continuate le rette AB , CD in infinito, in nessun luogo della loro estensione s'auvicinano, ne si scostano. Per la qual cosa le rette AB , CD segate dalla retta EF ad angoli retti continuate dall'una, e l'altra parte in infinito in nessun luogo della loro estensione s'auvicinano, o scostano, che era da dimostrarsi. Si chiameranno le rette AB , CD come si disse nella 34. definizione rette linee parallele, o veramente distanti.

X.

Se due rette linee sono frà di loro parallele, quella retta linea, che fega vna di quelle ad angoli retti, continuata segarà l'altra ad angoli retti.

Siano le rette linee AB, CD fra di loro parallele, ed in qualche punto E sopra la retta CD sia eleuata la retta EF ad angoli retti con la retta CD : Dico che continuata la retta EF segarà la retta AB ad angoli retti.

S'intendano segate le parallele AB, CD , ad angoli retti da qualche retta HI , si faccia HG ^a uguale ad IE , e dal punto G , al punto E , ^b si tiri la retta GE ; perche le rette GH, EI sono fra di loro uguali e fanno angoli retti con HI , per l'ottaua delle an-



3. prop.

2. pol.

cedenti dimostrazioni, gli angoli IEG, HGE sono retti; se dunque la retta EF non passa per la retta EG , essendo l'angolo FEI retto, sarà l'angolo GEI uguale all'angolo FEI , la parte uguale al tutto ch'è impossibile; perciò la retta EF passa per la retta EG , e concorre con AB nel punto G , ad angoli retti, come si proposto dimostrare.


X I.

Se farà qualunque angolo acuto rettilineo ABC , e da gl'infiniti punti immaginati nella retta AB continuata verso A in infinito, cadano infinite perpendicolari alla retta CD . Dico che quanto il punto preso in AB sarà più lontano dal punto B , tanto la perpendicolare segarà la retta CB nel punto più remoto dal punto B .

Cadano da varj punti presi in AB le rette DE, FG ^a perpendicolari alla retta CB , e sia il punto D più lontano dal punto B di quello, ch'è il punto F . Dico che il punto E sarà più lontano dal punto B , che il punto G ; se il punto E non è più lontano dal punto B , che il punto G , la retta DE caderà nel punto G , come si la retta DG , ouero caderà fra li punti G, B , come si la retta DH , la quale sega la retta FG in qualche punto I ; se cade nel punto G , essendo l'angolo DGE

11. prop.

FGE retti, saranno ^b frà di loro uguali, dal che la parte ^c sarà uguale al tutto ch'è impossibile, non dunque la retta DE cade nel punto G , se cade fra i punti G, B , come in H , essendo gli angoli IHG, IGH retti, nel triangolo



10. assom.

9. assom.


IGH

IGH i due ang.li IHG, IGH nò faranno minori di due angoli retti, ch'è contro alla decimasettima proposizione, nò dunque la retta DE cade frà li punti GB; sù dimostrato che ne meno cade nel punto G, in conseguenza caderà nella retta GC, daleche sarà EB maggiore di GB: se dunque concepiremo continuate le rette BA, BC in infinito verso A, & C; e da g'infiniti pùti immaginati nella retta DA infinita verso A, si faranno cadere perpendicolari alla retta CE, nell'istesso modo si dimostrerà, che quella segarà la retta CE nel punto più lontano dal punto B, la quale caderà dal punto in AD più lontano da esso punto B, che era da dimostrarsi.

X I I.

Se sarà qualunque angolo acuto A B C, ed in qualche punto D, preso nella retta CB, sia eleuata la retta DE ad angoli retti con CB. Dico che continuata la retta DE, quella concorrerà con AB in qualche punto F.

Si prenda in AB qualunque punto G, dal quale si faccia cadere la retta GH^a perpendicolare alla retta CD: se la retta GH cade nel punto D quella passerà per la retta DE; e perciò continuata DE passerà per il punto G, e segarà la retta AB.



Se la retta GH cade fra li punti C, D, essendo le rette ED, GH perpendicolari alla retta CB, per la nona dimostrazione, le rette DE, HG sono fra di loro parallele, dal che continue, mai concorreranno scambievolmente insieme, e perciò continuata la retta DE necessariamente segarà la retta GB.

Se la retta GH cade fra li punti D, B, come fa la retta KI, s'intendano le rette BA, BC^b continue in infinito verso A, & C, e per l'antecedente dimostrazione infinite rette linee possono cadere dalla retta AK perpendicolari alla retta CI, delle quali quella segarà CB in luogo più lontano dal punto B, la quale verrà da quel punto in AB, che sarà più lontano da esso punto B, e perche la retta DB è terminata, e le rette BA, BC s'intendono continue in infinito verso A, & C; perciò da g'infiniti punti G, immaginati nella indeterminata retta GA, possono cadere innumerevoli rette GH perpendicolari alla retta CD, le quali seghino la retta CD in qualche punto H, più lontano dal punto B di quello, ch'è il punto D; sia dunque quella perpendicolare, che sega la retta CD, la notata GH; perche le rette GH, ED fanno angoli retti con la retta CD, per la nona dimostrazione, le rette DE, HG sono fra di loro parallele, e perciò continue mai concorreranno insieme, ma la retta HG concorre con AB nel punto G, necessariamente la retta DE continuata concorrerà con la retta GB in qualche punto F, come sù proposto dimostrare.

THEOREMA XVIII. PROPOSITIONE XXVII.

Se due rette linee poste in vn medesimo piano sono se-

gate

gate da vn'altra linea retta, e gli angoli alterni sono frà di loro vguali, quelle rette linee sono frà di loro parallele.


Siano le rette linee AB , CD in vn medesimo piano, segate dalla retta EF , e gli angoli alterni BGH , CHG , siano frà di loro vguali: Dico che le rette AB , CD sono frà di loro parallele. Si diuida la retta GH in due parti vguali nel puto I , dal punto I si facciano cadere le rette IK , IL che facciano angoli retti con le rette CD , AB , e si considerino i due triangoli IKH , ILG ; perche l'angolo IHK , per ipotesi è vguale all'angolo IGL ; e l'angolo IKH , per costruzione è vguale all'angolo ILG , faranno i due angoli IHK , IKH vguali all' due angoli IGL , ILG ; il lato IH , per costruzione, è vguale al lato IG , faranno li rimanenti due lati HK , LI vguali alli restanti due lati GL , LI , ed il rimanente angolo KIH vguale al rimanente angolo GIL ; se le aggiunga vgualmente l'angolo HIL , i due angoli KIH , HIL faranno vguali alli due angoli GIL , LIH ; mali due angoli GIL , LIH sono vguali à due angoli retti, faranno li due angoli KIH , HIL vguali à due angoli retti; e perciò le due rette KI , IL costituiscono vna sola retta linea; e perche gli angoli in K , ed L sono per costruzione retti, le due rette AB , CD faranno segate dalla retta KL ad angoli retti, e per la nona dimostrazione le rette AB , CD sono frà di loro parallele, ch'era da dimostrarli.

THEOREMA XIX. PROPOSITIONE XXVIII.

Se due rette linee poste in vn medesimo piano sono segate da vn'altra linea retta, e l'angolo esterno è vguale all'angolo interno, ed opposto dalla medesima parte; ouero li due angoli interni, e dalla medesima parte sono vguali à due angoli retti, quelle due rette linee sono frà di loro parallele.

Siano le due rette linee AB , CD in vn medesimo piano, segate dalla retta EF , come in G , ed H , e l'angolo EGB esterno, sia vguale all'angolo DHG interno, ed opposto dalla medesima parte B , & D ; ouero li due angoli BGH , DHG interni, e dalla medesima parte BD ; siano vguali à due angoli retti: Dico che le rette AB , CD sono frà di loro parallele.

Perche l'angolo AGH è vguale all'angolo al vertice EGB , e l'angolo DHG per ipotesi è vguale al medesimo angolo EGB , sarà l'angolo AGH vguale all'angolo alterno DHG , e



H

per

d 10. propof.

d 12. propof.

c 2. affom.

d 26. prop.

c 2. affom.

f 13. prop.

c 14. prop.

d 15. prop.

d 2. affom.

per l'antecedente proposizione le rette AB, CD sono frà di loro parallele.

Di nuovo perche li due angoli BGE, BGH ^c sono uguali à due angoli retti, e li due angoli BGH, DHG, per ipotesi sono uguali à due angoli retti, li due angoli BGE, BGH ^d faranno uguali alli due angoli BGH DHG; se ne leui il commune angolo BGH, resta l'angolo esterno EGB ^e vguale all'angolo DHG interno, ed opposto dalla medesima parte, e per quel che si è dimostrato, le rette linee AB, CD sono frà di loro parallele, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA XX. PROPOSITIONE XXIX.

Se due rette linee parallele sono segate da vn'altra linea retta; gli angoli alterni sono frà di loro uguali; ogn'angolo esterno è vguale al corrispondente angolo interno, ed opposto dalla medesima parte, e li due angoli interni, e dalla medesima parte sono uguali à due angoli retti.


Siano le due rette linee parallele AB, CD, segate dalla retta EF, come in G ed H: Dico prima, che gl'angoli alterni BGH, CHG sono frà loro uguali

Si diuidi la retta GH ^a in due parti uguali nel punto I, dal punto I si faccia cadere la retta IK ^b perpendicolare alla retta CD, si prolunghi la retta KI ^c verso L, e per l'annotatione antecedente al numero decimo, la retta KI continuata segarà la retta AB ad angoli retti. Si considerino li due triangoli IKH, ILG: perche gli angoli IKH, ILG sono retti, e gli angoli al vertice KIH, LIG ^d sono frà di loro uguali, i due angoli HKI, HIK ^e sono uguali alli due GLI, GIL, il lato IH per costruzione è vguale al lato GI, farà il rimanente angolo IHK ^f vguale al rimanente angolo IGL; dal che gli angoli alterni BGH, CHG sono frà di loro uguali, ed i supplementi à due retti, cioè gli angoli alterni AGH, DHG sono frà di loro uguali, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

Dico nel secondo luogo, che l'angolo esterno EGB è vguale all'angolo DHG interno, ed opposto dalla medesima parte BD.

Perche l'angolo EGB ^g è vguale all'angolo al vertice AGH, e l'angolo DHG è dimostrato vguale al medesimo angolo AGH, farà l'angolo EGB ^h esterno vguale all'angolo GHD interno, ed opposto dalla medesima parte, ed i supplementi à due angoli retti, cioè l'angolo esterno EGA, farà vguale all'angolo CHG interno ed opposto dalla medesima parte AC. Nell'istesso modo si dimostrerà l'angolo esterno CHF essere vguale all'angolo AGH interno, ed opposto, e che l'angolo FHD esterno è vguale all'angolo BGH interno, ed opposto, il che era da dimostrarsi nel 2. luogo.

Dico



Dico finalmente che li due angoli BGH , DHG interni, e dalla medesima parte BD sono vguali à due angoli retti.

Perche l'angolo EGB è dimostrato vguale all'angolo DHG , vguualmente se gl'aggiunga l'angolo BGH , li due angoli BGE , BGH saranno vguali alli due angoli DHG , BGH , ma li due angoli BGE , BGH sono vguali à due angoli retti, li due angoli dunque BGH , DHG sono vguali à due angoli retti, e li supplementi à due retti, cioè li due angoli AGH , CHG , interni, e dalla medesima parte, sono vguali à due angoli retti, come fù proposto dimostrare.

K. 2. a. a. i. o. m.

13. propof.


13. prop.

THEOREMA XXI. PROPOSITIONE XXX.

Quelle rette linee, che sono parallele ad vna medesima linea retta, se non costituiscono vna sola retta linea, sono frà di loro parallele.

Sia la retta AB parallela alla retta EF , e la retta CD parallela alla medesima EF , e le rette AB , CD non costituiscano vna sola retta linea. Dico che le rette AB , CD sono frà di loro parallele.

Si concepiscano segate tutte da qualche retta linea GH , nelli punti, per esempio, I , L , K ; perche la retta AB è supposta parallela ad EF , l'angolo GIB esterno, è vguale all'angolo IKF interno, ed opposto dalla medesima parte. Similmente essendo, per ipotesi, CD parallela alla retta EF , farà l'angolo IKF vguale all'angolo ILD , mà l'angolo IKF fù dimostrato vguale all'angolo GIB , farà l'angolo GIB vguale all'angolo ILD : hor perche le rette AB , CD sono segate dalla retta GH , e l'angolo esterno GIB è dimostrato vguale all'angolo ILD interno, ed opposto dalla medesima parte, farà la retta AB parallela alla retta CD , ch'era da dimostrarsi.



13. prop.

13. prop.

1. a. i. o. m.


13. prop.

THEOREMA XXII. PROPOSITIONE XXXI.

Data vna retta linea infinita, ed vn punto fuori di essa, per il dato punto far passare vna retta linea parallela alla data.

Sia data la retta linea infinita AB , ed il punto fuori C , per il dato punto C si vuole far passare vna retta parallela alla data AB .

Si prenda in AB qualunque punto D , dal dato punto C al punto D si tiri la retta CD , nel punto C , sopra la retta CD , si costituisca l'angolo ECD vguale



1. post.

H 2

le

b 23. prop.


le ^b all'angolo A D C. Dico che la retta EC continuata se si vuole verso F, ed E, è parallela alla data retta AB.

c 27. prop.

Perche le rette FE, AB sono segate dalla retta CD, e gli angoli alterni ECD, ADC, per costruzione, sono frà di loro uguali, farà la retta FE: parallela alla data retta AB; ch'era da farsi, e dimostrarli.

COROLLARIO.

Da quel che s'è detto è manifesto, che per vn medesimo punto non possono passare due rette



parallele ad vna medesima retta linea, perche se per qualche punto A passino le rette AB, AC parallele alla retta DE, le due AB, AC, per l'antecedente proposizione farebbero frà di loro parallele; dal che le due AB, AC, farebbero frà di loro parallele, e concorrerebbero nel punto A, ch'è impossibile, non dunque per vn medesimo punto possono passare due rette linee parallele ad vn'altra retta linea.


S C O L I O I.

Qui facilmente si può dimostrare l'undecimo assioma d'Euclide nel modo seguente.

Se due linee rette in vn medesimo piano sono segate da vn'altra linea retta, e li due angoli interni dalla medesima parte sono minori di due angoli retti, quelle due rette linee prolungate concorreranno insieme da quella parte, doue sono li due angoli minori de' due angoli retti.

a 29. prop.

Siano le due rette linee AB, CD in vn medesimo piano segate dalla retta EF, come in G, ed H, e gli angoli BGH, DHG interni, dalla medesima parte BD, siano minori di due angoli retti: Dico che le rette AB, CD continue concorreranno verso M; per l'antecedente proposizione si faccia passare per il punto G la retta IGR parallela alla retta CD, li due angoli KGH, DHG saranno uguali a due angoli retti, ma li due angoli BGH, DHG, per ipotesi sono minori di due angoli retti, perciò li due angoli KGH, DHG sono maggiori de' due angoli BGH, DHG; se ne leui il comune angolo DHG, resta l'angolo KGH maggiore dell'angolo



b 5. axiom.

BGH,

BGH, dal che la retta BG sega l'angolo KGH, e la retta AB sega la retta IK. Dal punto G si faccia cadere la retta GL perpendicolare alla retta CD, perche le rette IK, CD per costruzione sono parallele, e la retta GL fa angoli retti con la retta CD, per il numero decimo all'annotazione antecedente, la retta LG fa angoli retti con la retta IK, daleche l'angolo LGB sarà acuto; finalmente essendo l'angolo BGL acuto, e la retta LD fa angoli retti con la retta GL, per il numero duodecimo dell'antecedente annotazione, la retta LD concorrerà con la retta GB in qualche punto M, come fu proposto dimostrare.

COROLLARIO.

Da quel che s'è detto è manifesto, che se vna retta sega vna di due rette parallele, quella continuata sega l'altra delle parallele: poiche essendo IK, CD frà di loro parallele, s'è dimostrato, che la retta AB, la quale sega la parallela IK continuata, concorre con l'altra parallela CD.


S C O L I O II.

Perche quest'opera non sia mancante in cosa alcuna m'è parso bene aggiungere la seguente dimostrazione.

Se due rette linee in vn medesimo piano non sono frà di loro parallele, quelle continuate concorrono scambievolmente in qualche punto: e se due rette linee in vn medesimo piano continuate non concorrono, quelle sono frà di loro parallele.

Siano le due rette linee AB, CD in vn medesimo piano, e supposto prima, che non siano frà di loro parallele: Dico che continuate concorrono scambievolmente in qualche punto.

Nella retta AB sia preso qualunque punto E, per il quale si faccia passare la retta FG^a parallela alla retta CD, quella per l'annotazione dopo la quarta proposizione, sega la retta AB; perche se non la sega, passerà per la retta AB, ed in tal caso la retta AB, sarà parallela alla retta CD, ch'è contro all'ipotesi: si seghino dunque, e la parte EG cada sopra la retta EB, dal punto E si faccia cadere la retta EH perpendicolare alla retta CD, per l'annotazione dopo la 26. proposizione numero decimo, la retta EH sarà angoli retti con la retta FG;




dal

dal che l'angolo BEH sarà minore d'un angolo retto, l'angolo DHE per costruzione è retto, i due angoli dunque BEH, DHE sono minori di due angoli retti, e per lo Scolio antecedente, le rette AB, CD continuate concorrono in qualche punto I, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

Dico di nuovo, che se le rette AB, CD, posse in un medesimo piano, e continuate non concorrono, sono fra di loro parallele.

Se le rette AB, CD non sono fra di loro parallele, si prenda in AB qualunque punto E, per il quale si faccia passare la retta FG: parallela alla retta CD; se la retta FG passa per la retta AB, sarà la retta AB parallela, ma se non passa per la retta AB, quelle si segaranno scambievolmente nel punto E; e cada dūque la parte EG sopra la retta AB, e la parte FE sotto: Dal



punto E sopra la retta CD, si faccia cadere la perpendicolare EH, e per l'annotazione dopo la 26. proposizione numero decimo, la retta EH sarà angoli retti con la parallela FG; dal che l'angolo HEG sarà retto, ma l'angolo BEH è minore dell'angolo GEH, sarà l'angolo BEH minore del retto; e perché l'angolo DHE, per costruzione, è retto, i due angoli BEH, DHE saranno minori di due angoli retti, e per l'antecedente Scolio le rette EB, HD continuate concorrono, che è contro all'ipotesi, mentre fu supposto, che non concorrono; per la qual cosa le rette AB, CD sono fra di loro parallele, come fu proposto dimostrare.

C O R O L L A R I O.

Da quel che s'è dimostrato è manifesto, che se due rette linee sono in vn medesimo piano, le quali continuate non concorrono, quelle in nissun luogo della loro estensione s'auicinano, o s'allontanano, stante che s'è dimostrato, che quando non concorrono sono fra di loro parallele.

S C O L I O III.

Con tutto ch'Euclide habbia disposto questi Elementi con ordine interamente perfetto, non hà però dimostrato gli elementi delle parallele con metodo corrispondente alla perfezione dell'ordine; il che osservato da nostri Maggiori, per non lasciare mancante in questa parte vn'opera di tanta importanza, cercarono con varij mezzi supplire à quello, ch'Euclide ò perché non auuertisse all'equiuoco, ò perché stimasse secondo il suo metodo il tutto ben dimostrato, non hebbe in molta consideratione; e perché la mancanza non è nelle dimostrazioni, ma bensì nella certezza de' principj hanno creduto alcuni, che i nostri Antichi prendessero nuouj principj, con i quali poi dimostrassero le passioni delle

delle parallele, ma perche queste dimostrazioni in modo alcuno non si trouano, cōgetturano, che forse queste non fossero più stabili di quelle, che porta Proclo nel suo commento, perche se fossero migliori esso Proclo non le haurebbe trascurate, come hà fatto dell'altre, delle quali appresso si parlerà.

Di tre principij si serue Euclide nel dimostrare le passioni delle parallele, il primo de' quali (cb'è la definizione delle rette parallele) è stimato mancante, per le ragioni da me addotte nella 34. definizione, cioè che chiamando Euclide rette linee parallele quelle, che poste in un medesimo piano, e continue in infinito mai scambievolmente concorrono, e non essendosi dimostrato come due rette linee in un medesimo piano non concorrendo, ne meno nella loro infinita estensione s'auuicinano, ne si scostano, mentre si trouano in natura varie linee, le quali poste in un medesimo piano, e continue non concorrono, e sempre scambievolmente s'auuicinano; perciò tal definizione è stimata mancante, ed insufficiente à spiegare la propria natura delle rette parallele: ond'io, seguendo la sentenza di Possidonio, e Gemini, hò definito le rette parallele, non per la negatiua del semplice loro scambieuolo concorso, come fà Euclide, ma per la negatiua del scambieuolo auuicinamento, e scostamento nella loro infinita estensione, il che tutto hò dimostrato nell'annotatione dopo la 26. proposizione, e secondo tal definizione, senza turbare in cosa alcuna il bell'ordine dato da Euclide à questi elementi, dimostro tutte le passioni delle parallele, come ogn'uno da se può vedere, senza auualermi d'altro principio, ma con le sole cose prima dimostrate.


Conosciuta ancora da graui Autori de nostri tempi l'insufficienza dell'antedetta definizione d'Euclide, stimarono necessario abbracciare la sentenza di Possidonio, e Gemini, e dimostrare le passioni delle parallele con metodo diuerso da quello tenuto da Euclide, e perciò fare s'auualsero d'un nouo principio riceuuto dal P. Clauio nel suo Commento ad Euclide cioè che una retta linea come *AB*, muouendosi trasuersalmente sempre perpendicolare, cioè ad angoli retti, sopra la retta *BC*, con l'altro estremo *A* descriua la retta linea *AD*.

Com pace di così Illustri Autori non sò vedere qual certezza maggiore sia in questo principio, che in quello d'Euclide quando chiama rettelinee parallele quelle due, cb'essendo in un medesimo piano, e continue in infinito mai concorrono: certo è che se faremo esatta riflessione all'uno, ed all'altro principio, senza dubio trouaremo, o che la definizione d'Euclide è totalmente perfetta, ed in tal caso gl' Antichi soprannominati hanno errato, e con essi ancora noi, o pure non è perfetta, e per una simile ragione, per la quale quella è mancante: o anco imperfetto, è mancante l'antecedente principio. E per chiarezza di quanto s'è detto, mi si permetta, che io faccia una breue repetitione circa à quello, che rende insufficiente la definizione d'Euclide, ed è, che trouandosi in natura due linee curve, come sono le Parabole congruenti, o le hyperbole congruenti, le quali sono in un medesimo piano, e continue in infinito sempre s'auuicinano, e mai concorrono: similmente trouandosi in natura,

Proclo lib. 2
cap. 11.

Dopo la 28.
propol. del
primo lib.

Viuiano de
maximis &
minimis
lib. 1.




due


Apoll. 14.
propof. del
lib. 2. che
corrisponde
alla... prop.
pos. degl'E-
lementi Co-
nici possi
nel fine di
questo tomo

due altre linee, cioè una curva, e l'altra retta, come è l'hyperbole, e l'Asyn-
tote, ouero com'è la concoide di Nicomede, e la retta rispetto la quale si gene-
ra essa concoide, le quali sono in un medesimo piano, e continuate in infinito
sempre s'auvicinano, e mai concorrono: Benché Euclide nella sua definizione
parli semplicemente di due linee rette, e non di due curve, ne d'una retta, ed
una curva, con tutto ciò dandosi tal'auvicinamento in due linee curve, come
anco in una retta, ed una curva, cade in dubbio se questo auvicinamento si dia
ancora in due linee rette; e perciò, non hauendo Euclide dimostrato come due
rette continuate in un medesimo piano, non concorrendo, ne meno scambieuo-
lente s'auvicinano, tal definizione è stimata insufficiente à spiegare la natura del-
le rette parallele, ed in conseguenza a tutte le passioni delle parallele restano in-
dimostrate. Supposto questo.

Veniamo alla generatione della Concoide di Nicomede. S'intenda la retta
BN segata dalla retta CA ad angoli retti in qualche punto B, e preso nella
retta AC qualunque punto C, dal quale s'intendano tirare infinite rette linee
come CE, CF, CG, CH che seghino la retta BN come ne i punti I, K, L, M,
N, &c. preso poi in AB qualunque punto A, si facciano le rette IE, KF,
LG, MH ogn'una uguale ad AB quelle saranno frà di loro uguali, e la li-
nea curva, che passa per gl'infiniti punti A, E, F, G, H, &c. si chiama
linea Concoide, la quale continuata in infinito, e continuata ancora la retta
BN in infinito, queste due sempre s'auvicinano, e mai concorrono insieme come
à suo luogo si dimostrerà: hor perche le infinite rette AB, EI, FK, GL, HM
&c. sono frà di loro uguali, se concepiremo la retta linea AB mouersi tran-
suerfalmente sopra la retta BN con
una continuata diminutione d'ango-
lo, quella con l'estremo A disegna-
rà la linea curva AEF GH, se dun-
que la retta AB muouendosi tran-
suerfalmente sopra la retta BN con
una continuata diminutione d'ango-
lo con l'estremo A disegna la curva
AEFGH, cade in dubbio se la mede-
sima, o altra retta linea AB muou-
endosi transuerfalmente sempre ad an-
goli retti sopra la retta BN se con
l'estremo A possa descriuere qualch'
altra linea curva, la quale continuata s'auvicini alla retta BN, e per-
ciò l'antecedente principio preso dal P. Clauio è tanto imperfetto per
quanto è imperfetta la definizione d'Euclide. E se qualch'uno dicesse
non poter concepire come la retta AB muouendosi transuerfalmente so-
pra la retta BN sempre ad angoli retti possa con l'estremo A descriuere altro
che una linea retta, se gli risponde, che ne meno potrà concepire, quando le
rette AB, CD, EF segate dalla retta GH ad angoli retti in A, C, E, come
la retta BA può inclinarsi più verso D, che altroue, e la retta CD possa più
inclinarsi verso B, che verso F, o pure inclinandosi le due AB, CD scambie-
uolmente in modo, che l'una s'auvicini all'altra, ed inclinandosi le due CD,
EF in modo, che l'una s'auvicini all'altra, possa la retta CD nel medesimo
transi-



transito inclinarsi ad F, ed inclinarsi verso B, mentre solo tale avvicinamento si darebbe, quando li due angoli BAC, FEC fossero acuti, nel qual caso, non la retta CD sarebbe inclinata all'una, ed all'altra parte, ma procederebbe dalle inclinazioni delle rette BA, EF, e pure tutte queste ragioni non vagliono con alcuna a favore d'Euclide, ma procedendosi col solito rigore del Geometra si dubita, che non solo le due AB, CD, ouero le due CD, EF, ma



infinita altre perpendicolari alla retta GH continuate siano per avvicinarsi scambievolmente, e perciò la detta definizione d'Euclide è stimata imperfetta, si che fatta la comparazione anco il detto principio preso dal Clauio deue esser stimato imperfetto, ed in conseguenza tutte le passioni delle parallele appoggiate a questo principio si deono riputare non dimostrate, o pure se tal principio non è mancante, ne meno è mancante la definizione d'Euclide.

L'altro principio preso da Euclide, è l'undecima notione nel testo greco, ouero la quinta petizione appresso Proclo, Campano, e Commandino, ed il decimoterzo assioma appresso il P. Clauio, cioè che quando due rette linee in un medesimo piano sono segate da un'altra retta linea, e gli angoli interni dalla medesima parte sono minori di due angoli retti, quelle due rette linee continue concorreranno da quella parte, doue sono gli angoli minori di due retti; e perche questo principio non è niente diuerso dalla conuersa della 17. proposizione, alcuni seguendo l'orme di Proclo, Gemini, Possidonio, e Tolomeo, la rimuouono dal numero de' principj, e la pongono fra i Theoremi da dimostrarli.

Proclib.4.

Riferisce Proclo, che Tolomeo ritenendo la definizione d'Euclide, e tutte laltre cose, solamente rimosse da i principj l'antedetta undecima notione, la quale prese come Theorem, ed in due modi dimostrò in un suo libro intitolato, Le rette linee continue dalle parti, doue gli angoli sono minori di due retti, concorrono; ma perche esso Proclo ne parla con qualche liure, mentre dice, ch'il progresso tenuto da Tolomeo nell'una, e l'altra dimostrazione è peruerso, ed inganneuole, il che in modo alcuno non può adattarsi nella persona d'un sì grand'buomo come Tolomeo, probabilmente si può credere, che tali dimostrazioni possano essere apocrife.

Controuerse da Proclo l'una, e l'altra dimostrazione, che dice essere di Tolomeo, si sforza egli in dimostrare la medesima notione undecima d'Euclide, con auualersi di quell'antico pronunziato riceuto da Aristotile, cioè che due rette linee, che fanno angolo in qualche punto, continue da quella parte doue non fanno angolo, la loro distanza supera ogni finita grandezza. Rigetta il P. Clauio nel suo commento ad Euclide la dimostrazione fatta da Proclo, allegando che questo pronunziato d'Aristotele è santo incerto, per quanto è incerta l'undecima notione d'Euclide, e vi è chi dottissimamente rigetta la medesima dimostrazione di Proclo ancora col concedergli il pronunziato del Peripatetico, dimostrando ch'esso Proclo nella sua dimostrazione viene a supporre per vero quello, che deue dimostrarli, cioè che due rette in un medesimo piano segate da un'altra retta ad angoli retti, quelle continue in infiniti in nessun luogo della loro estensione s'avvicinano, o si scostano,

Proclib.4.

lib. primo
de Cielo.Scol. alla
prop. 28. del
lib. primo.

Scol. خالد
propof. 28.
lib. primo.

ma da per tutto ritengono il medesimo intervallo.

Finalmente il P. Clauio, ritenendo la medesima definizione d'Euclide, cerca supplire alla mancanza di Proclo con dimostrare per altra via l'undecima notione d'Euclide, e perciò fare l'auuale del sopradetto principio, cioè, che muovendosi la retta AB trasuersalmente, & ad angoli retti, sopra la retta BC, con l'estremo A disegna la retta linea AD, il che sopra si riprouato, per essere questo principio tanto imperfetto per quanto è stimata imperfetta la definizione sopra nominata d'Euclide e perciò il P. Clauio ne meno potè conseguire l'intento.

Hauendo io dunque offeruato, che per l'insufficienza de' principj presi, tanti huomini Illustri non hanno potuto conseguire l'intento di rendere ben dimostrate le passioni delle parallele,

sopra le quali è fabricata poi tutta la macchina composta di varie scienze, che si numerano nella Matematica, pensai rimuouere affatto dalla Geometria quei principj, che non erano per se noti, e ne meno si poteuano dimostrare, e ricorrendo alla comparatione della linea retta, e la curua, conobbi essere impossibile, che la retta linea possa esser parallela alla curua, cioè essere impossibile, che tutte le rette, le quali cadono dalla curua perpendicolari alla retta linea, siano frà di loro uguali; e benché questo sia noto dalla sola definizione della retta linea, e della curua, con tutto ciò mi parue bene farui sopra qualche picciola dimostrazione, come si vede nel numero sesto dell' annotatione dopo la 26. propositione, e da quella feci il passaggio ad altre dimostrazioni, mediante le quali facilmente potei dimostrare la 34. definizione: si che con questa, e con altre dimostrazioni, che gli sieguono, non hebbi difficoltà a dimostrare l'undecima notione d'Euclide, e successiuamente tutte laltre passioni delle parallele, come si può vedere nelle propositioni seguenti.

THEOREMA XXII. PROPOSITIONE XXXII.


Continuato qualunque lato d'un triangolo rettilineo, l'angolo esterno è vguale alli due angoli interni, ed opposti, insieme giunti, e li trè angoli del triangolo sono vguale a due angoli retti.

Sia qualsiuoglia triangolo rettilineo ABC, del quale sia continuato qualunque lato BC verso D. Dico che l'angolo DCA esterno è vguale alli due angoli CAB, CBA interni, ed opposti.

37. prop.

Dal pñto C si tiri la retta CE parallela al lato AB.

Perche le rette parallele AB, EC sono segate dalla retta BD



Pan-

l'angolo esterno ECD ^b sarà vguale all'angolo ABC interno, ed opposto dalla medesima parte. Similmente perche le parallele AB, EC sono scgate dalla retta AC , gli angoli ECA, BAC alterni, sono fra di loro vguali, dal che li due angoli DCE, ECA , cioè tutto l'angolo esterno DCA , ^c è vguale alli due angoli CAB, CBA , interni, ed opposti, ch'era da dimostrarli nel primo luogo.

Di nouo essendosi dimostrato l'angolo DCA vguale alli due angoli CAB, CBA , giunti insieme, all'vna, ed all'altra parte s'aggiunga vgualmente l'angolo ACB , li trè angoli CAB, CBA, ACB ^d saranno vguali alli due angoli DCA, ACB , mà li due angoli DCA, ACB , ^d sono vguali à due angoli retti; li tre angoli dunque CAB, CBA, ACB , del triangolo ABC , sono vguali à due angoli retti, ch'era da dimostrarli.

S C O L I O

Da quel, che s'è detto, facilmente si viene in cognitione à quanti angoli retti siano vguali gli angoli d'ogni figura rettilinea.


Tutti gli angoli di qualunque figura rettilinea sono vguali à tanti angoli retti, per quanto è il duplo numero de' lati, che restano, detrattone due.

Per effempio, il triangolo A hà tre lati, detrattone due, resta vno, il di cui duplo sarà due, e così diremo, che trè angoli d'un triangolo sono vguali à due retti, come s'è dimostrato nell'antecedente propositione.

Il quadrilatero BC si diuide nè i due triangoli B, C ; e perche li tre angoli d'un triangolo sono vguali à due retti, li sei angoli dunque delli due triangoli B, C , sono vguali à quattro retti; mà li sei angoli dei triangoli B, C sono vguali à i quattro angoli del quadrilatero BC , saranno i quattro angoli del quadrilatero BC , vguali à quattro retti, cioè, leuato due dal numero de' lati, resta due, il di cui duplo è quattro, e così diremo, che i quattro angoli della figura quadrilatera sono vguali à quattro angoli retti.

Similmente la figura di cinque lati DEF si diuide in trè triangoli, gli angoli d'ogni triangolo sono vguali à due retti, saranno tutti gli angoli delli trè triangoli D, E, F vguali à sei angoli retti, mà tutti gli angoli delli trè triangoli D, E, F sono vguali alli cinque angoli della figura di cinque lati, perciò tutti gli angoli della figura di cinque lati, sono vguali à sei retti, cioè, leuato due dal numero de' lati della figura di cinque lati, resta trè, il di cui duplo è sei, e così diremo, che i cinque angoli della figura di cinque lati sono vguali à sei angoli retti.

Di nouo la figura di sei lati $GHIK$, si diuide nè i quattro triangoli



b 29. prop.

c 1. assiom.

d 1. assiom.

d 13. prop.

d 31. prop.


d 1. assiom.

d 31. prop.

d 1. assiom.

e 31. prop.


G, H, I, K ; e perche tre angoli d'un triangolo sono uguali a due retti, tutti gli angoli de' quattro triangoli G, H, I, K , sono uguali ad otto angoli retti, ma tutti gli angoli delli quattro triangoli G, H, I, K sono uguali alli sei angoli della figura di sei lati $GHIK$, gli angoli dunque della figura di sei lati sono uguali ad otto angoli retti, cioè leuato due dal numero de' lati, che sono sei, resta quattro, il di cui duplo è otto, e così diremo, che gli angoli della figura di sei lati sono uguali ad otto angoli retti, e con quest'ordine si procederà in tutte le altre figure rettilinee.



THEOREMA XXIII. PROPOSITIONE XXXIII.

Se due rette linee sono uguali, e parallele, quelle, che congiungono gl'estremi dalle medesime parti, sono frà di loro uguali, e parallele.

Siano le rette linee AB, CD , frà di loro uguali, e parallele; tirate le rette AC, BD , Dico che le rette AC, BD sono frà di loro uguali, e parallele. Si tiri la retta AD .



a 1. postul.

Perche le rette AB, CD , per ipotesi, sono frà di loro parallele, segate dalla retta AD , gli angoli alterni BAD, CDA sono frà di loro uguali. Si considerino i triangoli ADB, ADC , essendo il lato AB , per ipotesi uguale al lato CD , ed il lato AD è commune, i due lati BA, AD , sono uguali alli due lati CD, DA , l'angolo BAD , è dimostrato uguale all'angolo CDA , farà la base BD uguale alla base AC , e l'angolo BDA uguale all'angolo CAD . Finalmente perche le rette AC, BD sono segate dalla retta AD , e gli angoli alterni BDA, CAD , sono frà di loro uguali, le rette AC, BD faranno frà di loro parallele. Per la qual cosa le rette AC, BD , sono frà di loro uguali, e parallele, ch'era da dimostrarsi.

b 27. prop.

c 2. assom.

d 4. prop.

e 27. prop.

THEOREMA XXIV. PROPOSITIONE XXXIV.

In ogni parallelogrammo i lati opposti sono frà di loro uguali, gli angoli opposti sono frà di loro uguali, ed il diametro diuide il parallelogrammo in due parti uguali.

Sia qualunque parallelogrammo $ABDC$, il di cui diametro AD , come nella figura della proposizione antecedente. Dico che il lato AB è uguale al lato opposto CD , il lato AC è uguale all'opposto BD , l'angolo B è uguale all'angolo opposto C , l'angolo BAC è uguale all'angolo op-

posto

posto BDC, ed il diametro AD diuide il parallelogrammo ABDC in due parti vguali.

Perche il quadrilatero ABDC è supposto parallelogrammo, illato AB^a sarà parallelo al lato DC, ed il lato AC sarà parallelo al opposto DB, ed essendo i lati AB, DC frà di loro paralleli segati dalla retta AD, gli angoli alterni BAD, CDA ^b sono frà di loro vguali. Similméte perche la retta AD sega le parallele AC, BD, gli angoli CAD, BDA alterni ^b sono frà di loro vguali. Si considerino i triangoli BAD, DCA, de' quali i due angoli B A D, B D A, dell'vno, sono vguali alli due angoli CAD, C D A, dell'altro, il lato AD è commune à tutti due, faranno i rimanenti due lati BD, BA ^c dell'vno, vguali à i rimanenti due lati AC, DC dell'altro, cioè il lato AB vguale al lato DC, ed il lato AC vguale al lato DB, ed il restante angolo B sarà vguale al restante angolo C; e perche l'angolo BAD è mostrato vguale all'angolo C D A, e l'angolo BDA vguale all'angolo CAD, farà tutto l'angolo BAC ^d vguale all'opposto angolo B D C. Finalmente perche i due lati AB, B D, del triangolo BAD, sono mostrati vguali à i due lati A C, D C del triangolo ADC, e l'angolo B è mostrato vguale all'angolo C, farà il triangolo ABD ^e vguale al triangolo ACD: per la qual cosa i lati opposti d'ogni parallelogrammo sono vguali, gli angoli opposti sono frà di loro vguali, ed il diametro diuide il parallelogrammo in due parti vguali, ch'era da dimostrarfi.

125. defin.

29. prop.

29. prop.

26. prop.


2. assiom.

4. prop.

S C O L I O.

Li rettangoli contenuti da linee rette vguali sono frà di loro vguali.

Siano li rettangoli BD, FH, e sia AB vguale ad EF, ed il lato BC vguale ad FG. Dico che li rettangoli BD, FH sono frà di loro vguali; si tirino li diametri AC, EG, perche li lati AB, BC sono vguali à i lati EF, FG, e li angoli in B ed F sono vguali, stante che sono retti, sarà il triangolo ABC ^a vguale al triangolo EFG ed i loro dupli, cioè li rettangoli BD, FH ^b sono frà di loro vguali, ch'era da dimostrarfi.



44. prop.

34. prop.

THEOREMA XXV. PROPOSITIONE XXXV.

I Parallelogrammi costituiti sopra d'vna medesima base, e frà le medesime parallele, sono frà di loro vguali.


Sia-

Siano i parallelogrammi $ABCD$, $EBCF$, sopra la medesima base BC , e collocati frà le medesime parallele AF , BC ; dico che la superficie parallelogramma $ABCD$ è vguale alla superficie parallelogramma $EBCF$.

O' gli angoli ADC , FEB terminano in vn solo punto come apparisce nella prima figura; ò l'angolo FEB cade nel lato AD , come nella seconda figura; ò pure cade fuori del lato AD nella continuatione DF , come nella terza figura. Supposto prima che l'angolo FEB termini nel punto D , perche nel parallelogrammo $ABCD$ il lato AD è vguale all'opposto lato BC , e nel parallelogrammo $EBCF$ il lato EF , è vguale all'opposto lato BC , farà il lato AD vguale al lato EF . Similmente nel parallelogrammo $ABCD$ il lato AB è vguale all'opposto lato DC , e nel parallelogrammo $EBCF$ il lato EB è vguale al lato opposto FC , però i due lati AB , BD del triangolo ABD , sono vguali à i due lati EC , CF del triangolo ECF ; la base AD fu mostrata vguale alla base EF , farà l'angolo ABD vguale all'angolo ECF , ed il triangolo ABD vguale al triangolo ECF , vguualmente se gl'aggiunga il commune triangolo EBC , ne verrà il parallelogrammo $ABCD$, vguale al parallelogrammo $EBCF$, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

Cada il punto E frà i punti A , & D , come nella seconda figura. Perche nel parallelogrammo $ABCD$ il lato AD è vguale all'opposto BC , e nel parallelogrammo $EBCF$ il lato EF è vguale all'opposto BC , farà il lato AD vguale al lato EF , se ne leui la commune parte ED , resta AE vguale alla retta DF . In oltre perche nel parallelogrammo $ABCD$ il lato AB è vguale all'opposto DC , e nel parallelogrammo $EBCF$ il lato EB è vguale all'opposto FC , i due lati AB , BE , del triangolo ABE , faranno vguali à i due lati DC , CF del triangolo DCF , la base AE è dimostrata vguale alla base DF , farà l'angolo ABE vguale all'angolo DCF , ed il triangolo ABE vguale al triangolo DCF ; vguualmente se gl'aggiunga il trapetio $EBCD$, ne viene il parallelogrammo $ABCD$ vguale al parallelogrammo $EBCF$, ch'era da dimostrarsi nel secondo caso.

Finalmente cada il punto E nella continuatione DF , come nella terza figura. Perche il lato AD è vguale all'opposto BC , ed il lato EF è vguale all'opposto BC , farà il lato AD vguale al lato EF ; vguualmente se gli aggiunga la retta DE , ne viene la retta AE vguale alla retta DF . Nel parallelogrammo $ABCD$ il lato AB è vguale all'opposto DC , e nel parallelogrammo $EBCF$ il lato EB è vguale all'opposto FC ; però i due lati AB , BE , del triangolo ABE , sono vguali à i due lati DC , CF , del




triangolo DCF; la base AE è mostrata vguale alla base DF, farà l'angolo ABE vguale all'angolo DCF, ed il triangolo ABE vguale al triangolo DCF; da i quali se ne leui il commune triangolo DGE, resta il trapetio ABGD vguale al trapetio GCFE, à i quali s'aggiunga vgualemente il triangolo GBC, ne viene il parallelogrammo ABCD vguale al parallelogrammo EBCF. Per la qual cosa i parallelogrammi, che hanno vna medesima base, e sono frà le medesime parallele, sono frà di loro vguali, ch'era da dimostrarfi.

THEOREMA XXVI. PROPOSITIONE XXXVI.

I Parallelogrammi, che hanno vguali bafi, e sono collocati frà le medesime parallele, sono frà di loro vguali.

Siano li parallelogrammi ABCD, EFGH, i quali habbiano le bafi BC, FG vguali, e siano collocati frà le medesime parallele AH, BG. Dico che sono frà di loro vguali.




Per dimostrar questo dal punto B al punto E si tiri la retta BE, e dal punto C al punto H si tiri la retta CH.

Perche la base BC è supposta vguale alla base FG, ed il lato FG è vguale all'opposito EH, farà la retta BC vguale alla retta EH; e perche la retta AH è parallela, per ipotesi, alla retta BG, faranno le rette EH, CB, frà di loro vguali è parallele, dal che le rette linee EB, HC, che congiungono gli estremi, faranno vguali, e parallele; ed il quadrilatero EBCH farà parallelogrammo. Si considerino li due parallelogrammi ABCD, EBCH, i quali hanno la medesima base BC, e sono costituiti frà le medesime parallele AH, BG, e perciò faranno, frà di loro vguali. Similmente i due parallelogrammi EBCH, EFGH, hanno la medesima base EH, e sono costituiti frà le medesime parallele AH, BG in conseguenza sono frà di loro vguali; ma il parallelogrammo ABCD fu mostrato vguale al parallelogrammo EBCH; il parallelogrammo dunque ABCD sarà vguale al parallelogrammo EFGH, ch'era da dimostrarfi.

THEOREMA XXVII. PROPOSITIONE XXXVII.

I triangoli, che hanno la medesima base, e sono collocati frà le medesime parallele, sono frà di loro vguali.

Siano i triangoli ABC, DEC, i quali habbiano la medesima base BC, e siano collocati frà le medesime parallele AF, BC. Dico che sono frà di loro vguali.




Dal punto C si tiri la retta CE pa-

ralle-

parallela alla retta AB , che concorra con EF in qualche punto E ; e dal medesimo punto C si tiri la retta CF parallela alla retta BD , la quale concorrerà con la retta AD continuata in qualche punto F .

Perche le rette AF , BC , peripotesi, sono parallele, e la retta CE per costruzione è parallela ad AB , come anco la retta CF è parallela al lato BD ; i quadrilateri $ABCE$, $DBCF$, saranno parallelogrammi, i quali, hauendo la medesima base BC , ed essendo collocati frà le medesime



35-defin.

35-prop.

34-prop.


parallele AF , BC , saranno frà di loro vguali; e perche il diametro AC divide il parallelogrammo $ABCE$ in due parti vguali, ed il diametro DC , divide il parallelogrammo $DBCF$ in due parti vguali, essendo essi parallelogrammi frà di loro vguali, le loro metà saranno ancora frà di loro vguali: ma il triangolo $ABCE$ è la metà del parallelogrammo $ABCE$, ed il triangolo DBC è la metà del parallelogrammo $DBCF$, perciò il triangolo ABC sarà vguale al triangolo DBC , come fù proposto dimostrare.

COROLLARIO.

Da qui è manifesto, che se li triangoli posti frà le medesime parallele hanno ineguali basi, quello sarà maggiore, che haurà la base maggiore.

Per esempio siano li triangoli ABC , DEF , frà le medesime parallele AD , BF , e sia la base BC maggiore della base EF .

Dico che il triangolo ABC sarà maggiore del triangolo DEF . Si faccia CG vguale ad EF , e si tiri la retta GA sarà BC maggiore di GC , ed il triangolo ABC maggiore del triangolo AGC , ma per l'antecedente,




proposizione il triangolo AGC è vguale al triangolo DEF , sarà il triangolo ABC maggiore del triangolo DEF , come si disse.

THEOREMA XXVIII. PROPOSITIONE XXXVIII.

I triangoli, che hanno vguali basi, e sono collocati frà le medesime parallele, sono frà di loro vguali.

Siano i triangoli ABC , DEF , i quali habbiano le basi BC , EF vguali, e siano collocati frà le medesime parallele AH , BF . Dico che il triangolo ABC è vguale al triangolo DEF .



31-prop.

Dal punto C si tiri la retta CG paral-

lela

lela alla retta BA, e dal punto F si tiri la retta FH parallela al lato ED; essendo, per ipotesi, AH parallela à BF, i quadrilateri BG, EH^b faranno parallelogrammi, i quali, hauendo le basi BC, EF vguali, ed essendo collocati frà le medesime parallele AH, BF, sono^c frà di loro vguali; e perche il diametro AC^d diuide il parallelogrammo BG in due parti vguali, ed il diametro DF diuide il parallelogrammo EH in due parti vguali, essendo i parallelogrammi BG, EH vguali, le loro metà, cioè li triangoli ABC, DEF, e faranno frà di loro vguali, ch'era da dimostrarli

b 35.d. An.

c 36. prop.
d 34. prop.

e 3. a. om.

THEOREMA XXIX. PROPOSITIONE XXXIX.

I triangoli vguali costituiti in vna medesima base, e collocati dalla medesima parte; sono frà le medesime parallele.

Siano gli vguali triangoli ABC, DBC, i quali habbiano la medesima base BC, e siano collocati dalla medesima parte AD. Dico che sono frà le medesime parallele, cioè che la retta AD è parallela alla retta BC.

Se la retta AD non è parallela alla retta BC, si può dal punto A^a tirare vna retta linea parallela alla retta BC;

ò quella passerà sotto, ò sopra la retta AD; passi prima sotto la retta AD, e sia AE, la quale concorra col lato BD in qualche punto E, si tiri^b la retta CE; e si considerino i due triangoli ABC, EBC, che hanno la medesima base BC, e sono collocati frà le medesime parallele AE, BC, e sarà il triangolo EBC vguale al triangolo ABC, mà per ipotesi, il triangolo DBC è vguale al medesimo triangolo ABC, sarà il triangolo EBC^c vguale al triangolo DBC, la parte vguale al tutto, ch'è^d impossibile, non dunque la retta AE è parallela alla retta BC.

Di nouo passi la tirata parallela sopra la retta AD, e sia la notata AF; si continui il lato BD^b sino che concorra con AF in qualche punto F, si tiri^c la retta CF. Hauemo i triangoli ABC, FBC costituiti sopra la medesima base BC, e frà le medesime parallele AF, BC, e dal che il triangolo FBC sarà vguale al triangolo ABC; mà il triangolo DBC, per ipotesi, è vguale al triangolo ABC, sarà il triangolo DBC^d vguale al triangolo FBC, la parte vguale al tutto, ch'è^e impossibile, non dunque la retta AF è parallela alla retta BC; fu dimostrato, che ne meno la retta AE è parallela alla retta BC, in conseguenza sarà la retta AD parallela alla retta BC, come fu proposto dimostrare.

a 31. prop.

b 1. post.

c 37. prop.

d 1. a. om.

e 9. a. om.

b 2. post.

c 1. post.

d 37. prop.


e 1. a. om.

f 9. a. om.

THEOREMA XXX. PROPOSITIONE XL.

I triangoli vguali, che hanno vguali basi poste nella medesima dirittura, e collocati dalla medesima parte; sono frà le medesime parallele.

Siano gli vguai triangoli ABC , DEF , e sia la base BC vguale alla base EF , nella medesima dirittura BF , ed i triangoli siano collocati dalla medesima parte AD . Dico che sono frà le medesime parallele, cioè che la retta AD è parallela alla retta BF .



a 31. prop.

Se la retta AD non è parallela alla retta BF , si tiri dal punto A una retta lineale parallela alla retta BF , la quale ò passerà sotto la retta AD , ouero sopra. Passi prima, s'è possibile, sotto la retta AD , quella, concorrerà col lato ED in qualche punto G , si tiri ^{b} la retta GF ; ed hauremo i due triangoli ABC , GEF , sopra le vguali basi BC , EF , e frà le medesime parallele AG , BF , ^{c} e perciò farà il triangolo GEF vguale al triangolo ABC , ma il triangolo DEF , per ipotesi, è vguale al medesimo triangolo ABC , farà il triangolo GEF vguale al triangolo DEF , la parte vguale al tutto, ^{d} ch'è impossibile, nondunque la retta AG è parallela alla retta BF .

b 1. post.

c 38. prop.

d 1. a. s. om.

e 9. a. s. om.

Passi di nuouo la parallela sopra la retta AD , che sia la notata AH , la quale concorrerà col lato ED continuato in qualche punto H . Si tiri la retta HF , ed hauremo i triangoli ABC , HEF sopra le vguali basi BC , EF , e frà le medesime parallele AH , BF , dal che il triangolo HEF farà vguale al triangolo ABC ; ma il triangolo DEF è posto vguale al medesimo triangolo ABC , farà il triangolo DEF vguale al triangolo HEF , la parte vguale al tutto, ch'è ^{e} impossibile; nondunque la retta AH è parallela alla retta BF ; ma si disse, che la retta AG ne meno è parallela alla retta BF , in conseguenza la retta AD sarà parallela alla retta BC , ch'era da dimostrarsi.

f 38. prop.


g 1. a. s. om.

h 9. a. s. om.

THEOREMA XXXI. PROPOSITIONE XLI.

Se vn triangolo, ed vn parallelogrammo, haueranno vna medesima base, e saranno collocati frà le medesime parallele il parallelogrammo farà il doppio del triangolo.

Sia il parallelogrammo $ABCE$, ed il triangolo DBC sopra d'vna medesima base BC , e frà le medesime parallele AD , BC . Dico che il parallelogrammo $ABCE$ è il doppio del triangolo DBC .



a 1. postula.

b 34. prop.

c 37. prop.

Si tiri ^{a} la retta AC ; farà il triangolo ABC vguale al triangolo ACE , e perciò il parallelogrammo $ABCE$, farà il doppio del triangolo ABC . In oltre perche i triangoli ABC , DBC , hanno vna medesima base BC , e sono collocati frà le medesime parallele AD , BC , farà il triangolo DBC vguale al triangolo ABC ;

ma


ma il parallelogrammo ABCE, per quel, che s'è mostrato, è il doppio del triangolo ABC, farà il parallelogrammo ABCE il doppio del triangolo DBC, come fu proposto dimostrare.

PROBLEMA XI. PROPOSITIONE XLII.

Dato vn triangolo, ed vn angolo rettilineo, descriuere vn parallelogrammo vguale al dato triangolo, e che habbia vn angolo vguale ad vn angolo dato.

Sia il dato triangolo rettilineo ABC, e l'angolo D. Dico esser possibile descriuere vn parallelogrammo vguale al dato triangolo ABC, e che habbia vn angolo vguale al dato angolo rettilineo D.

Per il vertice A, del triangolo ABC, si faccia passare la retta AE parallela alla base BC: si diuidi la base BC in due parti vguali in F, e nel punto F si costituisca l'angolo CFG, vguale all'angolo D, si continui la retta GF, che costituisce l'angolo, fin che con-




corra con la retta AE in qualche punto G, dal punto C si tiri la retta CE, parallela alla retta FG, la quale concorrerà con la retta AE in qualche punto E. Essendo per costruzione, la retta AE parallela alla base BC, e la retta EC parallela ad FG, il quadrilatero GFCE sarà parallelogrammo. Dico che il parallelogrammo GFCE è vguale al triangolo ABC, ed hà l'angolo GFC vguale all'angolo D.

Si tiri la retta FA, ed habbiamo i due triangoli ABF, AFC, sopra le vguali basi BF, FC, e frà le medesime parallele AE, BC, dalche i triangoli ABF, AFC sono frà di loro vguali, ed il triangolo ABC farà il doppio del triangolo AFC. In oltre il parallelogrammo GFCE, ed il triangolo AFC, hanno la medesima base FC, e sono frà le medesime parallele AE, BC, farà il parallelogrammo GFCE il doppio del triangolo AFC; ma il triangolo ABC fu mostrato il doppio del medesimo triangolo AFC, farà il parallelogrammo GFCE vguale al triangolo ABC, e perche l'angolo GFC, per costruzione, è vguale all'angolo D, farà dunque costruito il parallelogrammo GFCE vguale al dato triangolo ABC, ed haurà l'angolo GFC vguale all'angolo dato D, ch'era da farsi, e dimostrarsi.

THEOREMA XXXII. PROPOSITIONE XLIII.

Se vn parallelogrammo è diuiso in quattro parallelogrammi, due de' quali siano intorno al diametro, i complementi sono frà di loro vguali.

Sia il parallelogrammo $ABCD$, diuiso ne' quattro parallelogrammi $AEIG$, $IHCF$, $EBHI$, $GIFD$, e siano li due $AEIG$, $IHCF$ intorno al diametro AC . Dico che li complementi $EBHI$, $GIFD$, sono fra di loro vguali.



4. prop.

Perche il diametro AC diuide il parallelogrammo $ABCD$ in due parti vguali, farò il triangolo ABC vguale al triangolo ACD : Similmente il diametro AI sega il parallelogrammo $AEIG$ in due parti vguali, farò il triangolo AEI vguale al triangolo AIG ; finalmente il diametro IC diuide il parallelogrammo $IHCF$ in due parti vguali, dalche il triangolo IHC è vguale al triangolo ICF : se dagl'vguali triangoli ABC , ACD se ne leuano gli vguali triangoli AEI , AIG , resta il trapezio $CIEB$ vguale al trapezio $CIGD$, da i quali se ne leuano gli vguali triangoli IHC , ICF , restano i complementi $EBHI$, $GIFD$ fra di loro vguali, che era da dimostrarsi.


8. axiom.

PROBLEMA XII. PROPOSITIONE XLIV.

Ad vna data retta linea applicare vn parallelogrammo, vguale ad vn dato triangolo rettilineo, secondo vn angolo rettilineo dato.

Sia data la retta linea A , il triangolo BCF , e l'angolo rettilineo O . Dico esser possibile descriuere vn parallelogrammo, vguale al dato triangolo BCF , che habbia vn angolo vguale all'angolo rettilineo O , e che habbia vn lato vguale alla retta linea data A .

Per la 42. propositione si descriua il parallelogrammo $DEFG$ vguale al triangolo BCF , che habbia l'angolo GFE vguale al dato angolo O , poi si prolunghi il lato DG verso H , e si faccia la retta GH vguale alla data linea retta A ; dal punto H al punto F si tiri la retta HF , la quale si continui fin che concorra col lato DE , prolungato in qualche punto I ; dal punto I si tiri la retta



1. post.

3. prop.

1. post.

2. postul.

31. prop.

2. post.

IK parallela alla retta DH , e dal punto H si tiri la retta HK parallela alla retta DI , la quale concorrerà con la retta IK in qualche punto K ; si prolunghi il lato EF fin che concorra con HK in qualche punto L , e si prolunghi il lato GF fin che concorra col lato IK in qualche punto M . Dico che il parallelogrammo $FMKL$ è vguale al triangolo BCF , che hà vn angolo vguale all'angolo O , ed hà vn lato vguale alla data retta linea A .

Si

Si consideri il parallelogrammo DIKH diviso ne i quattro parallelogrammi DEFG, EIMF, FMKL, GFLK, de' quali i due IEFM, GFLH sono inrono al diametro IH, e per l'antecedente proposizione, i complementi DEFG, FMKL sono fra di loro vguali; ma il triangolo BCF per costruzione, è vguale al parallelogrammo DEFG, farà il parallelogrammo FMKL vguale al triangolo BCF; e perche gli angoli al vertice LFM, GFE¹ sono fra di loro vguali, e l'angolo O, per costruzione, è vguale all'angolo GFE, farà l'angolo MFL² vguale all'angolo O. Nel parallelogrammo GFLH, i lati opposti FL, GH,³ sono fra di loro vguali, ma la retta A, per costruzione, è vguale alla retta GH, farà la retta FL⁴ vguale alla retta A. Per la qual cosa si è costruito il parallelogrammo FMKL vguale al triangolo BCF, hà l'angolo MFL vguale al dato angolo O, ed il lato FL vguale alla retta data A, ch'era da farsi, e dimostrarsi.

f. 1. affiom.
b. 15. prop.
c. 1. affiom.
K. 34. prop.
L. 1. affiom.

PROBLEMA XIII. PROPOSITONE XLV.

Ad vna data retta linea applicare vn parallelogrammo vguale à qualunque data figura rettilinea, secondo vn angolo dato.

Sia la figura rettilinea data ABC, l'angolo rettilineo D, e la data linea retta FE. Dico esser possibile costruire vn parallelogrammo vguale al dato rettilineo ABC, che habbia vn angolo vguale all'angolo D, ed vn lato vguale alla retta FE.

Da vn angolo del rettilineo ABC^a si tirino linee rette à gli angoli opposti in modo, che sia distribuito il dato rettilineo ne i triangoli A, B, C, poi alla retta EF, per l'antecedente proposizione, s'applichi il parallelogrammo EFGH, vguale al triangolo A, che habbia l'angolo F, vguale al dato angolo D; similmente al lato HG s'applichi il parallelogrammo HGIK vguale al triangolo B, che habbia l'angolo HGI vguale all'angolo D; ed al lato KI s'applichi il parallelogrammo KILM vguale al triangolo C, che habbia l'angolo KIL vguale all'angolo D. Dico che la figura FELM è vn solo parallelogrammo, vguale al rettilineo ABC, che hà vn angolo vguale all'angolo D.


Perche l'angolo F, per costruzione è vguale all'angolo D, e l'angolo HGI è fatto vguale all'angolo D, farà l'angolo F^b vguale all'angolo HGI, vgualemente se gli aggiunga l'angolo HGF, ne viene l'angolo F coll'angolo HGI, vguale alli due angoli HGF, HGI,

a. Postul.

b. 1. affiom.

c. 2. affiom.

ma



d 29. prop.
e 1. assioma.

ma gli angoli F , & HGF ^d sono vguali à due angoli retti, gli angoli dunque HGF , HGI ^e sono vguali à due angoli retti, e per la 14. proposizio-

f 1. assioma.

ne, le rette GF , GI , costituiscono vna sola retta linea. Similmente perche l'angolo KIL è fatto vguale all'angolo D , sarà, anco vguale all'angolo HGI , vgualmente s'aggiunga l'angolo KIG , i due angoli HGI , KIG , ^f faranno vguali alli due angoli KIG , KIL ; ma i due angoli HGI , KIG sono vguali à due angoli retti;

g 29. prop.

gli angoli dunque KIG , KIL faranno vguali à due angoli retti, e le rette GI , IL ^g costituiscono vna sola retta linea; dal che le tre rette FG , GI , IL , costituiscono la sola retta FL .


b 14. prop.

Nell'istesso modo si dimostrerà, che le tre rette EH , HK , KM , costituiscono la sola retta linea EM .

i 35. defin.

K 2. assioma

Perche le rette EH , HK , KM sono parallele alle rette FG , GI , IL , stante che sono lati opposti de i parallelogrammi EG , HI , KL , perciò tutta la retta EM è parallela à tutta la retta FL . Di più, ne i parallelogrammi EG , HI , KL i lati opposti EF , HG , KI , ML sono frà di loro paralleli; onde tutta la figura $EFLM$, ⁱ sarà vn solo parallelogrammo: ma il parallelogrammo EG è fatto vguale al triangolo A , il parallelogrammo HI vguale al triangolo B , ed il parallelogrammo KL vguale al triangolo C , sarà tutto il parallelogrammo $EFLM$ ^K vguale al dato rettilineo ABC , & haurà l'angolo F , per costruzione, vguale all'angolo D , ch'era da farsi, e dimostrarli.



PROBLEMA XIV. PROPOSITIONE XLVI.

Sopra vna data retta linea terminata descriuere vn quadrato.

d 11. prop.

g 3. prop.

e 1. postul.

d 28. prop.

Sia data la retta linea terminata AB , sopra la quale è possibile descriuere vna figura quadrata:

Negli estremi A , & B ^d si eriggano le rette AC , BD , perpendicolari alla retta AB ; tanto AC ^g quanto BD ^e si faccia vguale alla retta AB , ^e si tiri la retta CD . Dico che il quadrilatero $ABDC$ è quadrato.

Perche gli angoli in A , & B sono retti, perciò le rette AC , BD ^d sono frà di loro parallele, ma per costruzione sono frà di loro vguali, perciò i lati AC , BD sono frà di loro vguali e paralleli, e le rette CD , AB , che congiungo-




no gli estremi, ^e sono uguali, e parallele, ed il quadrilatero $ABDC$ è parallelogrammo; mà il lato AB ^e è uguale, per costruzione al lato BD , ed al lato AC , perciò li quattro lati AB , BD , DC , CA sono frà di loro uguali, e perchè nelli parallelogrammi gli angoli opposti ⁸ sono frà di loro uguali, essendo gli angoli A , & B per costruzione retti, faranno gli angoli C & D retti; ed il quadrilatero $ABDC$ ⁹ sarà quadrato, ch'era da farsi, e dimostrarfi.

Di Proclo.

I quadrati delle rette linee uguali sono frà di loro uguali, ed i lati degli uguali quadrati sono frà di loro uguali.

Siano prima le rette AB , CD frà di loro uguali. Dico che li loro quadrati AE , CG sono frà di loro uguali. Si tirino li diametri FB , HD , per la definizione del quadrato sarà FA uguale ad AB , ed il lato HC uguale ad CD , mà AB è posto uguale a CD , li due lati FA , AB saranno uguali a i due lati HC , CD , li angoli in A & C



sono retti, sarà la base FB ¹⁰ uguale alla base HD , ed il triangolo FAB , uguale al triangolo HCD , & i loro dupli, cioè li quadrati AE , CG ¹¹ son frà di loro uguali ch'era da dimostrarfi.

Di nuovo siano li quadrati $ABCD$, $EBGF$ frà di loro uguali. Dico che li lati AB , BG sono fra di loro uguali. Si congiungano li proposti quadrati in modo che i lati EB , BC costituiscano la sola retta EC , essendo gli angoli ABC , EBG uguali, se l'aggiungbi il comune angolo ABE ¹² fa li due angoli GBE , EBA , ¹³ uguali alli due angoli CBA , ABE , mà li due angoli CBA , ABE sono uguali a due angoli retti, faranno li due angoli GBE , EBA uguali a due angoli retti, e le rette GB , BA costituiranno una sola retta linea. Si tirino i diametri AC , EG , e si tirino le rette AE , CG , perchè i quadrati BD , BF sono fra di loro uguali, le loro metà, cioè li triangoli ABC , EBG sono fra di loro uguali, se l'aggiunga il comune triangolo BGC , li triangoli AGC , EGC saranno fra di loro uguali, hanno la medesima base GC , e sono costituiti dalla medesima parte, e perciò ¹⁴ sono fra le medesime parallele EA , GC ; in oltre perchè i lati BC , CA sono uguali a i lati DC , CA , e la base AB è uguale alla base AD ¹⁵ farà l'angolo DCA , ¹⁶ uguale all'angolo BCA , mà l'angolo DCB è retto sarà ognuno degli angoli DCA , BCA , la metà d'un angolo retto; nell'istesso modo si dimostrerà che ognuno degli angoli DAC , BAC è la metà d'un angolo retto, e perciò il diametro del quadrato divide gli angoli opposti in due parti uguali, dalche il diametro EG del quadrato FB divide gli angoli FEB , FGB in due parti uguali, mà gli angoli FGB , DAB sono fra di loro uguali, stante che



sono

^e 33. prop.

^f 35. defin.

^g 1. assioma.

^h 34. prop.

ⁱ 29. defin.

^a 2. assioma.

^b 4. prop.

^c 34. prop.

^d 2. assioma.

^e 13. prop.

^f 14. prop.


^g 1. assioma.

^h 39. prop.

^k 8. prop.

129. prop.
= 35. defin.
= 34. prop.

sono retti, perciò le loro metà, cioè gli angoli EGB, CAB sono fra di loro uguali. Hor essendo le rette AC, EG segate dalla retta AG , e gli angoli alterni EGB, CAB sono fra di loro uguali, sarà EG parallela ad AC , ed il quadrilatero $AEGC$ sarà parallelogrammo, dalche AC sarà uguale ad EG . Finalmente perche il diametro divide gli angoli del quadrato in due parti uguali, perciò li divide in due mezzi retti, e così ognuno delli angoli BGE, BEG, BCA, BAC sarà la metà d'un angolo retto, e perciò li due angoli BGE, BEG sono uguali alli due angoli BCA, BAC , il lato AC è dimostrato uguale al lato EG saranno li rimanenti due lati GB, BE uguali alli rimanenti due lati AB, BC , per la qual cosa il lato AB è uguale al lato BG , ch'era da dimostrarsi.



THEOREMA XXXIII. PROPOSITIONE XLVII.

Nelli triangoli rettangoli, il quadrato del lato opposto all'angolo retto, è uguale alli quadrati de' lati, che contengono l'angolo retto.

a 46. prop.

Sia il triangolo ABC , del quale l'angolo BAC sia retto, e sopra i lati BC, CA, AB , s' siano descritti li quadrati $BDEC, ACHI, BAGF$. Dico ch'il quadrato $BDEC$, descritto sopra il lato BC , ch'è opposto all'angolo retto, è uguale alli quadrati $ACHI, BAGF$, giunti insieme, che son descritti sopra i lati CA, AB , che contengono l'angolo retto BAC .


b 31. prop.
e 1. post.

Dal punto A si tira la retta AK parallela al lato BD , ouero CE , la quale concorrerà col lato DE in qualche punto K , si tirino le rette AD, AE, CF, BH .

d 14. prop.

Perche l'angolo BAC , per ipotesi, è retto, e l'angolo BAG (come angolo del quadrato) è retto, perciò i due angoli BAC, BAG , sono uguali a due angoli retti, e le rette CA, AG costituiscono vna sola retta linea; nell'istesso modo si dimostrerà, che le rette BA, AI costituiscono vna sola retta linea: & essendo gli angoli in G , ed F retti, le due rette linee FB, GC saranno fra di loro parallele, e nell'istesso modo si prouerà, che le due rette BI, HC sono fra di loro parallele.

e 28. propof.



Di nuovo l'angolo FBA è retto, perchè è angolo del quadrato GB , e similmente l'angolo DBC è retto per esser angolo del quadrato BE ; vguualmente se gli aggiunga l'angolo ABC , ne viene l'angolo $FB C$, s vguale all'angolo ABD ; e perchè, nel quadrato BG , il lato FB s è vguale al lato BA , e nel quadrato DC il lato DB è vguale al lato BC ; al lato BC s'aggiunga il lato BF , ed al lato DB s'aggiunga il lato BA , i due lati FB, BC , del triangolo FBC , s faranno vguali alli due lati AB, BD del triangolo ABD , l'angolo $FB C$ è dimostrato vguale all'angolo ABD , farà la base FC i vguale alla base AD , ed il triangolo ABD , vguale al triangolo FBC .

f 3. assioma.
 f 29. defn.

f 3. assioma.

f 4 prop.

Si consideri il parallelogrammo GB , ed il triangolo FBC , posti sopra la medesima base FB , e fra le medesime parallele GC, FB ; il parallelogrammo GB κ sarà il doppio del triangolo FBC ; ma il triangolo FBC è mostrato vguale al triangolo ABD , farà il parallelogrammo GB i il doppio del triangolo ABD . Similmente il parallelogrammo $LBDK$, ed il triangolo ABD sono sopra la medesima base BD , e fra le medesime parallele AK, BD , il parallelogrammo $LBDK$ μ sarà il doppio del triangolo ABD : ma il parallelogrammo GB , per quel che si è mostrato, è i doppio del medesimo triangolo ABD , farà il parallelogrammo GB , μ vguale al parallelogrammo $LBDK$. Nell'istesso modo si dimostrerà, ch' il parallelogrammo IC è vguale al parallelogrammo $LKEC$: perchè, essendo l'angolo HCA retto, e l'angolo ECB retto, vguualmente se gli aggiunga l'angolo BCA , ne verrà l'angolo HCB , vguale all'angolo ACE ; e perchè HC ν è vguale ad AC , ed il lato EC vguale al lato CB , i due lati HC, CB , ν faranno vguali alli due lati EC, CA , l'angolo HCB è mostrato vguale all'angolo ACE , farà il triangolo HCB ν vguale al triangolo ACE . In oltre il parallelogrammo IC , ed il triangolo HCB , hanno la medesima base CH , e sono fra le medesime parallele, il parallelogrammo IC f sarà il doppio del triangolo HCB : ma il triangolo HCB è vguale al triangolo ACE , il parallelogrammo IC sarà il doppio del triangolo ACE . Di più il parallelogrammo $LKEC$, ed il triangolo ACE hanno la medesima base CE , e sono fra le medesime parallele AK, CE , il parallelogrammo $LKEC$ sarà il doppio del triangolo ACE : ma il parallelogrammo IC è mostrato il doppio del medesimo triangolo ACE , farà il parallelogrammo IC ν vguale al parallelogrammo $LKEC$, e perchè il quadrato GB fu mostrato vguale al parallelogrammo $LBDK$, tutto il quadrato $BDEC$ μ sarà vguale alli due quadrati IC, GB giunti insieme, che era da dimostrarsi.

κ 41. prop.

i 7. assioma.

μ 41. prop.

μ 6. assioma.

ν 3. assioma.

ν 29. defn.

ν 3. assioma.

ν 4. prop.

f 41. prop.

ν 6. assioma.

μ 3. assioma.

THEOREMA XXXIV. PROPOSITIONE XLVIII.

Se il quadrato d'un lato d'un triangolo è vguale alli quadrati de i due rimanenti lati, l'angolo contenuto da quei lati sarà retto.

Sia il triangolo ABC, ed il quadrato del lato AC sia vguale alli quadrati degl' altri due lati AB, BC. Dico che l'angolo ABC sarà retto.

a 12. prop.

b 3. prop.
i. postul.

Nel punto B sopra la retta AB ^a si erigga la perpendicolare DB, e si faccia DB ^b vguale alla retta BC, si tiri la retta ^c AD.

d 47. prop.


Perche l'angolo ABD, per costruzione è retto, il quadrato del lato AD ^a sarà vguale alli quadrati de' i lati AB, BD. In oltre essendo DB, per costruzione, vguale alla retta CB, sarà il quadrato di BD vguale al quadrato di CB; vguualmente se gli aggiunga il quadrato della retta AB, i quadrati de' i due lati DB, BA ^a saranno vguali alli quadrati delli due lati CB, BA; ma i quadrati de' i due lati DB, BA si disse, che sono vguali al quadrato del lato AD, il quadrato dunque del lato AD ^c sarà vguale alli quadrati delli due lati CB, BA, ma li quadrati delli lati CB, BA, per ipotesi, sono vguali al quadrato del lato AC, sarà il quadrato del lato AD ^a vguale al quadrato del lato AC, ed il lato AD vguale al lato AC. Finalmente perche i due lati DB, BA, sono vguali alli due lati CB, BA, e la base AD è mostrata vguale alla base AC, sarà l'angolo DBA ^b vguale all'angolo ABC, ma l'angolo DBA, per costruzione è retto, l'angolo dunque ABC sarà retto, come fu proposto dimostrare.

e 2. assioma.

f 1. assioma.

g 1. assioma.

h 8. prop.



Fine del Primo Elemento.

EVCLIDE RESTITVTO

DA

VITALE GIORDANI

ELEMENTO SECONDO.




DEFINITIONI.

I.

Ogni parallelogrammo rettangolo si dice esser contenuto da due rettelinee, che contengono l'angolo retto.



L Parallelogrammo, che hà gli angoli retti, si chiama parallelogrammo rettangolo, e per l'auuere si chiamerà semplicemente rettangolo. Hor, per spiegazione dell'antecedente definizione, deuesi auuertire, che ogni parallelogrammo rettangolo, benche sia racchiuso da quattro linee rette, con tutto ciò non si dice essere contenuto da tutte quattro, mà da due sole, cioè da due di quelle, che contengono l'angolo retto, le quali, prese in qualunque modo, sempre ei rappresentano la lunghezza, e larghezza di esso rettangolo, come, per essemplio, il parallelogrammo $ABCD$, se hà tutti gli angoli retti, lo chiameremo semplicemente rettangolo, e diremo esser contenuto da i due lati AB , BC ; ouero dalli due BC , CD ; o pure dalli due CD , DA ; ò dalli due BA , AD ch'è sempre la medesima cosa, stanteche, per la 34. proposizione del primo libro, i lati opposti sono fra di loro uguali.



Quando dunque diremo, ch'il rettangolo $ABCD$ è contenuto dalli due lati AB , BC , non douremo concepir' altro, se non che il rettangolo $ABCD$, hà per lunghezza il lato BC , e per larghezza il lato AB ; e se dirimo esser contenuto dalle rette AD , DC , concepiremo esser contenuto dalla lunghezza AD , e dalla larghezza DC .

E da notarsi, che se saranno espresse due qualunque linee rette, come A , & B , e si dirà il rettangolo contenuto dalle rette A , & B , si douerà concepire un parallelogrammo rettangolo, del quale la lunghezza sia uguale alla retta A , e la larghezza uguale alla retta B ; ouero la larghezza uguale ad A , e la lunghezza uguale a B .

L. 2

Di

Di più quando qualche retta linea per esempio AC è diuisa come in B , e si dirà il rettangolo contenuto dalle rette AB, BC , si concepirà un parallelogrammo rettangolo, del quale vno de' lati, intorno all'angolo retto, è uguale ad AB , e l'altro uguale alla retta BC .


Quando poi si dirà, il rettangolo contenuto da tutta la retta AC , e dalla parte BC , concepiremo un parallelogrammo rettangolo, del quale vno de' lati intorno all'angolo retto è uguale a tutta la retta AC , e l'altro uguale alla parte BC .

Similmente se si dirà, il rettangolo contenuto dalle rette CA, AB , concepiremo un parallelogrammo rettangolo, che habbia vno de' lati, intorno all'angolo retto, uguale a tutta la retta CA , e l'altro uguale alla parte AB .

I I.

Se vn parallelogrammo è diuiso in quattro parallelogrammi, due de' quali siano intorno al diametro, i complementi con vno di quelli intorno al diametro si chiamerà Gnomone.


Sia il parallelogrammo $ABCD$, diuiso ne' quattro parallelogrammi $AEIG, IHCF, EBHI, GFD$, de' quali li due $AEIG, IHCF$ siano intorno al diametro AC , i due complementi $EBHI, IFDG$, con vno di quelli intorno al diametro, come per esempio col parallelogrammo $IHCF$, cioè tutto il piano $BCDGIE$, si chiamerà Gnomone: e similmente, i due complementi BI, ID , col parallelogrammo EG , cioè tutto il piano $BADFIH$, si chiamerà Gnomone.



THEOREMA I. PROPOSITIONE I.

Se di due rette linee vna è diuisa in quante parti si vuole, e l'altra non diuisa, i rettangoli contenuti dalle parti della diuisa, e dalla non diuisa, giunti insieme, sono uguali al rettangolo contenuto da tutta la diuisa, e dalla non diuisa.

Sia la retta linea AB diuisa in quante parti si vuole, come in D , ed E , e sia la retta C non diuisa. Dico, che i rettangoli contenuti da AD , e dalla retta C , da DE , e della retta C , e da EB , e dalla retta C , insieme giunti, sono uguali al rettangolo contenuto da tutta la retta AB , e dalla retta C .



Negl'estremità A, B si erigano le rette AF, BG , perpendicolari alla

a. del 1.
b. del 1.
c. 3. affom.
d. 17. del 1.
e. 30. del 1.
f. 31. del 1.

g. 31. defin.
del 1.
h. 34. del 1.
K. 1. affom.
l. 34. del 1.
m. 1. affom.
n. Scelto an-
tecedente
o. 2. affom.
p. 2. affom.
q. 1. defin.
del 1.

a. 45. del 1.
b. 31. del 1.
c. 19. del 1.


Nel punto A s'erigga la retta AE^a perpendicolare ad AB ; si faccia AE^b uguale alla retta CB ; e si tagli AF uguale a CD ; sarà FE^c uguale a DB ; da' punti C, D, B si tirino le rette CG , DH , BI , a parallele ad AE , le quali c' saranno fra di loro parallele; dalli punti F, ed E, si tirino le rette FI , EH^d parallele ad AB , cioè FI si continui fin che concorre con BI in qualche punto I; e la retta EH fin che concorre con DH in qualche punto H; la retta FI segnerà le rette CG , DH come in L, & K, e la retta EH segnerà CG in qualche punto G. Tutti i quadrilateri, che sono in questa figura, saranno parallelogrammi rettangoli, e sarà AE^b uguale a CG , e la retta CL uguale ad AF ; ma AE è uguale, per costruzione, a CB , e la retta AF uguale a CD , sarà CG^k uguale a CB , ed LC uguale a DC ; dal che il restante LG sarà uguale a DB . Nel rettangolo $CLRD$, sarà CL^l uguale a DK , ed il lato CD uguale ad LK ; ma CL è uguale a CD , sarà LK^m uguale a KD , e tutti quattro i lati CL , LK , KD , DC sono fra di loro uguali; per essendo LK uguale a DK , ed il lato KH uguale a DB , sarà il rettangolo GK^n uguale al rettangolo KB ; ugualmente s'aggiunga il rettangolo FD , ne viene il rettangolo FB^o uguale al piano $ADHGLF$; ugualmente se gli aggiunga il rettangolo EL , ne viene il rettangolo ED^p uguale al rettangolo FB , col rettangolo EL . Il rettangolo ED^q è contenuto da' due lati AD , AE , ma il lato AE è uguale, per costruzione a CB , perciò il rettangolo ED sarà contenuto dalle due rette AD , CB , ed in conseguenza i due rettangoli FB , EL sono uguali a quello, ch'è contenuto dalle due AD , CB ; e perchè il rettangolo FB è contenuto dalle due BA , AF , cioè dalle due AB , CD , ed il rettangolo EL è contenuto dalle due FL , FE , cioè dalle due AC , DB , (stante che FL è uguale ad AC , ed il lato EF è uguale a DB) sarà il rettangolo contenuto dalle due AD , CB , uguale a i due rettangoli contenuti, cioè uno dalle due AB , CD , e l'altro dalle due AC , DB , ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA II. PROPOSITIONE II.

Se vna retta linea è diuisa come si vuole, il quadrato di tutta la retta è uguale alli rettangoli contenuti da tutta la retta, e dalle parti della medesima.

Sia la retta linea AB , diuisa in quante si voglia parti, come, per esempio, nelle due AC , CB . Dico, che li due rettangoli, cioè vno contenuto da tutta la retta AB , e dalla parte AC , l'altro contenuto dalla medesima retta AB , e dalla parte CB , giunt' insieme, sono uguali al quadrato di tutta la retta AB .

Sopra la retta AB^a si descriva il quadrato AD , dal punto C si tiri la retta CF , b parallela ad AE , ouero DB ; gli angoli in C, ed F c' saranno retti, ed il quadrato AD sarà diuiso



ne i due rettangoli EC, FB. Perche il rettangolo EC è contenuto dalle rette EA, AC, ed il lato EA, come lato del quadrato, è vguale ad AB, farà il rettangolo EC vguale à quello, ch'è contenuto dalle due rette BA, AC. Similmente perche il rettangolo FB è contenuto da i lati DB, BC, ed il lato DB è vguale al lato AB, farà il rettangolo FB vguale al rettangolo contenuto dalle due AB, BC. Ma i due rettangoli EC, FB, giunti insieme, compongono il quadrato AD, cioè il quadrato della retta AB; faranno i due rettangoli, cioè il rettangolo contenuto da tutta la retta BA, e dalla parte AC, ed il rettangolo contenuto dalla medesima AB, e dalla parte BC, giunti insieme, vguali al quadrato di tutta la retta AB, ch'era da dimostrarli.

In altro modo. S'esponga la retta D vguale alla retta AB. Perche la retta AB è diuisa nel punto C, e la retta D è indiuisa, farà il rettangolo contenuto da tutta la retta AB, e dalla retta D, vguale à i due rettangoli, cioè vno contenuto dalla retta D, e dalla parte AC; e l'altro contenuto dalla retta D, e dalla parte CB; ma la retta D è posta vguale ad AB, i due rettangoli dunque, cioè vno contenuto da tutta AB, e dalla parte AC, l'altro contenuto da AB, e dalla parte BC, insieme giunti, faranno vguali al rettangolo contenuto dalle due AB, & D, cioè vguale al quadrato della retta AB. Il medesimo si dimostrerà, se la retta AB sarà diuisa in più di due parti, il che cra da dimostrarli.

A — C — B

D —

A 1. definit.
del 2.

e 1. definit.



1. del 1.

THEOREMA III. PROPOSITIONE III.

Se vna retta linea è diuisa in due qualunque parti, il rettangolo contenuto dalle parti, col quadrato di vna delle parti, è vguale al rettangolo contenuto da tutta la retta, e da quella parte, sopra la quale si considera il quadrato.

Sia la retta AB, diuisa in due qualunque parti, come AC, CB. Dico, che il rettangolo contenuto dalle parti AC, CB, col quadrato della parte CB, è vguale al rettangolo contenuto da tutta la retta AB, e dalla parte BC, sopra la quale si considera il quadrato.



Sopra la retta CB, si descriva il quadrato BE, dal punto A si tiri la retta AF^b parallela al lato CE, la quale concorrerà col lato DE continuato in qualche punto F, e faranno costrutti i due rettangoli AD, AE. Perche il rettangolo AD è contenuto da i lati AB, BD, ed il lato BD, come lato del quadrato CD, è vguale alla retta CB,

a 46. del 1.
b 31. del 2.

farà

farà il rettangolo AD vguale à quello, ch'è contenuto dalle due AB, BC. Similmente il rettangolo AE, è contenuto dalle rette AC, CE; ma la retta EC, come lato del quadrato CD, è vguale alla retta CB, farà il rettangolo AE, vguale al rettangolo contenuto dalle due AC, CB, vguualmente s'aggiunga il quadrato CD, cioè il quadrato della retta CB; ne viene il rettangolo AE, col quadrato CD, e cioè il rettangolo AD, vguale al rettangolo contenuto dalle parti AC, CB col quadrato di CB. Ma si disse, che il rettangolo AD è contenuto da tutta la retta AB, e dalla parte CB; il rettangolo dunque contenuto dalle parti AC, CB col quadrato della parte CB, è vguale al rettangolo contenuto da tutta la retta AB, e dalla parte CB, sopra la quale fù descritto il quadrato, come fù proposto dimostrare.

In altro modo. S'isponga la retta D, vguale alla parte CB; farà il rettangolo contenuto da tutta la retta AB, e dalla retta D vguale à i rettangoli contenuti dalle parti AC, CB, e dalla retta D; ma la retta D è posta vguale alla retta CB, farà il rettangolo contenuto da tutta la retta AB, e dalla retta D, cioè il rettangolo contenuto da tutta la retta AB, e dalla parte BC, vguale al rettangolo contenuto dalla parte AC, e dalla retta D, cioè dalle parti AC, CB, col rettangolo contenuto dalla parte CB, e dalla retta D, cioè col quadrato della retta CB, ch'era da dimostrarfi.




THEOREMA IV. PROPOSITIONE IV.

Se vna retta linea è diuifa in due qualunque parti, il quadrato di tutta è vguale à i quadrati delle parti, col doppio rettangolo contenuto dalle medefime parti.

Sia la retta linea AB, diuifa in due parti come si vuole in C. Dico, che il quadrato di tutta la retta AB è vguale à i quadrati delle parti AC, CB, col doppio rettangolo contenuto dalle medefime parti AC, CB.

Sopra la retta AB, si descriva il quadrato AD, si tiri il diametro EB, dal punto C sicuri la retta CH parallela alla retta DB, ouero AE, la quale segnerà il diametro EB in qualche punto F, e per il punto F si faccia passare la retta GH parallela al lato AB; sarà diuiso il quadrato



quadrato AD in quattro parallelogrammi, de' quali i due GI, CH, sono intorno al diametro EB. Perche il quadrilatero AD, per costruzione, è quadrato, sarà il lato AE uguale al lato AB, ed il triangolo ABE, sarà isoscele, dal che gli angoli ABE, AEB ϵ sono fra di loro uguali; e perche li tre angoli d'ogni triangolo d sono uguali à due angoli retti, e l'angolo A, come angolo del quadrato, è retto, gli altri due angoli AEB, ABE, insieme giunti, saranno uguali ad vn angolo retto, ma gli habbiamo mostrati fra di loro uguali, perciò ognuno delli angoli AEB, ABE sarà la metà d'un angolo retto. In oltre perche le rette GH, AB sono parallele, e sono segate dalla retta AE, l'angolo EGF ϵ esterno sarà uguale all'angolo A interno ed opposto; ma l'angolo A è retto, sarà l'angolo EGF retto. Nel triangolo GFE, essendo l'angolo EGF retto, e l'angolo GEF la metà d'un angolo retto, sarà il rimanente angolo GFE f la metà d'un angolo retto, e perciò gli angoli GEF, GFE g sono fra di loro uguali, ed il lato GF h sarà uguale al lato GE. Di nuouo perche in ogni parallelogrammo k i lati opposti sono uguali, e gli angoli opposti sono fra di loro uguali, sarà nel parallelogrammo GI, il lato EG uguale all'opposto IF, ed il lato GF uguale all'opposto EI; ma s'è mostrato il lato GF uguale al lato GE, sarà il lato EI l uguale al lato IF, e tutti quattro i lati EG, GF, FI, IE, saranno fra di loro uguali. Oltre à ciò l'angolo EGF sarà uguale all'angolo EIF, e l'angolo GEI, uguale all'angolo GFI; ma gli angoli FGE, GEI, sono retti, gli angoli dunque EIF, IFG, saranno retti; per la qual cosa il parallelogrammo GI sarà quadrato. Nell'istesso modo si dimostrerà, che il parallelogrammo CH è quadrato. Di più nel parallelogrammo AF i lati opposti GF, AC m sono fra di loro uguali; ma GI è il quadrato del lato GF, sarà il quadrato GI uguale al quadrato di AC. Nel parallelogrammo AF, essendo gli angoli in A, & C retti, saranno gli angoli opposti in G, ed F n retti, dalche il parallelogrammo AF è rettangolo, il quale o è contenuto da i due lati AC, CF; ma il lato CF è uguale al lato CB, per essere lato del quadrato CH, sarà il rettangolo AF, uguale al rettangolo contenuto dalle parti AC, CB: e perche i rettangoli AF, FD, sono fra di loro uguali, i due rettangoli AF, FD saranno uguali al doppio rettangolo contenuto dalle parti AC, CB. S'aggiunga dall'vna, e l'altra parte il quadrato CH, cioè il quadrato di CB, ne viene lo gnomone ABDIFG o uguale al doppio rettangolo contenuto dalle parti AC, CB, eol quadrato di CB; à i quali s'aggiunga vguilmente il quadrato GI, cioè il quadrato di AC; ne viene tutto il quadrato AD, o cioè il quadrato della retta AB, uguale à i quadrati delle parti AC, CB col doppio rettangolo contenuto dalle medesime parti AC, CB, ch'era da dimostrarsi:

Più breue. Perche la retta AB è diuisa in C, il quadrato di AB p è uguale al rettangolo contenuto da tutta AB, e dalla parte AC, col rettangolo contenuto dalla medesima AB, e dalla parte BC; ma il rettangolo contenuto da tutta AB, e dalla parte AC q è uguale al rettangolo contenuto dalle parti AC, CB col quadrato di AC; ed il rettangolo contenuto da tutta AB, e dalla parte BC è uguale al rettangolo con-

M

tenuto

e 5. del 1.
d 32. del 1.

e 29. del 1.

f 32. del 1.

g 10. affom.

h 6. del 1.

k 34. del 1.

l 1. affom.

m 34. del 1.

n 1. defin.
del 3.

o 2. affom.

p 2. del 3.

q 3. del 3.

tenuto dalle parti AC, CB, col quadrato di CB; sarà il quadrato di AB uguale à i quadrati delle parti AC, CB, & al doppio rettangolo contenero dalle parti AC, CB, ch'era da dimostrarsi.

COROLLARIO I.

Da quel che s'è detto è manifesto, che quando vn quadrato è diuiso in quattro parallelogrammi, de' quali due siano intorno al diametro, i due intorno al diametro sono quadrati, ed i complementi sono rettangoli.


COROLLARIO II.

Quindi anco è manifesto, ch'ogni diametro del quadrato diuide gli angoli del medesimo quadrato in due parti uguali: poiche essendosi dimostrato ognuno degli angoli ABE, AEB, essere la metà d'un angolo retto, se dagli angoli retti ABD, AED, se ne detraggano gli angoli ABE, AEB, ognuno de' i rimanenti angoli DEB, DBE sarà la metà d'un angolo retto, e perciò gli angoli retti AED, ABD, sono diuisi dal diametro EB in due parti uguali.

SCOLIO DEL CLAVIO.

Se la retta AB è il doppio della retta K, il quadrato di AB è il quadruplo del quadrato della retta K; e se il quadrato di AB è il quadruplo del quadrato di K, ancora la retta AB sarà il doppio della retta K.

Si diuidi AB in due parti uguali in E, e si faccia la medesima costruzione dell'antecedente proposizione, saranno i due HF, CI, per il primo Corollario, quadrati; cioè CI sarà il quadrato di CB, ed HF uguale al quadrato di AC: mà le rette CB, AC, per ipotesi, sono frà di loro uguali; saranno i quadrati HF, CI frà di loro uguali. Similmente essendo AC uguale à CB, sarà il rettangolo contenuto dalle due AC, CG, uguale al rettangolo contenuto dalle due GC, CB, cioè uguale al quadrato CI; mà il rettangolo AG è contenuto dalle due AC, CG: sarà il rettangolo AG uguale al quadrato CI. E perche i complementi AG, GD, sono frà di loro uguali; i quattro rettangoli dunque AG, CI, GD, FH, sono frà di loro uguali; e tutto il quadrato AD, sarà il quadruplo del qua-



Prima figura
dell' antecede-
nte propo-

a 10. del 1.

b 43. del 1.

drato

drato CI ; cioè il quadrato di AB , sarà il quadruplo del quadrato di CB : ma la retta CB è uguale alla retta K , sarà il quadrato di AB il quadruplo del quadrato della retta K , ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.


Di nuovo se il quadrato di AB è il quadruplo del quadrato della retta K . Dico che la retta AB , è il duplo della retta K .

Si diuidi AB in due parti uguali, e si faccia la costruzione, e dimostrazione di prima; sarà il quadrato di AB il quadruplo del quadrato di CB ; mà il quadrato di AB è supposto il quadruplo del quadrato di K , sarà il quadrato di CB uguale al quadrato di K , e la retta CB uguale alla retta K : mà AB , per costruzione, è il doppio della retta CB ; sarà AB il doppio della retta K ; come fu proposto dimostrare.

THEOREMA V. PROPOSITIONE V.

Se vna retta linea è diuisa in due parti uguali, e la medesima è diuisa in due parti ineguali; il rettangolo contenuto dalle parti ineguali, col quadrato dell'intermedia portione, sarà vguale al quadrato della metà della linea.

Sia la retta linea AB diuisa in due parti uguali in C , e la medesima retta AB sia diuisa in due parti ineguali in D , e sia CD la portione intermedia fra l'uguale diuisione, e la diuisione ineguale. Dico che il rettangolo contenuto dalle parti ineguali AD, DB , col quadrato della intermedia portione CD , è vguale al quadrato della metà CB .



Sopra la retta CB si descriva il quadrato CE , si tiri il diametro FB ; dal punto D si tiri la retta DG parallela al lato EB , ouero FC , la quale segará il diametro FB in qualche punto H ; per il punto H si faccia passare la retta IK parallela alla retta AB , che segará il lato FC in qualche punto L ; dal punto A si tiri la retta AK parallela ad FC , la quale concorrerà con la retta IL continuata in qualche punto K : sarà diuiso il quadrato CE in quattro parallelogrammi, de' quali i due LG , DI , intorno al diametro, per il primo Corollario alla quarta proposizione, sono quadrati, ed i complementi CH , HE sono rettangoli: E perche i complementi CH , HE sono fra di loro uguali, s'aggiunga all'vno, ed all'altro il quadrato DI , ne viene il rettangolo CI vguale al rettangolo DE ; mà il rettangolo AL è vguale al rettangolo CI (stante, che sono sopra le uguali bafe AC , CB , e fra le medesime parallele KI , AB) farà il rettangolo AL vguale al rettangolo DE ; vgualmente se gli aggiunga il rettangolo CH , ne viene il rettangolo AHL vguale allo gnomone $CBEHGL$: all'vno, ed all'altro s'aggiunga il quadrato LG , farà il quadrato CE , vguale al rettangolo AH col quadrato LG : il rettangolo AH è contenuto dalle due AD , DH , cioè dalle due AD , DB , per essere DH

a 46. del 1.

b 31. del 1.

c 43. del 1.

d 2. affom.

e 36 del 1.

f 1. affoma.

g 2. affoma.

h 1. defn.

del 2.


X 30. del 1.

vguale al lato DB, farà il rettangolo contenuto dalle parti ineguali AD, DB, col quadrato LG, cioè κ col quadrato di CD, vguale al quadrato CE, cioè al quadrato di CB; e così il rettangolo contenuto dalle parti ineguali AD, DB, col quadrato dell'intermedia portione CD, farà vguale al quadrato di CB, ch'è metà della linea AC, come fu proposto dimostrare.

THEOREMA VI. PROPOSITIONE VI.

Se vna retta linea è diuisa in due parti vguali, ed à quella s'aggiunga vna retta ad arbitrio; il rettangolo contenuto dalla composta, e dall'aggiunta, col quadrato della metà della linea, è vguale al quadrato della retta composta della metà, e dell'aggiunta.

Sia la retta AB, diuisa in due parti vguali in C, alla quale s'aggiunga nella medesima dirittura qualunque retta BD. Dico che il rettangolo contenuto da tutta la composta AD, e dall'aggiunta DB, col quadrato di CB, ch'è metà della linea AB, è vguale al quadrato della retta CD, composta della metà CB, e dell'aggiunta BD.

a 46. del 1.
b 31. del 1.

Sopra la retta, CD, α si deseruiua il quadrato CE, si tiri il diametro FD, dal punto B β si tiri la retta BG parallela alla retta ED, ouero FC, segará il diametro FD in qualche punto H; per il punto H si faccia passare la retta IK parallela alla retta AD, la quale segará FC in qualche punto L; dal punto A, si tiri la retta AK, parallela al lato FC, la quale concorrerà con IK continuata in qualche punto K, e farà diuiso il quadrato CE in quattro parallelogrammi, de' quali i due LG, BI, che sono intorno al diametro FD, per il primo Corollario alla quarta propositione, sono quadrati, ed i complementi CH, HE sono rettangoli: e perche i complementi CH, HE ϵ sono frà di loro vgualised il rettangolo AL δ è vguale al rettangolo CH (stante che sono sopra le vguali basi AC, CB, e frà le medesime parallele KH, AB) farà il rettangolo AL vguale al rettangolo HE; s'aggiunga all'vno, ed all'altro il rettangolo CI, ne viene il rettangolo AI ϵ vguale allo gnomone CDEGHL; vgualmente s'aggiunga il quadrato LG, farà il quadrato CE vguale al rettangolo AI col quadrato LG. Il rettangolo AI ϵ è contenuto dalle due rette AD, DI, cioè dalle due AD, DB (stante che DI è vguale à DB) farà il rettangolo contenuto dalle due AD, DB, col quadrato LG, cioè ζ col quadrato di CB, vguale al quadrato CE, cioè al quadrato di CD. Per la qual cosa il rettangolo contenuto da tutta la composta AD, e dall'aggiunta DB, col quadrato di CB, ch'è metà della linea AB, è vguale al quadrato della retta CD, ch'è composta della metà CB, e dell'aggiunta BD, come fu proposto dimostrare.

c 43. del 1.
d 30. del 1.

e 1. affom.

f 1. definit.
del 2.


g 34. del 1.

THEOREMA VII. PROPOSITIONE VII.

Se vna retta linea è diuisa in due parti come si vuole ; il quadrato di tutta, col quadrato d'vna delle parti , è vguale al doppio rettangolo contenuto da tutta , e da quella parte, doue è fatto il quadrato, col quadrato dell'altra parte.

Sia la retta linea AB diuisa in due parti, come si vuole in C . Dico che il quadrato di tutta la retta AB , col quadrato della parte AC , è vguale al doppio rettangolo contenuto da tutta la retta AB , e dalla parte AC , col quadrato dell'altra parte CB .

Sopra la retta AB si descriva il quadrato AD , si tiri il diametro EB ; dal punto C , si tiri la retta CF parallela alla retta DB , oueto AE , la quale segnerà il diametro in qualche punto G ; dal punto G , si faccia passare la retta HI parallela al lato AB ; farà diuiso il quadrato AD in quattro parallelogrammi, de' quali i due IF , CH , che sono intorno al diametro EB , per il primo Corollario alla quarta proposizione, sono quadrati, ed i complementi AG , GD sono rettangoli. E perchè i complementi AG , GD sono fra di loro vguali, all'vno, ed all'altro s'aggiunga il quadrato IF , ne viene il rettangolo AF vguale al rettangolo ID . In oltre il rettangolo AF è contenuto dai lati AE , AC ; ma il lato AE è vguale ad AB , per essere lato del quadrato AD , farà il rettangolo AF vguale al rettangolo contenuto dalle due BA , AC ; e perciò i due rettangoli AF , ID , sono vguali al doppio rettangolo contenuto dalle due BA , AC ; ma i due rettangoli AF , ID sono vguali allo gnomone $CAEDHG$ col quadrato IF ; farà lo gnomone $CAEDHG$, col quadrato IF , vguale al doppio rettangolo contenuto dalle due BA , AC ; vguualmente s'aggiunga il quadrato CH , cioè il quadrato di CB , ne viene tutto il quadrato AD col quadrato IF , vguale al doppio rettangolo contenuto dalle due BA , AC , col quadrato di CB : ma il quadrato IF è vguale al quadrato di AC (stante che IG è vguale ad AC) farà il quadrato AD , cioè il quadrato di AB col quadrato di AC , vguale al doppio rettangolo contenuto da tutta AB , e dalla parte AC , col quadrato del rimanente CB , ch'era da dimostrarsi.



a 46. del 1.

b 31. del 1.

c 43. del 1.

d 2. affiom.

e 1. definit. del 1.

f 2. affiom.


g 34. del 1.

THEOREMA VIII. PROPOSITIONE VIII.

Se vna retta linea è diuisa in due parti come si vuole , il quadruplo rettangolo contenuto da tutta , e da vna delle parti , col quadrato del restante, è vguale al quadrato della retta composta di tutta, e di quella parte .

Sia

Sia la retta linea AB diuisa come si vuole in C, alla quale s'aggiunga BD vguale alla parte CB. Dico che Il quadruplo rettangolo contenuto da tutta la retta AB, e dalla parte CB, è vguale al quadrato della retta AD, composta di tutta AB, e dell'aggiunta BD.



*
Sopra la retta AD

a 46. del 1.

b 30. del 1.

c 3. affiom.

d 2. affiom.

e 34. del 1.

f 36. del 1.

g 43. del 1.

h 1. affiom.

k 36. del 1.

l 43. del 1.

m 1. affiom.

n 2. affiom.

Sopra la retta AD si descriva il quadrato AE, si tiri il diametro FD; delli punti C, & B, si tirino le rette CH, BG parallele al lato DE, ouero AF, le quali segheranno il diametro ne i punti come in I, & K; per li punti I, & K si facciano passare le rette LM, NO, parallele al lato AD; sarà diuiso il quadrato AE in tanti parallelogrammi, de' quali quelli intorno al diametro FD, per il Corollario alla quarta proposizione, sono quadrati, e così li notati OH, PQ, BL, MG, CN, sono quadrati; e perciò IB sarà vguale à BD, ouero BC. Similmente essendo CN quadrato, sarà ND vguale à CD, leuatone le vguali LD, BD, resta NL e vguale à CB; ma CB è vguale à BD, le quattro CB, BD, DL, NL sono frà di loro vguali. E perche ne i parallelogrammi i lati opposti sono frà di loro vguali, essendo DL vguale ad LN, sarà BI vguale ad IQ, e sarà CP vguale à PK. E similmente essendo CB vguale à BD, sarà PI vguale ad IL, & KQ vguale à QN. Di più perche i parallelogrammi CI, BL sono sopra le vguali basi CB, BD, e frà le medesime parallele PL, CD, perciò sono frà di loro vguali, e per l'istessa ragione i parallelogrammi PQ, IN sono frà di loro vguali.

Si consideri il quadrato CN diuiso in quattro rettangoli, de' quali i complementi CI, IN, sono frà di loro vguali: fu mostrato CI vguale à BL, ed il rettangolo IN vguale à PQ; i quattro rettangoli CI, BL, PQ, IN sono frà di loro vguali.

Si considerino i rettangoli KG, QE, sopra le vguali basi KQ, QN, e frà le medesime parallele HE, KN, e perciò sono frà di loro vguali. Similmente i rettangoli AP, MK sono sopra le vguali basi CP, PK, e frà le medesime parallele AO, CK, in conseguenza sono frà di loro vguali: e perche il quadrato MG è diuiso ne' quattro parallelogrammi, de' quali i due OH, PQ sono intorno al diametro, faranno i complementi MK, KG frà di loro vguali; mà il rettangolo KG fu mostrato vguale al rettangolo QE, ed il rettangolo KM vguale al rettangolo PA; i quattro rettangoli AP, MK, KG, QE sono frà di loro vguali. Al rettangolo AP s'aggiunga il rettangolo CI; al rettangolo MK s'aggiunga PQ; al rettangolo GN s'aggiunga QL; ed al rettangolo HQ s'aggiunga BL; ne verranno i quattro rettangoli AI, MQ, LE, & HQ con LB, frà di loro vguali; dal che tutti quattro sono il quadruplo d'vno, cioè il quadruplo del rettangolo AI: mà tutti quattro compongono lo gnomone ADEHKO, sarà il detto gnomone vguale al quadruplo rettangolo AI. Il rettangolo AI è conte-

nuto


nuto da tutta AB, e da BI, cioè da BC, farà il detto gnomone vguale al quadruplo rettangolo contenuto da tutta AB, e dalla parte BC: vgualemente se gli aggiunga il quadrato OH, cioè il quadrato di AC; ne viene tutto il quadrato AE, cioè il quadrato della composta AD, vguale al quadruplo rettangolo contenuto da tutta AB, e dalla parte BC, col quadrato del restante AC, ch'era da dimostrarfi.

THEOREMA IX. PROPOSITIONE IX.

Se vna retta linea è diuisa in due parti vguali, e la medesima è diuisa in due parti ineguali; li quadrati delle parti ineguali sono il doppio del quadrato della metà, col quadrato dell'intermedia portione.

Sia la retta AB diuisa in due parti vguali in C, e la medesima AB sia diuisa in due parti ineguali nel punto D, e sia CD l'intermedia portione frà l'vguale, ed ineguale diuisione. Dico che i quadrati delle parti ineguali AD, DB, sono il doppio del quadrato della metà AC, col quadrato dell'intermedia portione CD.

Nel punto C s'erigga la retta CE ad angoli retti con AB, si faccia CE^b vguale ad AC, ouero CB, e si tirino le rette AE, EB; nel punto D, s'erigga la retta DF^c perpendicolare ad AB, la quale continuata concorrerà col lato EB in qualche punto F, dal quale si tiri la retta FG^d parallela ad AB, segará la retta EC in qualche punto G, si tiri la retta FA.



Perche la retta EC è fatta vguale ad AC farà il triangolo AEC isoscele, e gli angoli CAE, CEA, e saranno frà di loro vguali; mà l'angolo in C è retto, ogn'vno de' due angoli CAE, CEA, farà la metà d'un angolo retto. Considerando il triangolo CEB, nell'istesso modo si dimostrerà, ch'ogn'vno de' due angoli CEB, CBE, è la metà d'un angolo retto, dal che tutto l'angolo AEF sarà retto. Nel triangolo FDB, l'angolo in D, per costruzione è retto, l'angolo B è dimostrato esserc la metà d'un angolo retto, il rimanente angolo DFB^e sarà la metà d'un angolo retto; e perciò gli angoli DFB, DBF^h sono frà di loro vguali, ed il lato DB^k è vguale al lato DF. Essendo GF, per costruzione parallela ad AB, l'angolo esterno EGFⁱ è vguale all'angolo ECB interno, ed opposto; mà l'angolo in C è retto, farà l'angolo EGF retto. Nel triangolo EGF, l'angolo G è retto, l'angolo GEF è la metà d'un retto, il rimanente angolo EFG^m farà la metà d'un angolo retto; e perciò gli angoli GEF, GFE sono frà di loro vguali; ed il lato GBⁿ farà vguale al lato GF.

a 11. del 1.

b 3. del 1.

c 17. del 1.

d 31. del 1.

e 57. del 1.

f 31. del 1.

g 32. del 1.

h 10. affom.

k 6. del 1.

l 29. del 1.

m 31. del 1.

n 6. del 1.

Di

o 47. del 1.


Di nuovo nel triangolo ECA, angolo retto in C, il quadrato di EA è uguale a i quadrati de' due lati EC, CA, ma EC, per costruzione è uguale ad AC, farà il quadrato di A E il doppio del quadrato di AC.

Nel triangolo EGF, angolo retto in G, il quadrato di EF è uguale a i quadrati de' due lati EG, GF; ma EG è dimostrato uguale a GF, farà il quadrato di EF il doppio del quadrato di GF, cioè il doppio del quadrato di CD: e così li quadrati delle due

p 34. del 1.

q 47. del 1.

AE, EF, sono il doppio de' i quadrati delle due AC, CD. Nel triangolo AEF, angolo retto in E, il quadrato di AF è uguale a i quadrati de' due lati AE, EF, ma i quadrati de' lati AE, EF sono il doppio de' i quadrati delle due AC, CD; farà il quadrato di AF il doppio de' quadrati delle due AC, CD. Si consideri il triangolo ADF, angolo retto in D; il quadrato di AF è uguale a i quadrati de' due lati AD, DF, ma il quadrato di AF è il doppio de' quadrati delle due AC, CD; i quadrati de' due lati AD, DF faranno il doppio de' quadrati delle due AC, CD; ma DF è dimostrato uguale al lato DB, faranno i quadrati delle parti ineguali AD, DB il doppio de' quadrati delle due AC, CD, ch'era da dimostrarsi.



THEOREMA X. PROPOSITIONE X.

Se vna retta linea è diuisa in due parti vguali; e nella medesima dirittura se le aggiunga vna retta ad arbitrio; il quadrato di tutta la composta, col quadrato dell'aggiunta, è il doppio del quadrato della metà, col quadrato della retta composta della metà, e dell'aggiunta.


Sia la retta linea AB diuisa in due parti vguali in C, alla quale sia aggiunta qualunque retta BD nella medesima dirittura. Dico che il quadrato di tutta la composta AD, col quadrato dell'aggiunta BD, è il doppio del quadrato della metà AC, col quadrato di CD, composta della metà CB, e dell'aggiunta BD.

a 11. del 1.

b 3. del 1.

c 31. del 1.

Nel punto C si erigga la retta CE perpendicolare alla retta AD, si faccia EC uguale ad AC, ouero CB, e si tirino le rette AE, EB; dal punto E si tirino la retta EF parallela alla retta AB, e per il punto D si faccia passare la retta FDG parallela ad EC, la quale concorrerà con EF in qualche punto F, e con EB continuata in qualche punto G; si tirino la retta AG.



Perche

Perche il lato AC è vguale al lato CE, farà il triangolo AEC isoscele, e gli angoli CAE, CEA, d' saranno frà di loro vguali; mà l'angolo ACE, per costruzione è retto, ogn'vno de' due angoli CAE, CEA farà la metà d'vn angolo retto. Nell'istesso modo, considerando il triangolo ECB, si dimostrerà, ch'ogn'vno de' angoli CEB, CBE, è la metà d'vn angolo retto; dal che tutto l'angolo AEB farà retto. In oltre perche le rette EF, CD, sono parallele, segate dalla retta EC, i due angoli FEC, DCE, interni, e dalla medesima parte, sono vgnali à due angoli retti; mà l'angolo DCE è retto, farà l'angolo FEC retto. Nel parallelogrammo CF, gli angoli opposti, ed i lati opposti sono vgnali; & essendo gli angoli FEC, DCE retti, faranno gli angoli opposti in F, & D retti; ed il lato CD farà vguale al lato EF. Perche dunque l'angolo CEP è retto, leuato l'angolo CEB, ch'è la metà d'vn angolo retto, l'angolo FEG, che resta, farà la metà d'vn angolo retto. Nel triangolo FEG, l'angolo F è retto, l'angolo FEG è la metà d'vn retto, farà il restante angolo FGE la metà d'vn angolo retto; dal che i lati EF, FG, sono frà di loro vgnali. Similmente nel triangolo GDB, l'angolo D è retto, l'angolo DGB è la metà d'vn angolo retto; il rimanente angolo DBG, farà la metà d'vn angolo retto; e perciò gli angoli DBG, DGB sono frà di loro vgnali, ed il lato DG, farà vguale al lato DB.

Di nuono nel triangolo ECA, angolo retto in C, il quadrato di AE è vguale à i quadrati de' due lati AC, CE; mà EC è fatto vguale al lato CA, farà il quadrato di AE il doppio del quadrato di AC. Similmente nel triangolo EFG, angolo retto in F, il quadrato di EG è vguale à i quadrati de' due lati EF, FG; mà EF è vguale ad FG, farà il quadrato di EG il doppio del quadrato di EF, cioè il doppio del quadrato di CD; e così li quadrati de' due lati AE, EG sono il doppio de' i quadrati delle due rette AC, CD. Si consideri il triangolo AEG, angolo retto in E, il quadrato di AG è vguale à i quadrati de' due lati AE, EG; mà i quadrati de' due AE, EG sono il doppio de' i quadrati delle due AC, CD, farà il quadrato di AG il doppio de' i quadrati delle due AC, CD. Nel triangolo ADG, angolo retto in D, il quadrato di AG è vguale à i quadrati de' due lati AD, DG; mà il quadrato di AG è il doppio de' quadrati delle due AC, CD, i due quadrati de' lati AD, DG faranno il doppio de' i quadrati delle due AC, CD: fu dimostrata DG vguale à BD; farà dunque il quadrato della composta AD, col quadrato dell'aggiunta DB, il doppio del quadrato della metà AC, col quadrato della retta CD, composta della metà CB, e dell'aggiunta BD, ch'era da dimostrarsi.


PROBLEMA I. PROPOSITONE XI.

Data vna retta linea, diuiderla talmente, che il rettangolo contenuto da tutta, e da vna delle parti, sia vguale al quadrato dell'altra parte.

Sia la retta linea AB, la quale s'habbia à diuidere come s'è detto.

a 48. del 1.
b 10. del 1.
c 3. del 1.
d 46. del 1.

Sopra la retta AB^a si descriua il quadrato DB, si diuidi il lato CB^b in due parti vguali in E, e si tiri la retta EA; poi si prolunghi CB verso F, e si faccia EF^c vguale alla retta EA; sopra la retta BF^d si descriua il quadrato BG, il di cui lato GH segarà il lato AB in qualche punto H. Dico ch'il rettangolo contenuto da tutta BA, e dalla parte AH, e vguale al quadrato di HB. Si prolunghi GH fino ad I.



e 6. del 2.

Perche la retta CB, per costruzione è diuisa in due parti vguali in E, e gli è aggiunta la parte BF, sarà il rettangolo contenuto dalla composta CF, e dall'aggiunta BF, col quadrato della metà, EB, e vguale al quadrato di EF: la retta EF è fatta vguale ad EA, sarà il rettangolo contenuto dalle due CF, FB, col quadrato di EB, vguale al quadrato di AE.

f 47. del 1.

Nel triangolo ABE, angolo retto in B, il quadrato di AE^e è vguale à i quadrati de' due lati AB, BE; mà il quadrato di AE è vguale al rettangolo contenuto dalle due CF, FB, col quadrato di EB; i quadrati dunque delle due AB, BE, sono vguali al rettangolo contenuto dalle due CF, FB, col quadrato di EB: vguualmente se ne leui il quadrato di EB,

g 1. assom.

h 3. assom.

resta il quadrato di AB, cioè il quadrato DB, vguale al rettangolo contenuto dalle due CF, FB, cioè vguale al rettangolo CG, (stante, che BF è vguale ad FG) vguualmente se ne leui il comune rettangolo IB; resta il rettangolo DH vguale al quadrato HF. E pere che il rettangolo DH^k è contenuto dal lato DA, e da AH, ed il lato AD è vguale ad AB; sarà il rettangolo contenuto da BA, & AH vguale al quadrato BG, cioè vguale al quadrato di BH, ch'era da farsi, e dimostrarfi.

K 1. definit. del 2.

THEOREMA XI. PROPOSITIONE XII.

Ne i triangoli ambignonij il quadrato del lato opposto all'angolo ottuso è tanto maggiore de' i quadrati de' lati, che contengono l'angolo ottuso, per quanto è il doppio rettangolo contenuto da vno de' lati intorno all'angolo ottuso, e dalla continuatione di quello, interposta fra l'angolo ottuso, e la perpendicolare, che cade dall'angolo opposto al lato continuato.

a 13. del 1.

Sia il triangolo ambigonio A B C, angolo ottuso in B, e dall'angolo A cada la retta AD perpendicolare al lato CB, continuato fino in D. Dico ch'il quadrato del lato AC opposto all'angolo ottuso ABC, è tanto maggiore de' i quadrati de' i lati AB, BC, che contengono l'angolo ottuso, per quanto è il doppio rettangolo conte-



nuto


nuto dal lato CB, e dalla continuatione BD.

La retta CD è divisa in B; farà il quadrato di CD ^b vguale à i quadrati delle due CB, BD, col doppio rettangolo contenuto dalle medesime due CB, BD: vguualmente s'aggiunga il quadrato di AD; i quadrati de' due lati CD, DA ^c faranno vguali à i quadrati delle tre CB, BD, DA, col doppio rettangolo contenuto dalle due CB, BD: mà, per essere l'angolo D retto, il quadrato di AC ^d è vguale à i quadrati de' due lati CD, DA; farà il quadrato di CA vguale à i quadrati delle tre CB, BD, DA, col doppio rettangolo contenuto dalle due CB, BD. E perche il quadrato di AB ^d è vguale à i quadrati delle due AD, DB; farà il quadrato di AC vguale à i quadrati de' due lati CB, BA, col doppio rettangolo contenuto dalle due CB, BD. Hor se à i quadrati de' due lati CB, BA, bisogna aggiungere il doppio rettangolo contenuto dalle due CB, BD, accioche siano vguali al quadrato di AC; il quadrato dunque dellato AC è tanto maggiore de' quadrati de' due lati CB, BA, per quanto è il doppio rettangolo contenuto dalle due CB, BD, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA XII. PROPOSITIONE XIII.

In qualunque triangolo rettilineo, il quadrato del lato opposto all'angolo acuto, è tanto minore de' quadrati de' lati, che contengono l'angolo acuto, per quanto è il doppio rettangolo contenuto da vno de' lati intorno all'angolo acuto, e la parte del medesimo lato interposta frà l'angolo acuto, e la perpendicolare.

Sia qualunque triangolo rettilineo ABC, angolo acuto in C, e cada dall'angolo A la retta AD perpendicolare al lato BC. Dico che il quadrato del lato AB, opposto all'angolo acuto C, è tanto minore de' quadrati de' lati BC, CA, per quanto è il doppio rettangolo contenuto dal lato BC, e dalla parte DC, interposta frà l'angolo acuto C, e la perpendicolare AD.



Perche la retta BC è divisa in D, ^b il quadrato di tutta BC, col quadrato della parte DC, è vguale al doppio rettangolo contenuto dalle due BC, CD, col quadrato del restante BD: dall'vna, e l'altra parte di questa vguaglià, s'aggiunga il quadrato di AD; ne vengono i quadrati delle tre BC, CD, DA, ^c vguali al doppio rettangolo contenuto dalle due BC, CD, con i quadrati delle due BD, DA: e perche nel triangolo ADB, angolo retto in D, i quadrati de' due lati BD, DA, ^d sono vguali al quadrato di AB, farà il quadrato di AB, col doppio rettangolo contenuto dalle due BC, CD, vguale à i quadrati delle tre BC, CD, DA: mà nel triangolo rettangolo ADC, i quadrati de' due lati AD, DC sono vguali al quadrato di AC; farà il quadrato di AB, col doppio

b 4. del 2.

c 2. affiom.

d 47. del 1.

a 12. del 1.

b 7. del 1.

c 2. affiom.

d 47. del 1.


rettangolo contenuto dalle due BC, CD , vguale à i quadrati de' due lati BC, CA . Hor se al quadrato del lato AB bisogna aggiungere il doppio rettangolo contenuto dalle due BC, CD , accioche sia vguale à i quadrati de' due lati BC, CA ; farà il quadrato del lato AB tanto minore de' i quadrati de' lati BC, CA , per quanto è il doppio rettangolo contenuto dalle due BC, CD , come fu proposto dimostrare.



PROBLEMA II. PROPOSITIONE XIV.

Costruire vn quadrato vguale ad vn dato rettilineo .

Habbiasi à destruiere vn quadrato vguale al dato rettilineo A . Si faccia il parallelogrammo rettangolo BC a vguale al dato rettilineo A ; si continui il lato BD verso E , e si faccia DE vguale al lato DC ; si diuida la retta BE in due parti vguali in F ; fatto centro in F , coll'intervallo FB , ouero FE , si descriua il mezzo circolo BGE , si continui il lato CD fino, che concorra con la circonferenza in qualche punto G . Dico che il quadrato, che si



descriue sopra alla retta DG , è vguale al rettilineo dato A . Dal centro F al punto G si tiri la retta FG . Nel triangolo FGD , angolo retto in D , il quadrato del lato FG è vguale à i quadrati de' due lati FD, DG . In oltre perche la retta BE è diuisa in due parti vguali in F , e la medesima è diuisa in due parti ineguali in D , e la medesima è diuisa in due parti ineguali in D , e il rettangolo contenuto dalle due BD, DE , col quadrato di FD , è vguale al quadrato di EF , cioè vguale al quadrato di FG ; mà il quadrato di FG è dimostrato vguale à i quadrati de' due lati FD, DG , farà il rettangolo contenuto dalle rette BD, DE , col quadrato di FD , vguale à i quadrati de' due lati FD, DG : se ne leui vgualmente il quadrato del lato FD , resta il rettangolo contenuto dalle due BD, DE , cioè il rettangolo BC , vguale al quadrato della retta DG ; mà il rettangolo BC è fatto vguale al rettilineo A , farà il quadrato descritto sopra la retta DG vguale al dato rettilineo A , ch'era da farsi, e dimostrarsi.

Fine del Secondo Elemento.

EVCLIDE RESTITVTO

DA

VITALE GIORDANI

ELEMENTO TERZO.




DEFINITIONI.

I.

Quici circoli sono vguali, i di cui diametri, ò semidiametri sono frà di loro vguali.



I O E' se il diametro BD, è vguale al diametro FH, ouero il semidiametro IC è vguale al semidiametro KG, il circolo ABCD, è vguale al circolo EFGH; perche generandosi i circoli ABCD, EFGH, dalle reuolutioni de' loro semidiametri IC, KG, intorno à gli estremi I, & K,




posti immobili, se li semidiametri IC, KG sono frà di loro vguali, passeranno ne i loro flussi spatij vguali; e così i circoli descritti saranno frà di loro vguali. Ed all'incontro quando i circoli sono vguali i loro diametri, ò semidiametri sonò frà di loro vguali.

I I.

La retta linea si dice toccare il circolo, quando concorrendo col circolo continuata non lo sega.

Nel circolo BE concorra la retta DE, e continuata passi dentro del circolo, come fà la parte EF, in tal caso la retta DF non si dice toccare il circolo. Quando poi concorrendo qualche retta col circolo, come fà la retta AB, e continuata passi fuori di esso circolo, come apparisce per la retta AC, all'hora la retta AC si dirà toccare il circolo BE, ed il punto B, sarà il punto del contatto.




I Cir-

I I I.

I Circoli si dicono toccarsi frà di loro , quando concorrendo insieme non si segano.


Per effempio i circoli ABC , ADC de' quali parte dell' uno cade dentro dell' altro , si dicono segarsi , ed i circoli EFG , HFI , li quali concorrono insieme nel punto F , e l' uno non sega l' altro , ma l' uno cade totalmente fuori dell' altro , si dicono toccarsi di fuori ; ed i circoli KLM , NLO , le di cui circonferenze concorrono insieme nel punto L , e non si segano scambievolmente , si dicono toccarsi di dentro .



I V.

Le rette linee nel circolo si dicono essere vglualmente distanti dal centro, quando le rette , che dal centro cadono ad angoli retti à quelle , sono frà di loro vgluali ; e quella si dice essere più lontana dal centro , sopra la quale cade la perpendicolare maggiore .

Nel circolo $ABCF$, siano tirate le rette AB , EC , GF , e dal centro D , s'intendano tirate le rette DH , DI , DK ad angoli retti con le rette AB , EC , GF ; se la perpendicolare DH è uguale alla perpendicolare DI , le rette GF , AB si diranno essere vglualmente distanti dal centro D : e se la perpendicolare DK è maggiore della perpendicolare DI , la retta EC si dirà essere più distante dal centro D , che la retta AB , cioè se ID è minore di DK , la retta AB si dirà essere più vicina al centro D , che la retta EC .



V.

Portione del circolo è la figura contenuta dalla retta linea , e da vna parte della circonferenza di effo circolo .


S'intenda il circolo $ABCD$, il di cui centro E , ed il diametro FG , e sia sezzato il circolo $ABCD$ dalla retta AC ; la figura contenuta dalla retta AC , e dalla circonferenza ABC , si chiama *porzione del circolo*; che se il centro E cade in essa, in tal caso la *porzione* ABC è maggiore del semicircolo FBG , e perciò si dice *porzione maggiore*: e se il centro E cade fuori come nella notata $A'DC$, la quale per essere minore del semicircolo FDG , si chiama *porzione minore*: la linea ABC , ouero ADC , si chiama *arco*; e la retta AC si dice *corda dell'arco* ABC , ed anco dell'arco ADC .



V I.

Angolo della *porzione* è quello, ch'è contenuto dalla corda, e dall'arco.

L'angolo contenuto dall'arco AB ; e dalla corda BCD , cioè l'angolo ABC , ouero ADC , si chiama *angolo della porzione*.



V I I.

Angolo nella *porzione* è quello, ch'è contenuto da due rette tirate dagli estremi della corda ad vn punto preso nella circonferenza; e si chiama ancora *angolo nella circonferenza*.


Nella *porzione* BAC dagli estremi B , & C , della corda BC , siano tirate due rette, come BA , CA , à qualche punto A ; preso nella circonferenza BAC ; l'angolo BAC , contenuto dalle rette BA , AC , si chiama *angolo nella porzione*; cioè si dice essere nella *porzione* BAC , e si chiama ancora *angolo nella circonferenza*, ouero alla circonferenza.



V I I I.

L'angolo alla circonferenza si dice *insistere all'arco*, che gli è opposto.


Nel circolo $ABCD$, da qualche punto A siano tirate alla circonferenza le rette AB , CB , talmente che l'angolo ABC sia opposto à qualche arco ADC , in tal caso l'angolo ABC si dirà insistere all'arco ADC , che gli è opposto. E nota che l'angolo alla circonferenza può essere angolo nella porzione, ed ancora angolo insistente; come nella figura $EFGH$, l'angolo EFG , rispetto all'arco EFG , si dice essere nella porzione EFG ; e rispetto all'arco EHG , che gli è opposto, si dice insistente: e nell'istesso modo l'angolo EHG si dice essere nella porzione EHG , e si dice insistere all'arco EFG , che gli è opposto.



I X.

La figura contenuta da due semidiametri, che contengono qualche angolo nel centro del circolo, e dall'arco opposto à quell'angolo, si chiama settore del circolo.


Dal centro E , del circolo $ABCD$, s'intendano tirati alla circonferenza i due semidiametri AE , CE , i quali contenghino nel centro qualche angolo AEC , la figura $AECD$, contenuta dalle rette AE , EC , e dall'arco ADC , si chiama settore del circolo.



X.

Simili porzioni di circoli sono quelle, delle quali gli angoli alla circonferenza sono vguali, cioè, che gli angoli in quelle porzioni sono vguali fra di loro.

Nel circolo Z , se gli angoli FED , ABC , sono fra di loro vguali, le porzioni FED , ABC , nelle quali sono posti i detti angoli, si dicono essere fra di loro simili. Parimente ne i circoli ineguali X , T , se gli angoli GHI , KLM sono fra di loro vguali, le porzioni GHI , KLM si dicono essere fra di loro simili.




PROBLEMA I. PROPOSITIONE I.

Dato vn circolo, ritrouargli' il centro.

Sia il dato circolo ABCD, al quale si voglia ritrouare il centro.

Si tiri qualunque retta AC, che segghi il circolo ABC; si diuida la retta AC^a in due parti vguale in E, e sopra la retta AC, nel punto E, si erigga la perpendicolare EB, la quale continuata concorrerà con la circonferenza come in B, & D; si diuida la retta BD^c in due parti vguale in F. Dico ch'il punto F è il centro del dato circolo ABCD.

Se il punto F non è il centro del circolo ABCD, perche BF è vguale ad FD, necessariamente farà qualche altro puto fuori della retta BD, e sia quello, per esempio, il punto G; si tirino le rette GA, GE, GC. Perche il punto G è centro del circolo ABCD, le rette GA, GC^d sono fra di loro vguale: si considerino i due triangoli GEA, de' quali il lato EC, per costruzione, è vguale al lato AE, il lato EG è commune, perciò i due lati GE, EC sono vguale a i due lati GE, EA, la base GC è dimostrata vguale alla base GA, farà l'angolo GEC vguale all'angolo GEA; dal che l'angolo GEA^e farà retto: ma per costruzione l'angolo BEA è retto; l'angolo dunque BEA farà vguale all'angolo GEA, la parte vguale al tutto, ch'è impossibile; non dunque il punto G è centro del circolo ABCD, ma farà il punto F, ch'era da dimostrarsi.



a 10. del 1.
b 11. del 1.
c 10. prop.

d 15. defin.
del 1.

e 10. defin.
del 1.

COROLLARIO.

Da quel che s'è detto, è manifesto, che se vna retta linea sega vn'altra retta tirata nel circolo in due parti vguale, & ad angoli retti, quella passa per il centro del circolo.

THEOREMA II. PROPOSITIONE II.

Se nella circonferenza del circolo sono presi due qualunque punti, la retta, che congiunge quei punti, cade dentro del circolo.

Nella circonferenza del circolo ABCF, siano presi due qualunque punti A, & C, tirata la retta AC^a. Dico che la retta AC cade dentro del circolo.

Si troui il centro del circolo, b che sia D, e si tirino le rette DA, DC, e preso nella retta AC qualunque punto E, si tiri la retta DE, la quale si continui d indeterminatamente verso F, la retta DEF,



a 1. postul.

b 1. del 1.

c 1. postul.

d 1. postul.

e 25. defin.
del 1.
125. defin.
del 1.
6. 5. del 1.
h 16. del 1.

K 19. def. 1.

indeterminata verso F, segarà la circonferenza del circolo in qualche punto F. Perche le rette DC, DA sono tirate dal centro alla circonferenza, perciò sono frà di loro vguali, ed il triangolo DAC se è isoscele, dal che gli angoli DCA, DAC, sono frà di loro vguali. Nel triangolo DEC, il lato CE è continuato verso A, farà l'angolo esterno DEA maggiore dell'angolo DCA interno, ed opposto; ma l'angolo DCA, è mostrato vguale all'angolo DAC, farà l'angolo DEA maggiore dell'angolo DAE, ed il lato DE, sarà minore del lato AD; ma il lato AD, per la definizione del circolo, è vguale ad FD, farà DE minore della retta DF, dal che il punto E cade dentro al circolo: e perche il punto E è preso ad arbitrio nella retta AC, ogni punto dunque immaginato nella retta AC, cade dentro del circolo. Per la qual cosa la retta AC, che passa per quegli infiniti punti, cade dentro del circolo, ch'era da dimostrarsi.



C O R O L L A R I O.

Da quel, che s'è detto, è manifesto, che quando vna retta linea tocca vn circolo, quella tocca il circolo in vn sol punto; perche se passasse per due qualunque punti presi nella circonferenza, caderebbe dentro del circolo, ed all' hora lo segarebbe, e non lo toccherebbe.


THEOREMA II. PROPOSITIONE III.

La retta, che passa per il centro del circolo, e sega vn'altra retta tirata in esso circolo fuori del centro, se la sega in due parti vguali, la segarà ad angoli retti; e, se la sega ad angoli retti, la segarà in due parti vguali.

a 46. post.

b 6. del 1.

Sia il circolo ABCD, il di cui centro E, per il quale passi la retta BD, e seghi la retta AC, che non passa per il centro. Dico prima, che se la retta BD sega la retta AC in due parti vguali, gli angoli BFC, BFA sono retti. Dal centro E à i punti A, & C, si tirino le rette EA, EC. Si considerino i due triangoli EFC, EFA: perche FC, per ipotesi, è vguale ad FA, ed il lato FE è comune; i due lati EF, FC sono vguali à i due lati EF, FA; la base EC, per la definizione del circolo, è vguale alla base EA, farà l'angolo EFC, vguale all'angolo EFA, e per la decima definizione del primo libro, gli angoli EFC, EFA sono retti.



Di


Di nuouo, supposto che gli angoli in F siano retti. Dico che la retta AF è vguale alla retta FC. S'intenda fatta l'antecedente costruzione. Perche gli angoli EFC, EFA sono retti, sarà il quadrato del lato EC, ^{c 47. del 1.} è vguale à i quadrati de' due lati EF, FC, ed il quadrato del lato EA, sarà vguale à i quadrati de' due lati EF, FA; mà EC, per la definizione del circolo, è vguale ad EA; faranno i quadrati de' due lati EF, FC vguali à i quadrati de' lati EF, FA; se ne leui il quadrato del commune lato EF, resta il quadrato del lato FC ^{d 3. post.} vguale al quadrato del lato FA, ed il lato FC vguale al lato FA, come fu proposto dimostrare.

THEOREMA III. PROPOSITIONE IV.

Se nel circolo due rette linee si segano fuori del centro, ambedue non si segano scambievolmente in due parti vguali.

Nel circolo ACBD, il di cui centro F, si seghino due qualunque rette AB, CD, fuori del centro F, in qualche punto E. Dico che tutte due, non si segano scambievolmente in due parti vguali.

Si seghino s'è possibile in due parti vguali nel punto E, dal centro F all'intersegaione E ^a si tiri la retta FE. Perche la retta FE passa per il centro F e sega la retta AB fuori del centro in due parti vguali, gli angoli FEB, FEA ^b saranno retti. Similmente perche la retta FE passa per il centro F, e sega la retta CD in due parti vguali, gli angoli FED, FEC saranno retti; dal che l'angolo F E D ^c sarà vguale all'angolo FEB, la parte vguale al tutto, ^d ch'è impossibile; non dunque tutte due le rette AB, C D, si segano scambievolmente in due parti vguali, ch'era da dimostrarsi.



a 1. post.

b 3. del 1.


c 10. assiom.

d 9. assiom.

THEOREMA IV. PROPOSITIONE V.

Se due circoli si segano scambievolmente, non è possibile, ch' habbiano vn medesimo centro.

Si seghino i circoli ABC, A D C, come in A, & C. Dico che i circoli ABC, ADC non hanno il medesimo centro. Habbiano, s'è possibile, il medesimo centro E, dal quale all' intersegaione A: si tiri la retta AE; e dal medesimo punto E si tiri qualunque retta EB, che seghi le circonferenze de' circoli fuori delle intersegaioni A, & C, come in B & D. Perche il punto E è centro del circolo ADC, sarà ^b la retta ED vguale alla retta EA. Similmente perche



a 1. post.

b 15. definic. del 1.

c 15. defin.
del. 1.

d 9. affiom.

il punto E è centro del circolo ABC, la retta EB, ^a sarà vguale alla retta EA: dal che le rette ED, EB sono frà di loro vguali; la parte vguale al tutto, ^d ch'è impossibile; non dunque i circoli, che si segano hanno vn medesimo centro, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA V. PROPOSITIONE VI.


Se due circoli si toccano di dentro, non è possibile, che habbiano il medesimo centro.

a 1. post.

b 15. defin.
del. 1.

c 1. affiom.
d 9. affiom.

Si tocchino i circoli ABC, ADE, l'vno dentro l'altro in qualche punto A. Dico che non possono hauere il medesimo centro. Habbiano, s'è possibile, il medesimo centro F; dal centro F al contatto A ^a si tiri la retta FA, e dal medesimo centro F, si tiri qualunque altra retta FB, che seghi le circonferenze de' circoli fuori del contatto A, come in B & D. Perche il punto F è centro del circolo ADE, sarà la retta DF ^b vguale alla retta FA. Similmente perche il punto F è centro del circolo ABC. La retta FB sarà vguale alla medesima retta FA; dal che le rette FD, FB sono frà di loro vguali, la parte vguale al tutto, ^d ch'è impossibile; non dunque i circoli, che si toccano di dentro hanno vn medesimo centro, ch'era da dimostrarsi.



THEOREMA VI. PROPOSITIONE VII.

Se nel diametro del circolo sia preso qualche punto fuori del centro, e da quello siano tirate quante si voglia rette linee alla circonferenza; quella, che passa per il centro, è la massima, il restante del diametro è la minima, e delle altre quella, ch'è più vicina alla massima, è sempre maggiore di quella, ch'è più lontana; e dal medesimo punto due sole rette linee vguali possono cadere nella circonferenza, vna da vna parte, e l'altra dall'altra parte della massima, o minima.

Nel circolo ACDB, il di cui centro E, ed il diametro AB, nel quale, fuori del centro E, sia preso qualunque punto F, e dal punto F alla circonferenza siano tirate quante si voglia rette FC, FD, FG. Dico che di tutte le rette tirate dal punto F alla circonferenza ACDB, la massima è la retta FA, che passa per il centro E; la minima è il restante FB del diametro; e che la retta FC, più vicina alla massima, è maggiore di FD più lontana; ed FD, è maggiore di FG; e che dal punto F due sole rette linee vguali possono cadere alla circonferenza,



cioè

cioè vna da vna parte, e l'altra dall'altra parte della minima FB, ò massima FA.

Dal centro E si tirino le rette EC, ED, EG. ^a Per la definizione del circolo la retta EA è vguale alla retta EC; vgualemente se gli aggiunga la parte EF, sarà ^b FA vguale alle due FE, EC: ma nel triangolo FEC, i due lati FE, EC ^c sono maggiori del terzo lato FC, sarà FA maggiore di FC. Nell'istesso modo si dimostrerà, che FA è maggiore di FD, come anco di FG, e di ogn'altra tirata dal punto F alla circonferenza ACDB. Per la qual cosa la retta FA è la massima.

Nel triangolo EFG, i due lati EF, FG sono maggiori del ^d lato EG; ma il lato EG, per la definizione del circolo, è vguale ad EB; faranno i due lati EF, FG maggiori della retta EB; se ne leui la commune retta EF, resta FB ^e minore di FG. Nell'istesso modo si dimostrerà, che la retta FB è minore di FD, come anco di FC, e di ogn'altra tirata dal punto F alla circonferenza ACDB. Per la qual cosa la retta FB sarà la minima.

In oltre, perche la retta EC, per la definizione del circolo, è vguale ad ED, vgualemente se le aggiunga la retta EF: i due lati FE, ED, del triangolo FED; l'angolo FEC è maggiore dell'angolo FED, stante che, per costruzione, lo contiene, sarà la base FC ^f maggiore della base FD. Nell'istesso modo, considerando i triangoli EDF, EGF, si dimostrerà, che la retta FD è maggiore di FG. Per la qual cosa quelle, che sono più vicine alla massima FA, sono maggiori di quelle, che più sono lontane.

Finalmente nel punto E si faccia l'angolo BEH ^h vguale all'angolo BEG, e si tiri ^k la retta FH. Perche i due lati FE, EG del triangolo FEG, sono vguali a i due lati FE, EH, del triangolo FEH; e l'angolo FEG, per costruzione, è vguale all'angolo FEH, sarà la base FG ⁱ vguale alla base FH: dal che le due FG, FH, tirate dall'vna, e l'altra parte della minima, ò massima, sono frà di loro vguali. Che poi dal punto F non se ne possano tirare più di due vguali dall'vna, e l'altra parte della minima, ò massima, è chiaro da quel, che s'è dimostrato: poiche se dal punto F sia tirata qualche altra retta alla circonferenza, quella caderà sotto, ò sopra alla retta FH; se cade sopra come fa la retta FK, per quel, che s'è dimostrato, sarà FK, maggiore di FH, e se cade sotto, come fa FI, sarà FI minore di FH, che era da dimostrarsi.


THEOREMA VII. PROPOSITIONE VIII.

Se da qualche punto preso fuori del circolo sono tirate rette linee, che seghino il circolo, delle quali vna passi per il centro: di tutte quelle, che cadono nel cauo della circonferenza, la massima è la retta, che passa per il centro; dell'altre la più vicina à quella, che passa per il centro è maggiore d'ogn'altra più lontana. Nella parte con-

uessa

ueffa quella, ch'è diretta al centro, è la minima; dell'altre quella, ch'è più vicina alla minima è minore d'ogn'altra più lontana, e da quel punto due sole rette linee vguali cadono nel circolo dall'vna, e l'altra parte della minima, o mafsima.

Da qualche punto A, prefo fuori del circolo BCD, fiano tirate le rette AD, AG, AH, AL, AC &c. che feghino il circolo BCD, e la retta AD paffi per il centro F. Dico che la retta AD, che paffa per il centro F, è la mafsima; dell'altre, AG, più vicina alla mafsima, è maggiore di AH più lontana; & AH è maggiore di AL, come anco AL maggiore di AC e nella parte conueffa, la retta AB, ch'è diretta al centro F, è la minima; la retta AI, più vicina alla minima, è minore di AK più lontana, & AK è minore di AO; e finalmente dall'vna, e l'altra parte della minima, o mafsima, due sole rette vguali caderanno nel circolo.



a 1. post.

b 15. defin.
del 3.
c 3. affom.
d 20. del 1.

e 15. defin.
del 1.

f 24. del 1.

g 20. del 1.

h 3. affom.

i 1. del 1.

j 3. affom.

Dal centro F² fi tirino le rette FG, FH, FL, FC, FO, FK, FI. Perche la retta FD^b è vguale ad FG, vgualmente s'aggiunga la retta FA; farà la retta AD^c vguale alle due AF, FG: ma nel triangolo AFG i due lati AF, FG, ^d sono maggiori del terzo lato AG; farà la retta AD maggiore della retta AG. Nell'istefso modo fi dimostrerà, che la retta AD è maggiore della retta AH, e d'ogn'altra AL, AC &c. Per la qual cosa la retta AD, che paffa per il centro F è la mafsima.

Si considerino i due triangoli AFG, AFH, de' quali il lato FG^e è vguale al lato FH; il lato AF è commune ad ambidue, perciò i due lati AF, FG, sono vguali à i due lati AF, FH; l'angolo AFG, è maggiore dell'angolo AFH, (fante che, per costruzione, lo contiene) farà la base AG^f maggiore della base AH. Nell'istefso modo fi dimostrerà, che AH è maggiore di AL, & AL è maggiore di AC. Per la qual cosa quella, ch'è più vicina alla mafsima è maggiore d'ogn'altra più lontana.

Nella parte conueffa fi confideri il triangolo FIA, del quale i due lati AI, IF^g sono maggiori del terzo lato AF: fe ne leuino gli vguali FB, FI, ^h resta AB minore di AI. Nell'istefso modo fi dimostrerà, che la retta AB è minore di AK, e d'ogn'altra AO, AC &c. per la qual cosa AB ch'è diretta al centro è la minima.

Si confideri il triangolo FKA. Perche dagl'estremi del lato FA sono tirate le rette FI, IA, concorrenti nel punto I, dentro di effo triangolo KFA; i due lati AK, KI^k sono maggiori de' i due AI, IF; leuatoe gli vguali FI, FK, resta AI^l minore di AK. Nell'istefso modo fi dimostrerà,

che

che AK è minore di AO , e la retta AO è minore di AC . Per la qual cosa la retta AI , più vicina alla minima, è minore d'ogn'altra più lontana.

Si faccia l'angolo AFE m vguale all'angolo AFG , e si tiri n la retta AE . Perchè i due lati AF , FE sono vguali à i due lati AF , FG , e l'angolo AFE è vguale all'angolo AFG ; la base AE o sarà vguale alla base AG ; l'angolo AEF , sarà vguale all'angolo AGF , e l'angolo FAE vguale all'angolo FAG . Si tiri la retta FM ; farà l'angolo FME p vguale all'angolo FEM , cioè vguale all'angolo FGI : ma l'angolo FGI è vguale all'angolo FIG ; sarà l'angolo FIG q vguale all'angolo FME , ed i supplementi à due retti, cioè gli angoli FMA , FIA r , sono frà di loro vguali; ma gli angoli FAM , FAI sono stati mostrati frà di loro vguali, i rimanenti angoli AFM , AFI , sono frà di loro vguali. Finalmente perchè i lati AF , FM sono vguali à i due AF , FI , e l'angolo AFM è vguale all'angolo AFI , farà la base AM vguale alla base AI . Per la qual cosa le due AM , AI , dall'vna, e l'altra parte della minima, sono frà di loro vguali: come ancora le due AE , AG , dall'vna, e l'altra parte della massima per quel che si è dimostrato sono frà di loro vguali: ne possono essere più di due vguali, stante che nel concano ogn'altra, che passa più vicina ad AD , è maggiore di AE , e se passa più lontana, è minore per quel che si è dimostrato; e nel conuesso, ogn'altra, che passa più vicina ad AB , è minore di AM ; e se passa più lontana è maggiore, ch'era da dimostrarsi.

m 23. del 1.
n 1. post.

o 4. del 1.

p 5. del 1.

q 1. affiom.

r 13. del 1.

f 4. del 1.

THEOREMA VIII. PROPOSITIONE IX.

Se dentro d'un circolo sia preso qualche punto, dal quale cadano alla circonferenza più di due rette linee vguali; quel punto preso farà centro del circolo.

Dal punto A , preso dentro al circolo BCD , cadano alla circonferenza più di due rette vguali, come AB , AC , AD . Dico che il punto A è centro del circolo BCD . Si tirino le rette, BC , CD , e si diuidano b in due parti vguali in E , ed F ; dal punto A à i punti E , F , si tirino le rette AE , AF . Perchè i lati AE , EB del triangolo AEB , sono vguali à i due AE , EC del triangolo AEC , e la base AB , per ipotesi è vguale alla base AC ; gli angoli AEB , AEC d faranno frà di loro vguali, cioè e retti; e per il Corollario alla prima propos. di questo, la retta EA passa per il centro del circolo. Nell'istesso modo si dimostrerà che gli angoli ad F sono retti, e la retta FA passa per il centro del circolo. E perchè le rette EA , FA si segano in vn sol punto, e per costruzione passano per il punto A , farà il punto A il centro del circolo, ch'era da dimostrarsi.



a 1. post.

b 10. del 1.

c 1. post.

d 8. del 1.

e 10. defn. del 1.

THEOREMA IX. PROPOSITIONE X.

Due circoli, che si segano, non si possono segare più che in due punti.

a 1. del 3.

b 1. post.


Si seghino i circoli ABCD, EFGHIK, in più di due punti, s'è possibile, come in E, K, H, si troui ^a il centro del circolo ABCD, che sia L, dal quale alle interseghioni E, K, H, ^b si tirino le rette LE, LK, LH, che, per la definitione del circolo, sono frà di loro vguali. In oltre perche dentro del circolo EFGHIK, è preso il punto L, dal quale cadono più di due rette linee vguali alla circonferenza EFGHIK, come sonole rette LE, LK, LH, per l'antecedente propof. il punto L sarà centro del circolo EFGHIK; mà il medesimo punto L è centro del circolo ABCD; sarà il punto L centro commune de' due circoli ABCD, EFGHIK, che scambievolmente si segano, il che è contro alla quinta propof. Non dunque i circoli si segano in più di due punti, ch'era da dimostrarfi.



THEOREMA X. PROPOSITIONE XI.

Se due circoli l'vn dentro l'altro si toccano, la retta, che congiunge i loro centri, continuata passa per il punto del contatto.

Siano i circoli EAD, CAB, l'vn dentro l'altro, i quali si tocchino in qualche punto A; e sia G il centro del circolo EAD, ed F il centro del circolo CAB; si tiri la retta GF. Dico che continuata la retta GF, quella passerà per il contatto A. Se non passa per il contatto A, segarà le circonferenze fuori del contatto A, come in E, C, B, D; dal contatto A à i centri G, F, ^a si tirino le rette AG, AF. Nel triangolo AGF i due lati AF, FG, ^b sono maggiori del terzo lato AG; mà la retta GA, per la definitione del circolo, è vguale alla retta GD (stante che G è il centro del circolo EAD) i due lati GF, FA faranno maggiori della retta GD; se ne leui la commune GF, resta FA maggiore di FD. In oltre perche il punto F è centro del circolo CAB, le rette FA, FB ^c sono frà di loro vguali; mà la retta FA è stata dimostrata maggiore di FD, sarà FB maggiore di FD; la parte mag-



a 1. post.

b 20. del 1.

c 5. aſſiom.

d 15. defin. del 1.


giore

giore del tutto, e ch'è impossibile; non dunque la retta, che passa per i centri sega le circonferenze de' circoli fuori del contatto, mà passa per il contatto A, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA XI. PROPOSITIONE XII.

Se due circoli si toccano di fuori, la retta, che congiunge i loro centri, passa per il punto del contatto.

Si tocchino i circoli ABC, DBE nel loro conuesso in qualche punto B, e sia G il centro del circolo DBE, ed il punto F il centro del circolo ABC. Dico che tirata la retta FG, quella passerà per il contatto B.




Se non passa per il contatto B, seghi le circonferenze fuori del contatto, come in C ed E; dal contatto B à i centri F, & G^a si tirino le rette BF, BG. Perchè il punto F è centro del circolo ABC, le rette FC, FB^b sono frà di loro vguali. Similmente perchè il punto G è centro del circolo DBE, le rette GE, GB sono frà di loro vguali; dal che le rette FB, BG^c sono vguali alle due FC, GE: mà nel triangolo FBG i due lati FB, BG^d sono maggiori del terzo lato FG; le due rette dunque FC, GE sono maggiori della retta FG, la parte maggiore del tutto, e ch'è impossibile. Non dunque la retta, che passa per i centri sega le circonferenze fuori del contatto, mà passa per il contatto B, come fù proposto dimostrare.

THEOREMA XII. PROPOSITIONE XIII.

I circoli, ò si tocchino di dentro, ouero di fuori, non si possono toccare più ch'in vn punto.

Si tocchino i circoli A B C, A D E, ò di dentro, ouero di fuori, in qualche punto A. Dico che non si toccano in altro punto, che nel punto A. Sia F il centro del circolo ADE, ed il punto G sia il centro del circolo ABC; per i centri F, & G^a si faccia passare la retta FG, la quale continua-
^b per le due prossime



antecedenti propositioni, passerà per il contatto A. Nella circonferenza ABC si prenda qualunque punto B fuori del contatto A, dal quale al

P

cen-

e 9. axiom.

a 1. postul.

b 15. defin.

del 1.

c 2. axiom.

d 20. del 1.

e 9. axiom.


a 1. postul.

b 3. postul.

c. 6. del 3.

d. 7. & 8. del 3.

centro F si tiri la retta B F, che segnerà la circonferenza ADE in qualche punto D. Perché i circoli ABC, ADE si toccano, perciò non hanno vn medesimo centro; mà il punto F è supposto centro del circolo ADE, non sarà dunque il punto F centro del circolo ABC; dal che nel circolo ABC la retta F C, che passa per il centro G, sarà la massima di tutte l'altre rette tirate dal punto F alla circonferenza ABC; e la retta F A sarà la minima: per la qual cosa la retta F B è maggiore di F A; mà la retta FA, per la definizione del circolo, è vguale ad FD; sarà F D minore di FB; e perciò il punto B cade fuori del circolo ADE. E perché il punto B è preso ad arbitrio, ogni punto dunque preso nella circonferenza ABC, fuori del contatto A, caderà fuori del circolo ADE, per la qual cosa il circolo ADE non tocca il circolo in altro punto, che nel punto A, come fu proposto dimostrare.



THEOREMA XIII. PROPOSITIONE XIV.

Nel circolo, le vguali rette linee distano vgualmente dal centro, e quelle che sono vgualmente distanti dal centro sono frà di loro vguali.

a. 12. del 1.

b. 3. del 3.

c. 1. postul. d. 47. del 1.

e. 3. affirm.

Nel circolo ABCD, il dicui centro E, siano tirate l'vguali rette AB, CD. Dico prima, che l'vguali rette AB, CD, sono vgualmente distanti dal centro E. Dal centro E si tirino le rette EG, EF, ad angoli retti cō le rette DC, AB, le quali divideranno le rette AB, CD, in due parti vguali in F, & G; dal che AF sarà vguale alla retta DG; si tirino e le rette EA, ED. Essendo gli angoli in F, & G retti, il quadrato del lato AE sarà vguale à i quadrati de' due lati AF, FE; ed il quadrato di ED sarà vguale à i quadrati de' i due lati DG, GE; mà le rette EA, ED, per la definizione del circolo, sono frà di loro vguali; faranno i quadrati de' i due AF, FE, vguali à i quadrati de' i due DG, GE; se ne leuino i quadrati dell'vguali AF, DG, resta il quadrato di FE vguale al quadrato di EG; e la perpendicolare EF, sarà vguale alla perpendicolare EG; e, per la quarta definizione di questo, le rette AB, CD, sono vgualmente distanti dal centro E, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.



Di nouo siano le rette AB, CD vgualmente distanti dal centro E, cioè sia EF vguale ad EG. Dico che AB è vguale alla retta DC. S'in-

tenda

tenda fatta l'istessa costruzione, e si mostri, come prima, che i quadrati de' due lati AF, FE sono vguali à i quadrati de' due lati DG, GE; le ne leuino i quadrati dell'vguale FE, E G, resta il quadrato di FA ^f vguale quadrato di DG, e la retta FA, vguale alla retta D G; dalche il doppio di AF cioè AB, sarà vguale al doppio di DG cioè DC, ch'era da dimostrarsi.

f 3. assioma.

THEOREMA XIV. PROPOSITIONE XV.

Delle rette tirate nel circolo; la massima è il diametro; e delle altre, quella, ch'è vicina al centro, è maggiore d'ogn'altra più lontana.

Sia il circolo A B C D, il dicui centro H, & il diametro C E. Siano tirate in esso quante si voglia rette, come I K, & A G, cioè I K più vicina al centro, ed A G più lontana. Dico che il diametro C E è la massima, e che I K è maggiore di A G.



Dal centro H, si facciano cadere le rette HM, HL, perpendicolari alle rette I K, A G. Perche I K è più vicina al centro H, farà MH ^b minore di HL. Si faccia HN ^c vguale ad HM, e per il punto N ^d si faccia passare BF ad angoli retti con HL. Perche le rette HM, H N sono frà di loro vguali, sarà I K ^e vguale alla retta B F. Dal centro H ^f si tirino le rette HF, HB, H G, H A. Per la definizione del circolo le rette HE, HC, cioè la retta EC, è vguale alle due HF, H B; mà nel triangolo HFB, i due lati HF, HB ^g sono maggiori del terzo lato BF, sarà la retta C E maggiore della retta B F; mà fu mostrata BF vguale ad I K, sarà il diametro C E maggiore della retta I K per la qual cosa la retta CE, che passa per il centro H è la massima. Si considerino i due triangoli BHF, AHG; perche i due lati BH, HF, per la definizione del circolo, sono vguali à i due lati AH, HG, e l'angolo BHF è maggiore dell'angolo A H G, stante che per costruzione lo contine; sarà la base B F, ^h maggiore della base A G; mà la retta B F è vguale alla retta I K; sarà la retta I K maggiore di A G, ch'era da dimostrarsi.

a 12. del 1.

b 14. del 3.

c 3. del 1.

d 11. del 1.

e 14. del 3.

f 1. postula.

g 10. del 1.

h 14. del 1.

THEOREMA XV. PROPOSITIONE XVI.

Se nell'estremità del diametro di qualunque circolo sia eleuata vna retta linea, che faccia col diametro angoli retti, quella cade fuori del circolo; e nel luogo, ch'è frà quella retta linea, e la circonferenza del circolo, non è possibile che vi cada alcuna retta linea.

Nel circolo ABC, il dicui centro D, ed il diametro AC, nell'estremo A sia posta la retta FAE ad angoli retti col diametro AC. Dico prima, che la retta FE cade fuori del circolo ABC.

a 1. post.

b 17. del 1.

c 19. del 1.

d 13. del 1.

e 1. affom.

f 31. del 1.


g 17. del 1.

h 19. del 1.

K 1. post.

l 11. del 1.

Nella retta FE, si prenda fuori del punto A qualunque punto G; dal centro D al punto G si tiri la retta DG. Nel triangolo DAG, i due angoli DAG, DGA sono minori di due angoli retti; mà l'angolo DAG è retto, farà l'angolo DGA minore dell'angolo DAG, ed il lato DA^c farà minore del lato DG. E perchè la retta DA, per la definizione del circolo, è vguale alla retta DL, farà DL minore di DG: dalche il punto G cade fuori del circolo A B C. Hor essendo il punto G preso ad arbitrio, tutti i punti dunque immaginati in FE cadono fuori del circolo A B C; per la qual cosa la retta FE, che passa per quegli infiniti punti, cade fuori del circolo A B C, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.



Di nouo dico, che nel luogo contenuto frà la retta EA, e l'arco L K A, non può cadere alcuna retta linea. Cada, s'è possibile, nel luogo contenuto dalla retta EA, e l'arco LOA, qualunque retta linea HA, la quale farà qualche angolo con la retta EA; e perchè l'angolo EAD, per ipotesi, è retto, farà l'angolo HAD minore del retto. Nel punto D si costruisca l'angolo IDA^d vguale all'angolo IAD: i due angoli IDA, IAD, sono minori di due angoli retti, e per lo Scolio alla 31. proposizione, le rette AL, DI, concorrono in qualche punto I. In oltre, perchè l'angolo IDA, per costruzione, è vguale all'angolo HAE; vguualmente se gli aggiunga l'angolo IAD; i due angoli IDA, IAD^e sono vguali a tutto l'angolo EAD; mà l'angolo EAD, per ipotesi è retto; i due angoli dunque IDA, IAD sono vgnali ad vn angolo retto; ed il restante angolo DIA^f sarà retto: dal che l'angolo DAI^g è minore dell'angolo DIA, ed il lato ID^h è minore del lato AD; mà il lato AD, per la definizione del circolo, è vguale alla retta DO, farà DI minore della retta DO; dalche il punto I cade dentro del circolo, e la retta AH, che passa per il punto I, passa dentro del circolo. Per la qual cosa la retta AH non cade nel luogo contenuto frà la retta EA, e l'arco K O A; come fu proposto dimostrare.

COROLLARIO.

Perchè la retta FE, facendo angoli retti col diametro AC, cade fuori del circolo, per la seconda definizione di questo, la retta FE tocca il circolo nel punto A.


Se dunque per qualche punto A preso nella circonferenza d'un circolo A B C si voglia far passare vna retta, che tocchi il circolo, dal centro D al punto A si tiri il semidiametro DA, e nell'estremo A si ponga la retta FAE,ⁱ che faccia angoli retti con AD; la retta FE toccherà il circolo nel punto A. Dalche sarà manifesto il modo di far passare vna retta, che tocchi il circolo in qualunque punto preso nella circonferenza.

PROBLE-

PROBLEMA II. PROPOSITIONE XVII.

Da vn dato punto fuori d'vn circolo , tirare vna retta linea , che tocchi il dato circolo .

Sia il dato circolo BC , ed il punto fuori A, e si voglia dal punto A tirare vna retta , che tocchi il dato circolo BC . Si troui il centro del circolo BC , ^a che sia D , si tiri ^b la retta DA , e fatto centro in D , coll'intervallo DA , ^c si descriva il circolo AE ; nel punto B , sopra la retta AD , ^d si erigga la perpendicolare BE , la quale continuata concorra con la circonferenza AE in qualche punto E ; si tiri la retta DE , la quale segará l'arco BC in qualche punto C , si tiri la retta AC . Dico che la retta AC tocca il circolo BC nel punto C .



a 1. del 3.
b 1. post.
c 3. post.

d 11. del 1.


Per la definizione del circolo , la retta DA è vguale alla retta DE , e la retta DB è vguale alla retta DC ; dalche i duolati AD , DC , del triangolo ADC , e sono vguali à i due lati ED , DB , del triangolo EDB , l'angolo D è comune , perciò la base AC ^f sarà vguale alla base EB , e l'angolo DCA vguale all'angolo DBE : ma l'angolo DBE è retto , sarà l'angolo DCA retto , e per l'antecedente Corollario , la retta AC tocca il circolo nel punto C , ch'era da farsi , e dimostrarfi .

e 2. assioma.
f 4. del 1.

THEOREMA XVI. PROPOSITIONE XVIII.

Se vna retta linea tocca vn circolo , e dal centro sia tirata vna retta al contatto , quella sarà perpendicolare alla tangente .

Tocchi la retta AB il circolo CD in qualche punto C , e dal centro E al contatto C sia tirata la retta EC . Dico che la retta EC , è perpendicolare alla tangente AB . Se la retta EC non è perpendicolare alla tangente AB , dal centro E ^a si faccia cadere la retta EF perpendicolare alla retta AB . Perche i due angoli ECF , EFC ^b sono minori di due angoli retti , e l'angolo EFC , per costruzione è retto , sarà l'angolo ECF minore dell'angolo retto EFC ; dalche il lato EC ^c sarà maggiore di EF ; ma per la definizione del circolo , la retta EC è vguale ad ED , sarà ED maggiore di EF , la parte maggiore del tutto , ^d ch'è impossibile . Non dunque la retta EF è perpendicolare ad AB ; ma la retta EC sarà perpendicolare alla tangente AB , ch'era da dimostrarfi .



a 12. del 1.

b 17. del 1.

c 19. del 1.

d 9. assioma.

THEO-

THEOREMA XVII. PROPOSITIONE XIX.

Se vna retta linea tocca il circolo, e nel contatto si erigge vna retta perpendicolare alla tangente, quella passa per il centro del circolo.

Tocchi la retta AB il circolo CDE in qualche punto C, e nel punto C si ponga la retta linea CE ad angoli retti con AB, e continuata concorra con la circonferenza in qualche punto E. Dico che il centro del circolo CDE è nella retta CE, se il centro del circolo non è nella retta CE, farà necessariamente fuori della retta CE; sia dunque nel punto F, dal punto F al contatto C si tiri la retta FC, farà l'angolo FCB ^a retto; ma l'angolo ECB è supposto retto, l'angolo dunque FCB sarà vguale all'angolo ECB, la parte vguale al tutto ^c ch'è impossibile; non dunque il centro del circolo è fuori della retta EC, ma sarà nella retta EC, ch'era da dimostrarfi.



a 1. postul.

b 18. del 3.

c 9. assoma.

THEOREMA XVIII. PROPOSITIONE XX.

Nel circolo, l'angolo al centro è il doppio dell'angolo alla circonferenza, quando hanno vn medesimo arco per base.

Nel circolo ABC siano gli angoli BDC al centro e BAC alla circonferenza, ed habbiano il medesimo arco BC per base. Dico che l'angolo BDC al centro è il doppio dell'angolo BAC alla circonferenza. Cada nel primo luogo il centro D in vna delle rette che contiene l'angolo BAC alla circonferenza, come nella retta AB, della figura X. Perche le rette DA, DC, per la definitione del circolo, sono frà di loro vguali, farà l'angolo DAC ^a vguale all'angolo DCA. Nel triangolo DAC continuato il lato AD verso B, l'angolo BDC esterno ^b sarà vguale à i due angoli DAC, DCA interni, ed opposti; mà li due angoli DAC, DCA sono frà di loro vguali, farà l'angolo BDC al centro il doppio di vno, cioè il doppio dell'angolo BAC alla circonferenza.



a 5. del 2.

b 32. del 1.

Di nuouo cada il centro D, frà le due BA, AC, che contengono l'angolo alla circonferenza, come nella figura Z, si tiri la retta AD, e si continui fino alla circonferenza in E. Hauremo l'angolo BDE al centro, e l'angolo BAE alla circonferenza, che hanno il medesimo arco BE per base, ed il centro D cade in vna delle rette, che contiene l'angolo alla circonferenza, per quel che s'è dimostrato, farà l'angolo EDB al centro, il doppio dell'angolo EAB alla circonferenza. Per



c 1. postul.


Finita

l'istessa ragione l'angolo EDC al centro è il doppio dell'angolo EAC alla circonferenza, dalche tutto l'angolo BDC al centro è il doppio di tutto l'angolo BAC alla circonferenza.

Finalmente sia l'angolo BDC al centro, e l'angolo BAC alla circonferenza, che habbiano il medesimo arco BC per base, e non cada il centro D in niuna delle rette BA , AC , ne meno nello spatio interposto frà quelle, ma cada fuori come nella figura R . Dico similmente, che l'angolo BDC al centro è il doppio dell'angolo BAC alla circonferenza.

Si tiri la retta AD , e si prolunghi ^d fino che concorre con la circonferenza in qualche punto E . Haueremo l'angolo EDC al centro, e l'angolo EAC alla circonferenza, che hanno il medesimo arco EC per base, ed il centro D cade nella retta ADE , per quel che si disse nella prima parte, farà l'angolo EDC il doppio dell'angolo EAC . Similmente si consideri l'angolo EDB al centro, e l'angolo EAB alla circonferenza, che hanno il medesimo arco EB per base, ed il centro D cade nella retta AE , per la prima parte farà l'angolo EDB al centro, il doppio dell'angolo EAB alla circonferenza. Si diuida l'angolo BDC in due parti vguali con la retta DF , e si diuida l'angolo EDB in due parti vguali con la retta DG ; farà l'angolo BDC il doppio dell'angolo BDF , e l'angolo EDB il doppio dell'angolo GDB ; dalche tutto l'angolo EDC farà il doppio dell'angolo GDF : ma l'angolo EDC è dimostrato il doppio dell'angolo EAC , farà l'angolo GDF vguale all'angolo EAC . In oltre perche l'angolo EDB è il doppio dell'angolo GDB , ed il medesimo angolo EDB è dimostrato il doppio dell'angolo EAB , farà l'angolo GDB vguale all'angolo EAB . Hor essendo l'angolo EAC , per quel che s'è dimostrato, vguale all'angolo GDF , e la parte EAB è vguale alla parte GDB , farà il restante angolo BAC vguale al restante angolo BDF : ma l'angolo BDC è il doppio dell'angolo BDF , farà il medesimo angolo BDC il doppio dell'angolo BAC , ch'era da dimostrarsi.

d 2. post.



THEOREMA XIX. PROPOSITIONE XXI.

Gli angoli nella medesima ^{2c}portione del circolo sono frà di loro vguali.

Nel circolo ABCD , il di cui centro E , siano nella medesima portione CBAD , gli angoli CBD , CAD . Dico che sono frà di loro vguali. Supposto prima, che CBAD sia portione maggiore, si tirino ^a le rette EC , ED . L'angolo CED al centro, per l'antecedente proposizione, farà il doppio dell'angolo CAD alla circonferenza, e sarà ancora il doppio dell'angolo CBD ,




21. post.

alla

b 7. aſſiom.

alla circonferenza, e perciò gli angoli CAD , CBD nella medefima maggior portione ſono frà di loro vguali, che era da dimoſtrarſi nel primo luogo.

Di nouo ſia la portione $CBAD$, ò mezzo circolo, ouero portione minore. Dico ſimilmente che gli angoli CBD , CAD , nella medefima portione, ſono frà di loro vguali. Si riri la retta AB , farà $ADECB$ portione maggiore, e per quel che s'è dimoſtrato, gli angoli ADB , ACB , nella medefima portione maggiore $ADECB$, ſono frà di loro vguali. Si conſiderino i due triangoli FBC , FAD , de' quali l'angolo ADF è vguale all'angolo FCB ,



e 15. del 1.

per qualche s'è dimoſtrato; gli angoli AFD , BFC al vertice e ſono frà di loro vguali, faranno i due angoli ADF , AFD , del triangolo AFD , vguali à i due angoli BCF , BFC , del triangolo BCF , dal che il reſtante angolo FAD farà vguale al rimanente angolo FBC , cioè l'angolo CAD farà vguale all'angolo CBD , ch'era da dimoſtrarſi.

d 32. del 2.

S C O L I O.

*La conuerſa di queſta propoſitione ſi può fare facilmente nel ſe-
guente modo.*

Di due angoli vguali ſotteſi dalla medefima retta linea, e coſtituiti dalla medefima parte, vno ſia nella portione d'un circolo, l'altro farà nella medefima portione.

Siano gli angoli vguali BAC , BFC ſotteſi dalla medefima retta BC , e collocati dalla medefima parte FAC ſia l'angolo BAC nella portione del circolo BDC . Dico che l'angolo BFC farà nella medefima portione BDC . Se nò è nella circonferenza BDA , ò caderà dentro, ò fuori del circolo; ſe cade dentro, ſi continui CF fino ad E , e ſi congiunga BE . Gli angoli BEC , BAC , nella medefima portione, ſono per l'antecedente propoſitione, frà di loro vguali: ma l'angolo BFC è poſto vguale all'angolo BAC , farà l'angolo BFC vguale all'angolo BEC ; l'eſterno vguale all'angolo interno, ed oppoſto, ch'è contro alla decimeſſa propoſitione; non dunque l'angolo BFC cade dentro; ne fuori della circonferenza BDC , ma è nella portione BDC , ch'era da dimoſtrarſi.



a 2. poſt.

b 1. poſt.

c 1. aſſiom.

PROBLEMA XX. PROPOSITIONE XXII.

Di qualunque quadrilatero deſcritto nel circolo, gli angoli oppoſti ſono vguali à due angoli retti.

Nel circolo $ABCD$ sia descritto qualunque quadrilatero $ABCD$. Dico che gli angoli opposti ABC , ADC sono uguali a due angoli retti; e che i due angoli opposti DCB , DAB sono uguali a due angoli retti. Si tirino le diagonali AC , BD . La retta AD divide il circolo in due porzioni $ABCD$, AED ; gli angoli ABD , ACD ,^b sono nella medesima porzione $ABCD$, perciò sono frà di loro uguali. Similmente la retta DC sega il circolo in due porzioni, cioè $DEABC$, & DFC ; gli angoli DAC , DBC sono nella medesima porzione $DEABC$, e perciò sono frà di loro uguali: all'angolo DCA s'aggiunga l'angolo DAC , ed all'angolo DBA s'aggiunga l'angolo DBC , ne viene tutto l'angolo ABC e uguale a i due angoli DAC , DCA insieme giunti: all'vna, e l'altra parte di questa ugualità s'aggiuga l'angolo ADC , i due angoli ABC , ADC insieme giunti, faranno uguali a i tre angoli del triangolo ADC : ma i tre angoli del triangolo ADC ^d sono uguali a due angoli retti, li due angoli dunque ABC , ADC sono uguali a due angoli retti. Nell'istesso modo si dimostrerà, che i due angoli BAD , BCD sono uguali a due angoli retti, come fu proposto dimostrare.



a 1. postul.

b 21. del 3.

c 2. 2. om.


d 32. del 1.

S C O L I O I.

La conuersa dell'antecedente propos. facilmente si dimostra nel seguente modo.

Se due angoli opposti d'un quadrilatero sono uguali a due angoli retti; la circonferenza di quel circolo, che passa per tre angoli di quel quadrilatero, passa ancora per il quarto angolo. Dal che intorno a quel quadrilatero si può descrivere vn circolo.

Sia il quadrilatero $ABCD$, del quale i due angoli opposti ADC , ABC , siano uguali a due angoli retti; e per li tre angoli A , B , C , passi la circonferenza del circolo ABC . Dico che passerà ancora per l'angolo D . Nel arco AEC si prenda qualunque punto E , e si tirino le rette EA , EC . Il quadrilatero $AEGB$ sarà descritto nel circolo, e per l'antecedente proposizione gli angoli AEC , ABC sono uguali a due angoli retti: ma gli angoli ADC , ABC , per ipotesi sono uguali a due angoli retti, li due angoli dunque AEC , ABC sono uguali a i due angoli ADC , ABC ; leuato il commune angolo ABC , resta l'angolo ADC b



a 10. 2. om.

b 3. 2. om.

vguale all'angolo AEC : si tiri la retta AC . Perche gli angoli AEC , ADC sono fra di loro vguali, e sono sottesi dalla medesima retta AC ; e l'angolo AEC è nella porzione AEC , per lo Scolio alla proposizione vigesima prima, sarà l'angolo ADC nella medesima porzione AEC , per la qual cosa l'arco AEC passa per il punto D , ch'era da dimostrarfi.

SCOLIO II. DEL CLAVIO.

L'angolo esterno d'un quadrilatero descritto nel circolo, è vguale all'angolo interno, ed opposto.

Nel circolo $ABCD$ sia descritto il quadrilatero $BCDA$, e sia continuato il lato BA verso E . Dico che l'angolo esterno EAD è vguale all'angolo BCD interno, ed opposto.



c 13. del 1.

a 10. assom.

b 3. assom.

Perche gli angoli DAB , DCB , per l'antecedente proposizione, sono vguali a due angoli retti, e gli angoli EAD , DAB sono vguali a due angoli retti, li due angoli DAB , DCB saranno vguali a i due angoli EAD , DAB ; se ne leui il commune angolo DAB , resta l'angolo esterno EAD vguale all'angolo DCB , interno, ed opposto, ch'era da dimostrarfi.

THEOREMA XXI. PROPOSITIONE XXIII.

Sopra la medesima retta linea non si possono costituire due porzioni di circoli simili, ed ineguali.

Siano costituite, s'è possibile, due porzioni di circoli ACB , ADB , simili, ed ineguali, sopra la medesima retta AB , e dalla medesima parte. Perche le porzioni ADB , ACB sono ineguali, l'vna caderà dentro dell'altra, altrimenti due circoli si segarebbero in più di due punti, ch'è contro alla proposizione decima di questo.



a 1. postul.

b 16. del 1.

c 9. assom.

Cada dunque l'vna dentro l'altra; e dal punto A si tiri la retta AD , che seghi le circonferenze in qualunque modo, come in C , & D , si tirino le rette CB , DB . Perche le porzioni ADB , ACB sono simili, gli angoli ACB , ADB , nelle porzioni ACB , ADB , per la decima definizione di questo, sono fra di loro vguali. Nel triangolo DCB , continuato il lato DC verso A , l'angolo ACB esterno è maggiore dell'angolo ADB interno, ed opposto; ma gli habbiamo dimostrati vguali, farebbe l'angolo ACB vguale, e maggiore dell'angolo ADB , ch'è impossibile; non dunque due porzioni di circoli simili, ed ineguali possono essere costituite sopra d'vna medesima retta linea, e dalla medesima parte, ch'era da dimostrarfi.

THEOREMA XXII. PROPOSITIONE XXIV.

Le simili porzioni de' circoli sopra rette linee vguali, sono frà di loro vguali.

Sopra l'vguale rette A B,

CD, siano costrutte le simili

porzioni de' circoli A E B,

CKD. Dico che sono frà

di loro vguali.

Si concepisca sopra posta

la porzione A E B alla por-

zione CKD in modo, che la

retta AB cada sopra la ret-

ta CD, cioè il punto A ca-

da nel punto C, ed il punto B nel punto D. Perche le rette A B, C D

sono frà di loro vguali, per l'annotatione doppo la quarta propositione

del primo, le rette A B, C D congruono insieme.

O la porzione A E B

cade fuori della porzione CKD, come fa la notata CGD; ò cade dentro,

come fa la notata CFD; ò inclina da vna parte, come la notata CHD;

ouero congruono insieme; Se cade dentro, ò fuori della porzione CKD,

faranno frà di loro ineguali; ed in tal caso sopra d'vna medesima retta

linea saranno costituite due porzioni di circoli simili, ed ineguali, ch'è

contro all'antecedente propositione. Non dunque cade dentro, come fa

la porzione CFD, ne cade fuori, come fa la porzione CGD. Supposto dunque

che inclini da vna parte, come fa la porzione CHD; e due circoli

CED, CHD, si segaranno in più di due punti; ch'è contro alla decima

propositione di questo; non dunque inclina da vna parte. Per la qual cosa

la porzione AEB congrue con la porzione CKD; ma le cose, che con-

gruono insieme, sono frà di loro vguali; farà la porzione AEB vguale

alla porzione CKD, ch'era da dimostrarsi.

COROLLARIO.

Dall'antecedente propositione è manifesto, che le simili porzioni de' circoli poste sopra rette linee vguali, hanno gli archi vguali; poiche essendosi dimostrato, che le porzioni congruono insieme, necessariamente gli archi, che sono estremi delle porzioni, congruono insieme, e perciò sono frà di loro vguali.

PROBLEMA III. PROPOSITIONE XXV.

Data vna porzione di circolo, descriuere il circolo, del quale quella è porzione.

Sia data la porzione ABC, alla quale s'habbia da ritrouare il centro per compire il circolo.

Si diuida la corda AC^a in due parti vguali in D; nel punto D sopra la retta AC^b si erigga la perpendicolare DB, concorrente con l'arco ABC in qualche punto B; si prolunghi, se bisogna, BD e verso E, per la prima proposizione di questo, il centro del circolo sarà nella retta BE: Hor se la retta BD è vguale alla retta DA, le tre rette DA, DB, DC, sono frà di loro vguali, ed il punto D sarà il centro del circolo ABC, come nella figura X.

Se BD è maggiore, ò minore di DA, si tiri la retta BA, e nel punto A, sopra la retta BA, si costituisca l'angolo BAE, vguale all'angolo ABD. Perche l'angolo BDA è retto, e li due angoli EBA, EAB saranno minori di due retti, e per lo Scolio alla trigesima prima proposizione, continuata la retta BE, quella concorrerà con la retta AE continuata in qualche punto E. Dico che il punto E sarà il centro del circolo ABC: si tiri la retta EC. Perche gli angoli EBA, EAB, per costruzione sono frà di loro vguali, sarà la retta BE^k vguale alla retta EA. Si considerino i triangoli EDA, EDC, de'quali il lato DA è vguale al lato DC, il lato DE è comune, faranno i due lati ED, DC; gli angoli in D sono vguali, stante che sono retti, sarà la base EA^l vguale alla base EC; ma la retta EA è dimostrata vguale alla retta EB, le tre rette dunque EA, EB, EC, sono frà di loro vguali, ed il punto E^a sarà il centro del circolo ABC, ch'era da farsi, e dimostrarsi.

THEOREMA XXIII, PROPOSITIONE XXVI.

Ne i circoli vguali gl' angoli vguali, ò siano à i centri, ò alle circonferenze, sono opposti ad archi vguali.

Siano gli vguali circoli ABC, DEF, i di cui centri G, ed H, e siano gli angoli à i centri AGC, DHF frà di loro vguali; e gli angoli alle circonferenze ABC, DEF frà di loro vguali. Dico che gli archi opposti AIC, DKF agl' angoli vguali sono frà di loro vguali.

Perche i circoli sono frà di loro vguali i loro semidiametri^a faranno frà di loro vguali; si che ne i triangoli GAC, HDF, i due lati AG, GC sono vguali alli due DH, HF; l'angolo G è supposto vguale all'angolo H, sarà la base AC^b vguale alla base DF: In oltre, perche gli angoli



a. del 3.

b. del 1.

li AGC , DHF e sono dupli degl'angoli ABC , DEF , e gli angoli AGC , DHF sono frà di loro vguali, faranno gli angoli ABC , DEF frà di loro vguali; d'alche le portioni ABC , DEF e sono frà di loro simili; e perche sono poste sopra le rette linee vguali AC , DF , perciò sono frà di loro vguali; dalli circoli vguali $ABCI$, $DEFK$ se ne leuino le portioni vguali ABC , DEF , restano le portioni AIC , DKF e frà di loro vguali, e per il Corollario alla propositione vigesima quarta, gli archi AIC , DKF sono frà di loro vguali, ch'era da dimostrarfi.

e 10. del 3.

d 7. assom.

e 10. defm.

del 3.


f 14. del 3.

g 3. assom.

COROLLARIO.

Da qui è manifesto, che se gli angoli al centro, ò alla circonferenza sono frà di loro ineguali, il maggiore sarà opposto al maggior arco.

Ne i circoli vguali ABC , DEF , sia l'angolo al centro AGC maggiore dell'angolo al centro DHF , e l'angolo alla circonferenza ABC maggiore dell'angolo alla circonferenza DEF . Dico che l'arco AC è maggiore dell'arco DF . Nel punto G si faccia l'angolo CGI uguale all'angolo DHF .



Perche l'angolo AGC è maggiore dell'angolo DHF , sarà l'angolo AGC maggiore dell'angolo IGC ; dal che la retta GI sega l'angolo AGI , e sarà l'arco AC maggiore dell'arco IC . Hor essendo gli angoli IGC , DHF frà di loro vguali, per l'antecedente propositione, sarà l'arco IC uguale all'arco DF : ma l'arco AC è maggiore dell'arco IC , in conseguenza, l'arco AC sarà maggiore dell'arco DF , ch'era da dimostrarfi nel primo luogo. Si tiri la retta IB . Perche l'angolo IGC è il doppio dell'angolo IBC , e l'angolo DHF è il doppio dell'angolo DEF ; essendo gli angoli IGC , DHF frà di loro vguali, saranno gli angoli IBC , DEF frà di loro vguali: ma l'angolo ABC è posto maggiore dell'angolo DEF , sarà ancora maggiore dell'angolo IBC . Per la qual cosa l'arco AC , opposto all'angolo maggiore ABC , è maggiore dell'arco IC opposto all'angolo minore IBC : ma l'arco IC è uguale all'arco DF , sarà l'arco AC maggiore dell'arco DF , ch'era da dimostrarfi.

a 20. del 3.

THEOREMA XXIV. PROPOSITIONE XXVII.

Ne i circoli vguali, gli angoli; che sono opposti ad archi vguali, ò siano à i centri, ouero alle circonferenze, sono frà di loro vguali.

Siano gli vguali circoli ABC , DEF , i di cui centri G , ed H ; e siano

gli

gli archi AC, DF frà di loro vguali . Dico che gli angoli AGC, DHF à i centri , sono frà di loro vguali ; e parimente gli angoli ABC, DEF , alle circonferenze , sono frà di loro vguali .

Se gli angoli AGC, DHF, à i centri , non sono frà di loro vguali , vno de' i due sarà maggiore : supposto che l'angolo AGC sia maggiore dell'angolo DHF ; si faccia l'angolo AGI : vguale all'angolo DHF ; sarà l'angolo AGC maggiore dell'angolo AGI , e la retta GI caderà frà li punti A ,



& C . In oltre perche ne' i circoli vguali ABC , DEF , gli angoli AGI , DHF, à i centri , sono per costruzione vguali , per l'antecedente propositione, sarà l'arco AI vguale all'arco DK ; mà l'arco AC è supposto vguale all' medesim'arco DF , sarà l'arco AI vguale all'arco AC ; la parte, vguale al tutto ,^b ch'è impossibile : non dunque l'angolo AGC è maggiore dell'angolo DHF , e perciò sono frà di loro vguali . E perche gli angoli AGC , DHF , à i centri ^c sono dupli de' gli angoli ABC , DEF , alle circonferenze ; essendo gli angoli AGC, DHF , à i centri frà di loro vguali , faranno gli angoli ABC , DEF , alle circonferenze frà di loro vguali , ch'era da dimostrarsi .

THEOREMA XXV. PROPOSITIONE XXVIII.

Ne i circoli vguali , l'vguali rette linee detraggono archi vguali , cioè il maggiore vguale al maggiore , ed il minore al minore .

Siano gli vguali circoli ABC , DEF , i di cui centri G, ed H, e siano le rette linee AC , DF frà di loro vguali . Dico che l'arco ABC è vguale all'arco DEF, e l'arco AIC , vguale all'arco DKF .



Perche i circoli ABC, DEF , per ipotesi, sono frà di loro vguali , i loro semidiametri^a saranno frà di loro vguali ; dal che i lati AG, GC, del triangolo GAC, sono vguali à i due lati DH, HF del triangolo HDF , la base AC, per ipotesi, è vguale alla base DF , sarà l'angolo G^b vguale all'angolo H . In oltre essendo i circoli ABC , DEF frà di loro vguali , e gli angoli AGC, DHF , à i centri sono frà di loro vguali ; sarà l'arco AIC^c vguale all'arco DKF . e perche i circoli sono supposti vguali, le loro circonferenze saranno frà di loro vguali , dalle quali detrattone gli vguali archi AIC, DKF, resta l'arco ABC^d vguale all'arco DEF , ch'era da dimostrarsi .


Perche i circoli ABC, DEF , per ipotesi, sono frà di loro vguali , i loro semidiametri^a saranno frà di loro vguali ; dal che i lati AG, GC, del triangolo GAC, sono vguali à i due lati DH, HF del triangolo HDF , la base AC, per ipotesi, è vguale alla base DF , sarà l'angolo G^b vguale all'angolo H . In oltre essendo i circoli ABC , DEF frà di loro vguali , e gli angoli AGC, DHF , à i centri sono frà di loro vguali ; sarà l'arco AIC^c vguale all'arco DKF . e perche i circoli sono supposti vguali, le loro circonferenze saranno frà di loro vguali , dalle quali detrattone gli vguali archi AIC, DKF, resta l'arco ABC^d vguale all'arco DEF , ch'era da dimostrarsi .

THEO.

THEOREMA XXVI. PROPOSITIONE XXIX.

Ne gli vguali circoli, l'vguali circonferenze sono sotte-
se da vguali rette linee.

Siano gli vguali circoli ABC, D
EF, i di cui centri G, ed H, e sia l'ar-
co AIC, vguale all'arco DKF, tirate
le rette AC, DF. Dico che la ret-
ta AC è vguale alla retta DF.
Da' i centri G, ed H, si tirino le ret-
te GA, GC, HD, HF. Perche i cir-
coli, peripotesi, sono frà di loro
vguali, e gli archi AIC, DKF sono supposti vguali, gli angoli A G C,
D H F, ^ba i centri sono frà di loro vguali. Similmente essendo i circoli
A B C, D E F frà di loro vguali, i loro semidiametri c sono frà di loro
vguali. Dal che i due lati AG, GC, sono vguali à i due DH, HF; l'an-
golo AGC è dimostrato vguale all'angolo DHF, farà la base AC ^d vguale
alla base DF, ch'era da dimostrarsi.



a 1. po fl.

b 17. del 3.
c 1. defin.
del 3.

d 4. del 1.

PROBLEMA IV. PROPOSITONE XXX.

Dato qualunque arco, diuiderlo in due parti vguali.

Sia dato l'arco ABC, da diuidere in due parti vguali. Si tiri a la retta
AC, la quale si diuida ^b in due parti vguali in D, nel punto D si erigga
la retta DB c perpendicolare alla retta AC, concorrerà coll'arco ABC in
qualche punto B. Dico che l'arco AB è vguale all'arco BC.

Si tirino le rette BA, BC; e si considerino i due
triangoli BDC, BDA: de' quali il lato AD, per
costruzione, è vguale al lato DC, il lato DB è
commune, faranno i due lati BD, DA vguali à i
due BD, DC; gli angoli in D sono vguali, stan-
te che sono retti; farà la base BA ^d vguale alla
base BC; mà le rette linee vguali ne gli vguali
circoli detraggono archi vguali, c essendo la ret-
ta BA vguale alla retta BC, farà l'arco AB vguale all'arco BC: e così
rutto l'arco ABC è diuiso in due parti vguali nel punto B, ch'era da farsi,
e dimostrarsi.

a 1. postul.
b 10. del 1.
c u. del 1.

d 4. del 1.


e 18. del 3.

THEOREMA XXVII. PROPOSITIONE XXXI.

In ogni Circolo, l'angolo nel mezzo circolo è retto;
l'angolo nella portione maggiore è minore del retto: l'an-
golo nella portione minore è maggiore del retto.

Nel

Nel circolo ABCD, il dicui centro F, ed il diametro A C; sia prima l'angolo A B C nel mezzo circolo ABEC. Dico che l'angolo A B C è retto. Si tiri^a la retta F B. Per la definitione del circolo, le rette FA, F B, C F sono frà di loro vguali. Nel triangolo isoscele FAB gli angoli FAB, F B A^b sono frà di loro vguali, e similmente nel triangolo isoscele FBC, gli angoli FBC, FCB sono frà di loro vguali; se all'angolo F B A s'aggiunge l'angolo F B C, ed all'angolo F A B s'aggiunge l'angolo FCB; ne viene tutto l'angolo ABC^c vguale à i due angoli BAC, BCA, dal che i tre angoli del triangolo ABC sono il doppio dell'angolo ABC: mà i tre angoli d'un triangolo sono^d vguali à due angoli retti; farà dunque l'angolo A B C retto, e perciò l'angolo nel mezzo circolo è retto, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.



Di nuouo sia l'angolo ADB nella portione maggiore BECDA. Dico che l'angolo ADB è minore del retto. Perche l'angolo ABC è dimostrato retto, farà l'angolo BCA^e minore del retto; mà gli angoli A D B, ACB, nella medesima portione A D C B,^f sono frà di loro vguali, farà l'angolo ADB minore del retto, ch'era da dimostrarsi nel secondo luogo.

Finalmente sia la portione minore B E C; e nell'arco B E C sia preso qualunque punto E, si tirino le rette B E, C E. Dico che l'angolo BEC nella portione minore è maggiore del retto. Perche l'angolo ABC è dimostrato retto, farà l'angolo BAC^g minore d'un angolo retto. Nel quadrilatero ABEC, i due angoli opposti BEC, BAC,^h sono vguali à due angoli retti; mà l'angolo BAC è dimostrato minore del retto, farà l'angolo BEC maggiore del retto, ch'era da dimostrarsi.

g 17. del 1.
h 22. del 3.

SCOLIO DEL CLAVIO.

Qui facilmente si può dimostrare la conuersa nel seguente mouo.

La portione intorno all'angolo retto è mezzo circolo; intorno all'angolo minore del retto è portione maggiore; ed intorno all'angolo maggiore del retto è portione minore.

Sia nel primo luogo l'angolo ABC retto. Dico che la portione ABC è mezzo circolo; se la portione ABC non è mezzo circolo, ò sarà portione maggiore, ò portione minore; se sarà portione maggiore, per l'antecedente proposizione l'angolo ABC sarà minore del retto, ch'è contro all'ipotesi; non dunque è portione maggiore. Se sarà portione minore, l'angolo ABC sarà maggiore del retto, ch'è contro all'ipotesi; non dunque è portione minore, e perciò sarà mezzo circolo.



Sia nel secondo luogo l'angolo ABC minore del retto. Dico che la portione

ABC

ABC è portione maggiore. Se non è portione maggiore, o sarà mezzo circolo, ouero portione minore. Supposto prima, che sia mezzo circolo: l'angolo ABC sarà retto, cb'è contro all'ipotesi; s'è portione minore, l'angolo ABC sarà ottuso, cb'è contro all'ipotesi; non dunque è portione minore, ne mezzo circolo, e perciò è portione maggiore.

Sia finalmente l'angolo ABC ottuso. Dico, che la portione ABC è portione minore; se non è portione minore, o è mezzo circolo, ouero portione maggiore: s'è mezzo circolo, l'angolo ABC è retto, cb'è contro all'ipotesi; s'è portione maggiore, l'angolo ABC sarà acuto, cb'è contro all'ipotesi: non dunque è mezzo circolo, ne portione maggiore, ma sarà portione minore: cb'era da dimostrarsi.

THEOREMA XXVIII. PROPOSITIONE XXXII.

Se vna retta linea tocca qualche circolo, e dal contatto sia tirata vna retta linea, che lo segghi; gli angoli contenuti dalla tangente, e dalla secante, sono vguali a gli angoli costituiti nelle alterne portioni.

Tocchi la retta AB il circolo CDE, in qualche punto C, e dal contatto C sia tirata la retta CE, che segghi il circolo. Dico, che l'angolo ACE, contenuto dalla tangente AB, e dalla secante CE, è vguale all'angolo nell'alterna portione CFE; e l'angolo BCE è vguale all'angolo nell'alterna portione EDC.

Supposto prima, che la retta CE passi per il centro del circolo, quella ^a farà angoli retti con la tangente AB; ma gli angoli ne' mezzi circoli CFE, CDE ^b sono retti; sarà l'angolo ACE vguale all'angolo nell'alterna portione CFE; e l'angolo BCE sarà vguale all'angolo nell'alterna portione EDC.

Se la retta CE non passa per il centro del circolo, nel punto C sopra la retta AB, s'erigga la perpendicolare CG; sarà il centro del circolo nella retta CG, dal che le portioni CDG, CFG sono mezzi circoli: si tiri la retta EG; sarà l'angolo CEG ^d retto, e gli altri due EGC, ECG, insieme giunti, e saranno vguali ad vn angolo retto, cioè saranno vguali all'angolo retto ACG: se ne leui il comune angolo ECG, resta l'angolo ACE ^e vguale all'angolo CGE; ma l'angolo CGE ^f è vguale all'angolo CFE, stante che sono nella medesima portione CFGE; l'angolo dunque ACE, contenuto dalla tangente AC, e dalla secante CE, è vguale all'angolo nell'alterna portione CFE.

Nell'arco CDE si prenda qualunque punto D, e si tirino le rette DC, DE; si consideri il quadrilatero EFCD, descritto nel circolo, del



h 11. del 2.

quale gli angoli opposti EDC , EFC sono vguali à due angoli retti; mà i due angoli ECA , ECB sono vguali à due angoli retti; Il due angoli dunque EDC , EFC sono vguali à i due angoli ECA , ECB ; mà l'angolo ECA è dimostrato vguale all'angolo EFC ; sarà l'angolo ECB contenuto dalla secante EC , e dalla tangente CB , vguale all'angolo EDC nell'alterna portione CDE , ch'era da dimostrarsi.

SCOLIO DEL CLAVIO.

Segue la conuersa dell' antecedente proposizione.

Se vna retta linea passa per l'estremità d'vn'altra retta, che sega vn circolo, e gli angoli, che fa con la secante, siano vguali à gli angoli nelle alterne portioni; quella retta linea tocca il circolo.

Sia il circolo DCF , segato dalla retta CE , e per l'estremo C passi la retta AB , in modo, che l'angolo ACE sia vguale all'angolo nell'alterna portione CFE ; e l'angolo ECB sia vguale all'angolo nell'alterna portione EDC . Dico che la retta AB tocca il circolo nel punto C .

a 31. del 3.

Supposto prima, che la retta CE passi per il centro del circolo; sarà l'angolo CFE retto; mà l'angolo CFE è posto vguale all'angolo ACE ; l'angolo dunque ACE sarà retto; e per il Corollario alla 16. proposizione di questo, la retta AB tocca il circolo nel punto C .

b 1. del 3.

c 21. del 3.

d 31. del 3.

e 32. del 1.

fa. aduoma.

Non passi la retta CE per il centro del circolo; sitroui il centro del circolo, b e dal punto C , per il trouato centro si faccia passare la retta CG , e si congiunga EG : sarà l'angolo CFE vguale all'angolo CGE ; dal che l'angolo CGE sarà vguale all'angolo ACE . In oltre perche la retta CG è diametro del circolo, l'angolo CEG sarà retto, e li due ECG , EGC insieme, e saranno vguali ad vn angolo retto. Hor perche l'angolo ACE è vguale all'angolo CGE ; all'vno, ed all'altro s'aggiunga l'angolo ECG ; tutto l'angolo ACG sarà vguale à i due angoli ECG , EGC ; mà questi due angoli furono mostrati vguali ad vn retto; sarà l'angolo ACG retto, e per il citato Corollario, la retta AB tocca il circolo nel punto C . Il medesimo si prouarà se l'angolo ECB è vguale all'angolo EDC ; il che era da dimostrarsi.


PROBLEMA V. PROPOSITIONE XXXIII.

Sopra d'vna data retta linea descriuere vna portione di circolo, che capisca vn angolo vguale ad vn dato angolo.

Sia

Sia data la retta linea AB , ed il dato angolo $\widehat{C}$; si vuole sopra la retta AB descriuere vna portione di circolo, che capisca vn angolo vguale al dato angolo C .

Se l'angolo dato sarà retto; si diuida la retta AB in due parti vguali in D , e fatto centro in D , coll'intervallo DA , ouero DB , si descriua il mezzo circolo AEB . Perche l'angolo nel mezzo circolo ϵ è retto; farà AE B la portione, che si cerca.




a 10. del 1.
b 9. post.

c 31. del 3.

d 23. del 1.

e 11. del 1.

Se l'angolo C sarà acuto; nel punto A , sopra la retta AB , si costituisca l'angolo BAD vguale all'angolo C ; e nel punto A , si erigga la retta AE , e perpendicolare ad AD ; farà l'angolo EAD retto; mà l'angolo BAD è supposto acuto, il restante angolo BAE sarà acuto. Nel punto B , sopra la retta AB , si costituisca l'angolo FBA , vguale all'angolo FAB ; i due angoli FAB , FBA faranno minori di due retti; e per lo Scolio alla 31. proposizione del primo, continuata la retta BF concorrerà con la retta AE in qualche punto F : e perche gli angoli FAB , FBA sono frà di loro vguali, farà FA vguale ad FB ; si che, fatto centro in F , e coll'intervallo FA , ouero FB , si descriua il circolo ABG , la circonferenza di quello passerà per il punto B . Dico che la portione BGA è quella che si cerca.



f 23. del 1.

g 6. del 1.

h 3. post.

Perche la retta AD fa angolo retto col diametro AE , per il Corollario alla 16. proposizione di questo, tocca il circolo ABG nel punto A ; la retta AB lo sega, perciò l'angolo DAB , contenuto dalla tangente DA , e dalla secante AB , è vguale all'angolo nell'altra portione BGA ; mà l'angolo DAB , per costruzione è vguale all'angolo C , farà l'angolo nella portione BGA vguale all'angolo C . Per la qual cosa s'è descritta la portione BGA sopra la data retta AB , la quale contiene vn angolo vguale all'angolo dato C , ch'era da farsi nel primo luogo.

K 32. del 3.

L 1. all'oma.

Finalmente sia il dato angolo ottuso, come il notato H . Sopra la retta AB , nel punto A , si costituisca l'angolo BAI vguale all'angolo H ; sopra la retta AI , nel punto I , si erigga la perpendicolare AE ; farà l'angolo EAD retto, e perciò l'angolo EAB sarà acuto. Nel punto B , sopra la retta AB , si faccia l'angolo FBA vguale all'angolo FAB ; i due angoli FAB , FBA sono minori di due retti, e le rette AF , BF concorrono in qualche punto F ; e perche gli angoli FAB , FBA sono frà di loro vguali, farà FA vguale ad FB ; si che, fatto centro in F , coll'intervallo FA , ouero FB , si descriua il circolo ABG , quello passerà per il punto B . Dico che la portione AKB sarà quella, che si cerca.

m 23. del 1.

n 11. del 1.

o 17. del 1.

p 23. del 1.

q 6. del 1.

r 3. post.

Perche l'angolo IAF è retto, per il Corollario alla 16. proposizione di questo, la retta IA tocca il circolo nel punto A , la retta AB lo sega;

f 32. del 3.
r 1. affirma.

farà l'angolo IAB vguale all'angolo nell'alterna portione AKB ; mà l'angolo IAB è fatto vguale all'angolo H , farà l'angolo H vguale all'angolo AKB : dalche la portione AKB è quella, che si cerca, come fù proposto fare, e dimostrare.


PROBLEMA VI. PROPOSITIONE XXXIV.

Da vn dato circolo tagliare vna portione, che capisca vn angolo vguale ad vn angolo dato.

a Carol. alla
10. del 3.

b 29. del 3.

Sia il dato circolo ABC , dal quale si vuole tagliare vna portione, che capisca vn angolo vguale all'angolo dato D . Si tiri la retta EF , ^a che tocchi il circolo ABC in qualche punto A ; nel punto A , sopra la retta AF , si costituisca l'angolo FAB vguale al dato angolo D . Dico che la portione ACB farà quella, che si cerca.



c 32. del 3.

Perche la retta FA tocca il circolo ABC nel punto A , e la retta AB lo sega; farà l'angolo FAB vguale all'angolo nell'alterna portione ACB ; mà l'angolo FAB è fatto vguale all'angolo D , la portione dunque ACB capirà l'angolo vguale all'angolo D , ch'era da farsi, e dimostrarfi.

THEOREMA XXIX. PROPOSITIONE XXXV.

Se nel circolo due rette linee si segano scambievolmente, il rettangolo contenuto dalle parti dell'vna è vguale al rettangolo contenuto dalle parti dell'altra.

Nel circolo $ACBD$, si seghino le rette AB, CD in qualche punto E . Dico, che il rettangolo contenuto dalle parti AE, EB , è vguale al rettangolo contenuto dalle parti CE, ED . O le rette AB, CD , passano ambedue per il centro del circolo, ò passa vna di quelle per il centro, ò niuna. Passino prima le due AB, CD per il centro E ; saranno le rette EB, ED, EA, EC fra di loro vguali, e perciò il rettangolo contenuto dalle parti AE, EB è vguale al rettangolo contenuto dalle due CE, ED . ch'era da dimostrarfi per il primo caso.



a 3. del 3.

b 1. postul.

Di nouo supposto, ch'vna di quelle, come CD passi per il centro F , e diuida la retta AB fuori del centro in due parti vguali in E ; saranno gli angoli in E retti. Dico, ch'il rettangolo contenuto dalle due AE, EB è vguale al rettangolo contenuto dalle due CE, ED . Dal centro F al punto B si tiri la retta FB . Perche la retta CD è diuisa in due parti vguali in F , e la medesima è diuisa in due parti ineguali in E , il rettangolo contenuto



dalle

dalle parti *inequali* CE, ED, col quadrato dell'intermedia *portione* FE, *c* è vguale al quadrato di FD, cioè *d* al quadrato di FB: ma nel triangolo FEB, angolo retto in E, il quadrato del lato FB *e* è vguale à i quadrati de' lati BE, EF; farà il rettangolo contenuto dalle due CE, ED, col quadrato di EF, *f* vguale à i quadrati delle due BE, EF: dall'vna, e l'altra parte se ne leui il quadrato della commune EF; resterà il rettangolo contenuto dalle due CE, ED vguale al quadrato di EB: ma il quadrato di EB è vguale al rettangolo contenuto dalle due AE, EB, stante che AE è vguale ad EB; farà il rettangolo contenuto dalle due CE, ED, vguale al rettangolo contenuto dalle due AE, EB, ch'era da dimostrarsi.

Passi similmente la retta CD per il centro F, e seghi la retta AB fuori del centro, non in due parti vguali, in qualche punto E. Dico ch'il rettangolo contenuto dalle due CE, ED è vguale al rettangolo contenuto dalle due AE, EB. Si diuidi la retta AB *b* in due parti vguali in G, e si tiri la retta GF; gli angoli in G *k* saranno retti. Si tiri la retta FB: farà il quadrato di FB; vguale à i quadrati de i due lati FG, GB, ed il quadrato di FE sarà vguale à i quadrati de due lati EG, GF.

Perche la retta AB è diuisa in due parti vguali in G, ed in due *inequali* in E, farà il rettangolo contenuto dalle parti *inequali* AE, EB, col quadrato dell'intermedia *portione* GE, *n* vguale al quadrato di GB, ch'è metà della linea; all'vna, ed all'altra parte di questa vguaglià, s'aggiunga il quadrato di GF; ne viene il rettangolo contenuto dalle due AE, EB, con i quadrati delle due EG, GF, *n* vguale à i quadrati de i due lati BG, GF; ma i quadrati de i due lati BG, GF sono vguali al quadrato di FB; farà il quadrato di FB vguale al rettangolo contenuto dalle due AE, EB, con i quadrati delle due EG, GF; e perche i quadrati de i due lati EG, GF sono vguali al quadrato di FE; farà il quadrato di FB vguale al rettangolo contenuto dalle due AE, EB, col quadrato di FE.

La retta CD è diuisa in due parti vguali in F, ed in due *inequali* in E; il rettangolo contenuto dalle due CE, ED, col quadrato di FE, *p* è vguale al quadrato di FD, cioè vguale al quadrato di FB: ma il quadrato di FB fu mostrato vguale al rettangolo contenuto dalle due AE, EB, col quadrato di FE; farà il rettangolo contenuto dalle due CE, ED, col quadrato di FE, *q* vguale al rettangolo contenuto dalle due AE, EB, col medesimo quadrato di FE; se ne leui vguualmente il quadrato di FE, resterà il rettangolo contenuto dalle due CE, ED vguale al rettangolo contenuto dalle due AE, EB, ch'era da dimostrarsi nel secondo luogo.

Finalmente, supposto, che niuna delle rette AB, CD passi per il centro F. Dico, similmente, che il rettangolo contenuto dalle parti CE, ED è vguale al rettangolo contenuto dalle parti AE, EB. Dal centro F al punto E si tiri la retta FE, la quale si continui fino alla circonferenza in G, ed H. Perche la retta GH passa per il centro del circolo, e sega la retta AB, fuori del centro, per quel che s'è dimostrato, il rettangolo



e 5. del 9.
d 15. defin.
del 1.
e 47. del 1.

f 1. assioma.

g 9. assioma.

h 10. del 1.

k 3. del 3.

l 47. del 1.

m 5. del 1.

n 1. assioma.


o 47. del 1.

p 5. del 1.

q 1. assioma.

r 3. assioma.

contenuto dalle rette GE, EH è vguale al rettangolo contenuto dalle due AE, EB . Similmente la retta GH passa per il centro F , e sega la retta AB fuori del centro nel punto E ; per quel che s'è dimostrato, il rettangolo contenuto dalle rette CE, ED è vguale al rettangolo contenuto dalle due GE, EH ; ma si disse, che il rettangolo contenuto dalle due AE, EB è vguale al medesimo rettangolo contenuto dalle rette GE, EH ; farà il rettangolo contenuto dalle parti CE, ED vguale al rettangolo contenuto dalle parti AE, EB , come fu proposto dimostrare.




t 1. assioma.

THEOREMA XXX. PROPOSITIONE XXXVI.

Se da qualche punto preso fuori d'un circolo siano tirate due rette linee, vna che segghi il circolo, e l'altra, che lo tocchi; il rettangolo contenuto dalla secante, e dalla parte esterna, è vguale al quadrato della tangente.

Fuori del circolo ABC sia preso qualunque punto D , dal quale siano tirate le rette DA, DB , cioè DA , che segghi il circolo, come in A , & C , e la retta DB lo tocchi in qualche punto B . Dico che il rettangolo contenuto dalla secante AD , e dalla parte esterna DC , è vguale al quadrato della tangente DB . Supposto prima, che la secante DA passi per il centro E del circolo, dal contatto B al centro E si tiri la retta BE ; farà l'angolo EBD retto, ed il quadrato di DE sarà vguale à i quadrati de i due lati DB, BE .



a 1. postula
b 18. del 3.
c 47. del 1.

d 6. del 2.


e 1. assioma.

f 3. assioma.

Perche la retta AC è diuisa in due parti vguali in E , e l'è aggiunta la retta CD ; farà il rettangolo contenuto dalla composta AD , e dall'aggiunta DC , col quadrato di CE , vguale al quadrato della retta DE ; ma il quadrato di DE è vguale à i quadrati de i lati DB, BE ; farà il rettangolo contenuto dalle due AD, DC , col quadrato di EC , vguale à i quadrati delle due DB, BE : se ne leuino vgualmente i quadrati delle rette EC, EB , resta il rettangolo contenuto da tutta la secante AD , e dalla parte esterna DC , vguale al quadrato della tangente DB , ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

Se

Se la retta DA non passi per il centro E , ma sega la circonferenza, come in A , & C : Si divida la retta AC in due parti uguali in F , si tira la retta FE : gli angoli in F saranno retti, tirino le rette EB, EC, ED . L'angolo E BDK sarà retto, ed il quadrato di ED sarà uguale a i quadrati de i due lati EB, BD . Similmente perché gli angoli in F sono retti; il quadrato di ED è uguale a i quadrati de i due lati EF, FD , e nel triangolo EFC , il quadrato di EC è uguale a i quadrati de' due lati E




Perche la retta AC è diuifa in due parti vguagli in F, e l'è aggiunta la retta CD; farà il rettangolo contenuto dalla composta, AD, e dall'aggiunta DC, col quadrato di CF, vguale al quadrato della retta FD; all'vna, ed all'altra parte s'aggiunga il quadrato di EF; ne viene il rettangolo contenuto dalle due AD, DC, con i quadrati delle due CF, FE, vguale à i quadrati delle due DF, FE; i quadrati de' due lati DF, FE sono vguali al quadrato di DE; farà il quadrato di DE vguale al rettangolo contenuto dalle due AD, DC, con i due quadrati di CF, FE; mà i quadrati delle due CF, FE sono vguali al quadrato di CE; farà il quadrato di DE vguale al rettangolo contenuto dalle due AD, DC, col quadrato della retta CE: e perche il quadrato di DE è vguale à i quadrati de' due lati DB, BE; li quadrati dunque delle due DB, BE sono vguali al rettangolo contenuto dalle due AD, DC, col quadrato di CE; se neleuino i quadrati dell'vguale EB, EC, resta il rettangolo contenuto dalla segante AD, e dalla parte esterna DC, vguale al quadrato della tangente DB, ch'era da dimostrarfi.

COROLLARIO. I.

Da quel che s'è detto si caua, che se da vn punto prefo fuori d'vn circolo sono tirate quante si voglia rette linee, che seghino il circolo, i rettangoli contenuti dalle seganti, e dalle parti esterne sono frà di loro vguali. Perche se dal punto A fuori del circolo CDB siano tirate quante si voglia rette AC, AD, AE, che seghino il circolo, e sia ancora tirata la tangente AB, per quel che s'è dimostrato, il rettangolo contenuto dalle rette

 $\overline{EA},$

E A, AH è vguale al quadrato della tangente AB. Similmente il rettangolo contenuto dalle rette DA, AG, è vguale al quadrato della medesima tangente AB, ed il rettangolo contenuto dalle due CA, AF, è vguale al quadrato di AB; per la qual cosa il rettangolo contenuto dalle due EA, AH, è vguale al rettangolo contenuto dalle due DA, AG; ouero al rettangolo contenuto dalle due CA, AF.



COROLLARIO II.

Se dal punto A sia tirata la retta AI, che tocchi il circolo in qualche punto I, sarà il rettangolo contenuto dalle due DA, AG vguale al quadrato di AI; mà il rettangolo contenuto dalle due DA, AG è vguale al quadrato di AB, sarà il quadrato di AB vguale al quadrato di AI, e la retta AB vguale ad AI; d'onde è manifesto, che se da qualche punto A fuori d'un circolo siano tirate due rette AB, AI, che tocchino il circolo, quelle due tangenti sono frà di loro vguali.

COROLLARIO III.

Si caua ancora da quel che s'è detto, che da vn punto fuori d'un circolo non si possono tirare più di due rette, che tocchino il circolo; perche se dopo tirare le due tangenti AB, AC se ne potesse tirare vn'altra, come AD, tirare le rette EC, ED, gli angoli EDA, ECA sarebbero retti, e perciò frà di loro vguali; sì che tirata la retta AE, l'angolo ADE nõ sarebbe maggiore dell'angolo ACE, ch'è contro alla 21. **proposizione del primo libro: non dun-**




que

que dal medesimo punto si possono tirare più di due rette, che tocchino il medesimo circolo.

THEOREMA XXXI. PROPOSITIONE XXXVII.

Se da qualche punto preso fuori d'un circolo siano tirate due rette linee, delle quali vna segghi il circolo, e l'altra concorra con la circonferenza, ed il rettangolo contenuto dalla seganta, e dalla parte esterna, sia vguale al quadrato della concorrente, la concorrente toccherà il circolo nel punto del concorso.

Sia preso qualche puto D fuori del circolo AB C , dal quale siano tirate le rette DA , DB , cioè che la retta DA segghi il circolo come in A , & C , e la retta DB concorra con la circonferenza nel punto B in modo, ch'il rettangolo contenuto dalle rette AD , DC sia vguale al quadrato della concorrente DB . Dico, che la retta DB toccherà il circolo nel punto B .



a 17. del 3.

b 18. del 3.

c 36. del 3.

d 1. affiom.

e 8. del 1.

f 10. affiom.

Dal punto D sia tirata la retta DF , che tocchi il circolo in qualche punto F , dal centro E si tirino le rette EF , ED , EB ; sarà l'angolo EDF retto. Perche la retta DA sega il circolo, e la retta DF lo tocca, il rettangolo contenuto dalle due AD , DC , sarà vguale al quadrato della retta DF ; mà per ipotesi, il rettangolo contenuto dalle medesime due AD , DC , è vguale al quadrato della retta DB , sarà il quadrato della retta DF vguale al quadrato della retta DB ; e la retta DF sarà vguale alla retta DB . Si considerino i due triangoli DEF , DEB : perche i due lati DF , FE sono vguali à i due lati DB , BE , e la base DE è comune, sarà l'angolo DFE vguale all'angolo DBE ; mà l'angolo DFE è retto, sarà l'angolo DBE retto; e per il Corollario alla 16. propositione di questo, la retta DB tocca il circolo nel punto B , che era da dimostrarfi.

COROLLARIO.


Da quel che s'è detto è manifesto, che quãdo da vn punto fuori d'un circolo sono tirate due rette vguali, che concorrino con la circonferenza del medesimo circolo, ed vna di quelle tocca il circolo, ancora l'altra toccherà il medesimo circolo; poiche essendosi prima dimostrato, che le due DE , DB sono frà di loro vguali, e col supposto che la retta DF

tocchi il circolo, s'è poi dimostrato, che la retta DB ancora tocca il circolo.

S C O L I O.

Trattando qui Euclide delle passioni, che accadono alle rette, che segano il circolo, non sarà inutile porre in questo luogo il seguente Theorema.

Nel circolo, il di cui diametro AB sia continuato quanto si vuole verso C, e cadano le rette DA, EC perpendicolari alla retta CB, vna delle quali, come DA, cada nell'estremo A del diametro, e l'altra, doue si vuole nella continuatione CA; dall'estremo B sia tirata la retta BE, la quale seghi le perpendicolari, come in D, ed E, e la circonferenza del circolo in qualche punto F. Dico, ch'il rettangolo contenuto dalle due DB, BF è vguale al quadrato del diametro AB; ch'il rettangolo contenuto dalle rette BF, FD è vguale al quadrato di FA, e ch'il rettangolo contenuto dalle rette BF, DE, è vguale al rettangolo contenuto dalle rette BA, AG.



a Coroll. alla
16. del 3.

b 36. del 3.

c 2. del 2.

d 47. del 1.

e 36. del 3.

f 3. assioma.

g 47. del 1.

h 36. del 3.

k 1. assioma.

l 3. del 2.

m 2. assioma.

n 3. assioma.

E prima dico, che il rettangolo contenuto dalle due DB, BF è vguale al quadrato del diametro AB. Perche l'angolo DAB è retto, la retta DA^a tocca il circolo in A, ed il rettangolo contenuto dalle due BD, DF, sarà vguale^o al quadrato di DA. In oltre perche il rettangolo contenuto dalle due DB, BF, col rettangolo cōtenuto dalle due BD, DF^c è vguale al quadrato di DB cioè vguale^d a i quadrati^e delle due DA, AB; ma il rettangolo delle due BD, DF^c è vguale al quadrato di DA; sarà il rettangolo contenuto dalle due DB, BF^f vguale al quadrato del diametro AB, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

Di nuouo dico, che il rettangolo contenuto dalle due BF, FD è vguale al quadrato di AF. Essendo l'angolo AFB nel mezzo circolo, retto, i quadrati de i due lati AF, FD^g saranno vguali al quadrato di AD; mà il quadrato di AD^h è vguale al rettangolo contenuto dalle due BD, DF; sarà il rettangolo contenuto dalle due BD, DF^k vguale^l a i quadrati delle due DF, FA: e perche il rettangolo contenuto dalle due BD, DF^l è vguale al rettangolo contenuto dalle due BF, FD, col quadrato di DF; sarà il rettangolo contenuto dalle due BF, FD, col quadrato di DF, ^mvgualeⁿ a i quadrati de' due lati AF, FD; se ne leui il commune quadrato di DF, resta il rettangolo contenuto dalle due BF, FDⁿ vguale al quadrato di AF, ch'era

da


da dimostrarsi nel secondo luogo.

Finalmente dico, che il rettangolo contenuto dalle due BF, DE è uguale al rettangolo contenuto dalle due BA, AC . Si tiri la retta AE , sarà l'angolo EAB ottuso, e perciò saranno i quadrati delle due EA, AB col doppio rettangolo contenuto dalle due BA, AC , o uguali al quadrato di EB ; ma il quadrato di AE è uguale a i quadrati delle due AF, FE , ed il quadrato di AB è uguale a i quadrati delle due AF, FB ; sarà il doppio rettangolo contenuto dalle due BA, AC , col doppio quadrato di AF , e con i quadrati delle due BF, FE , uguali al quadrato di EB . E perchè il quadrato di EB è uguale a i quadrati delle due BF, FE col doppio rettangolo contenuto dalle due BF, FE ; sarà il doppio rettangolo contenuto dalle due BA, AC , col doppio quadrato di AF , e con i quadrati delle due BF, FE , uguale al doppio rettangolo contenuto dalle due BF, FE , con i quadrati delle medesime BF, FE . Dall'una, e l'altra parte se ne levino i quadrati delle due BF, FE , resta il doppio rettangolo contenuto dalle due BA, AC , col doppio quadrato di FA , uguale al doppio rettangolo contenuto dalle due BF, FE . In oltre perchè la retta FE è divisa in D , e la retta BF è non divisa, sarà il rettangolo contenuto dalle due BF, FD , col rettangolo contenuto dalle due BF, DE , uguale al rettangolo contenuto dalle due BF, FE : ma il rettangolo contenuto dalle due BF, FD , per quel che s'è dimostrato, è uguale al quadrato di FA , sarà il quadrato di FA , col rettangolo contenuto dalle due BF, DE , uguale al rettangolo contenuto dalle due BF, FE ; e duplicata l'una, e l'altra parte dell'egualità, ne verrà il doppio quadrato di AF , col doppio rettangolo contenuto dalle due BF, DE , uguale al doppio rettangolo contenuto dalle due BF, FE . Si è dimostrato, che il doppio rettangolo contenuto dalle due BF, FE , è uguale al doppio rettangolo contenuto dalle due BA, AC , col doppio quadrato di AF ; sarà il doppio rettangolo contenuto dalle due BA, AC , col doppio quadrato di FA , uguale al doppio rettangolo contenuto dalle due BF, DE : se ne levi ugualmente il doppio quadrato di FA , resta il doppio rettangolo contenuto dalle due BA, AC uguale al doppio rettangolo contenuto dalle due BF, DE ; e le loro metà, cioè il rettangolo contenuto dalle due BA, AC , sarà uguale al rettangolo contenuto dalle due BF, DE , che era da dimostrarsi.


COROLLARIO.

Da quel che s'è detto è manifesto, che il rettangolo contenuto dalle due BA, AC , col quadrato di AF , è uguale al rettangolo contenuto dalle due BF, FE .

Perchè essendo il rettangolo contenuto dalle due BF, FD uguale al quadrato di FA , ed il rettangolo contenuto dalle due BA, AC è uguale al rettangolo contenuto dalle due BF, DE sarà il rettangolo contenuto dalle due BA, AC , col quadrato di FA , uguale al rettangolo contenuto dalle due BF, FD , col ret-



tangolo contenuto dalle due BF, DE : ma il rettangolo contenuto dalle due BF, FD , col rettangolo contenuto dalle due BF, DE , è uguale al rettangolo contenuto dalle due BF, FE ; sarà il rettangolo contenuto dalle due BA, AC , col quadrato di FA , uguale al rettangolo contenuto dalle due BF, FE , come si disse.



COROLLARIO.

Quindi è manifesto, che se sarà vn triangolo rettangolo, come ECB , angolo retto in C , e nel lato CB è preso qualche punto A , dal quale cada la retta AF , perpendicolare al lato EB , il rettangolo contenuto dalle parti BF, FE , farà tanto maggiore del rettangolo contenuto dalle parti BA, AC , per quanto è il quadrato della perpendicolare AF .

Trattandosi delle passioni delle rette, che segano il circolo, s'anno bene aggiungere qui il seguente Theorema.

Se da vn'estremo del diametro del circolo sono tirate quante si voglia rette linee, le quali seghino la circonferenza del circolo, e seghino ancora qualche retta linea perpendicolare al medesimo diametro; i rettangoli contenuti dalle rette interposte frà quell'estremo, e la circonferenza del circolo, e dalle rette interposte frà il detto estremo; e la perpendicolare al diametro, sono frà di loro uguali.

Sia il circolo ABC , il di cui diametro AC , e sia ED perpendicolare al diametro AC , e dall'estremo A del diametro siano tirate quante si voglia rette linee AE, AF , le quali seghino la perpendicolare, come in E , ed F , e la circonferenza del circolo come in B , & G . Dico ch'il rettangolo contenuto dalle due EA, AB è uguale al rettangolo contenuto dalle due FA, AG ; ed anco è uguale al rettangolo contenuto dalle due DA, AC .

Supposto prima, che la perpendicolare cada nell'estremo del diametro, quella toccherà il circolo nel punto D , e sarà il rettangolo contenuto dalle due AE, EB uguale al quadrato di ED . In oltre essendo l'angolo EDA retto, il quadrato di AE sarà uguale a i quadrati de i due lati AD, DE ; ma il quadrato di AE è uguale al rettangolo contenuto dalle due AE, EB ,^a col

a Corol. alla
16. del 3.
b 36. del 3.
c 47. del 1.
d 2. del 2.

rettan-


rettangolo contenuto dalle due EA, AB ; faranno questi due rettangoli eguali à i quadrati de' due lati ED, DA . Fu dimostrato il rettangolo contenuto dalle due AE, EB , essere uguale al quadrato di ED , sarà il rettangolo contenuto dalle due EA, AB , uguale al quadrato di AD ; nell'istesso modo si dimostrerà, ch'il rettangolo contenuto dalle due FA, AG è uguale al medesimo quadrato di AD , e perciò il rettangolo contenuto dalle due EA, AB sarà uguale al rettangolo contenuto dalle due FA, AG , il che era da dimostrarsi nel primo luogo.

Li nuovo cada la perpendicolare ED nella continuazione CD ; si tirino le rette CB, CG : sarà l'angolo CBA nel mezzo circolo retto; si che nel triangolo ADE , angolo retto in D , dal punto C nel lato AD , cade la retta CB , perpendicolare ad AE ; e per l'antecedente Corollario, il rettangolo contenuto dalle rette AC, CD , col quadrato di CB , è uguale al rettangolo contenuto dalle due AB, BE : ugualmente, s'aggiunga il quadrato di AB , sarà il rettangolo contenuto dalle due AC, CD , con i quadrati delle due CB, BA , cioè B col quadrato di AC , uguale al rettangolo contenuto dalle due AB, BE , col quadrato di AB ; cioè K uguale al rettangolo contenuto dalle due E, A, AB . Ma il rettangolo contenuto dalle due AC, CD , col quadrato di AC , è uguale al rettangolo contenuto dalle due DA, AC ; sarà il rettangolo contenuto dalle due DA, AC , uguale al rettangolo contenuto dalle due EA, AB . Nell'istesso modo si dimostrerà, ch'il rettangolo contenuto dalle due FA, AG , è uguale al rettangolo contenuto dalle due DA, AC . Per la qual cosa i rettangoli contenuti da EA, AB ; da FA, AG ; e da DA, AC , sono fra di loro uguali: ch'era da dimostrarsi nel secondo luogo.



Nella terza figura si tirino le rette CB, CG, CE, CF, AH, AI . Gli angoli CBE, CGF, CHA, CIA , ne i mezzi circoli in sono retti, e per l'antecedente Corollario, il rettangolo contenuto dalle due CA, AD , col quadrato di AH , è uguale al rettangolo contenuto dalle due CH, HE . Similmente il rettangolo contenuto dalle due BA, AE , col quadrato di AH , è uguale al medesimo rettangolo contenuto dalle due CH, HE ; dal che il rettangolo contenuto dalle due CA, AD , col quadrato di AH , è uguale al rettangolo contenuto dalle due BA, AE , col quadrato di AH : se ne levi il comune quadrato di AH , resta il rettangolo contenuto dalle due CA, AD , uguale al rettangolo contenuto dalle due BA, AE . Nell'istesso modo si dimostrerà, ch'il rettangolo contenuto dalle due GA, AF , è uguale al rettangolo contenuto dalle due CA, AD . Per la qual cosa i rettangoli contenuti da BA, AE ; da GA, AF ; e da



c. 1. affom.



f. 31. del 3.

g. 1. affom.
h. 47. del 1.

K. 3. del 3.


l. 2. del 1.

m. 31. del 3.

CA,

CA, AD, sono frà di loro uguali, eb'era da dimostrarfi nel terzo luogo.

Finalmente nella quarta figura si prolunghi E D fino ad H. Essendo l'angolo in D retto, sarà FD ^u uguale ad HD, ed il rettangolo contenuto dalle due EF, FD, è uguale al rettangolo contenuto dalle due EF, DH; dal che il doppio rettangolo contenuto dalle due EF; FD, ^o è uguale al rettangolo contenuto dalle due EF, FH: ugualmente s'aggiunga il quadrato di EF; ne viene ^v il rettangolo contenuto dalle due HE, EF, cioè ^q quello contenuto dalle due AE, EB, ^vguale al doppio rettangolo contenuto dalle due EF, FD col quadrato di EF.



In oltre, essendo l'angolo ADF retto, sarà l'angolo esterno AFE ^v ottuso, e perciò il quadrato di AE ^v sarà uguale ai quadrati de' due lati AF, FE, col doppio rettangolo contenuto dalle due EF, FD: ma il quadrato di AE è uguale al rettangolo contenuto dalle due EA, AB, ^u col rettangolo contenuto dalle due AE, EB; sarà il quadrato di AF, col quadrato di EF, ed il doppio rettangolo contenuto dalle due EF, FD, uguale al rettangolo contenuto dalle due EA, AB, col rettangolo contenuto dalle due AE, EB; fù dimostrato il rettangolo contenuto dalle due AE, EB, uguale al doppio rettangolo contenuto dalle due EF, FD, col quadrato di FE, sarà il rettangolo contenuto dalle due EA, AB uguale al quadrato di AF. Di più essendo HD uguale ad FD, sarà il quadrato di FD uguale al rettangolo contenuto dalle due HD, DF: ma il rettangolo delle due HD, DF ^x è uguale al rettangolo contenuto dalle due AD, DC; sarà il rettangolo delle due AD, DC, ^y uguale al quadrato di FD: ugualmente s'aggiunga il quadrato di AD, sarà il rettangolo contenuto dalle due CA, AD, ^z uguale ai quadrati delle due FD, DA, cioè ^x uguale al quadrato di FA: ma il rettangolo contenuto dalle due EA, AB fù dimostrato uguale al medesimo quadrato di AF; sarà il rettangolo contenuto dalle due CA, AD uguale al rettangolo contenuto dalle due EA, AB, come fù proposto dimostrare.


La prima parte del segmento Theorema la spiega Gerónimo Cardano nel Libro 16. De subtilitate, però con differente dimostratione.

Se negli estremi d'un diametro del circolo sono eleuate rette perpendicolari à quel diametro; e dalli medesimi estremi sono tirate due rette, le quali scambievolmente si feghino in vn istesso punto con la circonferenza del circolo, e continuate concorrano con le perpendicolari; il rettangolo contenuto da ogn'vna delle seganti nella sua parte interna è uguale al quadrato del diametro; e l'vno, e l'altro rettangolo, contenuto dalle parti delle seganti, in-

terpo-

terposte fra la circonferenza, e le perpendicolari, giunti insieme, sono vguali al quadrato del diametro.

Sia il circolo ABCD, il di cui diametro BD, e negli estremi B, & D siano eleuate le rette BE, DF perpendicolari al diametro BD, e da qualche punto A preso nella circonferenza BAD a gli estremi B, & D del diametro, siano tirate le rette BA, DA, le quali continuate concorrino con le perpendicolari, come in E, ed F. Dico, ch'il rettangolo contenuto dalle rette FB, BA; ouero il rettangolo contenuto dalle rette ED, DA, è vguale al quadrato del diametro BD, e che i due rettangoli contenuti, cioè uno dalle parti FA, AB, l'altro dalle parti EA, AD, giunti insieme, sono vguali al quadrato del diametro BD.



Perche l'angolo BAD ^a nel mezzo circolo è retto, sarà il quadrato di BD ^b vguale a i quadrati de i due lati BA, AD; in oltre essendo gli angoli FDB, EBD retti, le rette FD, EB ^c toccheranno il circolo ne i punti D, & B, e sarà il quadrato di FB ^d vguale a i quadrati de due lati FD, DB, ed il quadrato di ED vguale a i quadrati de i due lati EB, BD; Hor perche i quadrati de i due lati FD, DB sono vguali al quadrato di FB; ed il quadrato di FB ^e è vguale al rettangolo contenuto dalle due BF, FA, col rettangolo contenuto dalle due FB, BA, i due quadrati de' lati FD, DB, saranno vgualli al rettangolo contenuto dalle due BF, FA, col rettangolo contenuto dalle due FB, BA; ma il rettangolo contenuto dalle due BF, FA ^f è vguale al quadrato della tangente FD; sarà il rettangolo contenuto dalle due FB, BA, è vguale al quadrato di BD. Similmente essendo i quadrati de i due lati EB, BD vguali al quadrato di ED, ed il quadrato di ED ^h è vguale a i rettangoli contenuti, cioè uno dalle due ED, DA, l'altro dalle due DE, EA; saranno i quadrati de i due lati EB, BD ^k vguali al rettangolo contenuto dalle due ED, DA, col rettangolo contenuto dalle due DE, EA; ma il rettangolo delle due DE, EA ^l è vguale al quadrato di EB; sarà il rettangolo contenuto dalle due ED, DA ^m vguale al quadrato di BD, ch'era da dimostrarfi nel primo luogo.

Dico di nuovo, che il rettangolo contenuto dalle due FA, AB, col rettangolo contenuto dalle due EA, AD, è vguale al quadrato di BD. Perche il rettangolo contenuto dalle due FA, AB, col quadrato di AB, ⁿ è vguale al rettangolo contenuto dalle due FB, BA, cioè per le cose dimostrate, vguale al quadrato di BD, ed il quadrato di BD ^o è vguale a i quadrati de i due lati BA, AD, sarà il rettangolo contenuto dalle due FA, AB, p col quadrato di AB, vguale a i quadrati de i due lati BA, AD. Se ne leui il commune quadrato di AB, resta il rettangolo contenuto dalle due FA, AB ^q vguale al quadrato di AD.

Finalmente perche il rettangolo contenuto dalle due EA, AD, col quadrato di AD, è vguale ^r al rettangolo contenuto da tutta ED, e dalla parte DA; ed il rettangolo contenuto da ED, & DA, per quel che s'è dimostrato, è vguale,

a 31. del 3.

b 47. del 1.

c Corollario alla 16. del 3.
d 47. del 1.

e 2. del 2.

f 16. del 3.

g 3. affom.

h 2. del 1.

K 1. affom.

l 16. del 3.

m 3. affom.

n 2. del 3.

o 47. del 1.
p 1. affom.

q 3. affom.

r 3. del 2.


al

147. del 1.

11. 1. affom.

13. 1. affom.

al quadrato di BD , cioè ϵ alli due quadrati di BA , AD ; sarà il rettangolo contenuto dalle due EA , AD , col quadrato di AD , u uguale $\grave{a}$ i quadrati de i due lati BA , AD ; se ne leui il comune quadrato di AD , resta il rettangolo contenuto dalle due EA , AD , x uguale al quadrato di AB ; $M\grave{a}$ s'è dimostrato il rettangolo delle due FA , AB uguale al quadrato di AD ; i due rettangoli dunque, vn contenuto dalle due EA , AD , l'altro contenuto dalle due FA , AB , giunti insieme, sono uguali $\grave{a}$ i quadrati de i due lati EA , AD , cioè uguale al quadrato del diametro BD , ch'era da dimostrarsi.



C O R O L L A R I O.

Da quel, che s'è detto, apparisce, che i due rettangoli, vno contenuto dalle parti FA , AB , e l'altro contenuto dalle parti EA , AD , giunti insieme, sono uguali al rettangolo contenuto da tutta FB , e dalla parte BA , ouero al rettangolo contenuto da tutta ED , e dalla parte DA .

Il seguente Theorema è di Pappo Alessandrino nel Settimo Libro.


Se da qualche punto A , preso fuori del circolo BCD , siano tirate due rette AB , AC , delle quali AB passi per il centro del circolo, ed AC lo seghi, come in E , & C , e dal punto C cada la retta CF perpendicolare al diametro BD . Dico, che il quadrato di AB supera il quadrato di AC , per quanto è il rettangolo contenuto dalla retta composta delle due AB , AD , e dalla parte BF .

13. del 1.

14. del 1.

c Corollario
14. del 1.

Si continui DA verso G , e si facci AG ϵ uguale ad AD , si consideri la retta AF diuisa in D , e la retta FB non diuisa; sarà il rettangolo ottenuto dalle due AF , FB ϵ uguale $\grave{a}$ i rettangoli, cioè vno contenuto dalle due BF , FD , e l'altro dalle due BF , DA ; ma il rettangolo contenuto dalle due DF , FB ϵ uguale al qua-



drato

drato di FC, sarà il rettangolo contenuto dalle due AF, FB, uguale al rettangolo contenuto dalle due AD, BF, col quadrato di FC.

In oltre si consideri la retta GB divisa in A, e la retta FB come non divisa; sarà il rettangolo contenuto dalle due AB, BF, col rettangolo contenuto dalle due GA, BF, è uguale al rettangolo contenuto dalle due GB, BF: ma il rettangolo contenuto dalle due GA, BF, è uguale al rettangolo contenuto dalle due AD, BF (per essere DA uguale ad AG) sarà il rettangolo contenuto dalle due GB, BF, uguale al rettangolo contenuto dalle due AB, BF, col rettangolo delle due AD, BF.

Di nuovo, perchè la retta AB è divisa in F, il rettangolo contenuto dalle due AB, BF, col rettangolo contenuto dalle due BA, AF, è uguale al quadrato di AB: ma il rettangolo contenuto dalle due BA, AF, è uguale al rettangolo delle due BF, FA, col quadrato di AF; sarà il rettangolo contenuto dalle due AB, BF, col rettangolo delle due BF, FA, e col quadrato di AF, uguale al quadrato di AB; ma il rettangolo delle due BF, FA, per il num. 1. è uguale al rettangolo delle due AD, FB, col quadrato di CF; sarà il rettangolo delle due AB, BF, col rettangolo delle due AD, BF, con i quadrati delle due AF, FC, uguali al quadrato di AB; e perchè i quadrati delle due AF, FC sono uguali al quadrato di AC; sarà il rettangolo delle due AB, BF, col rettangolo contenuto dalle due AD, BF, col quadrato di AC, uguale al quadrato di AB: ma per il num. 2. il rettangolo delle due GB, BF, è uguale al rettangolo contenuto dalle due AB, BF, col rettangolo delle due AD, BF; sarà il rettangolo contenuto dalle due GB, BF, col quadrato di AC, uguale al quadrato di AB: e perchè la retta GB è composta di AB, e d'una parte uguale ad AD; sarà dunque il rettangolo contenuto dalla retta, ch'è composta di AB, AD, e dalla retta BF, col quadrato di AC, uguale al quadrato di AB. Per la qual cosa il quadrato di AB supera il quadrato di AC, per quanto è il rettangolo contenuto da quella retta, ch'è composta delle due BA, AD, e dalla retta BF, ch'era da dimostrarsi.

Fine del Terzo Elemento.

EVCLIDE RESTITVTO

D A

VITALE GIORDANI

ELEMENTO QVARTO.




DEFINITIONI.

I.

La figura rettilinea si dice essere iscritta dentro vn altra figura rettilinea, quando ciascun'angolo della figura iscritta tocca ciascun lato di quella, nella quale è iscritta.



L A figura rettilinea, accioche sia iscritta dentro d'vn altra figura rettilinea, deue con tutti i suoi angoli toccare i lati della figura, nella quale è iscritta. Per esempio la figura rettilinea MNL , la quale tocca i lati HK , KI , con gli angoli L , ed N , ma non tocca il lato HI coll'angolo M , non si dice essere iscritta, nella figura HIK ; ma la figura DEF , che tocca i lati della figura ABC con tutti i suoi angoli, si dice essere iscritta nella figura ABC .



II.


La figura rettilinea si dice essere circonscritta intorno alla figura rettilinea, quando tutti i lati della circonscritta toccano gli angoli della figura iscritta.

Per esempio la figura HIK , che tocca con due soli lati gli angoli della figura MNL , non si dice essere circonscritta, stante che tutti i lati della circonscritta deueno toccare gli angoli dell'iscritta, come appare nella figura ABC , che con tutti i suoi lati tocca gli angoli della figura DEF iscritta.

I I I.

La figura rettilinea si dice essere iscritta nel circolo, quando ogn'angolo della figura iscritta tocca la circonferenza del circolo, nel quale è iscritto.


La figura rettilinea $ABCDEF$, che con tutti i suoi angoli tocca la circonferenza, si dice essere iscritta nel circolo ACE .



I V.

La figura rettilinea si dice essere circoscritta intorno al circolo, quand'ogni lato della figura circoscritta tocca il circolo.

La figura rettilinea $ABCDE$ tocca il circolo con tutti i suoi lati ne i punti F, G, H, I, K , e questa si dice essere circoscritta al circolo: ma se uno, o più lati non toccassero il circolo, benché lo toccassero gli altri, non si direbbe circoscritta al circolo.



V.

Il circolo si dice essere iscritto nella figura rettilinea, quando tocca tutti i lati della figura circoscritta.

Com'apparisce nel circolo $F G H I K$, che tocca tutti i lati della figura rettilinea $ABCDE$, che gli è circoscritta.

V I.

Il circolo si dice essere circoscritto intorno alla figura rettilinea, quando la circonferenza tocca tutti gli angoli della figura iscritta.

Cioè il circolo $ABCDEF$, che con la sua circonferenza tocca tutti gli angoli della figura interna, si dice essere circoscritto alla figura interna.

figura della
3. defin.

V I I.

La linea retta si dice essere addattata nel circolo , quando concorre con tutti due gli estremi nella circonferenza del circolo , al quale è addattata .

Nel circolo *ABC* la retta *E*, che con i suoi estremi in modo alcuno non concorre cō la circonferenza del circolo, e la retta *AD*, che concorre col solo estremo *A*, non si dice addattata nel circolo ; mà la retta *BC*, che concorre con ambidue gli estremi *B*, & *C* con la circonferenza del circolo, si dice essere addattata nel circolo *ABC*.




PROBLEMA I. PROPOSITIONE I.

Dato vn circolo , ed vna retta linea , che non sia maggiore del diametro , addattare nel dato circolo vna retta linea vguale alla retta data .

Sia il dato circolo *ABCD*, e la retta linea data sia *E*, si vuole nel circolo *ABCD* addattare vna retta linea vguale alla retta data *E*: è necessario però, che la data retta linea *E* non sia maggiore del diametro.

Nel circolo *ABCD* si troui il diametro *BD* ; se il diametro *BD* è



vguale alla retta data, sarà *BD* la retta addattata, vguale alla retta *E*; Se il diametro *BD* è maggiore della retta *E*, dal diametro *BD* si tagli la parte *BF* vguale alla retta *E*; fatto centro in *B*, coll'intervallo *BF*, e si descriua il circolo *CFA*, il quale segarà il primo, come in *A*, & *C*; dal punto *A* al punto *B* si tiri la retta *AB*. Dico che la retta *AB* è addattata nel circolo *ABC*, ed è vguale alla data retta *E*.

Perche il punto *B* è centro del circolo *CFA*, sarà *BA* e vguale alla retta *BF*; ma la retta *E*, per costruzione, è vguale alla medesima retta *BF*; sarà la retta *BA* vguale alla retta *E*; e perche i punti *A*, & *C* sono nella circonferenza del circolo *ABC*; sarà la retta *AB* addattata al circolo *ABC*, ch'era da farsi, e dimostrarli.

PROBLEMA II. PROPOSITIONE II.

In vn dato circolo iscriuere vn triangolo equiangolo ad vn dato triangolo.

Sia

a 1. del 3.

b 3. del 1.

c 1. postul.


d 1. postul.

e 15. defin. del 1.

f 1. assioma.

Sia dato il circolo ABC, ed il triangolo DEF; nel circolo ABC si vuole iscrivere vn triangolo equiangolo al triangolo DEF.

Si tiri la retta GH, ^a che tocchi il circolo ABC in qualche punto A; nel punto A, sopra la retta AG, ^b si costituisca l'angolo GAB vguale all'angolo F; e nel medesimo punto A, sopra la retta AH, si costituisca l'angolo HAC vguale all'angolo E. Perche gli angoli HAC, GAB, sono vguali à i due angoli E, ed F, e li due angoli E, ed F, sono minori di due angoli retti; li due angoli HAC, GAB, sono minori di due angoli retti; mà i tre angoli HAC, CAB, BAG ^d sono vguali à due angoli retti: perciò i due angoli HAC, GAB, sono minori di due angoli retti, per quanto è l'angolo CAB, che s'interpone; e perciò la retta AC, non cade nello spatio GAB, ne la retta AB cade nello spatio CAH: si prolunghino dunque le rette AC, AB fino alla circonferenza, come in B, & C, e si tiri la retta BC. Dico, ch'il triangolo ABC è equiangolo al triangolo DEF.



a 17. del 3.

b 32. del 1.

c 17. del 1.

d 32. del 1.

Perche la retta GA, per costruzione, tocca il circolo nel punto A, e la retta AB sega il medesimo circolo; l'angolo GAB, è contenuto dalla tangente GA, e dalla secante AB, è vguale all'angolo ACB nell'altra portione; ma l'angolo GAB è vguale per costruzione all'angolo F, farà l'angolo ACB ^e vguale all'angolo F. Similmente la retta HA tocca il circolo nel punto A, la retta AC lo sega; l'angolo dunque HAC ^g è vguale all'angolo ABC nell'altra portione; ma l'angolo HAC è fatto vguale all'angolo E, farà l'angolo ABC ^h vguale all'angolo E. Finalmente ne i triangoli DEF, ABC, i due angoli E, ed F, sono vguali à i due, ABC, ACB, ed il rimanente angolo D ^k farà vguale al rimanente angolo BAC. Per la qual cosa nel circolo ABC è iscritto il triangolo ABC; equiangolo al triangolo DEF, ch'eta da farsi, e dimostrarsi.

e 32. del 3.

f 1. assioma.

g 32. del 3.


h 1. assioma.

k 32. del 1.

PROBLEMA III. PROPOSITIONE III.

Intorno ad vn dato circolo circoscrivere vn triangolo equiangolo ad vn dato triangolo.


Sia dato il circolo ABC intorno al quale s'habbia à circoscrivere vn triangolo equiangolo al dato triangolo DEF: si continui il lato EF verso G, & H; si troui il centro del circolo ABC, ^b che sia il punto I, dal quale si tiri



a 2. post.

b 1. del 3.

c 23. del 1. qualunque semidiametro A I ; nel punto I sopra la retta A I , e si co-
 d 25. del 1. stituisca l'angolo A I B vguale all'angolo esterno D E G ; e nel punto I , so-
 c 21. del 1. pra la retta B I , d si ponga l'angolo B I C vguale all'angolo esterno D F H ;
 ne i punti A , B , C , sopra le rette A I , B I , C I , e si erigano rette perpe-
 dicolari , cioè A K sopra la retta A I , la retta K C perpendicolare ad I C ,
 e la retta B M , perpendicolare ad I B ; si prolunghino dall'vna , e l'altra
 f 13. del 1. parte , e si continui B I verso N . Perche i due angoli C I B , C I N sono
 vguali à due angoli retti , e li due angoli D F H , D F E sono vguali à due
 g 1. assioma. angoli retti ; li due angoli C I B , C I N , faranno vguali e à i due D F H ,
 D F E ; ma l'angolo B I C è vguale all'angolo D F H ; sarà l'angolo C I N
 vguale all'angolo D F E . Considerando i due angoli A I B , A I N , e
 li due D E G , D E F , si dimostrerà nell'istesso modo , che l'angolo D E F
 è vguale all'angolo A I N ; dache li due angoli D F E , D E F sono
 h 17. del 1. vguali à i due A I N , C I N ; ma i due angoli D E F , D F E sono h mi-
 nori di due angoli retti , perciò i due A I N , C I N sono minori di due
 K 14. del 1. angoli retti ; dache K le rette C I , I A , non costituiscono vna sola re-
 tta linca , ma contengono l'angolo C I A ; si tiri la retta A C , quella caderà
 frà i punti I , & K , e legarà gli angoli K C I , K A I . E perche gli angoli K C I ,
 K A I sono retti , i due an-
 goli K C A , K A C faranno
 minori di due angoli ret-
 ti , e per lo Scolio dopo la
 31. proposizione del 1. le
 rette A K , C K continuate
 concorrano in qualche
 punto K . Nell'istesso mo-
 do si dimostrerà , che le
 rette K M , L M , concorrano in qualche punto M ; e che i lati M L , K L ,
 concorrano in qualche punto L .



l 19. del 1. Nel quadrilatero L A I B , i due angoli L B I , L A I sono per costruzione
 m 1.2. assioma. retti , ma tutti li quattro angoli del quadrilatero , per lo Scolio alla 32. pro-
 n 3. assioma. positione del primo , sono vguali à quattro angoli retti , li due angoli
 A I B , A L B faranno vguali à due angoli retti ; e perche li due angoli D E G ,
 D E F sono vguali à due angoli retti ; li due angoli D E G , D E F faranno
 o 23. del 1. vguali m à i due A I B , A L B ; se ne leuino gli vguali angoli A I B , D E G ,
 resta l'angolo L , n vguale all'angolo D E F . Nel quadrilatero I B M C ,
 gli angoli M C I , M B I sono per costruzione retti ; dache i due C M B ,
 C I B sono vguali à due angoli retti . E perche i due angoli D F H , D F E
 p 3. assioma. sono vguali à due retti , i due angoli dunque B I C , B M C sono vguali à i
 due angoli D F H , D F E ; se ne leuino gli vguali angoli D F H , B I C resta
 q 32. del 1. l'angolo M n vguale all'angolo D F E . Ne i triangoli K L M , D E F , i due
 angoli D E F , D F E sono vguali à i due M , ed L , ed il rimanente angolo
 D n farà vguale al restante angolo K ; per la qual cosa i triangoli D E F ,
 K L M sono equiangoli . Finalmente perche le rette I C , I A , I B fanno , per
 costruzione , angoli retti con le rette M K , K L , L M , per il Corollario al-
 la 16. proposizione del 3. Libro , i lati K L , K M , L M toccano il circolo ne
 i punti A , B , C . Per la qual cosa intorno al circolo A B C s'è circoscritto


il triangolo KLM, equiangolo al dato triangolo DEF, ch'era da farsi, e dimostrarfi.

PROBLEMA IV. PROPOSITONE IV.

Dentro d'un dato triangolo iscrivere vn circolo.

Sia il dato triangolo ABC, dentro del quale s'habbia ad iscrivere vn circolo.

Si diuidano gli angoli B, & C in due parti vguali con le rette BD, CD, le quali concorreranno in qualche punto D; dal punto D à i lati del triangolo si facciano cadere le perpendicolari DE, DF, DG; fatto centro in D, coll'intervallo DE, ouero DF, ouero DG, si descriva il circolo EFG. Dico che il Circolo EFG è iscritto dentro del triangolo ABC.



e 9. del 1.

b 12. del 1.

e 3. postul.

Perche gli angoli DGC, DFC sono retti, e gli angoli DCG, DCF, per costruzione, sono frà di loro vguali, faranno i due angoli DGC, DCG, del triangolo DGC, vguali a i due angoli DFC, DCF, del triangolo DFC; il lato DC è commune, farà il lato FC^d vguale al lato CG, ed il lato DG vguale al lato DF. Similmente gli angoli DFB, DEB sono retti, gli angoli DBF, DBE sono frà di loro vguali; faranno i due angoli DFB, DBF, del triangolo DFB vguali a i due angoli DEB, DBE, del triangolo DEB; il lato BD è commune, farà il lato BF^e vguale al lato BE, ed il lato ED vguale al lato DF; mà il lato DF fu dimostrato vguale al lato DG, le tre rette DE, DF, DG^f sono frà di loro vguali, ed il punto D farà il centro del circolo, che passa per i punti F, G, E. In oltre, perche i semidiametri DF, DG, DE fanno, per costruzione angoli retti con i lati del triangolo; perciò i lati AB, BC, CA, s' toccano il circolo ne i punti E, F, G. Per la qual cosa dentro del triangolo ABC s'è iscritto il circolo EFG, ch'era da farsi, e dimostrarfi.

d 16. del 1.

e 16. del 1.

f 1. assioma.

g Corollario alla 6. del 1.

S C O L I O.

Accioche si sappia di quanto due lati d'un triangolo superano il terzo, Gio: Battista Benedetti fece il seguente Theorema.

Se dentro à qualunque triangolo sia iscritto vn circolo, e da vn angolo del triangolo sia tirata vna retta fino al concauo della circonferenza; i due lati, che contengono l'angolo, dal quale è stata tirata la retta, che sega il circolo, sono maggiori del terzo lato per vna retta, il di cui qua-


drato

drato è vguale al quadruplo rettangolo contenuto dalla retta, che sega il circolo, e dalla parte esterna.

Sia iscritto il circolo *EFD* dentro à qualunque triangolo *ABC*, e da uno de gli angoli, come *B*, sia tirata la retta *BH*, che segbi il circolo in qualsiuoglia modo, come in *H*, ed *I*. Dico che i lati *AB*, *BC* sono maggiori del lato *AC*, per una retta, il di cui quadrato è vguale al quadruplo rettangolo contenuto dalle rette *HB*, *BI*.

a 3. del 1.

Si faccia *KL* vguale ad *EB*, ed *LM* vguale ad *FB*; sarà tutta *KM* vguale alle due *BE*, *BF*. In oltre, perche le due *BE*, *BF* toccano il circolo in *E*, ed *F*, per il secondo Corollario alla 36. proposizione del terzo, le rette *BE*, *BF* sono frà di loro vguali. Per Pistessa ragione *EA* è vguale ad *AD*, e la retta *DC* è vguale alla retta *CF*. Hor essendo *BE* vguale à *B* *F*, sarà *KL* vguale ad *LM*, ed il



bScolio alla

4-prop.del 2

c 36. del 3.

quadrato di *KM* sarà^b il quadruplo del quadrato di *LM*; mà *LM* è vguale ad *FB*; il quadrato dunque di *KM* sarà il quadruplo del quadrato di *BF*. E perche il quadrato di *BF* è vguale al rettangolo contenuto dalle rette *HB*, *BI*; sarà il quadrato di *KM* il quadruplo rettangolo contenuto dalle rette *HB*, *BI*; dal che il quadruplo rettangolo contenuto dalle rette *HB*, *BI* sarà vguale al quadrato di *KM*; supposto questo. Perche *CF* è vguale à *CD*, ed *AD* vguale ad *AE*; se alla retta *CF* s'aggiunge la retta *AE*, ed alla retta *CD* s'aggiunge la retta *AD*, ne vengono le due *CF*, *AE* insieme, vguali alla retta *AC*: per la qual cosa i lati *AB*, *BC* superano il lato *AC* per la quantità delle rette *BF*, *BE*, cioè per la quantità *KM*: mà il quadrato di *KM* è dimostrato vguale al quadruplo rettangolo contenuto dalle rette *HB*, *BI*; i lati dunque *AB*, *BC* superano il lato *AC* per quanto è la retta *KM*, il di cui quadrato è vguale al quadruplo rettangolo contenuto dalle rette *HB*, *BI*, ch'era da dimostrarsi.

d 1. all'om.

C O R O L L A R I O I.

Da quel, che s'è detto, è manifesto, che i lati *AB*, *BC* superano il lato *AC*, per la retta vguale alle due tangenti *BE*, *BF*, cioè vguale al doppio di *BE*, ouero di *BF*. E per l'istessa ragione i lati *AB*, *AC* superano il lato *BC* per il doppio di *AE*, ouero *AD*, ed i lati *AC*, *CB* superano il lato *AB* per il doppio della retta *CD*, ouero *CF*.

COROL-

COROLLARIO II.

Appare da quel, che s'è detto, che se l'angolo BAC è retto, i lati AB , AC superano il lato CB per quanto è il diametro del circolo; stante che essendo gli angoli in D , ed A retti, i lati DG , AE faranno ^{e 28. del 1.} paralleli: parimente essendo gli angoli in A , & E retti, i lati EG , AD faranno paralleli; e perciò il quadrilatero $EGDA$ ^{f 35. del 1.} farà parallelogrammo, ed i lati opposti AD , EG , ouero AE , DG , ^{g 34. del 1.} sono fra di loro vguali; sì che i due lati EG , GD sono vguali à i due AD , AE ; mà i due DG , GE sono vguali al diametro del circolo EDF ; però i due AD , AE sono vguali al diametro del detto circolo.

PROBLEMA V. PROPOSITIONE V.

Intorno ad vn dato triangolo circoscriuere vn circolo.

Sia dato il triangolo ABC , intorno al quale s' habbia da circoscriuere vn circolo.

Si diuidano due qualunque lati AB , AC ^{a 10. del 1.} in due parti vguali in D , ed E ; ne i punti D , ed E ^{b 11. del 1.} si pongano le rette EF , DF ad angoli retti con i lati AC , AB ; si tiri la retta DE . Perche gli angoli AEF , ADF sono retti, detrattone gli angoli AED , ADE ; restano gli angoli FED , FDE minori di due angoli retti; e per lo Scolio alla 31. propositione del primo, le rette EF , DF continuate concorrono in qualche punto F ; si tirino le rette FA , FC , FB ; e fatto centro in F , e coll'intervallo FA , ouero FB , ouero FC , si descriua il circolo CAB . Dico ch'il circolo CAB è circoscritto al dato triangolo ABC .

Ne i triangoli FDA , FDB , i due lati AD , DF sono vguali à i due BD , DF ; gli angoli in D sono retti, sarà la base FA ^{d vguale alla base BF.} Similmente ne i triangoli FEA , FEC , i due lati AE , EF sono vguali à i due lati CE , EF ; gli angoli in E sono retti, sarà la base FC vguale alla base FA ; mà AF si dimostra vguale ad FB , le tre rette FB , FA , FC sono fra di loro vguali, ed il circolo descritto intorno al centro F passa per li punti B , A , C ; dalche è circoscritto il circolo BAC intorno al dato triangolo, ch'era da farli; e dimostrarli.



a 10. del 1.
b 11. del 1.


c 3. postul.

d 4. del 1.

e 1. assiom.

S C O L I O.


Dall' antecedente proposizione si eua il modo, come si possa far passare una circonferenza di circolo per tre punti dati, che non siano in una medesima retta linea. Per esempio: siano i dati punti A, B, C, che non siano in una medesima retta linea, per i quali si voglia far passare una circonferenza di circolo. Si prendano i tre punti A, B, C come angoli del triangolo BAC, e per l' antecedente proposizione, intorno al triangolo ABC si circoscriua il circolo CB A: e per operare con breuità, si faccia centro in C, & B, e con qualunque interuallo si descrivano gli archi FG, i quali s' intersegeranno in F, & G. Di nuovo fatto centro in B, & A, e con qualunque interuallo, si descrivano gli archi DE, i quali si segheranno in D, ed E; per l' interseghazioni D, E, si faccia passare la retta DE, come anco per le interseghazioni F, & G, si faccia passare la retta FGH; quelle concorreranno in qualche punto H. Si faccia centro in H, coll' interuallo HB, ouero HA, ouero HC, si descriva un circolo, il quale, per la dimostrazione antecedente, passerà per li tre punti A, B, C, come s' è detto.



PROBLEMA VI. PROPOSITIONE VI.

In vn dato circolo iscriuere vn quadrato.

Sia dato il circolo ABCD, il di cui centro E, nel quale s' habbia da iscriuere vn quadrato. Si tirino due diametri, come AC, BD, che si seghino scambievolmente ad angoli retti nel centro E; e si congiunghino gli estremi con le rette AB, BC, CD, DA. Dico ch' il quadrilatero ABCD è il quadrato iscritto nel circolo ABCD. Perche gli angoli nel centro E sono retti, perciò sono frà di loro vguali, e gli archi opposti AB, BC, CD, DA sono frà di loro vguali: ma gli vguali archi sono sottesi da rette linee vguali: e finalmente perche le rette AC, BD per costruzione sono diametri del circolo, perciò ogn'vna delle porzioni BCD, CDA, DAB, ABC, farà mezzo circolo; mà l'angolo nel mezzo circolo è retto, faranno gli angoli ABC, BCD, CDA, DAB retti; ed il quadrilatero ABCD sarà quadrato. Per la qual cosa nel circolo ABCD s' è iscritto il quadrato ABCD, ch' era da farsi, e dimostrarsi.



a 1. postul.

b 2. del 1.

c 29. del 3.

d 31. del 3.

e 29. defin. del primo.

PROBLEMA VII. PROPOSITIONE VII.

Intorno ad vn dato circolo circoscriuere vn quadrato.

Sia

Sia dato il circolo ABCD, il di cui centro E, intorno al quale s'habbia da circoscrivere vn quadrato.

Nel dato circolo si tirino due diametri, come AC, BD, i quali si feghino ad angoli retti nel centro E; per li punti A, B, C, D, si facciano passare le rette FG, GH, HI, IF, che facciano angoli retti con i diametri AC, BD, si tiri la retta AD. Perche gli angoli EDI, IAE sono retti, detratte i due angoli EDA, EAD, restano i due angoli IDA, IAD, minori di due angoli retti, e per lo Scolio alla 31. propositione del primo, le rette HI, FI, continuate concorrono in qualche punto I. Nell'istesso modo si prouerà, che continuate l'altre rette, IH, GH, GF, concorreranno come in H, G, ed F. Dico ch'il quadrilatero FGHI è il quadrato circoscritto al circolo ABCD.

Perche gli angoli in B, & E, per costruttione sono retti, faranno le rette FG, AC, frà di loro parallele. Similmente essendo gli angoli in E, & D retti, la retta IH farà parallela ad AC, dal che le rette FG, IH sono frà di loro parallele. Nell'istesso modo si dimostrerà, che le rette FI, BD, GH sono frà di loro parallele; e perciò il quadrilatero FGHI, sarà parallelogrammo, e farà FG ^a vguale ad HI, ed il lato FI vguale al lato GH. In oltre perche FG è parallela ad AC, e la retta FA è parallela à GC, farà il quadrilatero FGCA parallelogrammo, ed il lato FG ^f farà vguale ad AC. Nell'istesso modo si dimostrerà, ch'il quadrilatero BGHD è parallelogrammo, ed il lato GH è vguale à BD. Mà i diametri AC, BD sono frà di loro vguali, i lati dunque FG, GH sono frà di loro vguali: fu dimostrato il lato GH vguale ad FI; ed il lato FG vguale ad IH, i quattro lati FG, GH, HI, IF s'aranno frà di loro vguali. Finalmente perche le rette FG, AC sono frà di loro parallele, gli angoli CAF, GFA sono vguali à due angoli retti, e gli angoli FGC, ACG sono vguali à due angoli retti: mà gli angoli FAC, GCA sono retti; gli angoli dunque ^k in F, & G sono ancora retti. Nel parallelogrammo FGHI l'angolo F è vguale all'angolo opposto H, e l'angolo G vguale all'opposto I; mà gli angoli in F, & G sono retti, in conseguenza gli angoli in H, & I saranno retti; e perciò il quadrilatero FGHI, farà quadrato. E perche i lati FG, GH, HI, IF fanno angoli retti con i diametri AC, BD, per il Corollario alla 16. propositione di questo, tutti toccano il circolo, ed il quadrato FGHI è circoscritto al circolo ABCD, ch'era da farsi, e dimostrarsi.



PROBLEMA VIII. PROPOSITIONE VIII.

Dentro d'un dato quadrato iscrivere vn circolo.

Sia il dato quadrato ABCD, nel quale si voglia iscrivere il circolo.

a 12. del 1.

b 1. postul.

c 3. post.

d 33. del 1.

e 35. defin.
del primo
f 34. del 1.

g 29. del 1.

h Corollario
alla 16. pro
posizione
del 3.

Si diuidano tutti quattro i lati del quadrato^a in due parti vguali in H, E, F, G; si congiungano i punti opposti^b con le rette EG, HF, le quali si segaranno in qualche punto I, fatto centro nell' punto I, coll' intervallo d'vna delle rette IE, IF, IG, IH, e si descriva il circolo HEFG. Perche i lati AB, DC sono vguali, e paralleli, le loro meta, cioe EB, GC, sono fra di loro vguali, e parallele; dal che le rette EG, BC^d sono fra di loro vguali, e parallele. Nell' istesso modo si dimostrerà, che le rette AD, EG sono vguali, e parallele: e similmente che le rette AB, HF, come ancora DC, HF, sono vguali, e parallele; e perciò i quadrilateri ID, IA, IB, IC, e sono parallelogrammi, e sarà IF^e vguale ad EB, ed il lato IE vguale ad FB; come anco IG vguale ad HD, ed il lato HI vguale a GD. Ma le rette EB, BF, HD, DG sono fra di loro vguali, stante che sono metà de i lati del quadrato ABCD; saranno le rette IE, IF, IG, IH fra di loro vguali: dal che il circolo EFGH descritto intorno al centro I, passa per li punti F, G, H, I. Finalmente perche le rette AB, HF, sono parallele, gli angoli HFB, ABF^g sono vguali a due angoli retti; ma l'angolo in B è retto, sarà l'angolo in F retto. Nell' istesso modo si dimostrerà, che gli angoli in G, H, E sono retti; e perciò i lati AB, BC, CD, DA, h toccano il circolo ne i punti E, F, G, H: Per la qual cosa il circolo HEFG è iscritto nel quadrato ABCD, ch'era da farsi, e dimostrarfi.



PROBLEMA IX. PROPOSITIONE IX.

Intorno ad vn dato quadrato circoscriuere vn circolo.

Sia dato il quadrato ABCD, intorno al quale si vuole circoscriuere vn circolo.

Si tirino i diametri AC, BD, i quali si segaranno in qualche punto E. Perche il quadrilatero ABCD è quadrato, perciò il lato AB^a è vguale al lato AD, il triangolo ABD è isoscele, e gli angoli ABD, ADB^b sono fra di loro vguali; ma l'angolo BAD è retto, ogn'vno de' due angoli dunque ABD, ADB è la metà d'vn'angolo retto, & ogn'vno de i rimanenti angoli CBD, CDB sarà la metà d'vn'angolo retto. Nell'istesso modo si dimostrerà, che ogn'vno de gli angoli BCA, BAC, ouero DCA, DAC, è la metà d'vn'angolo retto; e perciò tutti sono fra di loro vguali. Hor essendo gli angoli EDA, EAD fra di loro vguali, sarà il lato EA^c vguale al lato ED. Similmente perche gli angoli EDC, ECD sono fra di loro



a 29. defin.
del primo
b 5. del 1.

c 6. del 1.


loro

di loro vguali, farà il lato E D vguale al lato E C. Nell'istesso modo si dimostrerà, ch'il lato EB è vguale al lato EC, e perciò le quattro rette EB, EC, ED, EA sono frà di loro vguali; Si che fatto centro nel punto E, e coll'intervallo EB si descriva il circolo A B C D; quello passerà per li punti A, B, C, D; e così farà circoscritto il circolo ABCD intorno al dato quadrato, ch'era da farsi, e dimostrarsi.

SCOLIO DEL CLAVIO.

Se nel circolo è iscritto, e circoscritto il quadrato; quello, ch'è circoscritto, è il doppio dell'iscritto.

Sia il quadrato iscritto nel circolo, il notato ABCD, si tirino i diametri AC, BD, ed intorno al circolo ABCD sia circoscritto il quadrato EFGH in modo, che tocchi il circolo ne i punti A, B, C, D, farà con i diametri AC, BD, angoli retti, e perciò AC sarà parallela ad EF, dal che il quadrilatero AEFC sarà parallelogrammo, ed il lato AC sarà vguale ad EF. Nel triangolo CDA, angolo retto in D, il quadrato del lato AC è vguale à i quadrati de i due lati CD, DA; ma CD, come lato del quadrato iscritto, è vguale ad AD; sarà il quadrato di AC il doppio del quadrato di CD, cioè del quadrato iscritto A B C D. Fù dimostrato il lato AC vguale ad EF, sarà il quadrato di EF, cioè il quadrato circoscritto EFGH, il doppio del quadrato iscritto ABCD, ch'era da dimostrarsi.



a 1. del 3.

b 7. del 3.

c 18. del 1.


d 34. del 1.

e 49. del 1.

PROBLEMA X. PROPOSITIONE X.

Costruire vn triangolo isoscele, del quale ciascun angolo sopra la base sia il doppio dell'angolo verticale.

S'esponga qualunque retta linea AB, la quale si diuidi talmente in C, ^a che il rettangolo contenuto da tutta, e dalla parte BC, sia vguale al quadrato del rimanente AC; poi fatto centro in A, ^b coll'intervallo AB, si descriva il circolo BDE, nel quale dal punto B s'addatti la retta BD ^c vguale alla retta AC, e si tiri la retta AD. Perche le rette AB, AD, per la definizione del circolo, sono frà di loro vguali, il triangolo A B D sarà isoscele, e gli angoli A B D, A D B sono frà di loro vguali. Dico, che ciascun'angolo A D B, ABD è il doppio dell'angolo BAD. Si tiri la retta CD, ed intorno al triangolo ACD ^c si



a 11. del 2.

b 3. postul.

c 1. del 4.

d 5. del 1.

e 5. del 4.

cir-


angolo ACD, ADC, il doppio dell'angolo CAD. Si diuidano gli angoli ACD, ADC^b in due parti vguali con le rette DB, CE; i cinque angoli ACE, ECD, ADB, BDC, DAC faranno frà di loro vguali; dal che gli archi opposti DE, EA, AB, BC, CD^c sono frà di loro vguali; ma gli archi vguali^d sono sottesi da rette linee vguali, faranno le rette DE, EA, AB, BC, CD frà di loro vguali, ed il pentagono A B C D E farà equilatero. In oltre, perche l'arco AB è vguale all'arco CD, vguualmente s'aggiunga l'arco AED, ne viene l'arco BAED vguale all'arco CDEA; ma gli archi vguali sono^e opposti ad angoli vguali, quando sono angoli alla circonferenza del medesimo circolo, farà l'angolo ABC vguale all'angolo BCD. Similmente perche l'arco BC è vguale all'arco ED, vguualmente s'aggiunga l'arco BAE, ne viene l'arco B A E D vguale all'arco CBAE; e perciò gli angoli BCD, CDE, che sono opposti a quegli archi vguali, f sono frà di loro vguali. Nell'istesso modo si prouerà, che l'angolo EAB è vguale all'angolo ABC. Per la qual cosa nel circolo dato è iscritto il pentagono ABCDE equilatero, & equiangolo, ch'era da farsi, e dimostrarfi.

PROBLEMA XII. PROPOSITIONE XII.

Intorno ad vn dato circolo circoscriuere vn pentagono equilatero, & equiangolo.

Sia il dato circolo ABCDE, il di cui centro F, intorno al quale si voglia circoscriuere vn pentagono equilatero, ed equiangolo.

S'iscrua nel circolo A B C D E, il pentagono A B C D E equilatero, & equiangolo, e dal centro F à i punti A, B, C, D, E, si tirino le rette FA, FB, FC, FD, FE; per li punti A, B, C, D, E, si facciano passare le rette GH, HI, IK, KL, LG, e che facciano angoli retti con le rette tirate dal centro. Perche gli angoli FEG, FAG sono retti, detrattone i due angoli FEA, FAE, restano i due angoli GEA, GAE minori di due angoli retti, e per lo Scolio alla 31. propositione, continuate le rette HG, LG concorreranno in qualche punto G. Ne l'istesso modo si dimostrerà, che le altre concorrono ne i punti H, I, K, L; si tirino le rette FG, FH, FI, FK, FL. Perche gli angoli in A, B, C, D, E, sono retti, perciò i lati GH, HI, IK, KL, LE^d toccano il circolo ne i punti A, B, C, D, E; e per il secondo Corollario alla 36. propositione del terzo, le tangenti HB, HA sono frà di loro vguali. E per l'istessa ragione la retta GA, è vguale ad EG; la retta LE è vguale ad LD; come ancora KD vguale alla retta KC, & IC, ad IB. Si considerino i triangoli HFA, HFB, de'quali il lato FA è vguale al lato FB, il lato FH è com-



b 9. del 1.

c 26. del 3.

d 29. del 3.

e 27. del 3.

f 27. del 3.

a 12. del 4.

b 1. po. ital.

c 11. del 1.

d Corollario alla 36. del 3.

mune;


e 8. del 1.

f. 8. del 3.
g. 27. del 3.

h. 26. del 2.

K 6. assioma.

munne; faranno i due lati FH, FA vguali à i due FH, FB; la base HA è vguale alla base HB, farà l'angolo AFH = vguale all'angolo BFH; e l'angolo AHF vguale all'angolo BHF; dalche l'angolo BFA farà il doppio dell'angolo HFA, e l'angolo BHA il doppio dell'angolo AHF. Nell'istesso modo si dimostrerà, che l'angolo AFE è il doppio dell'angolo AFC, e l'angolo AGE è il doppio dell'angolo AGF. In oltre perche i lati AE, AB sono fra di loro vguali, come lati del pentagono interno; farà l'arco AE ^f vguale all'arco AB, e gli angoli EFA, AFB al centro s^o sono fra di loro vguali; dalche le loro metà, cioè gli angoli GFA, HFA sono fra di loro vguali. Ne i triangoli FAG, FAH, i due angoli GFA, GAF sono vguali à i due angoli HFA, HAF, il lato AF è commune; farà il lato FG ^h vguale al lato FH; il lato GA vguale al lato AH; e l'angolo FGA vguale all'angolo FHA. Ma gli angoli BHA, EGA, per quel che s'è dimostrato, sono il doppio degli angoli vguali FGH, FHG; gli angoli dunque BHA, EGA ^k sono fra di loro vguali. Nell'istesso modo si dimostrerà, che gli altri angoli L, K, I, ognuno è vguale all'angolo G, ouero H; e perciò il pentagono GHIKL è equiangolo. In oltre, essendosi dimostrata la retta GA vguale ad AH, farà GH il doppio di GA. E nell'istesso modo si dimostrerà IH essere il doppio di HB: ma la retta AH s'è dimostrata vguale ad HB, farà il lato GH vguale al lato IH. E nell'istesso modo si dimostrerà, che gli altri lati GL, LK, KI, ognuno è vguale ad HG, ouero HI: e perciò sono fra di loro vguali. Per la qual cosa intorno al circolo ABCDE, s'è circoscritto il pentagono GHIKL, equilatero, & equiangolo, ch'era da farsi, e dimostrarsi.



COROLLARIO.

Da quel, che s'è detto, è manifesto, che se dentro d'un circolo sarà iscritta qualunque figura equilatera, & equiangola, e dal centro del circolo à gli angoli di questa faranno tirate rette linee, per gli estremi delle quali si facciano passare rette linee, che facciano angoli retti con le medesime tirate dal centro; quelle continuate concorreranno insieme; e sarà circoscritta intorno al circolo una figura di tanti lati vguali, ed angoli vguali, per quanti ne ha la figura iscritta.

SCOLIO DEL CLAVIO.

In ogni figura equilatera, & equiangola, se farà di lati di numero imparo, la retta linea tirata da vno de gli angoli, diuidendo il lato opposto in due parti vguale, diuiderà l'angolo in due parti vguale, e farà perpendicolare al lato opposto; e se diuide l'angolo in due parti vguale, diuiderà il lato opposto in due parti vguale, & ad angoli retti; e nella figura di lati di numero paro, la retta tirata da vn angolo all'angolo opposto, diuide quegli angoli in due parti vguale: e se la retta diuide vn angolo in due parti vguale, continuata segarà l'altr'angolo in due parti vguale.

Sia la figura di lati di numero imparo Z, e dall'angolo A sia tirata la retta AE, che diuida il lato opposto DF in due parti vguale; e la figura di lati di numero paro sia X, nella quale dall'angolo A all'angolo opposto E sia tirata la retta AE, ed ambedue le figure siano equilatera, ed equiangole. Dico prima, che l'angolo A è diuiso dalla retta AE in due parti vguale, e che gli angoli AEF, AED sono fra di loro vguale. Dall'angolo A à gli altri angoli si tirino le rette AG, AF, AD, AC. Perchè i due lati AH, HG sono vguale à i due lati AB, BC, e l'angolo AHG è vguale all'angolo ABC; sarà la base AG^b vguale alla base AC, l'angolo HAG vguale all'angolo BAC, e l'angolo HGA vguale all'angolo BCA. E perchè gli angoli HGF, BCD, per ipotesi sono vguale, detrattone gli vguale angoli HGA, BCA, resta l'angolo AGF^c vguale all'angolo ACD. Nei triangoli AFG, ADC, i due lati AG, GF sono vguale a i due lati AC, CD, l'angolo AGF è mostrato vguale all'angolo ACD; sarà la base AF^d vguale alla base AD; l'angolo GAF vguale all'angolo CAD; e l'angolo GFA vguale all'angolo CDA; che detratti da gli vguale angoli GFD, CDF, resta l'angolo AFE^e vguale all'angolo ADE. Similmente nei triangoli AFE, ADE, i due lati AF, FE sono vguale à i due lati AD, DE, l'angolo AFE è vguale all'angolo ADE, la base AE è commune, sarà l'angolo FAE vguale all'angolo DAE; e l'angolo FEA vguale all'angolo DEA, e tutto l'angolo EAH, è vguale à tutto l'angolo EAB. Per la qual cosa la retta EA, nella figura Z, diuide l'angolo BAH in due parti vguale, ed è perpendicolare^b al lato DF, stante che gli angoli FEA, DEA sono vguale, cioè retti; e nella figura X la retta AE diuide gli angoli BAH, DEF in due parti vguale; e' era da dimostrarsi nel primo luogo.




1.1. post.

b.4. del 1.

c.3.2. assiom.

d.4. del 1.

e.3. assioma.



f.4. del 1.


g.1. assiom.

h.10. defin. del 1.

X

Di

Di nuovo, supposto che la retta AE sega l'angolo BAH in due parti uguali. Dico che nella figura Z diuide il lato opposto DF in due parti uguali, & ad angoli retti; e nella figura X diuide l'angolo DEF in due parti uguali. Se la retta AE non diuide il lato DF , ò l'angolo DEF in due parti uguali, si diuida il lato DF in due parti uguali, come in I , e si tiri la retta IA , e nella figura X si tiri la retta EIA . Per quel che s'è dimostrato, la retta IA diuide l'angolo BAH in due parti uguali, ch'è contro all'ipotesi, mentre si è supposto, che la retta EA diuida l'angolo BAH in due parti uguali; non dunque nella figura Z la retta IA diuide il lato DF in due parti uguali in I , mà la retta AE lo diuide in due parti uguali in E . E nella figura X , la retta AEI non sega gli angoli DEF , BAH in due parti uguali; mà la retta AE , che sega l'angolo BAH in due parti uguali, sega ancora l'angolo DEF in due parti uguali. Nella figura Z si dimostra, come prima si fece, che AD è uguale ad FA ; e perche i lati AE , EF sono uguali à i due AE , ED , e la base AF è uguale alla base AD , farà l'angolo AEF uguale all'angolo AED ; e perciò la retta AE è perpendicolare al lato DF , ch'era da dimostrarsi.



K 8. del 1.

PROBLEMA XIII. PROPOSITIONE XIII.

In vn dato pentagono equilatero, ed equiangolo, iscrivere vn circolo.

Sia dato il pentagono $ABCDE$ equilatero, & equiangolo, nel quale s'abbia ad iscrivere vn circolo.


a 9. del 1.

Si diuidano due angoli prossimi, come i due CBA , BAE , in due parti uguali con le rette AF , BF ; per l'antecedente Scolio, le rette AF , BF continuate segano i lati opposti in due parti uguali, e perciò si segaranno scambievolmente in qualche punto F ; si tirino le rette FE , FD , FC , e si considerino i due triangoli ABF , AEF , de' quali i due lati EA , AF sono uguali alli due lati BA , AF ; l'angolo EAF è uguale, per costruzione all'angolo BAF ; farà la base FB uguale alla base FE , e l'angolo AEF uguale all'angolo ABF . Da-

b 4. del 1.

c 3. xxi. om.

gli uguali angoli AED , ABC se ne leuino gli uguali angoli AEF , ABF , resta l'angolo DEF uguale all'angolo CBF ; mà l'angolo CBF , per costruzione, è la metà dell'angolo ABC ; farà l'angolo DEF la metà dell'angolo DEA ; dal che la retta FE diuide l'angolo DEA in due



par-

parti vguali. Nell'istesso modo si dimostrerà, che le rette FD , FC diuidono gli angoli D , & C , in due parti vguali. Dal punto F a i lati del pentagono ^d si facciano cadere le perpendicolari FL , FG , FH , FI , FK . Ne i triangoli FLA , FGA , i due angoli FLA , FAL sono vguali à i due angoli FGA , FAG , il lato AF è commune, sarà AL ^e vguale ad AG , ed il lato FL vguale ad FG . Similmente ne i triangoli FGB , FHB , i due angoli FGB , FBG sono vguali à i due FHB , FBH , il lato FB è commune, sarà il lato FG vguale ad FH . Nell'istesso modo si dimostrerà, che ogn'vna delle rette FL , FK è vguale ad FL , e perciò tutte le rette FL , FG , FH , FI , FK ^f sono frà di loro vguali, ed il circolo descritto intorno al centro F passerà per li punti G , H , I , K , L . Finalmente perche i lati del pentagono fanno angoli retti con li semidiametri FL , FG , FH , FI , FK , per il Corollario alla 16. propof. del 3. toccano il circolo ne i punti G , H , I , K , L . Per la qual cosa il circolo $GHIKL$ è iscritto nel dato pentagono, ch'era da farsi, e dimostrarfi.

d 12. del 1.

e 26. del 1.

f 1. affom.

SCOLIO DEL CLAVIO.

Nell'istesso modo si può iscriuere vn circolo in qualunque data figura equilatera, & equiangola; cioè sempre si diuidono due angoli più prossimi in due parti vguali, ed il concorso delle rette, che diuidono i due angoli si fa dentro della figura; stante che, in quelle di lati di numero imparo, le rette, che diuidono gli angoli in due parti vguali, per lo Scolio alla 12. propositione, segano i lati opposti in due parti vguali, e perciò si segano scambievolmente dentro della figura; ed in quelli di lati di numero paro, le rette, che diuidono i due angoli in due parti vguali, diuidono ancora gli angoli opposti in due parti vguali, e perciò si segano scambievolmente dentro della figura. Poi dal punto del concorso si facciano cadere 2 rette linee perpendicolari a i lati della figura, e fatto centro nel detto concorso, coll'intervallo d'vna delle dette perpendicolari, si descriua il circolo, che sarà quello iscritto dentro della proposta figura.

a 12. del 1.

PROBLEMA XIV. PROPOSITIONE XIV.

Intorno ad vn dato pentagono equilatero, & equiangolo, circoscriuere vn circolo.

Sia il dato pentagono $ABCDE$ equilatero, & equiangolo, intorno al quale s'habbia da circoscriuere vn circolo. Si diuidano due angoli più prossimi, come CBA , BAE , ^a in due parti vguali con le rette AF , BF , le quali continuate concorreranno dentro del pentagono $ABCDE$, stante che ogn'vna, se si continua, sega il lato opposto in due parti vguali, come fu dimostrato nello Scolio alla 12. propof.; dal punto F si tirino le rette FE , FD , FC ; e si considerino i due triangoli FAE , FAB , de'quali i due lati FA , AE sono vguali à i due lati FA , AB ; l'an-



a 9. del 1.

b 4. del 2.

golo FAE , per costruzione, è uguale all'angolo FAB , sarà la base FE ^b uguale alla base FB , e l'angolo FEA uguale all'angolo FBA . E perchè gli angoli CBA , DEA sono frà di loro uguali, e l'angolo FBA è la metà dell'angolo CBA ; sarà l'angolo FEA la metà dell'angolo DEA , e perciò la retta FE diuide l'angolo DEA in due parti uguali. Nell'istesso modo si dimostrerà, che le rette FD , FC diuidono gli angoli BCD , CDE in due parti uguali. Si considerino i triangoli

c 4. del 2.

ABF , FBC , de' quali i due lati AB , BF sono uguali a i due lati CB , BF , l'angolo CBF è uguale all'angolo ABF , sarà la base CF ^c uguale alla base FA . Finalmente, perchè gli angoli del pentagono $ABCDE$ sono frà di loro uguali, le loro metà ^d saranno frà di loro uguali; e perciò l'angolo FAB è uguale all'angolo FBA , ed il lato FA ^e è uguale al lato FB :

d 7. axiom.


e 6. del 2.

mà il lato FB è dimostrato uguale ad FE , e la retta FA uguale ad FC ; le rette FE , FA , FB , FC ^f sono frà di loro uguali. Nell'istesso modo si dimostrerà che la retta FD è uguale ad FE ; si che fatto centro in F ,

f 1. assioma.

g 3. postul.

coll'intervallo FA , ouero FB , ^g si descriva il circolo, quello passerà per li punti B , C , D , E , A , e sarà circoscritto il circolo $ABCDE$, intorno al dato pentagono equilatero, & equiangolo; ch'era da farsi, e dimostrarsi.



SCOLIO DEL CLAVIO.

Nell'istesso modo si può circoscrivere il circolo intorno a qualunque figura equilatera, ed equiangola, cioè col diuidere due angoli più prossimi in due parti uguali, e facendo centro nel concorso di quelle rette, che diuidono gli angoli, coll'intervallo d'una di esse, si descriva il circolo, che sarà circoscritto intorno alla data figura equilatera, ed equiangola.

PROBLEMA XV. PROPOSITIONE XV.


Dentro d'un dato circolo iscrivere vn esagono equilatero, ed equiangolo.

Sia il dato circolo $ABCD$, il di cui centro G , dentro al quale s'abbia ad iscrivere vn esagono equilatero, ed equiangolo.

a 1. del 3.

b 3. postul.

Si tiri ^a il diametro AD , e fatto centro in D , coll'intervallo DG , ^b si descriva il circolo CGE ; segará il dato circolo come in C , & E ; si tirino le rette EG , CG , ^c e si prolunghino ^d sino alla circonferenza in B , ed F ; si tirino le rette AB , BC , CD , DE , EF , FA , e sarà iscritto nel dato circolo l'esagono $ABCDEF$. Dico, che questo è equilatero, ed equiangolo.

c 1. post.
d 3. post.

Per

Per la definizione del circolo le rette CG, GD, GE sono frà di loro vguali; e per l'istessa ragione le tre rette DC, DG, DE sono frà di loro vguali, per la qual cosa i due triangoli GCD, GDE sono equilateri, e perciò equiangoli; e perche tre angoli di qualsiuoglia triangolo sono vguali a due angoli retti, sarà tanto l'angolo DGC, quanto l'angolo DGE, la terza parte di due angoli retti, e tutti due insieme, cioè l'angolo CGE, sarà le due terze parti di due angoli retti; mà i due angoli EGC, EGF sono vguali à due angoli retti, sarà l'angolo EGF la terza parte di due angoli retti; dal che i tre angoli FGE, EGD, DGC sono frà di loro vguali; mà gli angoli al vertice K sono frà di loro vguali; li sei angoli dunque nel centro dell'esagono sono frà di loro vguali, e gli archi opposti l sono frà di loro vguali; mà gli archi vguali m sono sottesi da rette linee vguali; saranno i lati AB, BC, CD, DE, EF, FA, frà di loro vguali, e l'esagono iscritto sarà equilatero. Finalmente perche l'arco AB è vguale all'arco CD, vguualmente se gli aggiunga l'arco DEFA; tutto l'arco CDEFA sarà vguale all'arco DEFAB; e gli angoli opposti nella circonferenza, cioè gli angoli DCB, CBA, sono frà di loro vguali. Nell'istesso modo si dimostrerà, che tutti gli angoli dell'esagono ABCDEF, sono frà di loro vguali. Per la qual cosa l'esagono iscritto sarà equilatero, ed equiangolo, ch'era da farsi, e dimostrarsi.

e 27. defin.
del 1.
f 5. del 1.
g 32. del 1.

h 13. del 1.

K 15. del 1.

l 26. del 3.
m 29. del 3.

n 2. affirma.

o 27. del 3.

COROLLARIO.


Perche DE, lato dell'esagono, è vguale alla retta DG semidiametro del circolo; sarà manifesto, ch'il lato dell'esagono è vguale al semidiametro del circolo, nel quale è iscritto.

PROBLEMA XVI. PROPOSITIONE XVI.

Nel dato circolo iscriuere vn quindecagono equilatero ed equiangolo.

Sia il dato circolo ABC, nel quale s' habbia ad iscriuere vn quindecagono equilatero, ed equiangolo.

Si descrua qualunque triangolo equilatero D, il quale per la quinta propositione del primo libro sarà equiangolo; s'iscriua nel circolo ABC il triangolo ABC equiangolo al triangolo D, quello sarà equilatero; e perche rette linee vguali d detraggono archi vguali, sarà l'arco sotteso dal lato AB, la terza parte di tutta la circonferenza del circolo, e perciò di quelle parti, delle quali tutta la circonferenza deue essere quindici, la retta AB ne sottrenderà



a 1. del 1.


b 2. del 3.

c 6. del 1.

d 28. del 3.

cinque.

- a 11. del 4. cinque. Di nuouo s'iscruiua nel circolo ABC^e il pentagono equilatero, & equiangolo AEFGH in modo, che l'angolo A del pentagono termini nell'angolo A del triangolo A B C; essendo i cinque lati del pentagono frà di loro vguali, sottenderannoⁱ archi vguali, e perciò l'arco sotteso dal lato AE farà la quinta parte di tutta la circonferenza del circolo. Si che di quelle parti, delle quali tutta la circonferenza deue essere quindici, l'arco AE ne conterrà tre; mà si disse che l'arco AB, ne conteneua cinque, se dall'arco AB se ne detrae l'arco AE, resta l'arco EB, il quale conterrà due di quelle parti: diuiso l'arco EB ξ in due parti vguali in I, l'arco IB farà la decimaquinta parte di tutta la circonferenza del circolo; si tiri la retta IB, sarà IB, il lato del quinto decagono; s'addattino^h nel dato circolo altre quattordici rette linee vguali ad IB, che sottenderanno κ gli altri quattordici archi vguali all'arco IB; e sarà iscritto il quinto decagono che si cerca. Finalmente perche l'arco EB contiene due di quelle quindici parti, nelle quali è diuisa tutta la circonferenza del circolo, il rimanente EACB sarà tredici delle medesime parti. Similmente perche IF contiene due di quelle quindici parti, il restante I A C F, ne conterrà tredici; e perciò l'arco EACB sarà vguale all'arco I A C F; dalche gli angoli opposti FBI, BIEⁱ sono frà di loro vguali. Nell'istesso modo si dimostrerà, che tutti gli altri angoli sono frà di loro vguali. Per la qual cosa nel dato circolo s'è iscritto il quindecagono equilatero, ed equiangolo, ch'era da farsi, e dimostrasi.
- l 28. del 3.
- g 30. del 3.
- b 1. del 4.
- K 28. del 3.
- l 27. del 3.



Fine del Quarto Elemento.

EVCLIDE RESTITVTO

D A

VITALE GIORDANI

ELEMENTO QVINTO.



DEFINITIONI.

I.

La quantità minore si dice esser parte della maggiore, quando la minore misura giustamente la maggiore.



DELLE quantità *inequali*, la minore si dice misurare giustamente la maggiore all'ora quando, divisa la maggiore nelle parti uguali, alla minore non soprauanza cos' alcuna. Come se siano esposte le quantità *inequali* AB, CD , del medesimo genere, e sia AB maggiore di CD ; se concepiremo divisa la quantità AB nelle parti uguali alla quantità CD , che siano AE, EF, FB , e che non soprauanzi cos' alcuna; la quantità CD si dirà misurare giustamente la quantità AB ; ed all'incontro la quantità AB si dirà essere giustamente misurata dalla minore CD . Ma se, oltre le parti AE, EF, FB , soprauanzasse qualche quantità minore di CD ; all'ora la minore CD , non misura giustamente la maggiore AB , ne la maggiore AB è misurata giustamente dalla minore CD . Hor douendosi in questo quinto Libro fare la comparatione delle quantità rispetto alle loro grandezze, spiega Euclide che cosa douremo intendere, quando nelle comparationi da farsi lui esprime questa voce, Parte, e dice, ch' all'ora la quantità minore comparata alla maggiore, la chiama parte, quando misura la maggiore giustamente; e così la minore CD si chiamerà parte della maggiore AB , quando misurerà giustamente la maggiore AB . Ma se CD non misura giustamente la maggiore AB , all'ora CD non si chiamerà parte della maggiore AB .



La

II.


La quantità maggiore si dice essere multiplice della quantità minore, quando la maggiore è misurata giustamente dalla minore.

Quando si fa la comparatione frà due quantità ineguali, ò si fa la comparatione dalla minore alla maggiore, ouero dalla maggiore alla minore: facendosi la comparatione dalla minore alla maggiore, se la minore misura giustamente la maggiore, la minore, per la definitione antecedente, si dice esser parte della maggiore. Ma facendosi la comparatione dalla maggiore alla minore, se la maggiore sarà misurata giustamente dalla minore, la maggiore si dirà esser multiplice della minore.

S C O L I O.

Le quantità, che sono misurate vgualmente da altrettante quantità, si dicono essere vguali multipli di quelle quantità, dalle quali sono vgualmente misurate.

Come se le quantità AB , CD fossero misurate vgualmente dalle quantità E , ed F , cioè che la quantità E misuri tante volte AB , senza che soprauanzi cor' alcuna, per quante volte la quantità F misura CD , senza auanzo alcuno; in tal caso le quantità AB , CD , si dicono essere vguali multipli delle quantità E , ed F . Dand'è manifesto, che se saranno proposte due, ò più quantità, come E , F , e si vogliano ritrouare altrettante quantità, che siano vgualmente multipli delle proposte, basta à trouare altrettante quantità, come AB , CD , che siano vgualmente misurate dalle proposte E , F ; e per quel, che s'è detto, le quantità AB , CD , saranno vgualmente multipli delle quantità E , F ; ed il medesimo si farà, se le quantità proposte saranno più di due.



III.

Proportione è la scambieuoale relatione frà due quantità del medesimo genere, rispetto alle loro grandezze.

Quan-


Quando si fa la comparatione fra due terminate quantità del medesimo genere, come linea à linea, superficie à superficie, corpo à corpo, moto à moto, tempo à tempo, tono à tono &c. in riguardo à quello, che appartiene alle loro grandezze, cioè secondo quello, che una quantità è maggiore, ò uguale, ò minore dell'altra, tal relatione si chiama proportione. Come facendosi la comparatione fra la quantità terminata AB, e la quantità terminata CD, del medesimo genere, e trouandosi, che AB sia misurata dalla quantità CD, verbi gratia, due volte, si dice ordinariamente la quantità AB essere il doppio della quantità CD; cioè AB rispetto alla quantità CD è il doppio. Hor in vece di dire la relatione, che hà la quantità AB rispetto alla quantità CD, diremo la proportione, che hà la quantità AB alla quantità CD, essere il doppio; di modo che quella voce proportione non esprime altro se non che quella relatione, ò rispettiuità, ch'è fra l'una, e l'altra quantità, esprimendo come l'una è maggiore, ò minore, ouero uguale all'altra.

Nota che le quantità, fra le quali si fa la comparatione, si chiamano termini della proportione; come se si farà la comparatione fra le quantità AB, CD, le medesime AB, CD si chiamano termini della proportione, e la quantità AB nominata nel primo luogo, si chiama primo termine, ouero antecedente; e la quantità CD, nominata nel secondo luogo, si chiama secondo termine, ouero conseguente. E così facendosi la comparatione della quantità CD alla quantità AB, sarà CD il primo termine, ò antecedente, & AB sarà il secondo termine, ò conseguente.

I V.

Analogia, ò proportionalità, è la similitudine delle proportioni.

Le proportioni si dicono essere simili fra di loro, quando sono fra di loro uguali, e si dicono ancora essere le medesime; cioè l'istesso è dire, la proportione, ch'è fra la quantità A, e la quantità B, è simile alla proportione, ch'è fra la quantità C alla quantità D; quanto è dire, la proportione della quantità A alla quantità B, è uguale alla proportione della quantità C alla quantità D; e l'istesso è dire, la proportione di A à B, è la medesima, che la proportione di C à D, ouero che A à B è come C à D. Supposto questo, chiaramente si vede, ch'Euclide in questa definitione, non hà voluto intender altro, se non che dare il nome alle simili, ò vogliamo dire, uguali proportioni, comparate fra di loro; come se la proportione della quantità A alla quantità B fosse uguale alla proportione, ch'è fra la quantità C, e la quantità D. Questa uguaglianza, ò similitudine, che sarebbe fra la proportione di A à B, e la proportione di C à D, si chiama Analogia, ouero Proportionalità.



Y

Quel-

Quelle quantità si dicono hauere proportione frà di loro, le quali moltiplicate si possono scambievolmente superare.

Il senso di questa definizione è, che di due quantità, moltiplicandone una secondo tutte le moltiplicationi se uno di quei moltiplici supera l'altra quantità, diremo che quelle due quantità hanno scambievolmente proportione, come se fossero proposte le quantità A, B, e si voglia vedere se hanno proportione; si prenda C moltiplice di B, secondo qualunque moltiplicatione; se la quantità C supera A, diremo che A, & B hanno scambievolmente proportione. Se poi C non è maggiore di A; si prenda altro moltiplice maggiore di C, come D, e se questo non fosse maggiore di A, bisogna concepirne un altro maggiore di D, e con quest'ordine per tutte le moltiplicationi. Se in tutte le moltiplicationi si peruerà à qualche moltiplice, che sia maggiore di A, concluderemo, che le quantità A, B, hanno scambievolmente proportione; ma se niuno degl'infiniti moltiplici è maggiore di A, le quantità A, B, non bauranno scambievolmente proportione: e questo sia detto per modo d'esempio; poiche questa definizione non è fatta per trovare, se fra due quantità proposte sia, ò non sia proportione, secondo il modo tenuto antecedentemente; perche essendo infiniti i moltiplici, se fra due quantità non cadesse proportione alcuna mai si peruerrebbe alla notizia che fra quelle quantità non cade proportione alcuna; ma è fatta acciò che si concepisca di qual natura siano le quantità, che hanno proportione, come sono le quantità terminate del medesimo genere; e di qual natura siano quelle, che non hanno proportione, come sono le quantità indeterminate comparate alle terminate, e le quantità di diuerso genere; poiche moltiplicandosi una quantità terminata per qualunque gran moltiplice, mai produrrà quantità maggiore all'indeterminata; e perciò le quantità terminate non hanno proportioni all'indeterminate; ne la linea moltiplicata secondo qualunque gran moltiplice, produrrà quantità, che si possa dire maggiore di qualunque picciola superficie, e così moltiplicata ogni gran superficie per qualunque gran moltiplice, cioè preso il moltiplice d'una superficie, secondo qualunque gran moltiplicatione, mai produrrà quantità maggiore di qualunque picciolissimo corpo; e così fra le cose, che sono di diuerso genere non cade proportione alcuna. E di qui è manifesta la ragione, perche Euclide nella terza definizione dice, che la proportioni è la scambievolmente relatione fra due quantità del medesimo genere.

ANNOTATIONE.

Per render chiara, ed intelligibile la seguente definizione, stimata fin bora oscura, e cauata da principio remoto, premetto le seguenti dimostrazioni.

P R I M A.

Se due quantità sono misurate giustamente da vn altra quantità; se sono misurate vguualmente, sono frà di loro vguuali; e se non sono misurate vguualmente, quella, ch'è misurata più volte, sarà maggiore.

Siano le quantità A , & C misurate giustamente dalla quantità B , e supposto prima, che siano misurate vguualmente. Dico che A è vguale alla quantità C . Si diuidano le quantità A , & C nelle parti vguali à B , che siano AD , DE , EF , FG , GH ; & CI , IK , KL , LM , MN ; sarà la moltitudine delle parti in AH vguale alla moltitudine delle parti in CN . Hor essendo AD vguale alla quantità B , & IC vguale alla medesima B , sarà AD vguale ad IC . Nell'istesso modo si dimostrerà, che DE è vguale ad IK , che EF è vguale à KL , che FG è vguale ad LM , e similmente GH vguale ad MN . Per la qual cosa tutta AH sarà vguale à CN , ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.


Di nuouo nella figura seguente non siano A , & C vguualmente misurate dalla quantità B , mà A sia misurata più volte da B di quello ch'è misurata CN . Dico che A è maggiore di CN .

Si diuida A nelle parti vguali à B , e siano quelle AD , DE , EF , FG , GH , HI ; e si diuida C nelle parti vguali à B , che siano CK , KL , LM , MN . Si prendano in AI tante parti quante ne sono in CN , che siano quelle notate in AO . Perche tante parti sono in AO per quante ne sono in CN , le due AO , & CN saranno misurate vguualmente da B ; e, per quel che s'è dimostrato, le quantità AO , & CN sono frà di loro vguuali. E perche AI , per ipotesi, contiene maggior numero di parti di quelle che sono in CN , conterrà ancora maggior numero di parti di quelle, che sono in CO . Per la qual cosa AI sarà maggiore di AO ; mà AO è vguale à CN , sarà AI maggiore di CN , come fu proposto dimostrare.

S E C O N D A.


Se due quantità sono misurate giustamente da vn altra quantità; se quelle due sono vguuali, saranno misurate vguualmente; e se sono ineguali, la maggiore sarà misurata più volte, che la minore.

Siano le due quantità A , & C , le quali siano misurate giustamente dalla quantità B . Dico, che se sono frà di loro vguuali, saranno misurate vguualmente.



a. 1. assioma.
del 1.

b. 2. assioma.



se da B; e se sono ineguali, la maggiore sarà misurata più volte da A, che la minore.

Supposto prima, che A sia uguale a C. Dico che tante volte A è misurata da B, per quante volte C è misurata dalla medesima B. Se A, & C non sono misurate ugualmente da B, una di quelle sarà misurata più volte, che l'altra. Sia dunque A misurata più volte di quello, ch'è misurata C; per l'antecedente dimostrazione A sarà maggiore di C, ch'è contro all'ipotesi; non dunque A è misurata più volte, mà le quantità A, & C, sono ugualmente misurate da B, ch'era da dimostrarfi nel primo luogo.

Di nuovo sia A maggiore di C. Dico che A è misurata più volte da B di quello, ch'è misurata C. Se A non è misurata più volte da B di quello, ch'è misurata C, ò sarà misurata tante volte, per quante volte è misurata C; puorà sarà misurata minori volte. Se A è misurata tante volte, per quante volte è misurata C, per l'antecedente dimostrazione, A sarà uguale a C; ch'è contro all'ipotesi; se poi A è misurata minori volte da B di quello, ch'è misurata C, per l'antecedente dimostrazione, A sarà minore di C, ch'è contro all'ipotesi. Non dunque A è uguale, ne minore di C, mà sarà maggiore, ch'era da dimostrarfi.



T E R Z A.

Se faranno due quantità A, B, vguali multipli di due altre quantità C, D, secondo qualunque multiplicatione; e siano prese le quantità E, F, vguali multipli delle medesime C, D, secondo qualunque multiplicatione. Dico, ch'in tutte l'infinite multiplicationi, se A è uguale ad E, ancora B sarà uguale ad F; se A è maggiore di E, ancora B sarà maggiore di F: e se A è minore di E, ancora B sarà minore di F.

Supposto prima, che A sia uguale ad E. Dico che B sarà uguale ad F.

Perche A, & B, per ipotesi, sono vguali multipli delle due C, D, tante volte A è misurata da C, per quante volte B è misurata da D. Similmente essendo le due E, F vguali multipli delle due C, D, tante volte E sarà misurata da C, per quante volte F è misurata da D. In oltre perche A si suppone uguale ad E, per l'antecedente dimostrazione, tante volte A sarà misurata da C, per quante volte E è misurata dalla medesima C; mà la quantità A è misurata da C tante volte, per quante volte B è misurata da D, sarà B misurata da D tante volte, per quante volte E è misurata da C; per ipotesi E è misurata da C tante volte, per quante volte F è misurata da D, sarà B misurata tante volte da D, per quante volte F è misurata da D; e per la

La prima dimostrazione di questo libro, sarà B vguale ad F, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

Di nuovo, supposto che A sia maggiore di E. Dico che B sarà maggiore di F.

Perche A, ed E, per ipotesi, sono misurate giustamente da C: e si suppone A maggiore di E, per l'antecedente dimostrazione sarà A misurata più volte da C di quello, ch'è misurata E dalla medesima C. Ma A, per ipotesi, è misurata tante volte da C, per quante volte B è misurata da D; sarà B misurata più volte da D di quello, che E è misurata da C. S'è mostrato E essere misurata tante volte da C, per quante volte F è misurata da D; perciò B sarà misurata più volte da D di quello, ch'è misurata F dalla medesima D; e per la prima dimostrazione, B sarà maggiore di F.

Finalmente, supposto che A sia minore di E. Dico che B sarà minore di F.

Perche A è minore di E, per l'antecedente dimostrazione, sarà A minori volte misurata da C di quello, che E è misurata da C; ma s'è dimostrato che A è misurata da C tante volte, per quante volte B è misurata da D; sarà B minori volte misurata da D, di quello che E è misurata da C. Fu similmente dimostrato, essere tante volte E misurata da C, per quante volte F è misurata da D, sarà B misurata minori volte da D di quello, che F è misurata dalla medesima D; e per la prima dimostrazione, B sarà minore di F, ch'era da dimostrarsi.



Q V A R T A.

Se faranno quattro quantità, e la prima è multiplice, o parte della seconda, come la terza è multiplice, o parte della quarta; preso gli vguali multipli della prima, e terza, secondo qualunque multiplicatione; come ancora preso gli vguali multipli della seconda, e quarta, secondo qualunque multiplicatione. Dico che sempre se il multiplice della prima è vguale al multiplice della seconda, ancora il multiplice della terza sarà vguale al multiplice della quarta: se il multiplice della prima è maggiore del multiplice della seconda, ancora il multiplice della terza sarà maggiore del multiplice della quarta; e se il multiplice della prima è minore del multiplice della seconda, ancora il

mul-


multiplice della terza sarà minore del multiplice della quarta.

Siano le quattro quantità A, B, C, D , delle quali la prima A , e la terza C siano ugualmente multipli, ò parti della seconda B , e quarta D ; cioè che A sia multiplice, ò parte di B , come C è multiplice, ò parte di D ; e preso gli uguali multipli della prima A , e terza C , secondo qualunque multiplicatione, che siano F , & G : similmente siano presi gli uguali multipli della seconda B , e quarta D , secondo qualunque multiplicatione, che siano H , ed I . Dico che se F è uguale ad H , ancora G sarà uguale ad I : se F è maggiore di H , ancora G sarà maggiore di I : se F è minore di H , ancora G sarà minore di I . Supposto prima che A , & C , siano uguali multipli di B , & D .

Perche F , & G sono uguali multipli di A , & C , tante volte F sarà misurata da A , per quante volte G è misurata da C . Si diuidi la quantità F nelle parti uguali ad A , e siano FK, KL, LM ; e si diuidi la quantità G nelle parti uguali a C , che siano GN, NO, OP . Perche FK è uguale ad A , per la seconda dimostrazione, tante volte FK sarà misurata da B , per quante volte A è misurata dalla medesima B . Nell'istesso modo si prouerà, che tante volte GN è misurata da D , per quante volte C è misurata dalla medesima D . Ma la quantità A , per ipotesi, è misurata da B tante volte, per quante volte C è misurata da D ; sarà FK misurata tante volte da B , per quante volte GN è misurata da D . In oltre perche KL, LM , ogn'una è uguale ad FK ; e le parti NO, OP ogn'una è uguale a GN ; tante volte KL sarà misurata da B per quante volte NO è misurata da D ; e tante volte LM sarà misurata da B , per quante volte OP è misurata da D . Per la qual cosa tutta FM sarà tante volte misurata da B , per quante volte GP è misurata da D ; e perciò FM, GP sono uguali multipli delle due B, D . Ma, per ipotesi, le due H, I , sono uguali multipli delle medesime B, D ; per l'antecedente dimostrazione, se F è uguale ad H , ancora G sarà uguale ad I ; se F è maggiore di H , anco G sarà maggiore di I ; e se F è minore di H , ancora G sarà minore di I , come s'è proposto dimostrare.

Sia di nouo A tal parte di B , quale C è parte di D : faranno le due B, D ugualmente multipli di A, C ; ed operandosi come sopra s'è fatto, si dimostrerà, che $H, ed I$, sono uguali multipli di A, C : ma, per ipotesi, F & G , sono uguali multipli delle medesime A, C : per l'antecedente dimo-

stratio-



stratione se F è uguale ad H , ancora G sarà uguale ad I : se F è maggiore di H , ancora G sarà maggiore di I ; e se F è minore di H , ancora G sarà minore di I . E perche F , & G sono uguali multipli di A , & C , secondo qualunque multiplicatione, ed anco H , ed I sono uguali multipli di B , & D , secondo qualunque multiplicatione; in conseguenza in ogni multiplicatione sempre succederà, che se F è uguale ad H , ancora G sarà uguale ad I : se F è maggiore di H , ancora G sarà maggiore di I ; e se F è minore di H , ancora G sarà minore di I , ch'era da dimostrarsi.

V I.

All' hora di quattro quantità la prima alla seconda si dirà hauere l'istessa proportionione, quale hà la terza alla quarta, quando presi gli vguali multipli della prima, e terza quantità, secondo qualunque multiplicatione; ed anco presi gli vguali multipli, della seconda, e quarta quantità, secondo qualunque multiplicatione; il multiplice della prima, essendo maggiore del multiplice della seconda, anco il multiplice della terza sia maggiore del multiplice della quarta. Ouero se il multiplice della prima è minore, ò uguale al multiplice della seconda; anco il multiplice della terza sia minore, ò uguale al multiplice della quarta.

Dopo, che s'è dimostrato nell'annotatione, all'antecedente numero quarto, darfi in natura quattro quantità, delle quali presi gli vguali multipli della prima, e terza, secondo qualunque multiplicatione; e presi gli vguali multipli della seconda, e quarta, secondo qualunque multiplicatione; sempre, ed in ogni multiplicatione, gli vguali multipli della prima, e terza, ò sono ambidue maggiori de' gli vguali multipli della seconda, e quarta: ò sono ambidue minori; ò ambidue uguali à' gli vguali multipli della seconda, e quarta; cioè se il multiplice della prima è maggiore, ò minore, ò uguale al multiplice della seconda; anco il multiplice della terza sarà ò maggiore, ò minore, ò uguale al multiplice della quarta; non sarà più oscuro il concerto di questa sesta definitione, ne potrà dirsi, che sia causata da principio remoto, per il che stimauano non dimostrare tutte le propositioni di questo quinto libro. E se si dicesse, che la dimostratione da me fatta milita, quando delle quattro quantità la prima, e terza sono ugualmente multipli, ouero ugualmente parti della seconda, e quarta: gli rispondo hora per sempre, non esser necessario dimostrare quali siano tutte le quantità, che possono cadere sotto il medesimo symptoma, bastando à me hauer dimostrato, ch'in natura si danno quattro quantità, che cadono sotto tal symptoma; cioè che gli vguali multipli della prima, e terza, secondo qualunque multiplicatione, ò sono uguali, ò sono minori, ò maggiori, come sopra s'è detto, de' gli vguali mul-

ti-

tiplici della seconda, e quarta, secondo qualunque multiplicatione; per poter poi definire, come fa Euclide, che quando nelle cose seguenti hauremo quattro quantità, ed in qualche modo si prouerà, che gli uguali multipli della prima, e terza, secondo qualunque multiplicatione, sono ambidue maggiori, ò minori, ò uguali à gli uguali multipli della seconda, e quarta, secondo qualunque multiplicatione: la proportione della prima alla seconda la chiameremo essere l'istessa, ò uguale, alla proportione, ch'è dalla terza alla quarta. Ed all'incontro, quando si dirà la prima alla seconda hauere l'istessa proportione, che la terza alla quarta, non si debba intendere altro, se non, che gli uguali multipli della prima, e terza, secondo qualunque multiplicatione, cioè secondo tutte le multiplicationi, siano sempre ambidue ò maggiori, ò minori, ouero uguali à gli uguali multipli della seconda, e quarta, secondo tutte le multiplicationi. Come per essempio, siano esposte le quattro quantità A, B, C, D, e siano presi gli uguali multipli della prima A, e terza C, secondo qualunque multiplicatione, che siano K, F. Similmente siano presi gli uguali multipli della seconda B, e quarta D secondo qualunque multiplicatione che siano le due G, H: e proueremo in qualche modo, che se K è uguale à G, ancora F è uguale ad H; e se K è maggiore, ò minore di G, ancora F è maggiore, o minore di H; all'ora la proportione di A à B, la chiameremo essere la medesima qual'è la proportione di C à D. Ed all'incontro, se supporremo, che la prima A alla seconda B habbia l'istessa proportione, quale ha C à D, concepiremo questa proportionalità, ò Analogia essere di quella natura di proportione, che gli uguali multipli K, F, presi secondo qualunque multiplicatione, ambidue sono uguali, ò minori, ò maggiori, de' gli uguali multipli G, H, presi parimente secondo qualunque multiplicatione; cioè che, se K è maggiore di G, ancora F è maggiore di H; e se K è uguale, ò minore di G, ancora F è uguale, ò minore di H.

Qui è d'auertirsi, che haurei potuto prouare l'antecedente quarta dimostrazione, seruendomi della terza proposizione di questo quinto libro, ma per non turbare in cos'alcuna l'ordine tenuto da Euclide col porre le definitioni frà le proposizioni, mi sono contentato dimostrarlo con modo poco differente à quello, che tiene Euclide in essa terza proposizione. E qui mi si porge occasione accennare l'artificio d'Euclide in questa gran compositione, il quale in tutti questi Elementi non s'è seruito d'alcun principio, che non fosse totalmente noto, ò pure fosse facile à dimostrarli con altre proposizioni dimostrate, mediante le proposizioni poste prima di seruirsi di quel princi-

K	A	B	G
F	C	D	H

pio. E perche simili proposizioni, che poteuano dimostrarne tal principio, non sono state da lui stimate propriamente Elementi, non s'è curato connumerarle frà le proposizioni di questi elementi, e sarebbe improprio fare giudizio diuerso d'un tale Autore.

Deuesi notare, che l'antecedente sesta definizione non serue per conoscere, quando sono date quattro quantità, se quelle siano nella medesima proportionne; perche il modo di conoscere, se quattro date quantità habbiano l'istessa proportionne, si haueà nella 16. propof. del sesto libro, come à suo luogo si farà noto; e questa sesta definit. serue solo per spiegazione di quello, ch'intende Euclide, e che noi douemo intendere, quando nelle cose seguenti si dirà la proportionne della prima alla seconda quantità è l'istessa, che la proportionne della terza alla quarta quantità; e quando dalle cose seguenti hauremo cauato il modo da conoscere se di quattro quantità la prima alla seconda hà l'istessa proportionne, che la terza alla quarta, douremo concepire essere di quella natura di medesima proportionne, che cade sotto le condizioni poste da Euclide nella sesta definizione.

V I I.

Quelle quantità, che hanno la medesima proportionne, si chiamano quantità proportionali.

Dopo ch'Euclide hà definita l'ugualità delle proportioni, cioè hà spiegato quello, che douemo intendere, quando si dirà due proportioni essere le medesime, ò uguali, ouero simili; hà voluto anco dare il nome à quelle grandezze, frà le quali cadono queste uguali proportioni. Per esempio se saranno tre quantità come A, B, C, e la prima A alla seconda B, haueà l'istessa proportionne, quale hà la quantità B alla quantità C; le tre grandezze A, B, C si chiameranno quantità proportionali. Similmente se le quantità saranno più di trè, come D, E, F, G, H, e la prima D alla seconda E hà l'istessa proportionne, quale hà la quantità E ad F; e la proportionne di E ad F è l'istessa, che la proportionne di F à G; & F à G hà l'istessa proportionne, quale hà G ad H; le quantità D, E, F, G, H, si chiamano quantità proportionali. E perche le proportioni antedette continuamente sono le medesime, cioè sono uguali, tale analogia si chiama continua; e per l'auuenire le grandezze D, E, F, G, H si chiameranno quantità continue proportionali.

Nota che se le proportioni, che cadono frà quattro grandezze, non sono continuamente uguali, purchè la proportionne, che cade frà due di quelle, sia uguale alla proportionne, ch'è frà l'altre due, quelle quattro quantità si dicono ancora quantità proportionali.



Come per esempio nelle quattro quantità I, K, L, M , se la proporzione, che hà la grandezza I alla grandezza K , sia la medesima, cioè uguale alla proporzione, che hà L ad M ; benchè la proporzione di K ad L , non sia uguale alla proporzione di I à K , ovvero di L ad M : cò tutto ciò le quattro grandezze I, K, L, M si chiamano quantità proporzionali; e tale analogia si dice discontinua, stante che non è da per tutto la medesima. Nelle cose seguenti dunque quando diremo, che quattro quantità sono proporzionali, concepiremo, che la prima alla seconda hà l'istessa proporzione, che la terza alla quarta; quando diremo, che le quantità sono continue proporzionali, concepiremo la prima alla seconda essere come la seconda alla terza; e la seconda alla terza, come la terza alla quarta; e così la quarta alla quinta, e con quest'ordine in infinito.

Q V I N T A.

E possibile darsi due quantità ineguali, delle quali preso il multiplice della maggiore, secondo qualunque multiplicatione; e preso il multiplice della minore, secondo qualche multiplicatione maggiore; il multiplice della minore sia minore del multiplice della maggiore.


Siano esposte le due quantità A, B , ineguali, delle quali A sia maggiore di B . Dico che preso C multiplice di A , secondo qualunque multiplicatione, e preso D multiplice di B , con maggior multiplicatione di quella, che C è multiplice di A , può essere che D sia minore di C .

Supposto prima, che A sia uguale à D . Perché C si suppone multiplice di A , benchè nasca da multiplicatione quanto si voglia minore, rispetto à quella, con la quale D è multiplice di B ; sarà sempre C misurata più d'una volta da A ; e perciò la quantità C sarà maggiore di A ; mà, per ipotesi, A è uguale à D , sarà C maggiore di D .

Di nuovo, supposto che A sia maggiore di D ; essendo C multiplice di A , benchè la quantità C nasca da qualsivoglia picciola multiplicatione, per quel, che s'è detto, sempre sarà maggiore di A ; mà per ipotesi, A è maggiore di D , sarà C molto maggiore della quantità D , ch'era da dimostrarsi.

S E S T A.

E possibile darsi quattro quantità, delle quali presi gli uguali multipli della prima, e terza secondo qualunque multiplicatione; e presi gli uguali multipli della secon-




da, e quarta con maggior multiplicatione di prima: se il multiplice della prima è maggiore del multiplice della seconda, il multiplice della terza non sia maggiore del multiplice della quarta.

Siano le quattro quantità A, B, CL, D , e sia la prima A maggiore della seconda B , e la terza CL non sia maggiore di D : siano presi gli uguali multipli della prima A , e terza CL , secondo qualunque multiplicatione, che siano F , & GO ; e di nuovo siano presi gli uguali multipli della seconda B , e della quarta D , con maggior multiplicatione di quella, con la quale F , & GO sono uguali multipli di A , & CL , in modo che H sia minore di F , il che è possibile per l'antecedente dimostrazione. Dico ch'essendo F maggiore di H la quantità GO non sarà maggiore di K .

Supposto prima, che CL sia uguale a D . Perche le quantità F, GO sono uguali multipli delle quantità A & CL ; tante volte F sarà misurata da A , per quante volte GO è misurata da CL . Similmente essendo H multiplice di B , come K è multiplice di D ; tante volte H sarà misurata da B , per quante volte K è misurata da D . In oltre perche H è multiplice di B secondo maggior multiplicatione di quella, con la quale F è multiplice di A ; sarà H misurata più volte da B di quello, che F è misurata da A . Ma si disse, che H è misurata da B tante volte per quante volte K è misurata da D ; sarà K misurata più volte da D , di quello che F è misurata da A . Più mostrato che F è misurata da A tante volte, per quante volte GO è misurata da CL ; sarà K misurata più volte da D di quello, che GO è misurata da CL . Ma la quantità C L'è supposta uguale a D , sarà K misurata più volte da D , di quello, che GO è misurata dalla medesima D ; e per la prima dimostrazione di questo libro, la quantità GO sarà minore di K .

Di nuovo, supposto che la terza quantità sia CM minore di D , e sia presa GN multiplice di CM , come F è multiplice di A . Si concepisca ingrandita la quantità CM fino ad L in modo, che sia uguale a D . E sia di nuovo GO multiplice di CL , come F è multiplice di A . Poi operandosi, come prima s'è fatto, si dimostrerà GO essere minore di K . Finalmente essendo F multiplice di A , come GO è multiplice di CL ; e come GN è multiplice di CM : sarà GO multiplice di CL come GN è multiplice di CM : dal che GO sarà misurata tante volte da CL , per quante volte GN è misurata da CM . Ma CL è maggiore di CM ; sarà GO maggiore di GN ; si è mostrata GO minore di K ; in conseguenza GN sarà molto minore della quantità K . Per la qual cosa le quantità A, B, CL , ouero CM , & D , sono le quattro quantità, delle quali presi gli uguali multipli della prima A , e terza CL , ouero CM , secondo qualunque multiplicatione, che siano F , & GO , ouero GN ; e presi gli



uguali multipli della seconda B, e quarta D, con multiplicatione maggiore: Se F è maggiore di H, la quantità G non sarà maggiore di K, ch'era da dimostrarsi.

V I I I.

Se faranno quattro quantità, delle quali siano presi gli uguali multipli della prima, e terza, secondo qualunque multiplicatione; e similmente siano presi gli uguali multipli della seconda, e quarta, secondo qualunque multiplicatione: se in tutte le multiplicationi non sempre gli uguali multipli della prima, e terza sono tutti due (presi separatamente) maggiori de' gli uguali multipli della seconda, e quarta, o tutti due minori, o tutti due uguali a' gli uguali multipli della seconda, e quarta; ma che in qualche multiplicatione, essendo il multiplice della prima maggiore del multiplice della seconda, il multiplice della terza non sia maggiore del multiplice della quarta: in tal caso la prima alla seconda si dirà hauere maggior proportionione, che la terza alla quarta.

Dalla quarta, e sesta dimostrazione si caua, che quando di quattro quantità sono presi gli uguali multipli della prima, e terza, secondo qualunque multiplicatione; e sono presi gli uguali multipli della seconda, e quarta, con qualunque multiplicatione: due casi si possono dare, o che in tutte le multiplicationi, sempre gli uguali multipli della prima, e terza sono ambidue maggiori, o ambidue minori, o vero uguali a' gli uguali multipli della seconda, e quarta: o questo non succede sempre in tutte le multiplicationi, ma che alcune volte, essendo il multiplice della prima maggiore del multiplice della seconda, il multiplice della terza non sia maggiore del multiplice della quarta: quanto al primo caso, la prima si dirà hauere l'istessa proportionione alla seconda, quale ha la terza alla quarta, come si disse nella sesta definizione: e nel secondo caso la prima alla seconda si dirà hauere maggior proportionione, che la terza alla quarta quantità.

Da quel, che s'è detto, facilmente se ne caua la conuersa, cioè, che se faranno quattro quantità, e si supporrà la prima alla seconda hauere maggior proportionione, che la terza alla quarta, secondo la natura della maggior proportionione poco auanti definita; presi gli uguali multipli della prima, e terza, secondo qualunque multiplicatione, e presi gli uguali multipli della seconda, e quarta, secondo qualunque multiplicatione: in queste infinite multiplicationi qualche duna necessariamente ve ne sarà, la quale farà, ch'essendo il multiplice della prima maggiore del multiplice della seconda, il multiplice della terza non sarà maggiore del multiplice della quarta: perche se tal multi-

pli-

plice non visfusse, ne seguirebbe, ch'in tutte le multiplicazioni gli uguali multipli della prima, e terza, ò tutti due farebbero maggiori, ò minori, ò uguali à gli uguali multipli della seconda, e quarta: ed all' hora per la sesta definizione, la prima alla seconda si direbbe hauere l'istessa proportionione, che la terza alla quarta; il che farebbe contro all'ipotesi; mentre la supposizione è, che la prima alla seconda s'intenda hauere maggior proportionione, che la terza alla quarta.

I. X.

La proportionalità non si può costituire in meno di tre termini.

Perche la proportionalità, per la quarta definizione, è la similitudine delle proportioni; ed ogni proportion si disse essere la scambieuoale relatione di due termini; perciò la pro-

portionalità, che consta di più d'una proportionione, è necessario, che si costituisca non in due termini, mà in più di due termini, mentre quella, che si costituisce frà due soli termini nella terza definizione, s'è chiamata proportionione, e non proportionalità. Hor costituendosi la proportionalità in più di due termini, non sarà difficile à concepire, che non si può costituire in meno di tre termini. Come se dicessimo, che la proportionione di A à B è simile, ò è l'istessa, che quella di B à C; doue si vedono due proportioni simili costituite frà i tre termini A, B, C.

A.	B.	C.
----	----	----

X.

La proportionione si dice essere composta d'altre proportioni, quando è generata dalla multiplicatione di quelle proportioni, dalle quali si dice essere composta.


In nissun luogo hò stimato più corrotto il testo d'Euclide, quanto in questo, poiche qui dà la definizione della proportionione duplicata, triplicata &c. che deriuu dalla compositione delle proportioni, come appresso si dirà; e nel sesto Libro al num. 5. pone poi la definizione della compositione delle proportioni; le quali, perche tutte due conuengono alle proportioni vniuersali, ancora tutte due deuono esser poste in questo quinto Libro, doue tratta delle proportioni in genere. E perche si potrebbe dire, ch'Euclide definisce la compositione delle proportioni nel sesto Libro, stante che iui comincia à seruirsene; per l'istessa ragione douena ancora porre nel sesto Libro la definizione della proportionione duplicata, triplicata &c. mentre che in nissun altro luogo comincia à seruirsene, se non che nel sesto Libro. Potiamo dunque probabilmente credere, ch' il testo sia adulterato, non essendo verisimile, che quel grand'huomo che hà dato sì bell'ordine à questi Elementi, hauesse equiuocato nel collocare vna sola definizione. Ond'io per non lasciare difettosa quest'opera per sì picciola cosa, hò stimato bene leuare dal sesto Libro la quinta definizione, e restituir la qui,

come proprio suo luogo, e così diciamo, che quando una proportione nasce dalla multiplicatione di due, o più proportioni, quella si dice esser composta dalle proportioni multiplicatae.

X I.

Quando le grandezze sono continue proportionali; la prima si dice hauere duplicata proportione alla terza di quella, che hà alla seconda. Oltre à ciò la prima alla quarta si dice hauere triplicata proportione di quella, che hà alla seconda; e con quest'ordine sempre la prima all'ultima si dice hauere proportione tante volte multiplicata di quella, che hà alla seconda, per quanto è vno meno la moltitudine dellè grandezze proportionali.

Qui è d'auuertirsi, eb' Euclide non dice, che quando tre grandezze sono proportionali, la proportione della prima alla terza è duplicata di quella, che hà alla seconda; ne che la proportione della prima alla quarta, è triplicata della proportione della prima alla seconda; ma la proportione della prima alla terza la chiama duplicata di quella proportione, che hà la prima alla seconda; e la proportione della prima alla quarta la chiama triplicata di quella proportione, che hà la prima alla seconda; volendo inferire, che quando dice la duplicata proportione della prima alla seconda, si debba intendere, come se dicesse, la proportione della prima alla terza; e quando dice la proportione triplicata della prima alla seconda, vaglia l'istesso, come se dicesse, la proportione della prima alla quarta. Per esempio, siano le tre quantità proportionali C, D, E, che la proportione di C à D sia l'istessa, che la proportione di D ad E; e s'intendano due altre quantità, come A, & B. Hor quando Euclide dice, che la proportione della grandezza A alla grandezza B è duplicata della proportione, che hà C à D, non intende altro, se non che la proportione di A à B è l'istessa, che la proportione della prima A alla terza E; ed in questo senso se ne serue da per tutto. E ben vero, che questa definizione, benchè sia sufficientissima à rendere dimostrate tutte le cose, nelle quali se ne serue Euclide, con tutto ciò confonde assai l'intendimento di chi studia, il che nasce dal non essersi dimostrato, che la proportione della prima alla terza sia veramente duplicata di quella, ch'è della prima alla seconda; e che la proportione della prima alla quarta sia veramente triplicata di quella, ch'è della prima alla seconda. E pare che questa definizione sia appoggiata ad una cosa incerta; per ilche malamente gli studiosi s'applicano l'animo à concepirne il



vero

vero senso. Hor per leuare ogni ambiguità, che possa rendere oscuro il concetto di questa definizione. Dic. che quando tre quantità sono proporzionali, la proporzione della prima alla terza non solamente la chiamiamo duplicata, ma che realmente è duplicata di quella, ch'è della prima alla seconda; e che di quattro quantità continue proporzionali la proporzione della prima alla quarta è triplicata di quella, ch'è dalla prima alla seconda, e con quest'ordine sempre la prima all'ultima ha proporzione tante volte moltiplicata di quella, che ha alla seconda, per un meno la moltitudine delle quantità proporzionali. Il che tutto è dimostrato nell'annotazione dopo la 18. proposizione del sesto Libro.

X I I.

Delle quantità proporzionali, gli antecedenti si dicono omologhi, cioè simili à gli antecedenti; ed i conseguenti à i conseguenti.

Due similitudini si deuono concepire, quando consideriamo le grandezze proporzionali. La prima è la similitudine delle proporzioni, che cadono frà quelle grandezze proporzionali, per la quale si dicono quantità proporzionali; come se la proporzione dell'antecedente A al conseguente B, è uguale, o l'istessa, che la proporzione dell'antecedente C al conseguente D, queste due proporzioni si dicono simili frà di loro; poiche tanto è dire la proporzione di A à B è l'istessa, che la proporzione di C à D; quanto è dire, che la proporzione di A à B è simile alla proporzione di C à D. L'altra similitudine da considerarsi è nelle quantità frà le quali cadono le simili proporzioni; come se la proporzione dell'antecedente A al conseguente B è simile alla proporzione dell'antecedente C al conseguente D; li due antecedenti A, & C, si dicono esser simili frà di loro, e simili ancora si dicono i conseguenti B, & D frà di loro; e per leuare la confusione di queste due similitudini, in luogo di dire, che gli antecedenti A, & C sono simili, diremo, che gli antecedenti A, & C sono omologhi, che significa l'istesso: e così li conseguenti B, & D li chiameremo ancora omologhi.

X I I I.

Proporzione alterna, ouero permutata, è quando si fa la comparatione dell'antecedente all'antecedente, e del conseguente al conseguente.

Quando s'aueranno quattro quantità, come A, B, C, D, ed essendosi fatta la comparatione dell'antecedente A al conseguente B, e dell'antecedente C all' conseguente D; e si dirà permutando; questa voce Permutando significa, che si debba fare la comparatione dell'antecedente A all'antecedente C, e dell' conseguente B al conseguente D.



La

X I V.

La proportione inuerfa non è altro , se non che fare la comparatione de i consequenti à gli antecedenti , pigliando i consequenti come antecedenti , e gli antecedenti come consequenti .

Se faranno quattro quantità , come A, B, C, D, ed essendosi fatta la comparatione dell' antecedente A al conseguente B , e dell' antecedente C al conseguente D, e si dirà Inuertendo ; si dourà fare la comparatione del conseguente B all' antecedente A, e del conseguente D all' antecedente C .



X V.

La compositione della proportione è il fare la comparatione frà la composta dell' antecedente , e conseguente insieme , al conseguente .

Si considerino le quattro quantità A, B, C, D ; se , essendosi fatta la comparatione dell' antecedente A al conseguente B , e dell' antecedente C al conseguente D , si dirà Componendo ; all' hora si farà la comparatione delle due AB, prese insieme , al conseguente B , e delle due CD, prese insieme , al conseguente D .



X V I.

La diuisione della proportione è il fare la comparatione della differenza , ch'è frà l' antecedente , e conseguente , all' istesso conseguente . purchè gl' antecedenti superino i consequenti

Cioè se sarà fatta la comparatione dell' antecedente A al conseguente B , e dell' antecedente C al conseguente D , e si dirà Diuidendo ; si farà la comparatione della differenza che è frà l' antecedente A ed il conseguente B al

conse-


conseguente B, e della differenza, ch'è frà l'antecedente C, e conseguente D, al conseguente D. Similmente se sarà fatta la comparatione dell'antecedente EF al conseguente FG, e dell'antecedente HI al conseguente IK, dividendo, si farà la comparatione della differenza EG al conseguente GF, e della differenza HK al conseguente KI: auuertendo, che EG è la differenza di quanto l'antecedente EF supera il conseguente FG; e che HK è la differenza di quanto l'antecedente HI supera il conseguente IK.



XVII.

La conuerfione della proportionè è il fare la comparatione frà l'antecedente, e la differenza, ch'è frà l'antecedente, ed il conseguente, purchè gl'antecedenti superino i conseguenti.


Sia l'antecedente AB, ed il conseguente BC, sarà AC la differenza di quanto l'antecedente AB supera il conseguente BC. Similmente sia DE antecedente, ed il conseguente sia EF, farà DF la differenza frà l'antecedente DE, ed il conseguente EF: Hor se farà fatta la comparatione dell'antecedente AB al conseguente BC, e dell'antecedente DE al conseguente EF, dicendosi, per la conuerfione della proportionè, si farà la comparatione dell'antecedente AB alla differenza AC, e dell'antecedente DE, alla differenza DF.



XVIII.

Per l'egualità è quando sono più di due quantità da vna parte, ed altrettante quantità da vn'altra; e tanto nelle prime, quanto nell'altre, si fa la simile comparatione della prima all'ultima.

Come se siano le quantità A, B, C, D, da vna parte, & altrettante quantità, come E, F, G, H, da vn'altra parte; e fatta la comparatione di A à B, e di E ad F; e similmente fatta la comparatione di B à C, e di F à G; come ancora fatta la comparatione di C à D, e di G ad H, e con quest'ordine se vi saranno altre quantità: se si dirà, Per l'egualità, si farà la comparatione della prima A all'ultima D, e della prima E all'ultima H.



A a

Pro-

X I X.

Proportione ordinata si dice , quando sono più di due quantità da vna parte , & altrettante quantità da vn altra parte ; e la prima alla seconda , nelle prime , sia come la prima alla seconda , nell'altre ; e similmente la seconda alla terza , nelle prime , sia come la seconda alla terza nell'altre ; e la terza alla quarta , nelle prime , come la terza alla quarta , nell'altre ; e con quest'ordine se vi saranno più quantità .


Per esempio, se A à B è come E ad F , e la proportione di B à C è come quella di F à G ; come ancora C à D sia come G ad H ; e con quest'ordine se le grandezze saranno di maggior moltitudine; secondo questa disposizione le dette quantità si dicono essere nella proportione ordinata .



X X.

La perturbata proportione è quando sono tre quantità da vna parte , e tre altre da vn altra parte ; e la prima alla seconda , nelle prime , sia come la seconda alla terza nelle altre ; e la seconda alla terza , nelle prime , è come la prima alla seconda , nelle altre .

S'intendano le tre quantità A, B, C , da vna parte, e tre altre come D, E, F , da vn altra parte; e la proportione della prima A alla seconda B , sia come quella della seconda E alla terza F ; e similmente la proportione della seconda B alla terza C sia come quella della prima D alla seconda E ; le dette quantità A, B, C , & D, E, F , si dicono essere nella perturbata proportione .



ANNOTATIONE.

Perche la varia interpretatione data da Graui Autori à queste definitioni del quinto libro , può apportare non picciola confusione à i studiosi di questa scienza , parmi assai utile , prima di passare alle dimostrazioni delle proportioni , che cadono frà le grandezze in genere , come sono le dimostrazioni , che seguono in questo quinto libro ; porre in chiaro tutte le difficoltà , ed insieme esaminare di quanto valore siano l'eccezioni date fin' hora à queste definitioni d'Euclide . E per procedere con ordine , spiegheremo il senso litterale d'Euclide à misura , che si esporranno l'eccezioni date .

In tre cose stimano , ch'Euclide habbia vacillato in questo quinto libro, cioè.

Nel definire la proporzionalità in più modi; In bauer stabilita la sesta definizione sopra una passione remota: Ed in bauer dimostrato in specie nel V II. Libro quello, che ha dimostrato in genere nel quinto Libro. E quanto al primo capo giudicano, che la quarta, e sesta definizione del quinto Libro, non siano due definizioni distinte, e separate, ma che tutte due costituiscono una sola definizione. Il dubbio consiste nel fatto, nè potremo cauare chiarezza maggiore, se non che dalle proprie parole d'Euclide. Definisce prima questo Autore, che cosa sia proporzione, nel seguente modo. Ratio est, duarum magnitudinum eiusdem generis mutua quedam secundum quantitatem habitudo. Cioè, che la proporzione è la scambieuale relatione frà due quantità del medesimo genere, rispetto alle loro grandezze; come fu spiegato nella terza definizione di questo. E qui è d'auertirsi, che doue Euclide dice Ratio, noi, seguendo l'uso comune, diciamo Proporzione; e doue dice Proportio, diciamo Proporzionalità. Soggiunge poi nella quarta definizione. Proportio verò, est rationum similitudo, cioè chiama la similitudine delle proporzioni, con questa voce, Proporzionalità. E nella sesta definizione dice. In eadem ratione magnitudines dicuntur esse, prima ad secundam, & tertia ad quartam, cum primæ & tertiæ æque multiplicia, à secundæ & quartæ æque multiplicibus, qualicumque sit hæc multiplicatio, vtrumque ab vtroque, vel vna deficiunt, vel vna æqualia sunt, vel vna excedunt; si ea siniantur, quæ inter se respondent; cioè. Quattro quantità si dicono bauer la medesima proporzione, ouero simili proporzioni, quando gli eguali multipli della prima, e terza, secondo qualunque moltiplicazione, sono tutti due ò maggiori, ò minori, ò eguali à gli eguali multipli della seconda, e quarta, secondo qualunque moltiplicazione: come fu pienamente spiegato nella sesta definizione di questo. Quindi appare, ch'Euclide nella terza definizione, assegna il nome alla scambieuale relatione, ch'è frà due quantità del medesimo genere, col chiamarla proporzione; nella quarta definizione chiama proporzionalità la similitudine ò egualità delle proporzioni; e nella sesta definizione, spiega quali condizioni deuono bauer quattro quantità, acciò che frà loro si dica cadervi quella proporzionalità spiegata nella quarta definizione. Donde è manifesto, che la quarta, e sesta definizione sono totalmente distinte, e non hanno vn medesimo significato, come vogliono i contradicenti, i quali soggiungono ancora, ch'Euclide non soddisfatto della sesta definizione posta nel quinto, replicò il medesimo in altro modo nella 20. definizione del settimo Libro. Qui desiderarci sapere, chi forzò Euclide à porre nel quinto Libro quella sesta definizione, della quale non era soddisfatto, per replicarne una migliore nel settimo Libro (dico migliore, perche uno de gli Autori, che s'oppongono alla sesta definizione d'Euclide, si serue di questa 20. definizione del settimo nel luogo, doue lui dimostra le proporzioni delle quantità in genere) Io per me non sono di quelli, che stimano di tanto poco intendimento Euclide, che non sapesse valersi nel quinto Libro di quella medesima 20. definizione, che lui medesimo pose nel settimo Libro; mentre altri, credendosi di far bene, non senza qualche industria l' hanno fatto. Temo però, che la cosa sia tutta altrimenti di quello, che questi Autori s'immaginano. Mi si dica di gratia, che cosa hà la quantità continua di commune con la quantità discreta? Certo che se faremo esatta riflessione alla natura dell'vna, e dell'altra, trouaremo

mo, che non altro hanno di commune, se non che grandezza è l'una, e grandezza è l'altra; del rimanente la quantità continua riguarda la sola estensione, e la discreta la semplice moltitudine. La quantità continua comincia dal punto, e la discreta comincia coll'unità in modo, ch'il punto non è parte della quantità continua; e l'unità è parte della quantità discreta. La quantità continua si può accrescere, e diminuire quanto si vuole; la discreta si può accrescere, ma non diminuire quanto si vuole, stante che l'unità è sua minima parte. Sempre la quantità continua si può diuidere in due parti uguali; e la discreta non sempre. La quantità continua, ò è lunghezza, ò superficie, ouero corpo; e di queste la lunghezza non ha niente di commune con la superficie, ne col corpo; la superficie è totalmente diuersa dalla linea, e dal corpo; ed il corpo in nessun modo può essere considerato come superficie, ò come linea; e la quantità discreta può essere considerata come lunghezza, come piano, e come solido; cioè quel medesimo numero composto, che consideriamo come numero solido, lo possiamo considerare, come numero piano, ed ancora come lunghezza. Nella quantità continua à tutti i piani si può trouare vn quadrato uguale, ed à i solidi vn cubo uguale: per il che ad ogni piano si può trouare il lato di quel quadrato, che gli è uguale, & ad ogni solido si può trouare il lato di quel cubo, che gli è uguale: ma non tutti i numeri possono essere numeri quadrati, ò numeri cubi; e perciò non tutti hanno lato, ò radice quadrata, ne lato, ò radice cuba. Alle grandezze, nella quantità continua, sempre se le può trouare la terza, ò quarta, e quante altre quantità si vogliono, proportionali; ma nella quantità discreta non à tutti i numeri se gli può trouare il terzo, quarto, ed altro numero nella medesima proportionione. Nella quantità discreta si danno le grandezze minime in vna data proportionione, il che non succede nella quantità continua. E finalmente le grandezze, nella quantità continua, non sempre sono commensurabili, e le grandezze, nella quantità discreta, sono sempre commensurabili. D'onde ne segue, ch'essendo tanta diuersità frà la quantità continua, e la discreta; le passioni, che accadono all'una, non tutte possono conuenire all'altra. Per esempio nella quantità discreta, i numeri primi sono minimi nella loro proportionione; ma nella quantità continua non si trouano grandezze, che siano minime nella loro proportionione. Hor se le passioni, che accadono nella quantità continua non conuenengono tutte con quelle della quantità discreta, fu ben necessitato Euclide ad assegnare principij proprij, ed atti à spiegare quelle passioni nella quantità discreta, che non conuenengono alla quantità continua. E perche, come s'è detto, le grandezze nella quantità discreta, sono tutte commensurabili; le passioni di queste tutte riguardano i modi, come scambievolmente si misurano; cioè come vna grandezza misura, ò non misura vn'altra, ò più grandezza; e come più grandezze misurano, ò non misurano altre grandezze; da i quali ne nascono altre passioni, come apparisce nel settimo, ottauo, e nono Elemento. E per tal ragione, benchè Euclide habbia dimostrato in genere in questo quinto Elemento tutte le passioni delle proportioni, per il che sono dimostrate ancora le proportioni de' numeri; con tutto ciò, hauendo riguardo alle particolari passioni, che doueua dimostrare nella quantità discreta, stabilì nuoua definizione alla proportionione de' numeri, come si vede nella 24. definizione del settimo Elemento; la quale è solamente diretta à spiegare la natura delle proportioni


alle

alle grandezze commensurabili, come sono i numeri. E perche la proporzionalità è la similitudine delle proporzioni, bauendo per le ragioni sopradette, stabilita la definizione delle proporzioni numeriche, secondo che richiede la natura della commensurabilità, fu necessitato con noua definizione à spiegare quali condizioni deuono hauere i numeri, acciò che s'è dica caderui proporzionalità; cioè quali condizioni deuono hauere i numeri, che lui chiama numeri proporzionali. E questa è la 20. definizione del settimo Elemento, la quale douendo intieramente conuenire con la definizione delle proporzioni numeriche, l'è posta diuersamente dalla sesta definizione di questo quinto Elemento; ne potè fare altrimenti, perche questa sesta definizione abbraccia il commensurabile, e l'incommensurabile; e l'altra riguarda solamente la commensurabilità de numeri. D'onde è manifesto, ch'Euclide non pose nel settimo Elemento la definizione delle quantità proporzionali à causa, che non fosse soddisfatto di quello, che hauera definito nel quinto Elemento; mà fu necessitato à farlo per spiegarle quelle passioni ne i numeri, che in nessun modo possono essere nella quantità continua. E questo sia detto per mostrare, che non è vn forte argomentare il dire, che hauendo Euclide spiegato in specie nel settimo Libro quello, che hà spiegato in genere nel quinto, ne segua poi, ch'il quinto Libro non sia dimostrato.

Discusso questo picciolo dubbio (che in modo alcuno non può apportare detrimento ad Euclide, mentre quand'anche la quarta definizione del quinto Libro fosse superflua, questo non sà che il quinto Libro non sia perfettissimamente dimostrato) veniamo à spianare le difficoltà maggiori, le quali tutte parmi, che si restringano alla sesta definizione, che dicono hauere l'origine da passione remota, com'è quella, che si diano quattro quantità in natura in modo, che gli uguali multipli della prima, e terza, secondo qualunque multiplicatione, tutti due siano ò maggiori, ò minori, ò uguali à gli uguali multipli del la seconda, e quarta, secondo qualunque multiplicatione. E perche questa difficoltà è già superata, come apparisce nella dimostrazione, che antecede alla sesta definizione di questo, non resta più luogo da dubitare, che le passioni del quinto Libro non siano tutte ben dimostrate; benchè Euclide stimasse che non fosse tanto necessario di farui particolare dimostrazione: poiche se hauemo quattro quantità, e saranno presi gli uguali multipli della prima, e terza, secondo qualunque multiplicatione, e di più saranno presi gli uguali multipli della seconda, e quarta, secondo qualunque multiplicatione, due casi si possono dare in natura; cioè: O gli uguali multipli della prima, e terza, in ogni multiplicatione, sono tutti due maggiori, ò minori, ò uguali à gli uguali multipli della seconda, e quarta; ò pure non succede in ogni multiplicatione, mà che in alcune succeda, ed in altre nò. Se non succede in ogni multiplicatione, la proporzione della prima alla seconda, e della terza alla quarta, le chiamia proporzioni ineguali; e se succede in ogni multiplicatione, le chiamia simili, cioè uguali proporzioni: e così non pare tanto oscuro questo principio, che assolutamente si potesse dire, che le passioni del quinto Libro fossero indimostrate. Hauerei stimato assai più oscuro principio, quando di quattro quantità la prima fosse maggiore della seconda, e la terza non maggiore della quarta, ed Euclide hauesse supposto, che la prima alla seconda hauesse maggior proporzione, che la terza alla quarta: all'hora con ragione si sarebbe potuto domandare ad


Euclide, per qual causa non ha amMESSO per cosa nota, che le uguali quantità hanno l'istessa proporzione ad una terza del medesimo genere; e poi prenda per principio chiaro quello, che senza dubbio è un fortissimo Theorema da dimostrarsi (come si può vedere nella 10. & 11. proposizione del sesto Libro delle Collezioni Matematiche di Pappo Alessandrino) e non differente a questo si può stimare quel principio preso da gravi Autori (che per altro sono degni di ogni gloria) i quali definiscono la maggior proporzione nel seguente modo, Chiamo la proporzione della prima alla seconda maggiore della proporzione commensurabile, che ha la terza alla quarta, quando la prima aianza quella, la quale alla seconda, sia come la terza alla quarta.

Cioè se saranno quattro quantità come A, B, C, D , che le due A, B siano del medesimo genere, e le due C, D , d'un altro genere; o che tutte quattro siano del medesimo genere, e che C a D habbia qualsivoglia proporzione commensurabile: e qual-



c'è'altra quantità E sia minore di A , ed habbia alla seconda B l'istessa proporzione commensurabile, quale ha C a D ; la proporzione della prima A alla seconda B si debba chiamare maggiore della proporzione commensurabile, che ha C a D . Dunque acciò che la proporzione di A a B sia maggiore della proporzione commensurabile, che ha C a D , sarà necessario, che si dia in natura un'altra quantità come la notata E , la quale sia minore di A , e che habbia l'istessa proporzione commensurabile a B , quale ha C a D , e per maggiore chiarezza sogliono addurre una simile spiegazione.

Siano le quattro quantità AB, C, DE , ed F ; e sia AB , per esempio, nella proporzione sesquialtera alla quantità C , e parimente DE sia nella sesquialtera proporzione alla quantità F ; e così la proporzione di AB a C è l'istessa, che la proporzione di DE ad F ; il che se gli può dare per concesso,




Soggiungono poi, che aggiunta ad AB qualche particola G A in modo, che ne risulti tutta la quantità GB o commensurabile, o non

commensurabile alla quantità C , sarà chiaro, che GB è maggiore di quel che si ha bisogno, acciò che sia sesquialtera a C . E da questo concludono, che GB ha maggior proporzione a C di quella, che ha DE alla quantità F . Se aggiunga la particola GA alla quantità AB ne risultasse la composta GB commensurabile alla quantità C , all'ora GB sarebbe parti di C di maggior moltitudine di quello, che DE è parti di F ; cioè GB sarebbe maggiore di quello che si ha bisogno acciò che sia parti di C , come DE è parti di F ; e l'eccesso sarebbe parte, o parti, ouero moltiplice di C , ed in questo caso la definizione non sarebbe mancante, ne sarebbe necessario dimostrare, che le quantità uguali hanno l'istessa proporzione ad una terza; ne meno, che delle ineguali quantità la maggiore ha maggior proporzione ad una terza, che la minore alla medesima terza; poichè il tutto dipenderebbe dalle definizioni, come fa Euclide nel 7.

Ele-

Elemento. Ma la difficoltà sta, quando, aggiunta la particola AG ad AB, e ne risulti GB incommensurabile alla quantità C, nel qual caso non è AG parte, o parti, o moltiplice di C; e perciò non sappiamo, se la proporzione di GB, a C sia cresciuta, o diminuita. E per spiegare con qualche similitudine il dubbio, si consideri l'altuo di qualche fiume, come il notato ZX, che da per tutto ritenga uguale declivio, ma ineguale larghezza; cioè che la larghezza, nello spatio BXC sia maggiore della larghezza nello spatio DEZ; e corra l'acqua da Z verso X in modo, che nel sito DE faccia la sezione DFGE, e nel sito BC faccia la sezione BHIC. S'intenda in BC ristretto l'altuo in modo, che la larghezza BL sia uguale alla larghezza DE, per quel che si dimostra nel nostro



Trattato delle Acque Correnti, la sezione BHL, che fa l'acqua nel sito BL, sarà uguale alla sezione DFGE che fa nel sito DE; e la velocità dell'acqua nella sezione BHL è uguale alla velocità dell'acqua nella sezione DFGE. Se si concepisce rimosso l'argine E LK, la sezione dell'acqua sarà BHIC maggiore della sezione BHL, l'acqua nello spatio BIGED crescerà di mole a causa, che la velocità dell'acqua nella sezione BHIC è fatta minore: se poi all'acqua in ZX sopraggiunge un'altra piena, la sezione BHL cresce d'altezza, e si fa più veloce, come il tutto si dimostra nel luogo citato: e la sensata esperienza lo fa manifesto, di modo, che la crescita della sezione BHIC in un modo cresce di velocità, ed in un altro, come in latitudine diminuisce di velocità. Hor se la velocità è una cosa diversa dall'estensione superficiale, o corporea, e si dà in natura, che accrescendosi l'estensione in un modo, cresce la velocità, ed in un altro modo si diminuisce; essendo la proporzione una cosa diversa dall'estensione, cade in dubbio se accrescendo l'estensione al termine antecedente, possa in tutti gli accrescimenti produrre proporzione maggiore di quella, che haueua al conseguente, prima dell'accrescimento. E benché le sezioni più veloci in tempi uguali possano scaricare maggiori quantità d'acque di quelle, che scaricano le meno veloci, questa, ed altre passioni nell'acque correnti sono cognite a noi mediante le dimostrazioni Geometriche; ma non trouo fino a questo luogo con quali dimostrazioni Geometriche si possa spiegare alcuna passione delle proporzioni, dalla quale se ne possa cauare la causa, perché accresciuta una estensione in modo, che ne venga quantità incommensurabile ad un'altra, non possa auer poi minor proporzione a quell'altra, di quella, che haueua prima dell'accrescimento. E s'è passione ignota, che due quantità uguali habbiano uguali proporzioni ad una terza; e che le proporzioni, le quali sono le medesime ad una terza sono le medesime fra di loro; come poi non è passione ignota, che accresciuta una quantità in modo, che ne risulti quantità incommensurabile, habbia maggior proporzione ad una terza di quella commensurabile proporzione, che haueua

alla medesima, prima dell'accrescimento. Vn'altro esempio si può aggiungere, riflettend' alle cose, che discendono, ed à quelle, che galleggiano nell'acqua; cioè. Vna pallina di piombo discende nell'acqua con vna tale qualifica velocità; se à questa s'accresce, come ogn'uno sà, vna massa di cera, la quale, benchè sia leggiera rispetto al piombo, con tuttociò per se stessa pesa qualche cosa, e pure permista quella pallina di piombo con quella massa di cera, non solo quel piombo non discende con la velocità di prima, mà può essere tanta la cera accresciuta, che resti à galla. Donde se haueremo riguardo solamente à questi due graui aggiunti insieme, troueremo, ch'il peso della cera aggiunto al peso del piombo non hà prodotto accrescimento di velocità, mà bensì il tutto haurà minor velocità. Sò che le cause di quest'effetto sono cognite, mà habbiamo ancora la cognitione di molt'altre cose, che ce ne aprono la strada; mà nelle quantità incomensurabili non habbiamo fin' à questo luogo cognitione alcuna delle loro passioni; anzi che non senza gran difficoltà se ne può formar concetto; e perciò difficilissimo s'imo à poter dimostrare, ch'vna quantità comensurabile ad vn'altra accresciuta fin che diuenga incomensurabile, tale accrescimento non possa fare tal composto con la prima, che comparata ad vna terza produca proportion minore di quella, che haueua à quella terza prima dell'accrescimento. E quanto questo Theorema è più difficile à dimostrarsi, tanto l'antedetta definizione è più oscura, è dipende da passione remotissima. Per il che tutta la macchina delle passioni appoggiate à questa definizione, con quel che gli segue appresso, resta indimostrato. E benchè si potrebbe dire, aderendo alla sentenza del P. Clauio, che le definizioni sono nomi posti ad arbitrio, e che basta à questi Autori hauer spiegato quello, che si deue concepire quando nel progresso delle sue dimostrazioni dirà maggiore, ò minor proportion, cioè che quando dirà maggiore, ò minor proportion, si debba intendere di quella da loro definita, poco importando che sia più questa, che quella proportion: non intendo qui esaminare le ragioni del P. Clauio, mà dirò bene, che non altro intese Euclide nella sesta definizione, di questo quinto Libro, quando disse; All' hora chiamaremo la prima alla seconda hauer l'istessa proportion, quale hà la terza alla quarta, quando gli uguali multipli della prima, e terza, secondo qualunque multiplicatione, sono tutti due ò maggiori, ò minori, ouero uguali, à gli uguali multipli della seconda, e quarta, presi secondo qualunque multiplicatione; volendo inscrivere, che quando dirà la proportion della prima alla seconda essere la medesima, qual'è quella della terza alla quarta, si debba intendere, che questi quattro termini, frà quali si dice caderui proportionalità, ritenghino tal passione, che gli uguali multipli del primo, e terzo termine, secondo qualunque multiplicatione, siano tutti due ò maggiori, ò minori, ò uguali à gli uguali multipli del secondo, e quarto, secondo qualunque multiplicatione: pigliando le quantità in genere, senza fare alcuna distinctione di commensurabile, ed incomensurabile, voci tutte introdotte da gl'interpreti, e che mai sono state ne meno sognate da Euclide, prima del suo decimo libro, doue ne dimostra le passioni; conoscendo bene, che douendosi trattare delle proportioni, nelle quantità in genere, altra definizione non gli potua conuenire, che quella espressa da lui co' gli uguali multipli, atteso che gli uguali multipli si possono prendere d'ogni quantità.

THEOREMA I. PROPOSITIONE I.

Se quante grandezze si vogliano siano vguualmente, moltiplici d'altrettante grandezze, si come vna è moltiplice di vna, così tutte sono moltiplici di tutte.

Siano quante grandezze si vogliano AB, CD, vguualmente moltiplici di altrettante grandezze, come E, ed F. Dico che le grandezze AB, CD insieme, sono moltiplici delle grandezze E, & F insieme, come AB è moltiplice di E; ouero come CD è moltiplice di F.

A G H B C I K D

E — F —

Perche AB è moltiplice di E, come CD è moltiplice di F, tante volte AB è misurata da E, per quante volte CD è misurata da F. Si diuida AB nelle parti vguale ad E, che siano AG, GH, HB; e si diuida CD nelle parti vguale ad F, che siano CI, IK, KD; tante parti faranno in AB vguale ad E, per quante ne sono in CD vguale ad F. In oltre perche AG è vguale ad E, e la grandezza CI è vguale ad F, le due AG, CI insieme faranno vguale alle due E, & F insieme. Similmente perche GH è vguale ad E, ed IK è vguale ad F, le due GH, & IK insieme faranno vguale alle due E, ed F insieme. Nell'istesso modo le due HB, KD insieme, sono vguale alle due E, ed F insieme; e perciò tante volte le due AB, CD insieme, sono misurate dalle due E, ed F insieme, per quante volte AB è misurata da E, ouero CD, è misurata da F. Per la qual cosa le due AB, CD insieme, sono moltiplici delle due E, ed F insieme, come AB è moltiplice di E, ouero CD è moltiplice di F, ch'era da dimostrare.

a Scol. alla
2. def. del 5.

b 2. a. iom.

c Scol. alla
2. def. di
quello.

THEOREMA II. PROPOSITIONE II.

Se la prima è moltiplice della seconda, come la terza è moltiplice della quarta; e la quinta è moltiplice della seconda, come la sesta è moltiplice della quarta; la composta della prima, e quinta sarà moltiplice della seconda, come la composta della terza, è sesta, è moltiplice della quarta.

Sia la prima AB moltiplice della seconda C, come la terza DE è moltiplice della quarta F; e la quinta BG sia moltiplice della seconda C, come la sesta EH è moltiplice della quarta F. Dico, che AG, composta della prima, e quin-

A B G

C

D E H

F


Bb

ta,

ta, è multiplice della seconda C, come DH, composta della terza, e sesta, è multiplice della quarta F.

a Scol. alla
2. defin. di
questo.

Perche A B è multiplice di C, come DE è multiplice di F, ^a tante volte A B sarà misurata da C, per quante volte DE è misurata da F. Similmente perche BG è multiplice di C, come EH è multiplice di F, tante volte BG sarà misurata da C, per quante volte EH è misurata da



F: ma si disse che AB è tante volte misurata da C, per quante volte DE è misurata da F; sarà tutta AG misurata tante volte da C, per quante volte DH è misurata da F, e perciò AG è multiplice di C, ^b come DH è multiplice di F. Per la qual cosa AG composta della prima, e quinta, è multiplice della seconda C, come DH, composta della terza, e sesta, è multiplice della quarta F, ch'era da dimostrarfi.

b Scol. alla
2. defin. di
questo.


THEOREMA III. PROPOSITIONE III.

Se la prima è multiplice della seconda, come la terza, è multiplice della quarta; gli vguali multipli della prima, e terza, sono ancora vguali multipli della seconda, e quarta.

Sia la prima A multiplice della seconda B, come la terza C è multiplice della quarta D; e siano presi gli vguali multipli della prima A, e della terza C, che siano E, ed F. Dico che E, ed F sono ancora vguali multipli della seconda B, e della quarta D.

a Scol. alla
2. defin. di
questo.

Perche le due E, ed F, per ipotesi, sono vguali multipli delle due A, & C, tante volte la quantità E sarà misurata da A, ^a per quante volte la quantità F è misurata da C; si diuidi la quantità E nelle parti vguali ad A, che siano EG, GH, HI, e si diuidi la quantità F nelle parti vguali à C, che siano FK, KL, LM.



Perche le due EG, FK sono vguali alle due A, & C, e le due A, & C sono vguali multipli delle due B, & D, le due EG, FK faranno vguali multipli delle due B, & D. Per l'istessa ragione le due GH, KL sono vguali multipli delle due B, & D; e le due HI, LM sono vguali multipli delle due B, & D. Hor essendo la prima EG multiplice della seconda B, come la terza FK è multiplice della quarta D; e la quinta GH è multiplice della seconda B, come la sesta KL è multiplice della quarta D; sarà, per l'antecedente propositione, EH composta della prima, e quinta multiplice della seconda B, come FL composta della terza, e sesta, è

mul-

multiplice della quarta B. Di nuouo perche la prima EH è multiplice della seconda D, come la terza FL è multiplice della quarta D; e la quinta HI è multiplice della seconda B, come la sesta LM è multiplice della quarta D; farà per l'antecedente proposizione, EI composta della prima, e quinta, multiplice della seconda B, come FM composta della terza, e sesta, è multiplice della quarta D. Per la qual cosa le quantità E, ed F sono vguali multipli delle due B, & D, come fu proposto dimostrare.

THEOREMA IV. PROPOSITIONE IV.

Se di quattro quantità habbia la prima alla seconda la medesima proportionione, quale hà la terza alla quarta; e sono presi gli vguali multipli della prima, e terza, secondo qualunque multiplicatione; e similmente sono presi gli vguali multipli della seconda, e quarta, secondo qualunque multiplicatione: il multiplice della prima hauerà la medesima proportionione al multiplice della seconda, quale hà il multiplice della terza al multiplice della quarta.

Siano le quattro quantità A, B, C, D, ed habbia la prima A alla seconda B, l'istessa proportionione, che hà la terza C, alla quarta D; e siano presi gli vguali multipli della prima A, e terza C, secondo qualunque multiplicatione, che siano E, ed F; similmente siano presi gli vguali multipli della seconda B, e quarta D, secondo qualunque multiplicatione, che siano G, ed H. Dico che la proportionione di E à G è l'istessa, che la proportionione di F, ad H.

Si prendano gli vguali multipli delle due E, ed F, secondo qualunque multiplicatione, che siano I, & K; e si prendano gli vguali multipli delle due G, ed H, secondo qualunque multiplicatione, che siano L, ed M, e si considerino quattro quantità, la prima E, la seconda A, la terza F, e la quarta C. Perche la prima E è multiplice della seconda A, come la terza F è multiplice della quarta C, e per costruzione I, & K sono vguali multipli della prima E, e terza F, per l'antecedente proposizione, le due I, & K sono ancora vguali multipli di A, & C. Di nuouo, perche G, & H sono vguali multipli di B, & D, e le due L, ed M sono per costruzione,



B b 2

vguali

vguali multipli di G, ed H; per l'antecedente proposizione, le due L, ed M sono vguali multipli delle due B, & D. In oltre, perche la prima A alla seconda B, per ipotesi è come la terza C alla quarta D, e le due I, & K sono vguali multipli della prima A, e terza C; come anco le due L, ed M sono vguali multipli della seconda B, e quarta D; per la conuersa alla sesta definitione, se I è maggiore di L, ancora K farà maggiore di M, e se I è minore, ò vguale ad L, ancora K farà minore, ò vguale ad M, perche se questo nõ fusse, non farebbe la proportion di A à B, come quella di C à D, ch'è contro all'ipotesi.

Si considerino quattro altre quantità, cioè la prima E, la seconda G, la terza F, e la quarta H. Gli vguali multipli della prima E, e terza F, per costruzione, sono I, & K, e gli vguali multipli della seconda G, e quarta H, sono le due L, ed M. E perche I, ch'è multiplice della prima, essendo maggiore di L, multiplice della seconda, ancora K, ch'è multiplice della terza, per quel che s'è dimostrato, è maggiore di M, multiplice della quarta; e se I è minore, ò vguale ad L, ancora K è minore, ò vguale ad M; per la 6. definitione di questo, la prima E alla seconda G, hauerà l'istessa proportion, quale hà la terza F alla quarta H. Per la qual cosa il multiplice della prima al multiplice della seconda, è come il multiplice della terza al multiplice della quarta, come fu proposto dimostrare.



C O R O L L A R I O .

Da quel, che s'è detto nell'antecedente dimostrazione, facilmente si caua la dimostrazione della proportion inuerfa, spiegata da Euclide nella 14. definitione; cioè se quattro quantità sono proportionali, inuertendo sono ancora proportionali.

Habbia l'antecedente A al conseguente B l'istessa proportion, quale hà l'antecedente C al conseguente D. Dico che inuertendo, il conseguente B all'antecedente A è come il conseguente D all'antecedente C.


Si prendano gli vguali multipli della prima A, e terza C, secondo qualunque multiplicatione, che siano E, ed F; e si prendano gli vguali multipli della seconda B & quarta D, secondo qualunque multiplicatione, che siano G, ed H. Perche la proportion di A à B, per ipotesi è come quella di C à D, per la cōuersa della sesta definitione, se E è maggiore di G, ancora F sarà maggiore di H; se E è minore, ò vguale à G, ancora F sarà minore, ò vguale ad H; perche se altrimenti fosse, nõ sarebbe la proportion di A à B come quella di C à D. Hor se E è maggiore di G, ed ancora F è maggiore di H, sarà all'incontro G minore di E, ed ancora H minore di F; similmente se E è minore di G, ed ancora F è minore di H, all'incōtro G sarà maggiore di E, ed ancora H sarà maggiore di F; e se E, & F sono vguali alle due G, ed H, all'incontro G, & H saranno vguali ad E, & F. D'onde è manifesto, che se G è maggiore di E, ancora H è maggiore di F; se G è minore, ò vguale ad E, ancora H sarà minore, ò vguale ad F. Si prenda B come prima quantità, la seconda sia A, la terza D, e la quarta C; delle quali G, ed H, per costruzione, sono vguali multipli di B, & D, ch'è la prima, e terza; & E, ed F sono vguali multipli di A, & C, che sono la seconda, e quarta. E perche G multiplice della prima B s'è maggiore di E multiplice della seconda A, ancora H, ch'è multiplice della terza D, è maggiore di F, ch'è multiplice della quarta C; e se G è minore, ò vguale ad E, ancora H è minore, ò vguale ad F; e per la sesta definitione di questo, la prima B alla seconda A hauerà l'istessa proportion, quale hà la terza D alla quarta C. Per la qual cosa se A à B è come C à D, inuertendo, B ad A farà come D à C, ch'era da dimostrarsi.



THEOREMA V. PROPOSITONE V.

Se il tutto è multiplice del tutto, come la parte detratta è multiplice della parte detratta; il rimanente sarà multiplice del rimanente, come il tutto è multiplice del tutto.

Sia il tutto A B multiplice del tutto C D, come la parte AE è multiplice della parte C F. Dico che l'auanzo E B è multiplice dell'auanzo F D, come il tutto A B è multiplice del tutto C D.



Si concepisca la quantità GC talmente, che EB sia multiplice di GC, come AE è multiplice di CF; farà tutta AB multiplice di tutta GF, come AE è multiplice di CF. Mà per ipotesi AE è multiplice di CF, come


s. 1. del 5.

tutta

b 6. affom.

c 3. affom.


tutta AB è multiplice di tutta CD, farà AB multiplice di GF, come la medesima AB è multiplice di CD. Per la qual cosa GF^b farà vguale à CD. Se ne leui la comune CF, resta GC^c vguale ad FD. Ma per costruzione EB è multiplice di GC, come AE è multiplice di CF, farà l'auanzo EB multiplice dell'auanzo FD, come AE è multiplice di CF; cioè come il tutto AB è multiplice del tutto CD, ch'era da dimostrarfi.



THEOREMA VI. PROPOSITIONE VI.

Se due grandezze sono vgualmente multiplici di due altre quantità, e le parti detratte dalle due grandezze sono vgualmente multiplici di quelle quantità; i rimanenti ò sono vguali, ouero vgualmente multiplici di quelle due quantità.

Sia AB multiplice di E, come CD è multiplice di F; e la parte AG sia multiplice di E, come la parte CH è multiplice di F. Dico che se il restante GB è vguale ad E, ancora il restante HD è vguale ad F; e se GB è multiplice di E, farà HD vguale multiplice di F. Sia nel primo luogo GB vguale ad E. Dico che HD è vguale ad F. Si concepisca IC vguale ad F. Perche AG è multiplice di E, come CH è multiplice di F, tante volte AG è misurata da E, quante volte CH è misurata da F: Ma per ipotesi GB è vguale ad E, e per costruzione IC è vguale ad F; tante volte AB sarà misurata da E, per quante volte IH è misurata da F; e perciò AB è multiplice di E, come IH è multiplice di F. Ma per ipotesi AB è multiplice di E, come CD è multiplice di F; farà IH multiplice di F, come CD multiplice della medesima F; e perciò IH^b farà vguale à CD: se ne leui la comune CH, resta IC^c vguale ad HD; ma IC è posta vguale ad F, farà HD^d vguale ad F, come GB è vguale ad E, ch'era da dimostrarfi nel primo luogo.



a Scel. alla

2. defin. di

quello.

b 6. affom.

c 3. affom.

d 1. affom.

Di nouo, supposto che GB sia multiplice di E. Dico che HD è vguale multiplice di F. Si concepisca la quantità CI in modo, che IC sia multiplice di F, come GB è multiplice di E. Perche la prima AG, per ipotesi, è multiplice della seconda E, come la terza CH è multiplice della quarta F; e la quinta GB, per costruzione, è multiplice della seconda E, come la sesta IC è multiplice della quarta F; farà AB, composta della prima, e quinta, multiplice della seconda E, e come IH, composta della terza, e sesta, è multiplice della quarta F: Ma AB è multi-

e 1. del 5.

plice


plice di E, come CD è multiplice di F; farà IH multiplice di F, come CD è multiplice della medesima F; e perciò IH, & CD ſono frà di loro vguali; detratta la commune CH, reſta IC vguale ad HD; ma IC è multiplice di F, come GB è multiplice di E; farà HD multiplice di F, come GB è multiplice di E, ch'era da dimoſtrarſi.

f 6. aſſom.
g 1. aſſom.

THEOREMA VII. PROPOSITIONE VII.

Le quantità vguali hanno l'ſteſſa proportionc ad vna medeſima grandezza; e quella grandezza hà l'ſteſſa proportionc alle quantità vguali.

Siano le grandezze A, & B vguali frà di loro, e ſia C qualunque terza quantità. Dico prima. che la proportionc della grandezza A alla grandezza C, è l'ſteſſa che la proportionc di B alla medeſima C. Si prendano gli vguali multipli



di A, & B, ſecondo qualunque multiplicatione, che ſiano D, ed E; e ſi prenda F multiplice di C, ſecondo qualunque multiplicatione. Perche le due A, & B, per ipotefi, ſono frà di loro vguali, i loro vguali multipli D, ed E, faranno frà di loro vguali; dal che ſe D è vguale ad F, ancora E farà vguale alla medeſima F; ſe D è maggiore di F, ancora E farà maggiore di F; e ſe D è minore di F, ancora E farà minore di F. Si conſiderino quattro quantità, cioè A prima, C ſeconda, B terza, e la quarta ſia C; di modo che C rappreſenta la ſeconda, e la quarta. Le due D, & E ſono gli vguali multipli della prima A, e della terza B; e la quantità F, farà l'vguale multiplice della ſeconda, e quarta C. E perche D, multiplice della prima, s'è maggiore di F, multiplice della ſeconda, ancora E multiplice della terza, è maggiore di F, multiplice della quarta; e ſe D è minore, ò vguale ad F; ancora E è minore, ò vguale ad F, per la ſeſta definizione di queſto, la proportionc della prima A alla ſeconda C è come quella della terza B alla quarta C. Per la qual coſa le quantità vguali hanno l'ſteſſa proportionc ad vna terza quantità, ch'era da dimoſtrarſi nel primo luogo.

a b aſſom.

Di nuouo dico che C hà l'ſteſſa proportionc ad A, quale hà à B.

Eſſendoſi dimoſtrato D vguale ad E, ſe F è maggiore di D, farà ancora maggiore di E; e ſe F è minore, ò vguale à D, farà ancora minore, ò vguale ad E. Si conſiderino quattro quantità, la prima C, la ſeconda A, la terza C, e la quarta B. Gli vguali multipli della prima, e terza C, vengono ambidue rappreſentati dalla medeſima quantità F; e gli vguali multipli della ſeconda A, e terza B, ſono D, ed E; e perche F multiplice della prima C, s'è maggiore di D, multiplice della ſeconda A, ancora F, multiplice della terza C, è maggiore di E, multiplice della quarta E; e ſe F è minore, ò vguale à D, la medeſima F è ancora minore, ò vguale ad E; farà, per la citata 6. definizione, la proportionc della prima C alla ſe-


conda

conda A, come quella della terza C alla quarta B. Per la qual cosa vna terza quantità hà l'istessa proportionione alle quantità vgnali, ch'era da dimostrarli.

COROLLARIO.

Dall'antecedente propositione si caua, che l'vgnali quantità hanno la medesima proportionione ad altre quantità vgnali.

Come per esemplo sia A vgnale à B, e la quantità C vgnale à D. Dico, che la proportionione di A à C è come quella di B à D. Si prendano gli vgnali multipli di A, & B secondo qualunque multiplicatione, che siano E, & F; sarà E vgnale ad F. Similmente si



a 6. all'om.


prendano gli vgnali multipli di C, & D secondo qualunque multiplicatione, che siano G, ed H; e sarà G vgnale ad H. Hor perche le due E, F sono fra di loro vgnali; le due G, H sono fra di loro vgnali; se E sarà vgnale à G, ancora F sarà vgnale ad H; se E è maggiore, è minore di G, ancora F sarà maggiore, è minore di H. Si considerino le quattro quantità, cioè A prima, C seconda, B terza, & D quarta. Gli vgnali multipli della prima A, e terza B, sono E, ed F, e gli vgnali multipli della seconda C, e quarta D, sono G, ed H; E perche E, multiplice della prima, è maggiore di G, multiplice della seconda, ancora F, multiplice della terza, è maggiore di H, multiplice della quarta; e se la quantità E è minore, è vgnale à G, ancora F è minore, è vgnale ad H; per la sesta definitione di questo, la prima A alla seconda C, hà l'istessa proportionione, quale hà la terza B alla quarta D. Per la qual cosa le quantità vgnali hanno l'istessa proportionione ad altre quantità vgnali, come sù proposto.

THEOREMA VIII. PROPOSITIONE VIII.

Delle quantità ineguali, la maggiore hà maggior proportionione ad vna terza, che la minore alla medesima terza; e la terza hà maggior proportionione alla minore, che alla maggiore.

Siano le quantità ineguali, cioè AB maggiore, & C minore; e la terza sia qualunque quantità D, del medesimo genere. Dico prima che la proportionione della maggiore AB alla terza D, è maggiore che la proportionione della minore C alla medesima quantità D.

S'intenda dettratta da AB la parte



A E

AE vguale alla minore C; si prendano gli vguali multipli delle due AE, EB, in modo, ch'il multiplice di EB sia maggiore di D, ed il multiplice di AE non sia minore della medesima D, ma ò sia vguale, ouero maggiore; e siano FG, GH, cioè che FG sia multiplice di BE, come HG è multiplice di AE; ed il multiplice sia preso di tanta grandezza, che FG sia maggiore di D, & HG, ò sia vguale, ò maggiore di D. Si prenda poi IK multiplice di D, che sia prossimo maggiore ad HG; si tagli da IK la parte KL vguale alla quantità D. Perche IK è multiplice di D, ed è prossimo maggiore di HG, dettane la parte KL: ch'è vguale à D, resta IL non maggiore di HG, cioè HG non è minore di IL. In oltre perche FG, per costruzione, è maggiore di D, e la quantità D è vguale ad LK, sarà GF maggiore di LK. Ma HG non è minore di IL, sarà tutta HF maggiore di IK. Di più, perche FG è multiplice di EB, come HG è multiplice di AE, tutta HF sarà multiplice di tutta AB, come HG è multiplice di AE; ma AE fù fatta vguale à C; sarà HF multiplice di AB, come HG è multiplice di C. Per la qual cosa le due HF, HG sono vguali multipli delle due AB, & C. Si considerino quattro quantità AB prima, D seconda, C terza, e D quarta, di modo, che la quantità D serua per seconda, e per quarta quantità. Gli vguali multipli della prima AB, e terza C sono HF, & HG; e gli vguali multipli della seconda, e quarta D, vengono rappresentati dalla sola quantità IK. Hor perche HF, ch'è multiplice della prima AB, è maggiore di IK, ch'è multiplice della seconda D; ed HG, multiplice della terza C, per costruzione non è maggiore di IK multiplice della quarta D, per l'ottaua definizione di questo, la prima AB hauerà maggior proportionc alla seconda D, che la terza C alla quarta D, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

Di nouo dico, che la terza quantità D ha maggior proportionc alla minore C, che alla maggiore AB. Si considerino quattro quantità, cioè D prima, C seconda, D terza, & AB quarta. Gli vguali multipli della prima, e terza D, è la quantità KI; e gli vguali multipli della seconda C, e quarta AB, sono HG, & HF. E perche IK, multiplice della prima D, per costruzione, è maggiore di HG multiplice della seconda C; & IK, multiplice della terza D, non è maggiore di HF, multiplice della quarta AB; per l'ottaua definizione di questo, la prima D alla seconda C, ha maggior proportionc, che la terza D alla quarta AB. Per la qual cosa vna terza quantità ha maggior proportionc alla minore, che alla maggior quantità, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA IX. PROPOSITIONE IX.

Le grandezze, che hanno la medesima proportionc ad vna terza quantità, sono frà di loro vguali; e quelle grandezze, alle quali vna terza quantità ha l'istessa proportionc, sono frà di loro vguali.

Habbiano prima le due A, & B $\overline{A}$ $\overline{B}$
 istessa proportionione à qualunque terza $\overline{C}$

a 5. del 5. Dico che sono frà di loro vguali.
 Se non sono vguali vna delle due sarà maggiore; e supposto che A sia maggiore di B, hauerà maggior proportionione A alla terza C, che B alla medesima C, ch'è contro all'ipotesi. Non dunque le quantità A, & B sono ineguali, ma sono frà di loro vguali.

b 8. del 5. Di nuouo se la grandezza C, hà l'istessa proportionione alle due A, & B. Dico che A è vguale à B. Se A, & B, non sono frà di loro vguali, vna delle due sarà maggiore. Supposto che A sia minore di B, hauerà C ad A. b. maggior proportionione, che la medesima C à B, ch'è contro all'ipotesi. Non dunque A, & B sono ineguali, ma sono frà di loro vguali, come fu proposto dimostrare.

THEOREMA X. PROPOSITIONE X.

Delle quantità, che hanno proportionione ad vna terza, quella, che hà maggior proportionione, è maggiore; e quando la terza hà proportionione ad altre quantità, quella, alla quale hà maggior proportionione, è minore.

Habbia prima la grandezza A $\overline{A}$ $\overline{B}$
 maggior proportionione alla terza $\overline{C}$
 C di quella, che hà B alla medesima C. Dico che A è mag-

a 7. del 5. giore di B. Non sono A, & B frà di loro vguali, perche: hauerebbero la medesima proportionione à C, ch'è contro all'ipotesi. Sia dunque A minore di B, in tal caso A à C hauerà b minor proportionione, che B alla medesima C, ch'è contro all'ipotesi. Non dunque A è minore, ne vguale, ma è maggiore di B.

c 7. del 5. Di nuouo habbia C maggior proportionione à B, che la medesima C ad A. Dico che B è minore di A. Non può essere B vguale ad A, stante che C = hauerebbe l'istessa proportionione alle due B, & A, ch'è contro all'ipotesi. Sia dunque B maggiore di A, hauerà maggior proportionione C ad A, d che la medesima C à B; sù supposto C hauere maggior proportionione à B, hauerebbe maggiore, e minor proportionione à B, ch'è impossibile. Non dunque B è maggiore, ne vguale, ma è minore di A, come fu proposto dimostrare.

THEOREMA XI. PROPOSITIONE XI.

Le proportioni, che sono le medesime ad vna terza, sono le medesime frà di loro.

Siano le proportioni di A à B, e di C à D, le medesime, che la proportionione di E ad F. Dico che la proportionione di A à B è l'istessa, che la proportionione di C à D.

Si prendano gli vguali multipli di tutti gl'antecedenti A, E, C, secondo qualunque multiplicatione, che siano G, I, H; e si prendano gli vguali multipli di tutti i conseguenti B, F, D, secondo qualunque multiplicatione, che siano K, M, L.

Si considerino quattro quantità, cioè A prima, B seconda, E terza, ed F quarta. Gli vguali multipli della prima A, e terza E, sono per costruzione G, ed I; e gli vguali multipli della seconda B, e quarta F, sono K, ed M. E perche, per ipotesi, la proportion di A à B, è come quella di E ad F, per la natura della medesima proportion spiegata nella sesta definitione, se G è maggiore di K, ancora I sarà maggiore di M; se G è minore, ò vguale à K, ancora I sarà minore, ò vguale ad M; perche se fosse altrimenti, non farebbe la proportion di A à B come quella di E ad F, ch'è contro all'ipotesi. Di nouo si considerino quattro altre quantità, cioè la prima E, la seconda F, la terza C, e la quarta D. Gli vguali multipli della prima E, e terza C sono I, ed H; e gli vguali multipli della seconda F, e quarta D sono M, ed L. E perche la prima E alla seconda F, per ipotesi, è come la terza C, alla quarta D; per le ragioni antedette, se I è maggiore di M, ancora H sarà maggiore di L; se I è minore, ò vguale ad M, ancora H sarà minore, ò vguale ad L. Ma fu dimostrato, ch'essendo I maggiore di M, ancora G, è maggiore di K; e se I è minore, ò vguale ad M, ancora G è minore, ò vguale à K; perciò se G è maggiore di K, ancora H sarà maggiore di L; e se G è minore, ò vguale à K, ancora H sarà minore, ò vguale ad L. Si considerino finalmente quattro altre quantità, cioè A prima, B seconda, C terza, e D quarta. Gli vguali multipli della prima A, e terza C, sono per costruzione, le due G, ed H. Similmente gli vguali multipli della seconda B, e quarta D, sono K, ed L. E perche s'è dimostrato, che se G, multiplice della prima A, è maggiore di K, multiplice della seconda B, ancora H, multiplice della terza C, è maggiore di L, multiplice della quarta D; e se G è minore, ò vguale à K, ancora H è minore, ò vguale ad L; per la sesta definitione di questo, la proportion della prima A alla seconda B è l'istessa, che la proportion della terza C alla quarta D. Per la qual cosa quelle proportioni, che sono le medesime ad vna terza, sonò fra di loro le medesime, ch'era dimostrarsi.

THEOREMA XII. PROPOSITIONE XII.

Se saranno quante grandezze si vogliano proportionali, la proportion che hà vn'antecedente ad vn conseguente,

haueranno tutti gli antecedenti insieme à tutti i conseguenti insieme.

Siano quante grandezze si vogliano proportionali come A, B, C, D, E, F; cioè la proportion di A à B sia P istessa, che quella di C à D; e la proportion di C à D sia come quella di E ad F. Dico che tutti gli antecedenti A, C, E insieme, à tutti i conseguenti B, D, F insieme, sono come vn antecedente ad vn conseguente, cioè come A à B.



a. del 5.

Si prendano gli vguali multipli di tutti gli antecedenti A, C, E, secondo qualunque multiplicatione, che siano G, H, I: saranno le quantità C, H, I, insieme, multipli delle tre A, C, E insieme, a come G è multiplice di A. Similmente si prendano gli vguali multipli di tutti i conseguenti B, D, F, secondo qualunque multiplicatione, che siano K, L, M; saranno le quantità K, L, M insieme, multipli de' i conseguenti B, D, F, insieme, b come K è multiplice di B.



b. del 5.

In oltre perche la prima A alla seconda B, per ipotesi, è come la terza C alla quarta D; sono, per costruzione le due G, H vguali multipli della prima A, e terza C; e le due K, L, sono vguali multipli della seconda B, e quarta D, per la natura della medesima proportion spiegata nella sesta definitione, se G è maggiore di K, ancora H sarà maggiore di L; se G è minore, è vguale à K, ancora H sarà minore, è vguale ad L. E perche C à D, per ipotesi, è come E ad F, si prouerà nell' istesso modo, che se H è maggiore di L, ancora I è maggiore di M; e se H è minore, è vguale ad L, ancora I sarà minore, è vguale ad M. Per la qual cosa se G, H, I, insieme, sono maggiori di K, L, M, insieme, ancora G sarà maggiore di K; e se G, H, I, insieme, sono minori, è vguale à K, L, M insieme, ancora G sarà minore, è vguale à K.



Si considerino quattro quantità, la prima delle quali siano tutti gli antecedenti A, C, E insieme; la seconda siano i conseguenti B, D, F insieme; la terza sia l'antecedente A; e la quarta il conseguente B. Gli vguali multipli della prima A, C, E, e della terza A, per quel che si disse, sono G, H, I, & G; gli vguali multipli della seconda B, D, F, è della quarta B sono K, L, M, & K. E perche se G, H, I, multiplice della prima A, C, E è maggiore di K, L, M, multiplice della seconda B, D, F, ancora G, multiplice della terza A, sarà maggiore di K, multiplice della quarta B; e se G, H, I è minore, è vguale à K, L, M, ancora G sarà minore, è vguale à K, per la 6. defin. di questo, la prima A, C, E, alla seconda B, D, F, sarà come la terza A alla quarta B. Per la qual cosa tutti gli antecedenti A, C, E, à tutti li conseguenti B, D, F, sono come vn antecedente, cioè A, ad vn.

conse-

consequente , cioè B, ch'era da dimostrarsi .

THEOREMA XIII. PROPOSITIONE XIII.


Se la prima alla seconda hà l'istessa proportionè , che la terza alla quarta ; e la terza alla quarta hà maggior proportionè , che la quinta alla sesta ; hauerà la prima alla seconda maggior proportionè , che la quinta alla sesta.

Habbia la prima A alla seconda B , l'istessa proportionè , che la terza C alla quarta D ; ed habbia la terza C alla quarta D ; maggior proportionè , che la quinta E alla sesta F . Dico , che la proportionè della prima A alla seconda B è maggiore , che la proportionè della quinta E alla sesta F .

Si prendano gli vguali multipli de i consequenti B, D, F, secondo qualunque multiplicazione , che siano K, L, M .

Perche , per ipotesi , la proportionè di C à D , è maggiore della proportionè di E , ad F , secondo la natura della maggior proportionè , spiegata nell'ottava definizione di questo , gli vguali multipli della prima C , e terza E , secondo tutte le multiplicazioni , non saranno sempre , ò tutti due maggiori , ò tutti due minori , ò tutti due vguali , à gli vguali multipli della seconda D , e quarta F ; perche se fossero sempre maggiori , ò minori , ò vguali à gli vguali multipli di D , ed F , la proportionè di C à D , per la sesta definizione di questo , sarebbe l'istessa , che la proportionè di E ad F , ch'è contro all'ipotesi ; e perciò nella moltitudine delle multiplicazioni qualcheduna ve ne sarà , secondo la quale , pigliando gli vguali multipli della prima C , e terza E , come H , ed I , se H è maggiore di L , la quantità I non sarà maggiore di M . Si prenda poi G multiplice di A , come H è multiplice di C , in modo , che le tre G , H , I siano vguali multipli de i tre antecedenti A , C , E .

In oltre si considerino quattro quantità , delle quali C sia la prima , la seconda D ; la terza A , e la quarta B . Perche , per ipotesi , la prima C alla seconda D è come la terza A alla quarta B ; essendo H , & G vguali multipli della prima C , e terza A , e le due , L , & K sono vguali multipli della seconda D , e quarta B ; per la natura della medesima proportionè spiegata nella sesta definizione di questo , se H è maggiore di L , ancora G sarà maggiore di K , ma , per quel che s'è detto , la quantità H è per costruzione maggiore di L , in conseguenza G sarà ancora maggiore di K ; ma si disse , ch'è



sen-

sendo H maggiore di L, la quantità I non sarà maggiore di M; essendo dunque G maggiore di K, la quantità I non sarà maggiore di M. Si considerino quattro altre quantità, cioè A prima, B seconda, E terza, ed F quarta. Per costruzione gli uguali multipli della prima A, e terza E, sono le due G, ed I; e gli uguali multipli della seconda B, e quarta F, sono K, ed M; e perchè G, ch'è multiplice della prima, è maggiore di K, multiplice della seconda; ed I multiplice della terza non è maggiore di M multiplice della quarta; per l'ottava definizione di questo, la prima A alla seconda B, ha maggior proporzione, che la terza E alla quarta F, come s'è proposto dimostrare.

S C O L I O.

Se la prima E alla seconda F hauesse maggior proporzione, che la terza C alla quarta D; e la proporzione di C à D fosse l'istessa, che la proporzione della quinta A alla sesta B; tenendo il medesimo ordine di prima, si dimostrerà, che la proporzione di E ad F è maggiore della proporzione di A à B. Perchè hauendo E ad F maggior proporzione, che C à D, si prouerà, che se I è maggiore di M, la quantità H non sarà maggiore di L; ma se H non è maggiore di L, ne meno G è maggiore di K; e perciò se I è maggiore di M, la quantità G non sarà maggiore di K; e per l'ottava definizione di questo, E ad F hauerà maggior proporzione, che A à B.

Dond'è manifesto, che se A à B ha l'istessa proporzione, che C à D, & hà C à D minor proporzione, che E ad F, hauerà A à B minor proporzione, che E ad F; mentre tanto è dire, che E ad F ha maggior proporzione, che A à B, quanto che A à B ha minor proporzione, che E ad F.

Se poi A à B ha maggior proporzione, che C à D, & hà C à D maggior proporzione, che E ad F; sarà manifesto, che A à B ha molto maggior proporzione, che E ad F.

E se A à B ha minor proporzione, che C à D; & hà C à D minor proporzione, che E ad F; hauerà A à B minor proporzione, che E ad F. Il che tutto si dimostra secondo il modo tenuto prima.

THEOREMA XIV. PROPOSITIONE XIV.

Se la prima alla seconda ha l'istessa proporzione; che la terza alla quarta, e la prima è maggiore della terza, la se-

conda

a 8. defin.
del 5.
b 6. defin.
del 5.



conda sarà maggiore della quarta; se la prima è vguale alla terza, la seconda sarà vguale alla quarta; e se la prima è minore della terza, la seconda sarà minore della quarta.

Habbia la prima A alla seconda B l'istessa proportionione, che la terza C alla quarta D. Dico prima, che se A è maggiore di C, ancora B sarà maggiore di D. Perche A è maggiore di C, presa B come terza quantità, hauerà la maggiore A alla terza B ^a maggior proportionione, che la minore C alla medesima B. Ma la proportionione di C à D è l'istessa, che quella di A à B; hauerà C à D ^b maggior proportionione di quella, che hà la medesima C à B. Quando vna terza quantità hà proportionione à due, ^c quella, alla quale hà maggior proportionione, è minore; hauendo C maggior proportionione à D di quella, che hà à B, sarà D minore di B; cioè B maggiore di D, come A è maggiore di C, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

Di nuouo, supposto che A sia vguale à C.

Dico che B è vguale à D. Perche A è vguale à C, presa B come terza quantità, hauerà A à B ^d l'istessa proportionione, che hà C alla medesima B. Ma la proportionione di C à D è l'istessa, che quella di A à B; hauerà C à D ^e l'istessa proportionione, che la medesima C à B. Per la qual cosa B ^f è vguale à D, come A è vguale à C, ch'era da dimostrarsi nel secondo luogo.

Finalmente, supposto che A sia minore di C. Dico che B è minore di D. Perche A è minore di C, presa B, come terza quantità, la proportionione di A à B ^g sarà minore della proportionione di C à B. Ma la proportionione di C à D è l'istessa, che quella di A à B, hauerà C à D ^h minor proportionione di quella, che hà la medesima C à B. Quando vna terza quantità hà minor proportionione ad vna, che ad vn'altra quantità, ^k quella, alla quale hà minor proportionione, è maggiore; ma s'è detto, che C hà minor proportionione à D, che à B; sarà D maggiore di B, cioè B minore di D, come A è minore di C, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA XV. PROPOSITIONE XV.

Le parti hanno la medesima proportionione, quale hanno i loro corrispondenti vguali multiplici, quando sono del medesimo genere.

Sia A parte di CD, come B è C G H D E I K F parte di EF; cioè sia CD multiplice di A, come EF è multiplice di A, e le due A, & B, siano del medesimo genere. Dico che la proportionione di CD, ad EF, è come quella di A à B. Perche CD è multiplice di A,



a 8. del 5.

b 19. del 7.

c 10. del 5.

d 7. del 5.

e 11. del 5.

f 9. del 5.



g 8. del 5.

h 13. del 5.

k 10. del 5.



a Corol. alla
7. del 5.

b 12. del 5.

di A, come EF è multiplice di B; farà CD tante volte misurata da A, per quante volte EF è misurata da B. Si diuida CD nelle parti vguale ad A, che siano CG, GH, HD; e si diuida EF nelle parti vguale à B, che siano EI, IK, KF. Perché CG è vguale ad A, e la quantità EI è vguale à B; farà CG ad EI come A à B. Per l'istessa ragione GH ad IK farà come A à B; ed ancora HD à KF, farà come A à B. Hor se l'antecedente CG al conseguente EI, è come l'antecedente A al conseguente B; e gli antecedenti GH, HD; à i conseguenti IK, KF, presi separatamente, sono come l'antecedente A al conseguente B; faranno tutti gli antecedenti CG, GH, HD, insieme, à tutti i conseguenti EI, IK, KF insieme, come l'antecedente A al conseguente B. Per la qual cosa CD, ad EF; è come A à B, ch'era da dimostrarsi.


C G H D E I K F
A ————— B —————

S C O L I O.

La conuersa all'antecedente propositione .la faremo nel seguente modo .

Se la prima alla seconda hà l'istessa proportione , che la terza alla quarta ; e la prima è multiplice della terza, farà la seconda vguale multiplice della quarta .

Habbia AB à CD l'istessa proportione , quale hà E ad F , e sia AB multiplice di E ; Dico che CD è vguale multiplice di F . Se CD non è multiplice di F come AB è multiplice di E , si minuisca, o s'accresca CD in H in modo, che CH sia multi-



plice di F, come AB è multiplice di E ; e per l'antecedente propositi. AB à CH sarà come E ad F ; mà per ipotesi AB à CD, è come E ad F ; farà AB à CH come la medesima AB à CD . Dache le quantità CH, CD sono frà di loro vguale ; la parte vguale al tutto, ch'è impossibile . Non dunque CH è multiplice di F, come AB è multiplice di E ; mà farà CD multiplice di F, come AB è multiplice di E, ch'era da dimostrarsi.

COROLLARIO.

Da quel, che s'è detto è manifesto , che se AB à CD , è come E ad F , ed E è parte di AB, farà tale parte F di CD, quale parte è la quantità E di A B ; stante che C D è multiplice di F, come AB è multiplice di E .


Aut.

THEO-

THEOREMA XVI. PROPOSITIONE XVI.

Se quattro grandezze del medesimo genere sono proporzionali, permutando saranno ancora proporzionali.

Siano le quattro quantità A, B, C, D , del medesimo genere, & habbia l' antecedente A al conseguente B , l' istessa proporzione, che hà l' antecedente C al conseguente D . Dico che, permutando, l' antecedente A all' antecedente C , hauerà l' istessa proporzione, quale hà il conseguente B al conseguente D .



Si prendano gli vguali multipli di A , & B , secondo qualunque multiplicatione, che siano E , ed F : e similmente si prendano gli vguali multipli di C , & D , secondo qualunque multiplicatione, e siano G , ed H . Perche E , ed F sono vguali multipli delle loro parti A , & B , per l' antecedente propof. hauerà E ad F l' istessa proporzione di A à B . Per l' istessa ragione, essendo G , ed H vguali multipli delle due C , & D , la proporzione di G ad H farà come quella di C à D . Ma si disse, che A à B hà l' istessa proporzione, che hà C à D , hauerà A à B l' istessa proporzione, che hà G ad H ; fu dimostrata la proporzione di E , F come quella di A à B , hauerà E ad F la medesima proporzione, che hà G ad H . Dalche se la prima E è maggiore della terza G , & ancora la seconda F farà maggiore della quarta H . E se la prima E sarà minore, ò vguale à G , ancora F sarà minore, ò vguale ad H . Si considerino quattro quantità, delle quali A sia la prima, C la seconda, B la terza, e D la quarta. Gli vguali multipli della prima A , e terza B , per costruzione, sono le due E , & F ; e gli vguali multipli della seconda C , e quarta D , sono G , ed H . E perche E s'è maggiore di G , per quel che s'è dimostrato, ancora F è maggiore di H ; e se E fosse minore, ò vguale à G , ancora F sarebbe minore, ò vguale ad H ; per la 6. defin. di questo, la prima A alla seconda C , hà l' istessa proporzione, quale hà la terza B alla quarta D . Per la qual cosa quando A à B hà l' istessa proporzione, che C à D , permutando, hauerà A à C l' istessa proporzione, che hà B à D , come fu proposto dimostrare.

a 11. del 5.

b 11. del 5.

c 14. del 5.


S C O L I O.

L' antecedente dimostrazione hà solamente luogo quando le quattro quantità proporzionali sono del medesimo genere. Perche essendo le due E, F , vguale multipli delle due A, B ; saranno le quattro E, F, A, B del medesimo genere; e per l' istessa ragione le quattro G, H, C, D , saranno del medesimo genere: sicche se le due A, B , sono d' altro genere, che le due C, D ; le due E, F ,

D d


non

non faranno del medesimo genere con le due G, H : e perciò sarebbe errore il dire, che la quantità E sia maggiore, ò minore, ò uguale alla quantità G ; come ne meno si deue dire, che F sia maggiore, ò uguale, ò minore di H ; e perciò in modo alcuno puòauerui luogo la sesta definizione, dalla quale dipende la natura della medesima proportion; ed in conseguenza quando le quattro quantità proportionali non sono del medesimo genere, ne meno si possono permutare.



Dimostro Euclide nella 14. proposizione, che se quattro quantità sono proportionali, e la prima è maggiore, ò minore, ò uguale alla terza, che ancora la seconda è maggiore, ò minore, ò uguale alla quarta; mà perche i Geometri costumano spesso, quando la prima è maggiore, ò minore, ò uguale alla seconda, concludere, che anco la terza è maggiore, ò minore, ò uguale alla quarta, per non lasciare cos'alcuna mancante, la proueremo come s'è il Comandino, ed il Clauio nel seguente modo.

Habbia A à B l'istessa proportion che B à D . Dico che se A è maggiore di B , ancora C è maggiore di D ; e se A è uguale, ò minore di B , sarà C uguale, ò minore di D .



a 16. del 5.

Perche A à B è come C à D , permutando A à C sarà come B à D ; si che presa


A come prima quantità, C seconda, B terza, e D quarta; essendo la prima A alla seconda C , come la terza B alla quarta D , per la 14. proposizione di questo, se la prima A è maggiore della terza B , anco la seconda C sarà maggiore della quarta D ; e se A è minore, ò uguale à B , ancora C sarà minore, ò uguale à D , ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA XVII. PROPOSITIONE XVII.

Se le quantità composte sono proportionali, le medesime diuise saranno proportionali.

Habbia AB à BC l'istessa proportion, quale hà DE ad EF . Dico che, diuidendo, AC à CB hauerà l'istessa proportion, quale hà DF ad FE .

Si prendano gli vguale multipli delle quattro quantità A, C, B, D ; F, E , che siano GH, HI, KL, LM ; cioè GH sia multiplice di A ; C ; la quantità HI multiplice di CB ; la quantità KL , di DF ; e la quantità LM multiplice di FE . Perche GH è multiplice di A , come HI è multiplice di CB ; sarà



GI^a multiplice di AB, come GH è multiplice di AC; e per l'istessa ragione KM^a farà multiplice di ED, come KL è multiplice di DF. Ma per costruzione KL è multiplice di DF, come GH è multiplice di AC; farà MK multiplice di ED, come GH è multiplice di AC. Fù dimostrato GH multiplice di AC, come IG è multiplice di AB; farà MK multiplice di ED, come IG è multiplice di AB. Di nuouo si prendano due altri vguali multipli delle due CB, FE, secondò qualunque multiplicazione; e sia IN multiplice di CB, come MO è multiplice di FE. E perche IH è multiplice di CB, come ML è multiplice di FE; farà tutta NH^b multiplice di CB, come LO è multiplice di FE. Si considerino quattro quantità, cioè AB prima, BC seconda, DE terza, ed EF quarta. Gli vguali multipli della prima AB, e terza DE, sono, per quel che s'è dimostrato, GI, & KM; e gli vguali multipli della seconda CB, e quarta FE, sono HN, ed LO. E perche la proportionc della prima AB alla seconda BC, per ipotesi, è come la terza DE alla quarta EF; per la natura della medesima proportionc spiegata nella 6. definitione, se GI, ch'è multiplice della prima, supera HN, ch'è multiplice della seconda, ancora KM, ch'è multiplice della terza, supera LO, ch'è multiplice della quarta; e se GI è minore, ò vguale ad HN, sarà ancora KM minore, ò vguale ad LO. Supposto prima, che GI sia maggiore di HN; leuatane la commune IH, c resta GH maggiore di IN; e per l'istessa ragione essendo KM maggiore di LO, leuatane la commune LM, d resta KL maggiore di MO. Similmente se GI è vguale ad HN, ed anco KM è vguale ad LO, leuatone le communi HI, LM, e resta GH vguale ad IN, e KL vguale ad MO; e parimente essendo GI minore di HN, ed anco KM minore di LO, leuatane le communi HI, LM, resta GH^e minore di IN, e KL minore di MO. Si considerino quattro altre quantità, cioè la prima AC, la seconda CB, la terza DF, e la quarta FE. Gli vguali multipli della prima AC, e terza DF, sono, per costruzione, GH, & KL; e gli vguali multipli della seconda CB, e quarta FE, sono IN, ed MO. E perche s'è dimostrato, che se GH è maggiore di IN, ancora KL è maggiore di MO; e se GH è minore, ò vguale ad IN, ancora KL è minore, ò vguale ad MO; per la 6. definitione di questo, la prima AC alla seconda CB haucrà l'istessa proportionc, quale ha la terza DF alla quarta FE. Per la qual cosa se AB à BC è come DE ad EF, farà, diuidendo, AC à CB, come DF ad FE, ch'era da dimostrarfi.

THEOREMA XVIII. PROPOSITIONE XVIII.

Se le quantità diuise sono proportionali; composte ancora faranno proportionali.

Habbia AB, à BC, l'istessa proportionc, quale hà DE ad EF. Dico che, componendo, hauerà AC à CB, l'istessa proportionc quale hà DF, ad FE.

Se AC non hà l'istessa proportionc à CB, quale hà DF ad FE, hauerà

$$\begin{array}{c} \frac{A}{D} = \frac{B}{H} = \frac{C}{G} \\ \frac{B}{H} = \frac{C}{G} = \frac{E}{F} \end{array}$$

D d DF ad

a. 2. del 5.

b. a. d. l. 5.


c. 5. affiom.

d. 5. affiom.

e. 3. affiom.

f. 5. affiom.

a 17. del 5. DF ad vn altra quantità maggiore, ò minore di FE, l'istessa proportione, che hà AC à CB. Sia prima quella quantità la notata FG minore di EF; farà DE minore di DG. Perche AC à CB è come DF ad FG, diuidendo, AB à BC: hauerà l'istessa proportion, quale hà DG à GF: ma la proportion di AB à BC, per ipotesi, è come quella di DE ad EF; hauerà DG à GF l'istessa proportion, quale hà DE ad EF. Hor perche la prima DG alla seconda GF è come la terza DE alla quarta EF; e la prima DG è maggiore della terza DE; la seconda FG è farà maggiore della quarta EF; la parte maggiore del tutto, ch'è impossibile, non dunque DF hà l'istessa proportion ad vna quantità minore di FE, quale hà AC à CB.



Di nouo habbia DF ad vna quantità, come FH, maggiore di EF, l'istessa proportion, quale hà AC à CB; farà DE maggiore di DH; e diuidendo DH ad HF, farà come AB à BC; ma per ipotesi AB à BC è come DE ad EF; farà DH ad HF come DE ad EF; & essendo la prima DH alla seconda HF, come la terza DE alla quarta EF; e la prima DH è minore della terza DE; farà la seconda HF minore della quarta EF; il tutto minore della parte, ch'è impossibile: non dunque DF ad vna maggiore di FE hà l'istessa proportion, quale hà AC à CB; ne meno, per quel che s'è dimostrato, ad vna minore, ma la proportion di DF ad FE è come quella di AC à CB, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA XIX. PROPOSITIONE XIX.

Se il tutto hà l'istessa proportion al tutto, quale hà la parte detratta alla parte detratta; hauerà il rimanente al rimanente l'istessa proportion, quale hà il tutto al tutto.

Habbia il tutto AB al tutto CD l'istessa proportion, quale hà la parte AE alla parte CF. Dico che il rimanente EB al rimanente FD, farà come il tutto AB al tutto CD.



a 16. del 5. Perche AB à CD è come AE à CF, permutando, farà AB ad AE come CD à CF; e diuidendo, BE ad EA, farà come DF ad FC; e permutando di nouo, BE ad FD, farà come AE à CF; ma AE à CF, per ipotesi, è come AB à CD; farà EB ad FD, come tutta AB à tutta CD, ch'era da dimostrarsi.

COROLLARIO.

Qui facilmente si può dimostrare la conuersione della proportion, come fù spiegato nella defin. 16. ; cioè se AB à BC è come DE ad EF; farà, per la conuersione della pro-

portio-

portione, BA ad AC come ED, $A \text{ --- } C \text{ --- } B$
à DF. Perche AB à BC è come $D \text{ --- } E \text{ --- } F$
DE ad EF; diuidendo, AC à CB^a farà come DF ad FE; ed
inuertendo, farà BC à CA^b come EF ad FD; sì che, com-
ponendo, farà BA ad AC^c come ED à DF, ch'è il nostro
proposto.

THEOREMA XX. PROPOSITIONE XX.

Se siano tre grandezze da vna parte, e tre altre da vn'altra parte nella proportionne ordinata, se la prima delle prime è maggiore della terza, per l'egualità, ancora la prima dell'altre farà maggiore della terza; e se la prima delle prime è vguale, o minore della terza, ancora la prima dell'altre farà vguale, ò minore della terza.

Siano tre grandezze, come A, B, C, da vna parte, e tre altre, come D, E, F, da vn'altra parte, le quali siano nell'ordinata proportionne; cioè, che la proportionne di A à B sia come quella di D ad E, e la proportionne di B à C sia come quella di E ad F. Dico che, per l'egualità, se A è maggiore di C, ancora D farà maggiore di F; e se A è vguale, ò minore di C, ancora D farà vguale, ò minore di F.



Perche B à C, per ipotesi, è come E à F, farà, inuertendo, C à B^a come F ad E. Supposto prima che A sia maggiore di C. Dico, che D è maggiore di F. Perche A è maggiore di C, presa B come terza quantità, la maggiore A^b hauerà maggior proportionne alla terza B, di quella, che hà la minore C alla medesima B. Ma la proportionne di D ad E, per ipotesi, è l'istessa che la proportionne di A à B, hauerà D ad E^c maggior proportionne di quella, che hà C à B; fù dimostrata C à B hauere l'istessa proportionne, quale hà F ad E, hauerà D ad E^d maggior proportionne di quella, che hà F alla medesima E. Ma, quando due quantità hanno proportionne ad vna terza, quella, che hà maggior proportionne, è maggiore; e hauendo D maggior proportionne ad E di quella, che hà F ad E, farà D maggiore di F, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

Di nuouo sia A vguale à C. Dico, che D è vguale ad F. Perche A è vguale à C, presa B come terza quantità, hauerà A à B^e l'istessa proportionne, che hà C à B. Ma D ad E hà l'istessa proportionne, che A à B, hauerà D ad E^f l'istessa proportionne, quale hà C à B; fù mostrata la proportionne di F ad E essere come quella di C à B; hauerà D ad E^g l'istessa proportionne, quale



hà F

a 27. del 5.

b Corollario
alla 4. del 5.
c 28. del 5.a Corollario
alla 4. del 5.

b 8. del 5.

c 13. del 5.

d 13. del 5.

e 10. del 5.

f 7. del 5.

g 12. del 5.

h 11. del 5.

K 9. del 5.

hà F alla medesima E. Per la qual cosa D^K è vguale ad F, ch'era da dimostrarfi nel secondo luogo.

18. del 5.

m 13. del 5.

n 12. del 5.

o 10. del 5.

Finalmente, supposto che A sia minore di C. Dico, che D^L è minore di F. Perche A è minore di C, presa B come terza quantità, la proportion di A à B^L sarà minore di quella, che hà C alla medesima B; ma D ad E è come A à B, hauerà D ad E^m minor proportion di quella, che hà C à B; fù dimostrata la proportion di F ad E essere come quella di C à B; hauerà D ad Eⁿ minor proportion di quella, che hà F alla medesima E. E perche, quando due quantità hanno proportion ad vna terza, quella, che hà minor proportion, è minore; hauendo D minor proportion ad E, che F ad E, sarà D minore di F, come fù proposto dimostrare.



THEOREMA XXI. PROPOSITIONE XXI.

Se faranno tre quantità da vna parte, e tre altre da vn'altra parte nella perturbata proportion, per l'egualità, se la prima delle prime è maggiore della terza, ancora la prima dell'altre sarà maggiore della terza; e se la prima delle prime è vguale, ò minore della terza, ancora la prima dell'altre sarà vguale, ò minore della terza.

Siano tre quantità, come A, B, C, da vna parte, e tre altre come D, E, F, da vn'altra parte, nella perturbata proportion; cioè, che la proportion di A à B sia come quella di E ad F; e la proportion di B à C sia come quella di D ad E. Dico che, per l'egualità, se A è maggiore di C, ancora D sarà maggiore di F; e se A è vguale, ò minore di C, ancora D sarà vguale, ò minore di F. Perche B à C, per ipotesi, è come D ad E, inuertendo, sarà C à B, come E à D.



a Coroll. alla 4. del 5.

b 8. del 5.

c 13. del 5.

d 13. del 5.

e 10. del 5.

Supposto prima che A sia maggiore di C. Dico che D è maggiore di F. Perche A è maggiore di C, presa B come terza quantità, hauerà A à B^b maggior proportion di quella, che hà C à B; ma la proportion di E ad F è come quella di A à B; hauerà E ad F^c maggior proportion di quella, che hà C à B. Fù dimostrata C à B hauere l'istessa proportion, che hà E à D; hauerà E ad F^d maggior proportion di quella, che hà la medesima E à D. Quando vna quantità ha proportion ad dne, e quella, alla quale hà maggior proportion, è minore; hauendo E maggior proportion ad F di quella, che hà à D, sarà F minore di D, cioè, sarà D maggiore di F, ch'era da dimostrarfi nel primo luogo.

Di

Di nuouo, supposto che A sia vguale à C. Dico che D è vguale ad F. Perche A è vguale à C, presa B come terza quantità, hauerà A à B l'istessa proportionone, che hà C à B; ma la proportionone di E ad F è come quella di A à B, hauerà E ad F l'istessa proportionone, che hà C à B; fu dimostrata C à B hauere l'istessa proportionone, quale hà E à D; hauerà E ad F l'istessa proportionone, quale hà E à D; per il che D K è vguale ad F, ch'era da dimostrarli nel secondo luogo.



f 7. del 5.

g 11. del 5.

h 11. del 5.

K 9. del 5.

Finalmente supposto che A sia minore di C. Dico che D sarà minore di F. Perche A è minore di C, presa B come

minor proportionone à B di quella, che hà C alla medesima B; ma la proportionone di E ad F è come quella di A à B; hauerà E ad F minor proportionone di quella, che hà C à B; fu dimostrato hauere C à B l'istessa proportionone, quale hà E à D; hauerà E ad F minor proportionone di quella, che hà la medesima E à D.

Quando vna terza quantità hà proportionone à due, o quella, alla quale hà minor proportionone, è maggiore; essendosi dimostrato hauere E


ad F minor proportionone di quella, che hà E à D, in conseguenza sarà F maggiore di D, cioè D minore di F, ch'era da dimostrarli.

THEOREMA XXII. PROPOSITIONE XXII.

Se faranno quante grandezze si vogliano da vna parte, ed altrettante da vn'altra, nella proportionone ordinata; per l'egualità, la proportionone della prima delle prime all'ultima, sarà l'istessa, che la proportionone della prima delle altre, all'ultima.

Siano prima tre quantità, come A, B, C, da vna parte, e tre altre come D, E, F, da vn'altra parte nella proportionone ordinata; cioè che la proportionone di A à B sia come quella di D ad E, e la proportionone di B à C sia come quella di E ad F. Dico che, per l'egualità, la proportionone di A à C è come quella di D ad F. Si prendano gli vguali multipli delle due prime A, & D, che siano G, ed H. Similmente si prendano gli vguali multipli delle due seconde B, ed E, che siano I, & K; e si prendano gli vguali multipli delle due terze C, ed F, che siano L, ed M.

Perche la prima A, alla seconda B, per ipotesi, è come la terza D, alla quarta E; sono G, ed H gli vguali multipli della prima



A, c

a 4. del 3.

b 4. del 3.
e 19. defin.
del 3.

d 10. del 3.

e 6. defin.
del 3.f 10. defin.
del 3.

A, e terza D, e le due I, & K sono vguali multipli della seconda B, e quarta E; farà la proporzion di G ad I^a come quella di H à K. Similmente, perche la prima B alla seconda C è come la terza E alla quarta F, e per costruzione le due I, & K sono vguali multipli della prima B, e terza E; come anco le due L, ed M sono vguali multipli della seconda C, e quarta F; farà la proporzion di I ad L, ^b come quella di K ad M: dal che le quantità G, I, L, & H, K, M ^c sono nella proporzion ordinata; e perciò se G è maggiore di L, anco H ^d farà maggiore di M; e se G è vguale, ò minore di L, ancora H farà vguale, ò minore di M. Si considerino quattro quantità, cioè la prima A, la seconda C, la terza D, e la quarta F. Gli vguali multipli della prima A, e terza D, per costruzione, sono G, ed H; e gli vguali multipli della seconda C, e quarta F, sono L, ed M; e perche s'è dimostrato che se G è maggiore di L, anco H è maggiore di M; se G è vguale, ò minore di L, ancora H è vguale, ò minore di M; la proporzion della prima A alla seconda C ^e farà l'istessa, che la proporzion della terza D alla quarta F.

Di nuovo siano più di tre quantità, come A, B, C, N, da vna parte, ed altrettante, come D, E, F, O, da vn'altra, nella proporzion ordinata. Dico che A ad N farà come D ad O.

Si considerino tre quantità da vna parte, come A, C, N, e tre altre da vn'altra parte, come D, F, O: essendosi dimostrata la proporzion di A à C essere come quella di D ad F; e per ipotesi, C ad N è come F ad O; faranno le tre A, C, N, ^f da vna parte, e l'altre tre D, F, O, da vn'altra parte, nella proporzion ordinata; e per quel, che s'è dimostrato, la proporzion di A ad N farà l'istessa, che quella di D ad O. Il medesimo si dimostrerà se faranno più di quattro per parte, come fu proposto dimostrare.

S C O L I O.


La dimostrazione seguente la pongo in questo luogo, douendo seruire ne gl'elementi conici, ed in altri luoghi.

Se quattro quantità sono proportionali, detrattone le metà de gl'antecedenti, ò le metà de i conseguenti; i rimanenti sono proportionali.

Habbia AB à BC l'istessa proporzion, quale hà DE ad EF: Divisi prima gli antecedenti AB, DE in due parti vguali in G, ed H. Dico che GB à


$$\begin{array}{ccccccc} A & & G & & B & C \\ \hline D & & H & & E & F \end{array}$$

BC e



BC è come HE ad EF. Perche AG è uguale à GB, & DH è uguale ad HE; sarà AG à GB^a come DH ad HE, e componendo, AB à BG^b sarà come DE ad EH; ed inuertendo, BG à BA^c sarà come EH ad ED. Si considerino tre quantità BG prima, BA seconda, & BC terza da vna parte; e tre altre EH prima, ED seconda, & EF terza, da vn'altra parte. Perche la prima BG alla seconda BA è dimostrata essere come la prima EH alla seconda ED; e la seconda AB alla terza BC, per ipotesi, è come la seconda DE alla terza EF; per l'ugualità, la prima BG alla terza BC, ^d sarà come la prima EH alla terza EF, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

Di nouo siano diuisi i conseguenti BC, EF in due parti uguali in G, ed H. Dico che se AB à BC è come DE ad EF, sarà ancora AB à BG, come DE ad EH. Perche, BG è uguale à GC, & EH è uguale ad HF; sarà CG à GB, e come FH, ad HE; e componendo, CB à BG^f sarà come FE ad EH. Perche AB à BG per ipotesi, e come DE ad EF, componendo, sarà AC à CB^g come DF ad FE; ma CB à BG è come FE ad EH, sarà per l'ugualità AB à BG^h come DE ad EH, il che era da dimostrarsi.



a Corol. 21.
la 7. del 5.
b 18. del 5.
c Corol. 21.
la 4. del 5.


d 22. del 5.

e Corol. 21.
la 7. del 5.
f 18. del 5.
g 18. del 5.
h 22. del 5.

THEOREMA XXIII. PROPOSITIONE XXIII.

Se siano tre quantità da vna parte, e tre da vn'altra, nella perturbata proportionione; per l'egualità, la prima delle prime alla terza hauerà l'istessia proportionione, quale ha la prima dell'altre alla terza.

Siano le tre quantità A, B, C, da vna parte, e tre altre come D, E, F, da vn'altra parte nella perturbata proportionione; cioè che la proportionione di A à B sia come quella di E ad F; ed habbia B à C l'istessa proportionione, che ha D ad E. Dico che per l'egualità, hauerà A à C l'istessa proportionione, che ha D ad F. Si prendano gli uguali multipli di A, B, D, che siano G, H, I; e si prendano gli uguali multipli di C, E, F, che siano K, L, M. Perche G, ed H sono uguali multipli di A, & B, hauerà G ad H l'istessa proportionione, che ha la quantità A alla quantità B. Similmente essendo L, ed M uguali multipli di E, ed F; la proportionione di L ad M sarà come quella di E ad F. Hor hauendo G ad H l'istessa proportionione di A à B; ed E ad F, per ipotesi, è come A à B; hauerà G ad H l'istessa proportionione, che ha E ad F; fù dimostrata L ad M



a 15. del 5.

b 15. del 5.

c 11. del 5.

E e

come

d 11. del 5.

e 4. del 5.

f 10. defin.

del 5.

g 21. del 5.


h 6. defin.

del 5.

i Corollari.

4. del 5.

come E ad F; sarà G ad H^d come L ad M. In oltre perche la prima B alla seconda C, per ipotesi, è come la terza D alla quarta E; sono per costruzione H, ed I, vguali multipli della prima B, e terza D, e le due K, ed L sono vguali multipli della seconda C, e quarta E; la proportion di H, ch'è multiplice della prima, à K, è multiplice della seconda, sarà l'istessa, che la proportion, che hà I, ch'è multiplice della terza, ad L multiplice della quarta. Hor essendo G ad H, come L ad M, & H à K come I ad L, le quantità G, H, K, & I, L, M, sono ^e nella perturbata proportion; e per l'vgnalità, se G è maggiore di K, è ancora I sarà maggiore di M; e se G è vguale, ò minore di K, ancora I sarà vguale, ò minore di M. Si considerino quattro quantità, cioè A prima, C seconda, D terza, ed F quarta: gli vguali multipli della prima A, e terza D, per costruzione, sono G, ed I; e gli vguali multipli della seconda C, e quarta F, sono K, ed M; e perche G, multiplice della prima, s'è maggiore di K, multiplice della seconda, ancora I, multiplice della terza, è maggiore di M, multiplice della quarta, sarà la proportion della prima A alla seconda C, ^h come quella della terza D alla quarta F, ch'era da dimostrarsi.



THEOREMA XXIV. PROPOSITIONE XXIV.

Se la prima alla seconda hà l'istessa proportion, quale hà la terza alla quarta; e la quinta alla seconda hà l'istessa proportion, che la sesta alla quarta; la composta della prima, è quinta, hauerà l'istessa proportion alla seconda, quale hà la composta della terza, e sesta, alla quarta.

Habbia la prima AB alla seconda C, l'istessa proportion, quale hà la terza DE alla quarta F; e la quinta BG alla seconda C, habbia l'istessa proportion, che hà la sesta EH, alla quarta F. Dico che AG, composta della prima, e quinta, hauerà l'istessa proportion alla seconda C, quale hà DH composta della terza, e sesta, alla quarta F. Perche BG à C è come EH ad F; inuertendo, C à BG^a sarà come F ad EH.

Si considerino tre quantità da vna parte, come AB, C, BG, è tre da vn'altra, come DE, F, EH. Perche, per ipotesi, la proportion di AB à C è come quella di DE ad F, e la proportion di C à BG s'è dimostra-

^a e se G è minore, ò vguale à K ancora I è minore ò vguale ad M

ta essere come quella di F ad EH; sarà, per l'ugualità, AB à BG , come DE ad EH ; e componendo, AG à GB e sarà come DH ad HE . Si considerino tre altre quantità come AG , GB , C da vna parte; e tre altre, come DH , HE , F , da vn'altra parte. Essendosi dimostrato, che A G à G B è come D H ad H E, e per ipotesi, B G à C è come E H ad F ; sarà per l'ugualità AG à C come DH ad F ; per la qual cosa AG composta della prima, e quinta, hà l'istessa proportionè à C seconda, quale hà DH composta della terza, e sesta alla quarta F , ch'era da dimostrarsi.

b 22. del 5.
c 28. del 5.

d 22. del 5.

COROLLARIO.

Dall'antecedente proposizione si caua, che se A è multiplice di B , come C è multiplice di D , hauerà A à B l'istessa proportionè, quale hà C à D . Perche essendo A multiplice di B , come C è multiplice di D , tante volte A è misurata da B , per quante volte C è misurata da D . Si diuida A nelle parti vguali à B , che siano AE , EF , FG ; e si diuida C K nelle parti vguali à D , che siano CH , HI , IK . Essendo A e vguale à B , & CH vguale à D ; sarà AE à B , come CH à D ; e per l'istessa ragione, EF à B sarà come HI à D ; ed ancora FG à B sarà come IK à D . Hor se la prima AE alla seconda B è come la terza CH alla quarta D ; e la quinta EF alla seconda B è come la sesta HI alla quarta D ; sarà A F, composta della prima, e quinta, alla seconda B , come C I, composta della terza, e sesta, alla quarta D . Similmente la prima AF alla seconda B è come la terza C I alla quarta D ; e la quinta F G alla seconda B è come la sesta I K alla quarta D ; sarà AG , composta della prima, e quinta, alla seconda B , come CK , composta della terza, e sesta, alla quarta D , come si disse.




THEOREMA XXV. PROPOSITIONE XXV.

Se quattro quantità sono proportionali; la massima, e

la minima, giunte insieme, sono maggiori delle altre due.

Habbia AB à CD , l'istessa proportioné, quale hà E ad F , e sia AB la massima, ed F la minima. Dico che AB , ed F insieme, sono maggiori dell'altre due CD ed E insieme.



Si concepisca da AB detratta AG vguale ad E , e da CD , s'intenda detratta CH vguale ad F ; sarà AG à CH come E ad F , cioè come AB à $C D$. Se dunque il tutto AB al tutto $C D$ è come la parte AG alla parte CH ; sarà il restate GB e al restate HD come tutta AB à tutta CD ; ma tutta AB è maggiore di CD , stite ch'è massima, sarà GB maggiore di HD . In oltre perche AG è vguale ad E , e la quantità CH è vguale ad F ; le due AG , ed F insieme, e sono vguali alle due CH , ed E , insieme. Hor alle due AG , ed F insieme, s'aggiunga la maggiore GB ; ed alle due CH , ed E insieme, s'aggiunga la minore HD ; le due AB , ed F insieme, faranno maggiori delle due CD , ed E insieme, ch'era da dimostrarli.

S C O L I O I.

Quando sono quattro quantità proporzionali, e l'antecedente di una proportioné è la massima di tutte quelle quantità, necessariamente la conseguente dell'altra proportioné è la minima.

Per esempio se AB à CD è come E ad F , & AB è la massima; sarà F la minima; stante che essendo AB à CD come E ad F , & AB è maggiore di CD , per essere la massima, sarà E maggiore di F . E similmente essendo AB , à CD come E ad F , e la prima AB è maggiore della terza E ; sarà la seconda CD maggiore della quarta F : dal che tanto $C D$, quanto E è maggiore di F , e perciò F sarà la minima. Il che Euclide hà preso come cosa nota, per esser cosa di poco momento à dimostrarli.

C O R O L L A R I O.

Da quel, che s'è detto, è manifesto, che quando tre quantità sono proporzionali, la massima, e la minima, giunte insieme, sono maggiori del doppio della rimanente.

Per esempio habbia A à B l'istessa proportioné, che hà B à C , e sia A la massima, & C la minima, le due A , & C insieme sono maggiori del doppio di B . Si concepisca la quantità D vguale à B , la proportioné di A à B sarà l'istessa, che quella di D à C , e per quel, che s'è dimostrato, le due A , & C insieme



me, sono maggiori delle due B, & D insieme, cioè sono maggiori del doppio di B, come si disse.


S C O L I O . II.

Qui Euclide dà fine al quinto Libro; ma perche molte altre propositioni, delle quali si seruono Autori grauissimi, come Archimede, Apollonio Pergeo, ed altri, che ne i loro scritti le citano, quasi come cose d'Euclide, seguendo ancora io il metodo tenuto da varij Commentatori d'Euclide, e confrontando il tutto in Pappo Alessandrino, doue queste si trouano, le pongo successiuamente con quella maggior facilità, che mi sia possibile.

THEOREMA XXVI. PROPOSITIONE XXVI.

Se la prima alla seconda hà maggior proportione, che la terza alla quarta; inuertendo, la seconda alla prima hauerà minor proportione, che la quarta alla terza.

Habbia A à B maggior proportione, che C à D. Dico che, inuertendo, B ad A hauerà minor proportione di quella, che hà D à C.



Si concepisca la quantità E in modo, che habbia tal proportione à B, quale hà C à D, ed inuertendo B ad E, sarà come D à C.

Perche A à B hà maggior proportione di quella, che hà C à D, e C à D, per costruzione, è come E à B, hauerà A à B^a maggior proportione di quella, che hà E alla medesima B. Quando due quantità hanno proportioni ad vna terza, e quella, che hà maggior proportione, è maggiore, hauendo A maggior proportione à B di quella, che hà E à B, sarà A maggiore di E. In oltre perche A è maggiore di E, presa B, come terza quantità, hauerà B alla maggiore A^d minor proportione di quella, che hà alla minore E^a, ma B ad E, per quel che s'è dimostrato, è come D à C, hauerà B ad A^c minor proportione di quella, che hà D à C, che si dà dimostrare.

THEOREMA XXVII. PROPOSITIONE XXVII.

Se la prima alla seconda hà maggior proportione, che la terza alla quarta; permutando, la prima alla terza hauerà maggior proportione, che la seconda alla quarta.

Habbia

Habbia la prima A alla seconda B maggior proportione, che la terza C alla quarta D. Dico che permutando, la prima A alla terza C hauerà maggior proportione, che la seconda B alla quarta D. Si concepisca la quantità E, che habbia l'istessa proportione à B, quale hà C à D; e permutando, hauerà

A ————— C —————
 B ————— D —————
 E —————

- a 16. del 5. E à C ^a l'istessa proportione, che hà B à D. Perche A à B hà maggior proportione, che C à D, e la proportione di C à D è come quella di E à B, hauerà A à B ^b maggior proportione di quella, che hà E alla medesima B: per la qual cosa A ^c sarà maggiore di E. In oltre essendo A maggiore di E, presa C come terza quantità, la maggiore A ^d hauerà maggior proportione alla terza C, che la minore E alla medesima C: mà la proportione di A à C, per quel che s'è dimostrato, è come B à D, hauerà A à C ^e maggior proportione di quella, che hà B à D, come fu proposto dimostrare.

S C O L I O.

- Nell'istesso modo, col solo mutare la voce di maggiore in minore, si prouerà, che se A à B hà minor proportione, che C à D, permutando A à C hauerà minor proportione, che B à D. S'intenda fatta la medesima costruzione, e si dimostri, come prima, che E à C è come B à D. Perche A hà minor proportione à B, che C à D, e la proportione di C à D è come E à B, hauerà A à B ^a minor proportione, che E alla medesima B; e perciò A ^b è minore di E. Presa C come terza quantità, hauerà A minore alla terza C, e minor proportione, che E maggiore à C; mà E à C è come B à D, hauerà A à C ^c minor proportione, che B à D, ch'è il nostro proposto.

THEOREMA XXVIII. PROPOSITIONE XXVIII.

Se la prima alla seconda hà maggior proportione, che la terza alla quarta; componendo, la prima con la seconda hauerà maggior proportione alla seconda, che la terza con la quarta alla quarta.

Habbia A B à B C maggior proportione di quella, che hà D E ad E F. Dico che, componendo, A C à C B hauerà maggior proportione di quella, che hà D F ad F E. Si concepisca la quantità G B in modo, che G B à B C

A — G — B — C
 D — E — F

- a 18. del 5. sia come D E ad E F, è componendo, sarà G C à C B ^a come D F ad F E. Perche A B à B C hà maggior proportione, che D E ad E F, è la proportion di D E ad E F è come G B à B C, hauerà A B à B C ^b maggior proportion di quella, che hà G B alla medesima B C; e perciò A B ^c sarà maggiore di G B; vguualmente s'aggiunga la parte B C, sarà A C ^d mag-

giore

giore di tutta GC . Si prenda BC come terza quantità, hauerà la maggiore AC maggior proportionione à BC di quella, che hà GC alla medesima CB ; ma GC à CB , per quel che s'è dimostrato, è come DF ad FE , hauerà AC à CB maggior proportionione di quella, che hà DF ad FE , ch'era da dimostrarfi.

e 8. del 5.

f 13. del 5.

COROLLARIO.

Da quel che s'è detto è manifesto, che se AB à BC hà minor proportionione, che DE ad EF ; componendo, AC à CB hauerà minor proportionione, che DF ad FE . Perche se AB à BC hà minor proportionione, che DE ad EF , all'incontro DE ad EF hauerà maggior proportionione, che AB à BC ; e componendo, DF ad FE hauerà maggior proportionione di quella, che hà AC à CB . Hor se la proportionione di DF ad FE è maggiore della proportionione, che hà AC à CB ; farà la proportionione di AC à CB minore della proportionione, che hà DF ad FE , come si disse.


g 28. del 5.

THEOREMA XXIX. PROPOSITIONE XXIX.

Se la prima alla seconda hà maggior proportionione, che la terza alla quarta; diuidendo, la differenza frà la prima, e seconda, hà maggior proportionione alla seconda, che la differenza frà la terza, e quarta alla quarta.

Siano le quattro quantità AB prima, BC seconda, e la differenza sia AC ; sia la terza DE , la quarta EF , e la differenza DF . Hor habbia la prima AB alla seconda BC maggior proportionione, che la terza DE alla quarta EF . Dico che diuidendo, la differenza AC alla seconda CB , hauerà maggior proportionione, che la differenza DF alla quarta FE .

Si concepisca GC in modo, che GB à BC sia come DE ad EF ; e diuidendo, farà GC à CB come DF ad FE . Perche AB à BC hà maggior proportionione, che DE ad EF , e la proportionione di DE ad EF è come quella di GB à BC , hauerà AB à BC maggior proportionione di quella che hà GB alla medesima BC ; dal che AB sarà maggiore di GB ; e detratte la commune BC , resta AC maggiore di GC ; e presa CB come terza quantità, AC maggiore hauerà maggior proportionione alla terza CB di quella, che hà GC minore alla medesima CB ; ma GC à CB è come DF ad FE ; hauerà AC à CB maggior proportionione, che DF ad FE , come fù proposto dimostrare.



a 17. del 5.

b 19. del 5.

c 10. del 5.


d 5. assioma.

e 3. del 5.

f 13. del 5.

COROLLARIO.

Da quel che s'è detto è manifesto, che se AB à BC hà minor proportione di quella, che hà DE ad EF , diuidendo, hauerà AC à




CB , minor proportione di quella, che hà DF ad FE . Perche hauendo AB à BC minor proportione, che DE ad EF , hauerà DE ad EF maggior proportione, che AB à BC ; e diuidendo DF ad FE hauerà maggior proportione, che AC à CB . Hor se la proportione di DF ad FE è maggiore di quella, che hà AC à CB , farà la proportione di AC à CB minore della proportione di DF ad FE , come si disse.

a 29. del 5.

THEOREMA XXX. PROPOSITONE XXX.

Se la prima alla seconda hà maggior proportione, che la terza alla quarta; per la conuerfione della proportione, la prima alla differenza frà la prima, è seconda, hauerà minor proportione di quella, che hà la terza alla differenza frà la terza, e quarta.

Siano le quattro quantità A B prima, BC seconda, DE terza, & FE quarta; e la differenza frà la prima AB , e la seconda BC sia A C ; come anco la differenza frà la terza DE , e quarta FE , sia DF . Hor



habbia AB prima à BC seconda maggior proportione, che la terza DE alla quarta FE . Dico che, per la conuerfione della proportione, la prima AB alla differenza AC , hà minor proportione, che la terza DE alla differenza DF . Perche AB à BC hà maggior proportione, che DE ad EF , diuidendo, AC à CB hauerà maggior proportione, che DF ad FE ; ed inuertendo, BC à CA hauerà minor proportione di quella, che hà E F ad F D ; e componendo, BA ad AC hauerà minor proportione di quella, che hà ED à DF , ch'era da dimostrarfi.

a 29. del 5.

b 26. del 5.

c 28. del 5.

COROLLARIO

Da quel, che s'è detto, è manifesto, che se AB à BC hà minor proportione, che DE ad EF , per la conuerfione

della

della proportionone, hauerà BA ad AC maggior proportionone di quella, che ha ED à DF; il che si dimostra come prima s'è fatto; cioè, hauendo A B à BC minor proportionone, che DE $\frac{A}{BC}$ ad EF; diuidendo, AC à CB^a hauerà minor proportionone, che DF $\frac{D}{FE}$ ad FE; ed inuertendo, BC à CA^b hauerà maggior proportionone, che EF ad FD; e componendo, B A ad AC^c hauerà maggior proportionone di quella, che ha ED à DF, come si disse.

a 29. del 5.

b 26. del 5.

c 28. del 5.

THEOREMA XXXI. PROPOSITIONE XXXI.

Se siano tre quantità da vna parte, e tre da vn'altra parte, e la prima delle prime habbia maggior proportionone alla seconda, che la prima dell'altre alla seconda; e la seconda delle prime habbia maggior proportionone alla terza, che la seconda dell'altre alla terza; per l'egualità, la prima delle prime alla terza hauerà maggior proportionone, che la prima dell'altre alla terza.

Siano tre quantità A, B, C da vna parte, e tre altre come D, E, F, da vn'altra parte; e la proportionone di A à B sia maggiore della proportionone di D ad E; ed habbia B à C maggior proportionone che E ad F. Dico che per l'egualità, A à C hauerà maggior proportionone di quella, che ha D ad F. Si concepiscano le due quantità G, & H in modo, che G à C habbia l'istessa proportionone, quale ha E ad F; ed H à G habbia l'istessa proportionone, quale ha D ad E: per l'egualità hauerà H à C^a l'istessa proportionone, quale ha D ad F. Perche B ha maggior proportionone à C di quella, che ha E ad F; e la proportionone di E ad F è l'istessa di quella, che ha G à C; hauerà B à C^b maggior proportionone di quella, che ha G alla medesima C; e perciò B^c è maggiore di G. In oltre essendo B maggiore di G, presa A come terza quantità, la terza A hauerà maggior proportionone alla minore G,^d che alla maggiore B; ma la proportionone di A à B, per ipotesi, è maggiore della proportionone, che ha D ad E, la proportionone dunque di A à G^e sarà molto maggiore di quella, che ha D ad E, e perche D ad E è come H à G, hauerà A à G^f maggior

A ———	D ———
B ———	E ———
C ———	F ———
G ———	
H ———	

a 22. del 5.

b 23. del 5.

c 20. del 5.

d 8. del 5.

e Scol. alla

f 13. del 5.

F f

propor-

g 10. del 5.

h 8. del 5.

K 13. del 5.

proporzione di quella, che hà H alla medesima G; per la qual cosa A sarà maggiore di H. Presa C come terza quantità, hauerà A à C^h maggior proporzione di quella, che hà H alla medesima C; ma H à C è come D ad F, hauerà A à C^h maggior proporzione di quella, che hà D ad F, ch'era da dimostrarli.

S C O L I O.

Seguendo il medesimo ordine, e mutando solamente le voci di maggiore in minore; si dimostrerà, che se A à B hà minor proporzione, che D ad E; e B à C habbia minor proporzione, che E ad F; per l'ugualità, A à C hauerà minor proporzione, che D ad F.

THEOREMA XXXII. PROPOSITIONE XXXII.

Se siano tre quantità da vna parte, e tre da vna altra parte, e la prima delle prime habbia maggior proporzione alla seconda, che la seconda dell'altre alla terza; e la seconda delle prime alla terza habbia maggior proporzione, che la prima dell'altre alla seconda; per l'ugualità, la prima delle prime alla terza hauerà maggior proporzione, che la prima dell'altre alla terza.

Siano tre quantità A, B, C da vna parte, e tre altre, come D, E, F, da vna altra parte, ed habbia A à B maggior proporzione di quella, che hà E ad F, ed habbia B à C

A ———

D ———

B ———

E ———

C ———

F ———

G ———

H ———

maggior proporzione,

che D ad E. Dico che A à C hauerà maggior proporzione di quella, che hà D ad F. Si concepiscano due quantità come H, & G in modo, che G à C sia come D ad E, ed H à G sia come E ad F; sarà, per l'ugualità, H à C^a come D ad F. Perche B à C hà maggior proporzione, che D ad E, e la proporzione di D ad E è come G à C; hauerà B à C^b maggior proporzione di quella, che hà G alla medesima C; e perciò B^c è maggiore di G. In oltre, essendo B maggiore di G, presa A come terza quantità, hauerà A alla minore G^d maggior proporzione di quella, che hà alla maggiore B: ma la proporzione di A à B, per ipotesi, è maggiore della proporzione di E ad F; hauerà A à G^e molto maggior proporzione di quella, che hà E ad F: ma E ad F è come H à G, hauerà A à G^f maggior proporzione, che H alla medesima G, per la qual cosa A sarà maggiore di H, presa C come terza quantità, hauerà A à C^h maggior proporzione di quella,

a 23. del 5.

b 13. del 5.

c 10. del 5.

d 8. del 5.

e Scol. alla

13. del 5.

f 13. del 5.

g 10. del 5.

h 8. del 5.

quella, che hà H à C; ma H à C è come D ad F, hauerà A à C^K maggior proportione di quella, che hà D ad F, che era da dimostrarfi. K 23. del 5.


S C O L I O.

Se la proportione di A à B sarà minore della proportione di E ad F; e la proportione di B à C è minore della proportione di D ad E, ripetendo le medesime cose dette, col solo mutare le voci di maggiore in minore, si dimostrerà, che per l'ugualità la proportione di A à C è minore della proportione di D ad F.

THEOREMA XXXIII. PROPOSITIONE XXXIII.

Se il tutto hà maggior proportione al tutto, che la parte tratta alla parte tratta; il rimanente hauerà maggior proportione al rimanente, che il tutto al tutto.

Se il tutto AB hà maggior proportione al tutto CD, che la parte AE alla parte CF. Dico che il rimanente EB hauerà maggior proportione al rimanente FD, ch'il tutto AB, al tutto CD. Perche AB hà maggior proportione à CD, che AE à CF, permutando, hauerà AB^a ad AE maggior proportione, che DC à CF; e per la conuersione della proportione, AB à BE^b hauerà minor proportione di quella, che hà CD à DF; e permutando, AB à CD^c hauerà minor proportione di quella, che hà EB ad FD. Hor se la proportione di AB à CD è minore della proportione di EB ad FD; farà la proportione di EB ad FD maggiore della proportione che hà tutto AB al tutto CD, ch'era da dimostrarfi.



a 27. del 5.

b 30. del 5.

c 27. del 5.

S C O L I O.

Similmente se il tutto hà minor proportione al tutto, che la parte tratta alla parte tratta, ritenendo l'ordine antecedente, col solo mutare le voci di maggiore in minore, si dimostrerà, che l'auanzo all'auanzo hà minor proportione, ch'il tutto al tutto.

THEOREMA XXXIV. PROPOSITIONE XXXIV.

Se faranno quante grandezze si vogliano da vna parte, ed altrettanto da vn'altra parte; e la prima delle prime habbia maggior proportione alla prima delle altre, che la seconda

delle prime alla seconda delle altre, e la seconda alla seconda habbia maggior proportionone, che la terza alla terza, e con quest'ordine per le altre; tutte le prime insieme à tutte le altre insieme, haueranno maggior proportionone, che tutte le prime, leuatane la prima, à tutte le altre, leuatane la prima. Di più la prima delle prime hauerà maggior proportionone alla prima delle altre, che tutte le prime à tutte le altre; e che tutte le prime à tutte le altre haueranno maggior proportionone, che l'ultima all'ultima.

Siano prima tre quantità A, B, C, da vna parte, e tre altre D, E, F, da vn'altra parte, ed habbia A maggior proportionone à D di quella, che hà B ad E;

A	_____	D	_____
B	_____	E	_____
C	_____	F	_____

ed habbia B ad E maggior proportionone, che C ad F. Dico, che le tre A, B, C, insieme, alle tre D, E, F, insieme, hanno maggior proportionone, che le due B, C, alle due E, F; che A à D hà maggior proportionone, che le tre A, B, C, alle tre D, E, F; e che le tre A, B, C, alle tre D, E, F, hanno maggior proportionone, che l'ultima C all'ultima F.

a 27. del 5.
b 28. del 5.
c 27. del 5.
Perche B ad E hà maggior proportionone, che C ad F, permutando, B à C, hauerà maggior proportionone, che E ad F; e componendo B, C, à C, hauerà maggior proportionone, che E, F, ad F; e permutando di nouo, B, C, ad E, F, e hauerà maggior proportionone, che C ad F.

d 33. del 5.
e 31. del 5.
f 27. del 5.
g 28. del 5.
h 27. del 5.
Perche il tutto B, C al tutto E, F hà maggior proportionone, che la parte C alla parte F, il rimanente B al rimanente E, hauerà maggior proportionone, che il tutto B, C, al tutto E, F. In oltre perche A à D hà maggior proportionone, che B ad E, si è dimostrato che B ad E ha maggior proportionone, che B, C, ad E, F, per l'ugualità, hauerà A à D, e maggior proportionone, che le due B, C, alle due E, F; e permutando, A alle due B, C, si hauerà maggior proportionone, che D alle due E, F; e componendo le tre A, B, C, alle due BC, e haueranno maggior proportionone, che le tre D, E, F, alle due E, F; e permutando di nouo, le tre A, B, C, alle tre D, E, F, haueranno maggior proportionone, che le due B, C alle due E, F, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

K 33. del 5.
Perche il tutto A, B, C, al tutto D, E, F, hà maggior proportionone, che la parte B, C, alla parte E, F, il rimanente A al rimanente D hauerà maggior proportionone, che il tutto A, B, C, al tutto D, E, F, ch'era da dimostrarsi nel secondo luogo.

Finalmente perche le tre A, B, C, alle tre D, E, F, hanno maggior proportionone, che le due B, C, alle due E, F, e nel principio fu dimostrato, che le due B, C, alle due E, F, hanno maggior proportionone, che C ad F, per l'ugualità, le tre A, B, C, alle tre D, E, F, haueranno maggior proportionone, che l'ultima C all'ultima F, ch'era da dimostrarsi.

Se

Se faranno quattro quantità per parte, e ritenendo la prima ipotesi, habbiaz C ad F maggior proportione di quella, che hà G ad H. Dico che le quattro A, B, C, G, alle quattro D, E, F, H

A	_____	D	_____
B	_____	E	_____
C	_____	F	_____
G	_____	H	_____

hanno maggior proportione. che le tre B, C, G, alle tre E, F, H, che A à D hà maggior proportione, che le quattro A, B, C, G alle quattro D, E, F, H; e che le quattro A, B, C, G, alle quattro D, E, F, H, hanno maggior proportione, che l'ultima G all'ultima H.

Si considerino le tre B, C, G, da vna parte, e le altre tre E, F, H, da vna altra parte, e si dimostri come prima, che le tre B, C, G, alle tre E, F, H hanno maggior proportione, che le due C, G, alle due F, H, similmente che B ad E hà maggior proportione, che le tre B, C, G, alle tre E, F, H; e che le tre B, C, G, alle tre E, F, H hanno maggior proportione, che l'ultima G all'ultima H. In oltre perche A à D hà maggior proportione, che B ad E; e per quel che s'è dimostrato B ad E hà maggior proportione, che le tre B, C, G, alle tre E, F, H; per l'ugualità A à D ^m hauerà maggior proportione, che le tre B, C, G, alle tre E, F, H; e permutando, A alle tre B, C, G, ⁿ hauerà maggior proportione, che D alle tre E, F, H; e componendo, le quattro A, B, C, G alle tre B, C, G, ^o haueranno maggior proportione, che le quattro D, E, F, H, alle tre E, F, H; e permutado di nouo le quattro A, B, C, G, alle quattro D, E, F, H, ^p haueranno maggior proportione che le tre B, C, G, alle tre E, F, H, ch'era prima da dimostrarsi.

m 38. del 5.

n 17. del 5.

o 18. del 5.

p 27. del 5.

Di più perche il tutto A, B, C, G, al tutto D, E, F, H, hà maggior proportione, che la parte B, C, G, alla parte E, F, H; hauerà l'auanzo A all'auanzo D ^q maggior proportione, ch'il tutto A, B, C, G al tutto D, E, F, H, ch'era da dimostrarsi nel secondo luogo.

q 33. del 5.

Finalmente perche tutte A, B, C, G, à tutte D, E, F, H, hanno maggior proportione, che le tre B, C, G, alle tre E, F, H; e le tre B, C, G, alle tre E, F, H, hanno maggior proportione, che l'ultima G all'ultima H; per l'ugualità, tutte A, B, C, G, à tutte D, E, F, H, hanno maggior proportione, che l'ultima G all'ultima H. Il medesimo si dimostrerà se faranno più di quattro per parte, ch'è quanto fù proposto dimostrare.

r 31. del 5.

Fine del Quinto Elemento.

EVCLIDE RESTITVTO

DA

VITALE GIORDANI

ELEMENTO SESTO.



DEFINITIONI.


I.

Le figure rettilinee sono simili, quando gli angoli dell'una sono vguagli a i corrispondenti angoli dell'altra, e i lati intorno a gli angoli vguagli sono proporzionali.



E i triangoli ABC, DEF, se l'angolo A sarà vguale all'angolo D, l'angolo B vguale all'angolo E, l'angolo C vguale all'angolo F; e la proportion del lato AB al lato BC sia come quella del lato DE al lato EF, (che sono intorno a gli angoli vguagli B & E.) e la proportion di BC a CA sia come quella di EF ad FD; come ancora la proportion di BA ad AC sia come quella di ED a DF; i triangoli ABC, DEF, si diranno essere simili frà di loro. Il medesimo s'intende d'ogni altra figura piana rettilinea, come

le notate X, & Z; cioè, se l'angolo G sarà vguale all'angolo L, l'angolo H vguale all'angolo M, l'angolo I vguale all'angolo N, l'angolo K vguale all'angolo O; e la proportion di GH ad HI sia la stessa, che la proportion di LM ad MN; e sia HI ad IK, come MN ad NO, &c. Le figure rettilinee X, & Z si diranno simili frà di loro.




Figure

I I.

Figure reciproche sono quelle , quando due lati intorno ad vn angolo di vna sono estreme, e due lati intorno ad vn angolo dell'altra sono medie di quattro quantità proporzionali.

Per esempio siano prima i triangoli ABC, DEF; se la proportion del lato AC al lato EF è l'istessa che la proportion del lato FD al lato BC, gli angoli C, & F saranno contenuti da quattro quantità proporzionali, delle quali sarà la prima AC, la seconda EF, la terza FD, e la quarta BC; di



modo che l'angolo C sarà contenuto dalle estreme, cioè dalla prima AC, e dall'ultima BC, e l'angolo F sarà contenuto dalle due medie, cioè dalla seconda EF, e dalla terza FD; e secondo queste condizioni i triangoli ABC, DEF sono reciprochi. Similmente ne i parallelogrammi X, & Z, se NM ad IH sarà come IK ad ML, i parallelogrammi X, & Z si diranno essere reciprochi.

I I I.

La retta linea si dice esser segata secondo l'estrema, e media proportion, quando tutta la linea alla maggior parte sia, come la medesima parte maggiore alla minor parte.

Si concepisca qualunque retta linea AB, la quale se sarà diuisa nel punto C in modo, che la proportion di tutta AB alla maggior parte AC, sia come la medesima AC alla parte minore CB; la retta AB si dirà esser diuisa secondo l'estrema, e media proportion.



I V.

L'altezza di qualunque figura è la retta linea, che dalla sommità cade perpendicolare alla base.

Nel triangolo ABC, dall'angolo verticale A cada la retta AG perpendicolare alla base BC, la retta AG si chiamerà altezza del triangolo ABC. Similmente nel triangolo ABD, dall'angolo verticale A cada la retta AG perpendicolare alla base BD, continuata verso C, la perpendicolare AG si chiamerà altezza del triangolo ABD. E nell'istesso modo la



retta

retta AG sarà l'altezza del triangolo ADF; e la medesima sarà l'altezza del triangolo ABF; come anco del triangolo AEC; e de i triugoli AGE, AGC, AGF, AGB, AFE, ADC, &c. E da qui si raccoglie, che quando più triangoli hanno le basi in una medesima retta linea come BC, e gli angoli verticali s'uniscono in vn medesimo punto A, quei triangoli sono sotto vna medesima




altezza. Di più nel parallelogrammo HIKL dalla sommità HL cada la retta HM perpendicolare alla base KI, continuata, se bisogna, la perpendicolare HM si dirà essere l'altezza del parallelogrammo HIKL; ed il simile s'intende d'ogn'altra figura. Hor se le rette AL, BK saranno frà di loro parallele, essendo le rette AG, HM, perpendicolari alla retta BK, per le cose dimostrate auanti della 27. proposizione del primo Libro, le rette AG, HM sono frà di loro uguali; e così tutte le figure, che sono poste frà le medesime parallele, haueranno la medesima, o uguali altezze.

V.

Il parallelogrammo applicato ad vna retta linea, si dice mancare d'vn parallelogrammo della medesima altezza, quando non occupa tutta la retta linea, alla quale è applicato; e si dice superare d'vn parallelogrammo della medesima altezza, quando occupa maggior lunghezza della linea, alla quale è fatta l'applicazione.

Alla retta AB, s'intenda applicato il parallelogrammo ACDE in modo, che nella prima figura non occupi tutta la retta AB, mà che per compire la retta AB gli manchi il parallelogrammo DCBF; in questo caso il parallelogrammo ACDE si dice essere applicato secondo la retta AB mancante del parallelogrammo DCBF. E nella seconda figura, il parallelogrammo ACDE descritto sopra la retta AC in modo che superi la retta AB, per la quantità del parallelogrammo FBCE; si dice essere applicato secondo la retta AB eccedente la medesima retta AB, per la quantità del parallelogrammo FBCE.



THEOREMA I. PROPOSITIONE I.

I triangoli, e parallelogrammi, che hanno vna medesima

medesima, ò vguali altezze, sono frà di loro come le basi.

Siano i due triangoli ABC , DEF , ed i parallelogrammi $GBCA$, $DEFH$, le di cui basi siano BC , EF ; e s'intendano collocati fra le medesime parallele GH , LN ; e per quel, che fù spiegato nella quarta definizione di questo, haueranno vna medesima altezza. Dico che la proportion del triangolo ABC al triangolo DEF , come ancora del parallelogrammo $GBCA$, al parallelogrammo $DEFH$, è l'istessa, che la proportion della base BC alla



basi EF . Si continui BF verso L , ed N , e si prendano in LB quante parti si vogliano come BI , IK , KL , ogn'vna vguale alla base BC . Similmente si prendano in FN quante parti si vogliano come FM , MN , ogn'vna vguale ad EF ; si tirino le rette AI , AK , AL , DM , DN ; i triangoli ABC , ABI , AIK , AKL hanno le basi BC , BI , IK , KL , vguali, e sono frà le medesime parallele, e perciò sono frà di loro vguali. E per l'istessa ragione i triangoli DEF , DFM , DMN sono frà di loro vguali. Tante volte la base CL farà misurata dalla base BC , per quante volte il triangolo ALC è misurato dal triangolo ABC ; dal che il triangolo ALC sarà multiplice del triangolo ABC , come la base LC è multiplice della base BC . Nell'istesso modo si dimostrerà, che il triangolo DEN è multiplice del triangolo DEF , come la base EN è multiplice della base EF ; se la base LC è vguale alla base EN , i triangoli ALC , DEN , che hanno le basi vguali LC , EN , e sono frà le medesime parallele, sono frà di loro vguali: se la base LC è maggiore della base EN , il triangolo ALC sarà maggiore del triangolo DEN ; e se la base LC è minore della base EN , il triangolo ALC sarà minore del triangolo DEN . Si considerino quattro quantità; la prima sia il triangolo ABC , la seconda il triangolo DEF , la terza sia la base BC , e la quarta la base EF ; gli vguali multipli della prima ABC , e della terza BC , sono per quel, che s'è dimostrato, il triangolo ALC , e la base LC ; e gli vguali multipli della seconda DEF , e della quarta EF , sono il triangolo DEN , e la base EN . E perche se il triangolo ALC (ch'è multiplice della prima) supera il triangolo DEN (ch'è multiplice della seconda) ancora la base LC , ch'è multiplice della terza, supera la base EN , ch'è multiplice della quarta; e se il triangolo ALC è minore, ò vguale al triangolo DEN , ancora la base LC sarà minore, ò vguale alla base EN ; per la sesta definizione del 5. libro, la proportion della prima ABC alla seconda DEF , è l'istessa, che la proportion della terza BC alla quarta EF : per la qual cosa il triangolo ABC al triangolo DEF è come la base BC alla base EF , ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

Di nouo perche il parallelogrammo GC è il doppio del triangolo ABC , ed il parallelogrammo EH è il doppio del triangolo DEF , sarà il parallelogrammo GC multiplice del triangolo ABC , come il parallelo-

G g

gram-

a 38. del 1.

b 38. del 1.
e Corol. alla
38. del 1.

f 34. del 1.

d'15. del 5.
 e 11. del 5.
 grammo EH è multiplice del triangolo DEF; e perciò il parallelogrammo GC al parallelogrammo EH, d' sarà come il triangolo ABC al triangolo DEF; ma il triangolo ABC al triangolo DEF, per quel che s'è dimostrato, è come la base BC alla base EF, sarà il parallelogrammo GC, al parallelogrammo EH^e come la base BC alla base EF, ch'era da dimostrarsi.




S C O L I O.

Il P. Claudio fa la conuerfa dell'antecedente propositione nel seguente modo.

I triangoli, e parallelogrammi, che sono frà di loro come le basi, hanno la medesima, ò vguale altezze.

Siano i triangoli ABC, DEF, ed i parallelogrammi GBCA, DEFH, le di cui basi BC, EF, e le altezze siano le due AI, DK; ed habbia il triangolo ABC al triangolo DEF, ouero il parallelogrammo GBCA, al parallelogrammo DEFH, l'istessa proportion, quale hà la base BC alla base EF: Dico che le altezze AI, DK sono frà di loro vguali. Se l'altezza DK non è vguale all'altezza AI, una delle due sarà maggiore. Supposto che DK sia maggiore di AI, si faccia KL^a vguale ad AI, e dal punto L si tiri la retta LM^b parallela ad FK; segará il lato DE in qualche punto O, si tiri la retta OF. Perchè i triangoli ABC, OEF, hanno vguale altezze, perciò il triangolo ABC^d al triangolo OEF è come la base BC alla base EF; mà per ipotesi, il triangolo ABC al triangolo DEF, è come la base BC alla base EF; sarà il triangolo ABC al triangolo DEF, come il medesimo triangolo ABC al triangolo OEF; per la qual cosa il triangolo OEFⁱ sarà vguale al triangolo DEF; la parte vguale al tutto, ch'è impossibile; non dunque DK è maggiore di AI, mà sono frà di loro vguali.



a 3. del 1.
 b 31. del 1.
 d 1. del 6.
 e 11. del 5.
 f 9. del 5.
 g 1. del 6.
 h 11. del 5.
 K 9. del 5.
 Supposta la medesima costruzione, si considerino i parallelogrammi GBCA, OEFM, i quali hanno una medesima altezza, e perciò sono^k come le basi BC, EF: mà i parallelogrammi GBCA, DEFH, per ipotesi, sono come le basi BC, EF; sarà il parallelogrammo GBCA, al parallelogrammo DEFH, h come il medesimo parallelogrammo GBCA al parallelogrammo OEFM; dal che i parallelogrammi OEFM, DEFH sono^k frà di loro vguali; la parte vguale al tutto, ch'è impossibile: non dunque l'altezza DK è maggiore dell'altezza AI, mà sono frà di loro vguali, ch'era da dimostrarsi.

Aggiun-

Aggiunge in questo luogo il Commandino il seguente Theorema, che noi dimostriamo poco differente à quello, che fà il P. Clauio.


I triangoli, e parallelogrammi, che hanno le basi vguagli, sono frà di loro come le altezze.

Siano i triangoli ABC , DEF , ed i parallelogrammi $GBCA$, $DEFH$, che habbiano le basi BC , EF frà di loro vguagli, e le loro altezze siano le perpendicolari AI , DK . Dico che il triangolo ABC al triangolo DEF , ed il parallelogrammo $GBCA$ al parallelogrammo $DEFH$, e come l'altezza AI all'altezza DK . Si prolunghino le rette BI verso L , & FK verso M ; si faccia IL uguale à BC , e si faccia MK uguale ad EF . Essendo, per ipotesi, BC uguale ad EF , sarà IL uguale ad MK . Perche i triangoli ABC , AIL hanno la medesima altezza AI , perciò sono ^b come le basi; mà la base BC è uguale ad IL , sarà il triangolo ABC uguale al triangolo AIL . Nell'istesso modo si dimostrerà che il triangolo DEF è uguale al triangolo DMK ; e perciò il triangolo ABC al triangolo DEF ^d è come il triangolo AIL al triangolo DMK . In oltre perche LI è perpendicolare ad AI , & MK è perpendicolare à DK , prese AI , & DK come basi de i triangoli AIL , DKM , sarà LI l'altezza del triangolo AIL , ed MK sarà l'altezza del triangolo DKM ; mà LI è mostrata uguale ad MK , i triangoli AIL , DKM hauerranno le altezze IL , MK vguagli; d'alche il triangolo AIL al triangolo DKM ^e è come la base AI alla base DK ; mà il triangolo AIL al triangolo DKM è dimostrato come il triangolo ABC al triangolo DEF , sarà il triangolo ABC al triangolo DEF ^f come l'altezza AI all'altezza DK , ch'era da dimostrarfi nel primo luogo.

Di nouo perche il parallelogrammo $GBCA$ è il doppio del triangolo ABC , ed il parallelogrammo $DEFH$ è il doppio del triangolo DEF ; sarà il parallelogrammo $GBCA$ al parallelogrammo $DEFH$, ^g come il triangolo ABC al triangolo DEF ; mà il triangolo ABC al triangolo DEF , per quel che s'è dimostrato, è come l'altezza AI all'altezza DK ; sarà il parallelogrammo $GBCA$ al parallelogrammo $DEFH$, ^h come l'altezza AI all'altezza DK , ch'era da dimostrarfi.

Il P. Clauio fa la conuersa dell' antecedente Theorema nel seguente modo.

I triangoli, e parallelogrammi, che sono come le loro altezze, hauerranno vguagli basi; ò la medesima.



a 3. del 1.

b 1. del 6.

c Scol. alla 16. del 5.

d Corol. alla 7. del 5.


e 1. del 6.

f 11. del 5.

g 15. del 5.

h 11. del 5.

Siano i triangoli ABC , DEF , ed i parallelogrammi $GBCA$, $DEFH$, le di cui basi BC , EF , e le altezze siano AL , DM ; ed habbia il triangolo ABC al triangolo DEF , come ancora il parallelogrammo $GBCA$, al parallelogrammo $DEFH$, l'istessa proportion, quale ha l'altezza AL all'altezza DM . Dico che le basi BC , EF sono frà di loro uguali. Se la base BC non è uguale alla base EF una delle due sarà maggiore; sia dunque BC maggiore di EF , si



K 1. del 1.

I 11. del 5.

m 9. del 5.

n 31. del 3.

o 11. del 5.

p 9. del 5.

faccia BIK uguale ad EF , e si tiri la retta IA ; i triangoli ABI , DEF baueranno le basi BI , EF uguali, e per l'antecedente Teorema il triangolo ABI al triangolo DEF sarà come l'altezza AL all'altezza DM ; ma per ipotesi l'altezza AL all'altezza DM è come il triangolo ABC al triangolo DEF , sarà il triangolo ABC al triangolo DEF come il triangolo ABI al medesimo triangolo DEF , e perciò il triangolo ABI è uguale al triangolo ABC : la parte uguale al tutto, ch'è impossibile; non dunque la base BC è maggiore della base EF , ma sono frà di loro uguali.

Supposta la medesima costruzione, dal punto I si tiri la retta IK , parallela a GB ; i parallelogrammi $GBIK$, $DEFH$ baueranno le basi BI , EF frà di loro uguali, e per l'antecedente Teorema saranno frà di loro come le altezze AL , DM ; ma i parallelogrammi $GBCA$, $DEFH$, per ipotesi, sono come le altezze AL , DM ; sarà il parallelogrammo $GBIK$ al parallelogrammo $DEFH$, come il parallelogrammo $GBCA$ al medesimo parallelogrammo $DEFH$; e perciò i parallelogrammi $GBIK$, $GBCA$ sono frà di loro uguali: la parte uguale al tutto, ch'è impossibile; non dunque la base BC è maggiore della base EF , ma sono frà di loro uguali, ch'era da dimostrarsi.

Aggiungo qui il Teorema seguente di Claudio Midorgi, per lasciare liberi gli elementi Conici da particolari Lemma.

Se vn quadrato sia equilatero ad vn Rombo, e qualche rettangolo equilatero ad vn parallelogrammo, equiangolo al Rombo: il quadrato al rettangolo sarà, come il Rombo al parallelogrammo, che gli è equiangolo.


Sia il quadrato AB equilatero al Rombo CD , ed il rettangolo AE equilatero al parallelogrammo CF ; e sia il parallelogrammo CF equiangolo al Rombo CD . Dico che il quadrato AB al rettangolo AE , sarà come il Rombo CD al parallelogrammo CF . Si accomodi il quadrato AB , ed il rettangolo AE in modo, che l'angolo A sia commune ad ambedue; e similmente s'adatti il Rombo CD , ed il parallelogrammo CF in modo, che habbiano l'angolo C commune; sarà AK uguale a PG , ed LC uguale ad IH : ed essendo CL , per ipotesi, uguale ad AK , sarà HI uguale a PG ; dal che BP ad HD sarà come PG ad HI . Di più, essendo AP uguale a CH , & AM uguale a

a 34. del 1.


h Corollario alla 7. del 5.

CN,

CN, sarà AP ad AM come CH à CN .
 In oltre perche i rettangoli AB , AG hanno una medesima altezza, sarà il quadrato AB al rettangolo AG , e come la base BP alla base PG , cioè d come DH ad HI : mà DH ad HI , è come il Rombo CD al parallelogrammo CI (stante che hanno una medesima altezza); perciò il quadrato AB al rettangolo AG è sarà come il Rombo CD al parallelogrammo CI . Di nuovo essendo i rettangoli AG , AE , sotto una medesima altezza, sarà il rettangolo AG al rettangolo AE , g come la base AP alla base AM : fu dimostrata AP ad AM , essere come CH à CN ; sarà il rettangolo AG al rettangolo AE , h come CH à CN : mà CH à CN k è come il parallelogrammo CI al parallelogrammo CF (stante che i parallelogrammi CI , CF hanno una medesima altezza) sarà il rettangolo AG al rettangolo AE come il parallelogrammo CI al parallelogrammo CF . Finalmente perche il quadrato AB al rettangolo AG , per quel che s'è dimostrato, e come il Rombo CD al parallelogrammo CI ; ed il rettangolo AG al rettangolo AE è come il parallelogrammo CI al parallelogrammo CF ; per l'egualità, sarà il quadrato AB al rettangolo AE , m come il Rombo CD al parallelogrammo CF , ch'era da dimostrarsi.



c 1. del 6.
d 12. del 5.



e 1. del 6.
f 12. del 5.

g 1. del 6.

h 12. del 5.
k 1. del 6.

l 11. del 5.

m 22. del 5.


COROLLARIO.

Da quel che s'è detto è manifesto, che se faranno due qualunque rettangoli, e due parallelogrammi equilateri à i rettangoli, & equiangoli fra di loro; i rettangoli faranno fra di loro, come i parallelogrammi.

Per il medesimo fine aggiungiamo il seguente Theorema.

Se faranno due qualunque rette linee, il quadrato di vna al rettangolo contenuto dalle medesime, e come l'istesso rettangolo al quadrato dell'altra.

Siano qualunque due rette linee AB , BC . Dico che il quadrato di AB al rettangolo contenuto dalle due AB , BC , è come il medesimo rettangolo al quadrato di BC . Si pongano le rette AB , BC , in modo che facciano la sola retta ABC , e sopra la retta AC si descriva il quadrato AD ; si tiri il diametro EC ; dal punto B si tiri la retta BF parallela ad AE , la quale segnerà il diametro EC in qualche punto G , per il quale si faccia pas-




a 46. del 1.

b 31. del 1.

fare

- e 31. del 2. fare la retta IH ^c parallela ad AC ; sarà diuiso il quadrato AD in quattro parallelogrammi, de' quali i due IF , BH , che sono intorno al diametro, per il Corollario alla 4. proposizione del 2. Libro, sono quadrati, ed i complementi AG , GD sono rettangoli. In oltre perche i due IF , GD , hanno vna medesima altezza, sarà il quadrato IF al rettangolo GD ^e come la base IG alla base GH ; similmente i due AG , BH hanno vna medesima altezza, e perciò il rettangolo AG al quadrato BH ^e è come la base IG alla base GH ; ma IG à GH si disse essere come il quadrato IF al rettangolo GD : sarà il quadrato IF al rettangolo GD ^f come il rettangolo AG al quadrato BH ; ma il rettangolo GD è uguale al rettangolo AG , sarà il quadrato IF al rettangolo AG , come il medesimo rettangolo AG al quadrato BH : e perche il rettangolo AG ^e è contenuto dalle due AB , BC (stante che BC è uguale à BG) sarà il quadrato IF , cioè il quadrato di AB , al rettangolo contenuto dalle due AB , BC , come il medesimo rettangolo contenuto dalle due AB , BC , al quadrato BH , cioè al quadrato di BC , ch'era da dimostrarfi.



C O R O L L A R I O I.

Da quel che si è dimostrato è manifesto, che se le rette faranno AC , CB , il quadrato di AC al rettangolo contenuto dalle due AC , CB sarà come il medesimo rettangolo contenuto dalle due AC , CB al quadrato di CB .

C O R O L L A R I O II.

Sarà dunque manifesto, che il rettangolo contenuto dalle due AB , BC è medio proportionale frà i quadrati delle due AB , BC ; ed il rettangolo contenuto dalle due AC , CB è medio proportionale frà i quadrati delle due AC , CB .

THEOREMA II. PROPOSITIONE II.

Se nel triangolo sia tirata vna linea retta parallela ad vno de'lati, quella segarà gli altri due lati proportionalmente; e se due lati del triangolo sono segati proportionalmente, la retta, che congiunge le diuisioni, è parallela al terzo lato.

Sia

Sia il triangolo ABC, nel quale sia prima tirata la tetta DE parallela ad vno de' lati, come BC. Dico che i lati AB, AC sono segati dalla retta DE proportionalmente in D, ed E; cioè, che AD à DB, è come AE ad EC. Si tirino le tette BE, DC; e si considerino i due triangoli CED, BDE, i quali hanno la medesima base DE, e sono, per ipotesi, frà le medesime parallele DE, BC, e perciò sono frà di loro vguali. Si prenda il triangolo ADE come tetta quantirà, hauerà il triangolo ADE al triangolo CED ^a l'istessa proportionione, quale hà il medesimo triangolo ADE al triangolo BDE.


Si considerino i triangoli AED, DEB, i quali hanno le basi AD, DB, in vna medesima dirittura, e gli angoli verticali s'vnifcono nel medesimo punto E, e per quel che si disse alla 4. defin. di questo, hanno vna medesima altezza. E per l'istessa ragione i triangoli ADE, EDC, le di cui basi AE, EC sono in vna medesima dirittura, e gli angoli verticali s'vnifcono nel medesimo punto D, sono sotto d'vna medesima altezza. Perche dunque i triangoli AED, EDB hanno vna medesima altezza, farà il triangolo AED al triangolo EDB, e come la base AD alla base DB; ma il triangolo AED al triangolo EDB, per quel che s'è dimostrato, è come il medesimo triangolo AED al triangolo EDC; farà AD à DB ^d come il triangolo AED al triangolo EDC. E perche il triangolo ADE al triangolo EDC è come la base AE alla base EC ^e (stante che sono sotto d'vna medesima altezza) farà AD à DB, ^f come AE ad EC, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

Di nuouo supposto, che la proportionione di AE ad EC sia come quella di AD à DB, titara la retta DE. Dico ch'è parallela al lato BC. Sia fatta la medesima costruzione di prima. Essendo i triangoli AED, EDB, sotto d'vna medesima altezza, farà il triangolo AED al triangolo EDB, ^g come la base AD alla base DB; ma per ipotesi AD à DB è come AE ad EC; farà il triangolo AED al triangolo EDB, ^h come AE ad EC. In oltre, essendo i triangoli ADE, DCE sotto d'vna medesima altezza, il triangolo AED al triangolo DEC ^k farà come la base AE alla base EC: ma AE ad EC, per quel che s'è dimostrato, è come il triangolo AED al triangolo EDB; farà il triangolo ADE al triangolo EDC ⁱ come il medesimo triangolo ADE al triangolo EDB. Quando vna terza quantità hà l'istessa proportionione à due, i quelle ^m sono frà di loro vguali; faranno i triangoli DEB, EDC frà di loro vguali; hanno la medesima base DE, e sono collocati dalla medesima parte BC, e perciò ⁿ sono frà le medesime parallele BC, DE, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA III. PROPOSITIONE III.

Se vna retta linea diuide vn angolo del triangolo in due parti vguali, quella segarà il lato opposto proportional-

mente



a 37. del 1.

b 7. del 5.

c 1. del 6.

d 11. del 5.

e 1. del 6.

f 11. del 5.

g 1. del 6.

h 11. del 5.

k 1. del 6.


l 11. del 5.

m 9. del 5.

n 39. del 1.

mente à gli altri lati del triangolo; e se le parti della base sono proporzionali à gli altri due lati del triangolo, la retta tirata dall'angolo verticale al punto, che separa le parti della base, diuiderà l'angolo verticale in due parti vguali.

Nel triangolo ABC sia prima diuiso l'angolo BAC in due parti vguali dalla retta AD . Dico che la retta AD continuata segnerà la base BC proporzionalmente in qualche punto D ; cioè che la proporzione di CD à DB è come quella di CA ad AB . Si continui il lato CA verso E , e si faccia AE^a



vguale ad AB ; farà CA ad AE ,^b come la medesima CA ad AB ; si tiri la retta EB , il triangolo AEB sarà isoscele, e gli angoli AEB , ABE sopra la base sono ^c frà di loro vguali. Nel triangolo EAB , continuato il lato EA verso C , l'angolo esterno BAC^d è vguale alli due angoli ABE , AEB , interni, ed opposti; ma i due angoli ABE , AEB sono frà di loro vguali, farà l'angolo BAC il doppio dell'angolo ABE , e la metà dell'angolo BAC , cioè l'angolo BAD , farà vguale all'angolo ABE . Hor essendo le rette AD , EB segate dalla retta AB ; e gli angoli alterni DAB , ABE sono frà di loro vguali, farà la retta AD ^e parallela alla retta EB . Nel triangolo CEB è tirata la retta AD parallela al lato EB ,^f farà la proporzione di CD à DB , come quella di CA ad AE ; ma CA ad AE è come la medesima CA ad AB ; farà CD à DB ^g come CA ad AB , ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

Di nouo sia diuisa la base BC talmente in D , che CD à DB sia come CA ad AB ; tirata la retta DA . Dico che la retta DA diuide l'angolo BAC in due parti vguali. Si concepisca fatta la medesima costruzione di prima. Perche AB è vguale ad AE , gli angoli AEB , ABE ^h sono frà di loro vgualiⁱ ed oltre à ciò la proporzione di CA ad AE ^k farà come quella della medesima CA ad AB , ma per ipotesi CA ad AB è come CD à DB , farà CD à DB ^l come CA ad AE ; dal che AD ^m farà parallela ad EB . Hor essendo AD , EB frà di loro parallele, segate dalla retta AB , gli angoli alterni DAB , ABE ⁿ sono frà di loro vguali. E similmente le rette parallele AD , EB , essendo segate dalla retta EC , l'angolo CAD esterno è vguale^o all'angolo E interno, ed opposto; ma gli angoli AEB , ABE , sono frà di loro vguali; faranno gli angoli DAB , DAC frà di loro vguali, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA IV. PROPOSITIONE IV.

I triangoli equiangoli hanno i lati intorno à gli angoli

vguali

a 3. del i.

b 7. del 5.

c 5. del i.

d 32. del 2.

e 27. del 2.

f 2. del 6.

g 12. del 5.

h 5. del 1.

k 7. del 5.

l 11. del 5.


m 2. del 6.

n 29. del 2.

o 29. del 2.

vguali proporzionali; e quei lati sono homologhi, che sono opposti à gli angoli vguali.

Siano i triangoli equiangoli ABC, DCE, cioè che l'angolo ABC sia vguale all'angolo DCE; l'angolo BAC vguale all'angolo CDE; e l'angolo ACB sia vguale all'angolo DEC. Dico che la proporzione di AB à BC è come quella di DC à CE; che BC à CA è come CE ad ED; e che BA ad AC è come CD à DE. Si concepiscano collocati i triangoli ABC, DCE in modo, che si componghino secondo l'angolo ACD, e che i lati BC, CE costituiscano vna sola retta linea. Perche l'angolo ABC è supposto vguale all'angolo DCE, all'vno, ed all'altro s'aggiunga l'angolo DEC; i due angoli ABC, DEC sono vguali à i due angoli DCE, DEC; ma i due angoli DCE, DEC sono minori di due angoli retti; li due angoli dunque



ABC, DEC sono minori di due angoli retti. Hor essendo le rette AB, DE segate dalla retta BE, e gli angoli interni ABC, DEC sono minori di due angoli retti, per lo Scolio alla 31. propos. le rette BA, ED continuate concorreranno in qualche punto F. In oltre perche le rette DC, FB sono segate dalla retta BE, e l'angolo esterno DCE, per ipotesi, è vguale all'angolo ABC interno, ed opposto; farà la retta DC b parallela alla retta FB. Similmente le rette AC, FE sono segate dalla retta BE, e l'angolo esterno ACB è supposto vguale all'angolo E interno, ed opposto; farà la retta AC c parallela ad FE, e perciò il quadrilatero FACD è parallelogrammo, dal che il lato FA d farà vguale al lato DC, ed il lato FD vguale al lato AC.

Si consideri il triangolo FBE, segato dalla retta AC, parallela al lato FE; farà la proporzione di BA ad AF, e come quella di BC à CE; ma FA è vguale alla retta CD; farà BA à CD f come BC à CE; e permutando, AB à BC g farà come DC à CE; dal che i lati intorno à gli angoli vguali ABC, DCE sono proporzionali; e gli antecedenti AB, DC, che si dicono h homologhi, sono opposti à gli angoli vguali ACB, DEC; come ancora i conseguenti BC, CE, che gli chiamiamo homologhi, sono opposti à gli angoli vguali BAC, CDE. Di nouo si consideri il triangolo FBE, segato dalla retta DC, parallela al lato FB; farà EC à CB k come ED ad DF; ma DF è vguale ad AC; farà EC à CB l come ED ad AC; e permutando, CE ad ED m farà come BC à CA; e così i lati intorno à gli angoli vguali BCA, CED, sono proporzionali; e gli homologhi, cioè gli antecedenti BC, CE, sono opposti à gli angoli vguali BAC, CDE; come ancora gli homologhi, cioè i conseguenti ED, CA, sono opposti à gli angoli ABC, DCE vguali. Finalmente si considerino tre quantità da vna parte, come AB prima, BC seconda, & AC terza; e tre altre da vn'altra parte, cioè la prima DC, la seconda CE, è la terza ED. Perche

317. del 1.

b 28. del 1.

c 28. del 1.

d 34. del 1.

e 24. del 6.

f 11. del 5.

g 16. del 5.

h 18. defin. del 5.

k 2. del 6.


l 11. del 5.

m 16. del 5.

n 22. del 5.

n. 22. del 5.


la prima AB alla seconda BC , per quel che s'è dimostrato, è come la prima DC alla seconda CE ; e la seconda BC alla terza AC è come la seconda CE alla terza DE ; per l'egualità; la prima AB alla terza AC , sarà come la prima DC alla terza DE ; per la qual cosa i lati intorno à gli angoli vguali sono proporzionali, ch'era da dimostrarsi.



COROLLARIO.

n. 29. del 1.

Da quel che s'è detto è manifesto, che la retta linea nel triangolo parallela ad vn lato, detrae dal triangolo vn triangolo simile à tutto il triangolo. Come se nel triangolo ABC sia tirata la retta DE parallela al lato BC , il triangolo detratto ADE sarà simile à tutto il triangolo ABC . Perche, essendo DE parallela al lato BC , l'angolo AED sarà vguale all'angolo C interno, ed opposto; e per l'istessa ragione l'angolo esterno ADE è vguale all'angolo B interno, ed opposto; ma l'angolo A è commune, i triangoli dunque ADE , ABC sono equiangoli; e per l'antecedente proposizione, hanno i lati, intorno à gli angoli vguali, proporzionali; e per la definizione prima di questo, i triangoli ADE , ABC sono frà di loro simili.



S C O L I O.

Per breuità delle cose à venire aggiungo il seguente Theorema.

Se di due parallelogrammi vn angolo dell'vno è vguale ad vn angolo dell'altro; e due lati intorno à qualunque angolo dell'vno siano vguali à due lati intorno à qualunque angolo dell'altro; quei parallelogrammi sono frà di loro simili, ed vguali.

Siano

Siano i parallelogrammi BD , FH , de' quali l'angolo C sia eguale all'angolo G ; il lato AD uguale al lato EH ; ed il lato DC uguale al lato HG . Dico che i parallelogrammi BD , FH sono frà di loro simili, ed uguali. Perché i lati AD , DC , si suppongono uguali à i lati EH , HG ; ed in ogni parallelogrammo i lati opposti sono 2



34. del 1.

frà di loro uguali; sarà l'angolo E uguale all'angolo A ; il lato AB uguale al lato EF ; ed il lato BC uguale al lato FG ; per la qual cosa AD à DC b sarà come EH ad HG ; il lato DA ad AB sarà come EH ad EF ; il lato AB à BC sarà come EF ad FG ; e sarà BC à CD come FG à GH . Si tirino le diagonali DB , HF . Essendo i lati DA , AB , uguali à i lati EH , EF , e l'angolo A uguale all'angolo E ; sarà il triangolo ABD uguale al triangolo EFH ; l'angolo ABD sarà uguale all'angolo EFH , e l'angolo ADB uguale all'angolo EHF : Nell'istesso modo si dimostrerà, che il triangolo FGH è uguale al triangolo DBC ; che l'angolo GFH è uguale all'angolo CBD ; e che l'angolo GHE è uguale all'angolo CDB : dal che tutto l'angolo ABC sarà uguale à tutto l'angolo EFG ; e l'angolo ADC uguale all'angolo EHG ; e tutto il parallelogrammo AC uguale à tutto il parallelogrammo EG ; e perciò i parallelogrammi AC , EG sono equiangoli, hanno i lati intorno à gli angoli uguali proporzionali, e per la prima definizione, sono simili; per la qual cosa i parallelogrammi AC , EG sono frà di loro simili, ed uguali, ch'era da dimostrarsi.

b Corol. alla 4. del 5.


c 4. del 1.

THEOREMA V. PROPOSITIONE V.

I triangoli; che hanno i lati proporzionali, sono equiangoli; e quelli angoli sono eguali, che sono opposti à i lati homologhi.

Siano i triangoli ABC , DEF , che habbiano i lati proporzionali, cioè che AB à BC sia come DE ad EF ; che BC à CA sia come EF ad FD ; e che AB ad AC sia come ED à DF .

Dico che gli angoli A , & D , che sono opposti à i lati homologhi BC , EF , sono frà di loro uguali. E similmente gli angoli ABC , DEF , che sono opposti à i lati homologhi AC , DF , sono frà di loro uguali; come ancora gli angoli ACB , DFE , opposti à i lati homologhi AB , DE , sono frà di loro uguali. Sopra la retta EF nel punto E si costruisca l'angolo FEG uguale all'angolo B ; e nel punto F , si faccia l'angolo EFG uguale all'angolo C . Perché gli angoli B , & C sono minori di due angoli retti, i



23. del 1.

b 17. del 1.

H h 2

due

c Scol. alla
31. del 8.
d 32. del 1.
e 4. del 6.

f 21. del 5.

g 9. del 5.

h 4. del 6.

K 11. del 5.

l 9. del 5.


m 8. del 1.

n 4. del 1.

c 31. del 1.

due angoli GEF, GFE faranno minori di due angoli retti; e le rette EG, FG continuate ^a concorreranno in qualche punto G; ed oltre a ciò il triangolo

GFE ^d sarà equiangolo al triangolo ABC; dal che AB ^a BC ^e sarà come GE ad EF; ma per ipotesi, AB ^a BC ^e è come DE ad EF; sarà DE ad EF ^f come GE alla medesima EF; per la qual cosa E D ^g sarà vguale ad E G. In oltre perche i triangoli GEF, ABC sono equiangoli, e l'angolo C è vguale all'angolo GFE; sarà BC ^a CA ^h come E F ad FG. Ma, per ipotesi, BC ^a CA ^e è come EF ad FD; sarà E F ad FG ^k come la medesima EF ad FD, e perciò le due DF, FG ^l sono frà di loro eguali. Ne



i triangoli DEF, EGF, i due lati DE, DF, sono eguali alli due lati EG, GF, la base EF è commune; sarà l'angolo G ^m vguale all'angolo D, ed i rimanenti due angoli GFE, GEF ⁿ vguali alli rimanenti due angoli DFE, DEF; cioè l'angolo DFE sarà vguale all'angolo GFE, e l'angolo DEF vguale all'angolo GEF; ma l'angolo GEF è fatto vguale all'angolo B, sarà l'angolo DEF vguale all'angolo B. Similmente l'angolo GFE è fatto vguale all'angolo C; sarà l'angolo DFE vguale all'angolo C; e perche i due angoli DEF, DFE sono vguali a i due angoli ABC, ACB, il rimanente angolo D ^o sarà vguale al rimanente angolo A, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA VI. PROPOSITIONE VI.

Se vn angolo di vn triangolo è vguale ad vn angolo d'vn altro triangolo, ed i lati intorno a gli angoli vguali sono proporzionali; i triangoli sono equiangoli; e quegli angoli sono eguali, che sono opposti a i lati homologhi.

Siano i triangoli ABC, DEF; e sia l'angolo B eguale all'angolo DE F; e la proporzione di AB à BC sia come quella di DE ad E F. Dico che gli angoli ACB, DFE, opposti a i lati homologhi, cioè a gli antecedenti AB, D E, sono frà di loro vguali; e che gli angoli A, & D, che sono opposti a i lati homologhi, cioè a i conseguenti BC, EF, sono frà di loro vguali. Sopra la retta EF nel punto E ^a si faccia l'angolo FEG vguale all'angolo B, che sarà vguale all'angolo D E F; e nel punto F si faccia l'angolo EFG vguale all'angolo C, le rette EG, FG, continuate ^b concorreranno in qualche punto G, ed i triangoli GFE, ABC saranno ^c equiangoli; ed essendo l'angolo GEF vguale all'angolo B; sarà GE ad EF ^d come AB à BC: ma per ipotesi AB ^a BC ^e è come D E ad E F, sarà D E ad EF ^f come G E alla medesima EF; per la qual cosa i lati ED, E G ^g sono frà di loro vguali. Si considerino i due triangoli DEF, GEF, de' quali il lato EG è vguale al lato E D, il lato EF è commune, e l'angolo GEF è vguale all'angolo DEF; sarà la base GF ^h vguale alla base FD; e l'ango-

a 31. del 1.

b Scol. alla

31. del 1.

c 32. del 1.

d 4. del 6.

e 21. del 5.

f 9. del 5.

g 4. del 1.

lo GFE vguale all'angolo DFE: mà l'angolo GFE è fatto vguale all'angolo C, sarà l'angolo DFE vguale all'angolo C: per ipotesi l'angolo DEF è vguale all'angolo B; il rimanente angolo D sarà vguale al rimanente angolo A, ch'era da dimostrarfi.


h 32. del 1.

S C O L I O.

Per le cose, che bisogneranno stimo bene porre in questo luogo il seguente Theorema.

Se da due qualunque punti A, C, presi nella retta AB, continuata se bisogna, sono tirate due rette parallele, come AD, CE; e sia DA ad AB, come EC a CB; tirate le rette (nella prima figura) DB, BE; e nella seconda figura DE, EB. Dico che queste fanno vna sola retta linea.

Nella prima figura. Perché le rette AD, EC sono parallele, segate dalla retta AC, gli angoli alterni DAB, ECB sono fra di loro uguali: mà per ipotesi, DA ad AB è come EC a CB, i triangolo DAB, ECB; per l'antecedente proposizione, sono equiangoli; sarà l'angolo CEB vguale all'angolo ADB; e l'angolo EBC vguale all'angolo ABD: ugualmente s'aggiunga l'angolo DBC, i due angoli EBC, CBD saranno uguali a i due angoli CBD, DBA: mà i due angoli CBD, DBA sono uguali a due angoli retti; i due angoli dunque EBC, CBD saranno uguali a due angoli retti; e le rette EB, BD costituiranno vna sola retta linea. Nella seconda figura, se le rette DE, EB non costituiscono vna sola retta linea, continuata la retta DE, quella ò passerà sopra, ouero sotto la retta EB, come fà la retta DEF. Hor perché la retta EC è parallela ad AD, l'angolo FEC esterno sarà vguale all'angolo FDA interno, ed opposto; e similmente l'angolo FCE sarà eguale all'angolo FAD; ma l'angolo DFA è commune; saranno i triangoli DFA, EFC equiangoli; e la proportion di DA ad AF sarà come quella di EC a CF; e permutando, DA ad EC sarà come AF ad FC. In oltre, per ipotesi, DA ad AB è come EC a CB; permutando, DA ad EC sarà come AB a BC; mà DA ad EC, per quel che s'è dimostrato, è come AF ad FC; sarà AB a BC come AF ad FC; e diuidendo, AC a CB sarà come la medesima AC a CF; dal che CF sarà vguale ad EB; la parte vguale al tutto, ch'è impossibile: non dunque continuata DE passa sopra, né sotto la retta EB; mà le due DE, EB costituiranno vna sola retta linea, ch'era da dimostrarfi.



a 39. del 1.

b 17. del 1.

c 14. del 1.

e 19. del 1.

f 4. del 6.

g 16. del 5.

h 16. del 5.

i 17. del 5.

k 17. del 5.


l 19. del 5.

C O R O L L A R I O

Da quel che s'è detto è manifesto, che se DA ad AB è

come


come EC à CB ; tirata la retta BE , e continuata, quella concorre con AD nel punto D ; ouero tirata la retta ED , quella continuata passa per il punto B ; ouero tirata la retta DB , e continuata, se bisogna, quella passa per il punto E ; stante che s'è dimostrato, che tirate le rette EB , BD come nella prima figura, ouero ED , EB , come nella seconda figura, quelle costituiscono vna sola retta linea.



THEOREMA VII. PROPOSITIONE VII.

Se vn angolo d'un triangolo è vguale ad vn angolo d'un altro triangolo; ed i lati intorno ad vn altr'angolo sono proporzionali; ed oltre à ciò i rimanenti due angoli sono della medesima specie; i triangoli sono equiangoli; e quegli angoli sono vguali, che sono opposti à i lati homologhi.

Ne i triangoli ABC , DEF , sia l'angolo A vguale all'angolo D ; ed i lati intorno à due altri angoli, come C , ed F siano proporzionali; cioè che AC à CB sia come DF ad FE ; ed i rimanenti angoli E , & B siano della medesima specie; cioè che ognuno sia minore del retto,



ouero non minore del retto. Dico che gli angoli ABC , DEF , opposti à i lati homologhi, cioè à gli antecedenti DF , AC , sono fra di loro vguali; e che gli angoli C , ed F sono fra di loro vguali. Supposto prima, che gli angoli E , ed F siano acuti, cioè che ognuno sia minore del retto; se l'angolo D non è vguale all'angolo A , vno de i due sarà maggiore: e supposto che l'angolo ACB sia maggiore dell'angolo D , si faccia l'angolo ACG vguale all'angolo D ; farà l'angolo ACG minore dell'angolo ACB ; e perciò la retta CG sega l'angolo ACB , e continuata concorre col lato AB in qualche punto G . Ne i triangoli ACG , DEF essendo l'angolo A , per ipotesi, vguale all'angolo D ; e l'angolo ACG , per costruzione, vguale all'angolo F ; il rimanente angolo AGC sarà vguale al rimanente angolo E ; ed i triangoli ACG , DEF sono equiangoli, e la proportion di AC à CG farà come quella di DF ad FE : ma DF

a 3. del 1.

b 3. del 1.

c 4. del 1.

ad

ad FE, per ipotefi, è come AC a CB; farà AC à CG^d come la medefima AC à CB; d'alche le rette CG, CB sono frà di loro vguali, il triangolo CGB è ifofcele, e gli angoli CBG, e CGB fono frà di loro vguali: ma l'angolo CBG, per ipotefi, è minore d'un angolo retto, farà l'angolo CGB minore d'un angolo retto; e perche gli angoli CGB, CGA s^e sono vguali à due retti; detrattone l'angolo CGB minore del retto, refta l'angolo CGA maggiore del retto; fù dimoftrato l'angolo CGA vguale all'angolo E, farà l'angolo E maggiore del retto, ch'è contro all'ipotefi, mentre l'angolo E fù fuppofto minore del retto: quando dunque ognuno degli angoli E, & B è minore del retto, non fono gli angoli ACB, DFE frà di loro ineguali.


Di nuouo fuppofto, che ognuno degli angoli E, & B, non fia minore d'un angolo retto; fi faccia la medefima coftituzione, e dimoftratione di prima, e fi dimoftri, che le rette CG, CB fono frà di loro vguali; farà il triangolo CGB ifofcele, e gli angoli CBG, CGB h^a fono frà di loro vguali: ma l'angolo B è fuppofto non minore d'un angolo retto, ne meno l'angolo CGB farà minore d'un angolo retto; e perciò i due angoli CBG, CGB, del triangolo CBG, non fono minori di due angoli retti, ch'è contro alla 17. propofitione del primo Libro; non dunque l'angolo ACB è maggiore dell'angolo DFE, ma fono frà di loro vguali; e perche l'angolo A è fuppofto vguale all'angolo D, farà il rimanente angolo B vguale all'angolo E, ch'era da dimoftrarfi.

THEOREMA VIII. PROPOSITIONE VIII.

Se dall'angolo retto d'un triangolo rettangolo cade vna retta perpendicolare al lato oppofto, quella diuide il triangolo in due triangoli fimili fra di loro; ed ognuno fimile à tutto il triangolo.

Nel triangolo ABC, angolo retto in A, dal quale cada la retta AD, perpendicolare al lato oppofto B C: Dico che i triangoli ADB, ADC fono frà di loro fimili; ed ogn'vno è fimile à tutto il triangolo ABC.

Si confiderino i triangoli ADC, BAC, de' quali gli angoli BAC, ADC fono retti; l'angolo C è commune ad ambidue i triangoli; e perciò il rimanente angolo DAC^a farà vguale al rimanente angolo B, ed i triangoli ABC, ADC fono equiangoli; dal che haueranno i lati intorno à gli angoli vguali^b proportionali, e perciò c^c fono fimili frà di loro; e farà BA ad A C^d come AD à DC. Di nuouo fi confiderino i due triangoli ADB, ABC, de quali gli angoli BAC, ADB fono retti; l'angolo B è commune ad ambidue i detti triangoli; farà il rimanente angolo DAC, e



vqua-


2.13 del 6.
2.14 del 6.

g. 1. defin.
del 6.
h. 4. del 6.

K 11. del 5.

16. del 6.
m. 4. del 6.
n. 1. defin.
del 6.

uguale al rimanente angolo C, ed i triangoli ABC, ADB sono equiangoli; però i lati intorno a gli angoli uguali sono proporzionali; e conseguentemente sono fra di loro simili; e sarà BA ad AC come BD a DA; ma, per quel che s'è dimostrato, BA ad AC è come AD a DC; sarà BD a DA come AD a DC. Ne i triangoli ADB, ADC, angoli retti in D, essendo i lati intorno a gli angoli uguali ADB, ADC proporzionali, cioè BD a DA, come AD a DC; i triangoli ADB, ADC sono equiangoli, hanno i lati intorno a gli angoli uguali proporzionali, e perciò sono fra di loro simili. S'è dimostrato, che ogn'vno è simile a tutto il triangolo ABC; la retta dunque AD divide il triangolo ABC in due triangoli simili fra di loro, ed ognuno simile a tutto il triangolo ABC; ch'era da dimostrarsi.



COROLLARIO I.

Essendosi dimostrata BD a DA essere come la medesima DA a DC, sarà manifesto, che la retta AD, la quale cade dall'angolo retto A perpendicolare alla base BC, è media proportionale fra le parti BD, DC della base BC.

COROLLARIO II.


Perche i triangoli ABC, ADC sono equiangoli, e l'angolo C è commune, sarà BC a CA, come la medesima AC a CD; dal che AC è media proportionale fra BC, CD. Similmente i triangoli ABC, ADB sono equiangoli, e l'angolo B è commune; sarà CB a BA come la medesima AB alla parte BD, e perciò il lato AB è media proportionale fra il lato CB, e la parte BD. Donde è manifesto, che nel triangolo rettangolo, ogn'vno de' lati intorno all'angolo retto è media proportionale fra le base, e la parte interposta fra la perpendicolare, che cade dall'angolo retto, e quel lato.

PROBLEMA I. PROPOSITIONE IX.

Da vna data retta linea tagliarne vna parte propofa.

Sia

Sia data la retta AB, dalla quale se ne voglia tagliare vna parte proposta, e supposto che se ne voglia tagliare la quarta parte. Da vno degli estremi della retta AB, come dall'estremo A, si tiri la retta AC, che faccia qualunque angolo con la retta AB; si prenda in AC qualunque punto D, e si taglino le parti DE, EF, FG, ogn'vna vguale ad AD; e le parti vguale in AG deuono essere tante, per quanto bisogna, acciò che AD sia parte di AG, secondo la proposta parte; e perche s'è proposta la quarta parte, perciò le parti in AG faranno quattro. Si tiri la retta GB, e dal punto D si tiri la retta DH, ^b parallela alla retta GB, la quale segará AB in qualche punto H. Dico che AH sarà la quarta parte di AB. Nel triangolo AGB la retta DH è parallela al lato GB, e perciò GD à DA ^c farà come BH ad HA; e componendo, GA ad AD ^d farà come BA ad AH; ed inuertendo, AD ad AG ^e farà come AH ad AB: ma AD è la quarta parte di AG, sarà dunque AH ^f la quarta parte di AB. L'istesso si farà se sarà proposta altra parte, ch'era da farsi, e dimostrarli.



a 3. del 1.

b 31. del 1.

c 2. del 6.

d 18. del 5.

e Coroll. alla

4. del 5.


f Coroll. alla

15. del 5.

PROBLEMA II. PROPOSITIONE X.

Date due rette linee, delle quali vnà sia diuisa in quante parti si vuole, e l'altra non diuisa; segare la non diuisa nelle parti della diuisa.

Sia la retta non diuisa AB, da segarsinelle parti della diuisa AC; cioè che le parti di AB habbiano l'istessa proportion, qualè hanno le parti che sono in AC, la quale supponiamo diuisa come in D, ed E. S'inclinino le rette AB, AC, che s'uniscano nell'estremo A, secondo qualunque angolo CAB; si tiri la retta CB; e da i punti D, ed E, si tirino le rette DF, EG, parallele alla retta CB, le quali segaranno la retta AB come in F, & G. Dico che AB sarà diuisa nelle parti di AC. Dal punto D si tiri la retta DH ^b parallela ad AB, la quale segará le rette EG, CB, come in I, ed H. E perche le rette DF, IG, HB sono parallele, i quadrilateri DFGL, IGBH sono parallelogrammi; e farà DI ^c vguale ad FG, & IH vguale à GB; per la qual cosa DI ad IH ^d farà come FG à GB: Nel triangolo AGE la retta DF è parallela ad EG,



a 31. del 1.

b 31. del 1.

c 34. del 1.

d Coroll. alla

15. del 5.

I i

farà


e 1. del 6.

12. del 6.

g 11. del 5.

h 12. del 5.


farà AD à DE^c come AF ad FG. Similmente nel triangolo DHC la retta EI è parallela ad HC, farà DE ad EC^f come DI ad IH; ma DI ad IH è come FG à GB, farà DE ad EC come FG à GB. Hor essendo AD à DE come AF ad FG; e DE ad EC come FG à GB, per l'egualità, AD ad EC^h farà come AF à GB; per la qual cosa le parti in AB hanno frà di loro l'istessa proportion, quale hanno le parti in AC frà di loro, ch'era da farsi, e dimostrarsi.



S C O L I O.

Da quel che s'è detto, sarà facile trouare il modo da diuidere vna retta in quante parti uguali si vuole.

Per effempio, habbiasi da diuidere la retta AB in quante parti uguali si vuole: dall'estremo A si tiri la retta AC, che faccia qualunque angolo con la retta AB; si prendano in AC tante parti uguali, per quante parti si vogliono in AB; cioè se si vuole diuidere AB in tredici parti uguali, si prenderanno in AC, tredici parti uguali: se



AB si vuole diuidere in cinque parti uguali, si prenderanno in AC cinque parti uguali, e così per le altre di moltitudine maggiore, o minore; poi si congiungano gli estremi C, & B con la retta CB, e da i punti D, E, F, G, &c. si tirino rette linee parallele alla retta CB, le quali continuate diuideranno AB in tante parti uguali, in quante è diuisa la retta AC, come sopra fu dimostrato.


Non sarà inutile aggiungere qui vn Problema di Pappo nel settimo libro delle sue Colletzioni Matematiche.

Diuidere vna data retta linea secondo vna data proportion.

Habbiasi da diuidere qualunque data retta AB, secondo la data proportion di C à D. Dall'estremo A si tiri la retta AE, che faccia qualunque

angolo

angolo con AB ; poi si faccia AF uguale a C , e si tagli FG uguale a D ; sarà AF ad FG come C a D . Si tiri la retta GB , e dal punto F si tiri la retta FH parallela alla retta GB , la quale segnerà la retta AB in qualche punto H . Dico che AH ad HB è come C a D . Nel triangolo ABG , la retta FH è parallela al lato GB , sarà AH ad HB come AF ad FG ; ma AF ad FG è come C a D , sarà AH ad HB come C a D , ch'era da farsi, e dimostrarsi.



a 3. del 1.
b Corollalla
7. del 5.

c 3. del 1.

d a. del 6.


e 11. del 5.

PROBLEMA III. PROPOSITIONE XI.

Date due rette linee, ritrouarle vna terza proportionale.

Siano date le due rette AB , AC , alle quali si vuole ritrouare vna terza proportionale; cioè che la prima AB alla seconda AC sia come la seconda AC ad vn'altra terza quantità.

S'inclinino le due AB , AC , che concorrano infieme nell'estremo A , e facciano qualunque angolo CAB ; si tiri la retta CB , poi si continui AB verso D , e si faccia BD uguale ad AC ; dal punto D si tiri la retta DE parallela alla retta BC , la quale concorrerà con AC continuata in qualche punto E . Dico che la retta CE farà la terza proportionale. Nel triangolo ADE la retta CB è parallela ad ED , sarà AB a BD come AC a CE ; ma BD è uguale ad AC , sarà AB ad AC come la medesima AC a CE ; cioè la prima AB alla seconda AC come la seconda AC alla terza CE , ch'era da farsi, e dimostrarsi.



a 3. del 1.
b 31. del 1.


c 2. del 3.

PROBLEMA IV. PROPOSITIONE XII.

Date tre rette linee, ritrouarle la quarta proportionale.

Siano date le tre rette linee AB , BC , AD , alle quali si voglia ritrouare la quarta proportionale.

Si ponghino le prime due AB , BC in modo, che facciano la sola retta AC ; e nell'estremo A s'inclinino la terza AD a qualunque angolo con la




I i 2

retta

a 31. del 2.

retta AB; si tiri la retta DB; e dal punto C si tiri la retta CE^a parallela alla retta BD, la quale concorrerà con AD continuata in qualche punto E. Dico che DE farà la quarta proportionale, che si cerca. Nel triangolo ACE la retta DB è parallela ad EC, farà la prima AB alla seconda BC^b come la terza AD alla quarta DE, ch'era da farsi, e dimostrarsi.

b 2. del 6.



S C O L I O.


Il seguente problema di Pappo Alessandrino è simile all'antecedente.

Date le tre rette AB, BC, CD ritrouare vna retta, che habbia l'istessa proportionione à DC, quale hà AB à BC.

c 31. del 2.

Si pongano le due AB, BC in vna medesima dirittura; e nel Pestremo C s'inclini DC à qualunque angolo con la retta CA; si tiri la retta DB; e dal punto A si tiri la retta AE parallela alla retta DB, la quale concorrerà con CD, continuata in qualche punto E; sarà ED la retta, che si cerca. Perché essendo DB parallela ad AE, sarà AB à BC^d come ED à DC, ch'era da farsi, e dimostrarsi.

d 2. del 6.



PROBLEMA V. PROPOSITIONE XIII.


A due date rette linee ritrouare vna media proportionale.

Siano date le rette AB, BC, alle quali si voglia ritrouare vna media proportionale.

a 10. del 2.

b 11. del 1.

Si pongano le rette date AB, BC in modo, che costituiscano la sola retta AC, la quale si diuidi in due parti uguali in D, e fatto centro in D, coll' interuallo DA, ouero DC, si descriva il mezzo circolo AEC; nel punto B, sopra la retta AC, s'erigga la perpendicolare BE, la quale concorrerà con la circonferenza AEC in qualche punto E. Dico che la retta EB è media proportionale fra le due AB, BC. Si tirino le rette EA, EC; farà l'an-



golo

golo AEC nel mezzo circolo retto. Nel triangolo rettangolo AEC dall'angolo retto E cade la retta EB perpendicolare alla base AC , la retta EB diuide il triangolo EAC ne i due triangoli EBC , EBA frà di loro simili, e la proportionne di AB à BE sarà come quella di BE à BC ; dal che di tre rette proportionali AB , BE , BC , quella di mezzo è la retta EB , che diciamo media, ch'era da farfi, e dimostrarsi.

d 8. del 6.
e 1. de fin.
del 6.

COROLLARIO.


Da quel, che s'è detto, è manifesto, che se da qualunque punto preso nella circonferenza d'un mezzo circolo, cade vna retta perpendicolare al diametro, quella farà media proportionale frà le parti del diametro, e la dimostrazione è la medesima fatta antecedentemente.

SCOLIO.

Gioua per le cose auuenire il seguente Problema.

Sia data la retta C non maggiore della metà di AB ; diuidere la retta AB in modo, che la retta C sia media proportionale frà le parti di AB .

Si diuida AB , in due parti vguale in D ; fatto centro in D , coll'intervallo DA , ouero DB , si descriva il mezzo circolo AEB ; nel centro D si ponga DF perpendicolare ad AB , la quale concorrerà con la circonferenza in qualche punto F . Se la retta C è vguale ad FD , essendo FD media proportionale frà le due AD , DB sarà la retta C media proportionale frà le medesime parti AD , DB ; ma



se la retta C è minore di FD , si faccia DH vguale alla retta C , dal punto H si tiri la retta HE parallela ad AB , la quale concorrerà con la circonferenza in qualche punto E , dal punto E si faccia cadere la retta EG perpendicolare ad AB : per l'antecedente Corollario la retta EG sarà media proportionale frà le parti AG , GB ; ma la retta EG è vguale ad HD cioè vguale alla retta C (per essere $HDGE$ parallelogrammo) sarà la retta C media proportionale frà le parti AG , GB ; per la qual cosa la retta AB è diuisa in G in modo che la data C è media proportionale frà le parti AG , GB , ch'era da farfi, e dimostrarsi.

a ro. del 1.

b 11. del 1.

c 3. del 1.

d 31. del 1.

e 12. del 1.

f 34. del 1.

THEOREMA IX. PROPOSITIONE XIV.


Se i parallelogrammi, de'quali vn angolo dell'vno sia vguale ad vn angolo dell'altro, sono frà di loro vguali, i

lati

lati intorno à gli angoli vguali sono reciprochi; e se i lati intorno à gli angoli vguali sono reciprochi, i parallelogrammi sono frà di loro vguali.

Siano i due parallelogrammi ABCD, BEFG, de' quali l'angolo ABC dell'vno sia vguale all'angolo EBG dell'altro; e supposto prima che il parallelogrammo ABCD sia vguale al parallelogrammo BEFG. Dico che i lati intorno à gli angoli vguali, ABC, EBG sono reciprochi; cioè che AB à BG è come EB à BC.

Si accomodino i proposti parallelogrammi in modo, che i lati AB, BG facciano la sola retta linea AG. Perche gli angoli ABC, EBG sono vguali, s'aggiunga all'vno, ed all'altro, il commune angolo CBG; i due angoli ABC, CBG faranno vguali à i due angoli EBG, GBC: mà i due angoli ABC, CBG sono^a vguali à due angoli retti; i due angoli



dunque EBG, GBC sono vguali à due angoli retti; dal che le rette EB, BC^b costituiscono vna sola retta linea. Si prolunghino i lati DC, FG fin'che concorrono in qualche punto H. Perche i parallelogrammi DB, BF, per ipotesi sono frà di loro vguali, preso il parallelogrammo CG come terza quantità, sarà il parallelogrammo DB al parallelogrammo CG, e come il parallelogrammo BF al medesimo parallelogrammo CG: mà il parallelogrammo DB al parallelogrammo CG^d (per essere sotto d'vna medesima altezza) è come la base AB alla base BG; sarà il parallelogrammo BF al parallelogrammo CG, e come AB à BG. Il parallelogrammo BF al parallelogrammo CG, ^e per essere sotto d'vna medesima altezza, è come le base EB alla base BC; sarà AB à BG e come EB à BC; per la qual cosa i lati intorno à gli angoli vguali^b sono reciproci, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

Di nuouo, supposto che AB à BG sia come EB à BC. Dico che i parallelogrammi DB, BF sono frà di loro vguali. S'intenda fatta la medesima costruzione di prima; perche i parallelogrammi DB, CG hanno vna medesima altezza, sarà il parallelogrammo DB al parallelogrammo CG^k come la base AB alla base BG; mà AB à BG, per ipotesi, è come EB à BC; sarà il parallelogrammo DB al parallelogrammo CG^l come EB à BC. Similmente, essendo i parallelogrammi BF, CG sotto d'vna medesima altezza, sarà il parallelogrammo BF al parallelogrammo CG^m come le base EB alla base BC: mà la base EB alla base BC è come il parallelogrammo DB al parallelogrammo CG; il parallelogrammo dunque DB al parallelogrammo CGⁿ sarà come il parallelogrammo BF al medesimo parallelogrammo CG; per la qual cosa i parallelogrammi DB, BF^o sono frà di loro vguali, ch'era da dimostrarsi.


COROLLARIO.

Da quel, che s'è dimostrato nell'antecedente proposizione, è manifesto, che quando due angoli vguali, come EBG , ABC , sono in modo collocati, che due delle rette, che gli contengono, come AB , BG , fanno vna sola retta linea, le altre due rette EB , BC fanno ancora vna sola retta linea.

THEOREMA X. PROPOSITIONE XV.

Se due triangoli, de' quali vn angolo dell'vno è vguale ad vn angolo dell'altro, sono frà di loro vguali, i lati intorno à gli angoli vguali sono reciprochi; e se i lati intorno à gli angoli vguali sono reciprochi, i triangoli sono frà di loro vguali.

Siano i triangoli ABC , DBE , de' quali l'angolo ABC sia vguale all'angolo DBE ; e supposto prima che i triangoli ABC , DBE siano frà di loro vguali. Dico che i lati intorno à gli angoli vguali ABC , DBE sono reciprochi; cioè, che la proportion di AB à BE è come quella di DB à BC . Si addattino i proposti triangoli in modo, che si tocchino secondo l'angolo B , e che i lati AB , BE facciano vna sola retta linea: essendo gli angoli ABC , DBE frà di loro vguali, per l'antecedente Corollario, le rette DB , BC costituiranno vna sola retta linea; si tiri la retta CE . I triangoli DBE , ECB hanno le basi DB , BC in vna medesima retta linea, e gli angoli opposti s'uniscono nel solo punto E , e per quel che si disse nella quarta definizione di questo, hanno vna medesima altezza; e la



proportione del triangolo DEB al triangolo ECB è come la base DB alla base BC . Per l'istessa ragione i triangoli ACB , BCE hanno vna medesima altezza, e farà il triangolo ABC al triangolo CBE come la base AB alla base BE . In oltre perche i triangoli ABC , DBE , per ipotesi, sono frà di loro vguali, preso il triangolo CBE come terza quantità, farà il triangolo ABC al triangolo BCE , come il triangolo DBE al medesimo triangolo CBE ; si è dimostrato il triangolo ABC al triangolo CBE essere come AB à BE ; farà il triangolo DBE al triangolo CBE come AB à BE ; mà il triangolo DBE al triangolo CBE è come DB à BC ; farà dunque AB à BE come DB à BC , ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

a 1. del 6.

b 7. del 5.

c 11. del 5.

d 11. del 5.

Di

a 1. del 6.


f 11. del 5.

g 1. del 6.

h 11. del 5.

K 9. del 5.


Di nuovo, supposto che AB à BE sia come DB à BC . Dico che i triangoli ABC , DBE sono frà di loro vguali. S'intenda fatta la medesima costruzione di prima. Perche i triangoli DEB , EBC hanno vna medesima altezza, il triangolo DBE al triangolo EBC è farà come le bafe DB alla bafe BC ; mà per ipotefi DB à BC è come AB à BE ; farà il triangolo DBE al triangolo CBE come AB à BE . Similmente effendo i triangoli ABC , CBE sotto vna medesima altezza, farà il triangolo ABC al triangolo CBE come la bafe AB alla bafe BE ; mà fù dimostrato il triangolo DBE al triangolo CBE effere come AB à BE ; farà il triangolo ABC al triangolo CBE come il triangolo DBE al medesimo triangolo CBE : per la qual cosa i triangoli ABC , DBE sono frà di loro vguali, ch'era da dimostrarfi.



THEOREMA XI. PROPOSITIONE XVI.

Se quattro linee rette sono proportionali, il rettangolo contenuto dalle estreme, è vguale al rettangolo contenuto dalle medie; e se il rettangolo contenuto dalle estreme è vguale al rettangolo contenuto dalle medie, le quattro rette linee sono proportionali.

Siano le quattro rette linee AB , EF , FG , BC ; e prima habbia AB ad EF l'istessa proportion, quale hà FG a BC . Dico che il rettangolo contenuto dalle estreme AB , BC , è vguale al rettangolo contenuto dalle medie EF , FG . Con le due estreme AB , BC si faccia il parallelogrammo rettangolo $ABCD$; e con le due medie EF , FG si faccia il rettangolo $EFGH$.



a 24. del 6.

Perche gli angoli in B , ed F sono vguali, stante che sono retti, ed il lato AB al lato EF , è come FG a BC ; cioè i lati intorno à gli angoli vguali sono reciprochi; farà il rettangolo AC vguale al rettangolo EG : mà il rettangolo AC , per costruzione, è contenuto dalle estreme AB , BC ; ed il rettangolo EG è contenuto dalle medie EF , FG ; il rettangolo dunque contenuto dalle estreme AB , BC è vguale al rettangolo contenuto dalle medie EF , FG , ch'era da dimostrarfi nel primo luogo.

Di nuovo supposto, che il rettangolo contenuto dalle estreme AB , BC , sia vguale al rettangolo contenuto dalle medie EF , FG . Dico che

AB

AB ad EF, farà come FG à BC; s'intenda fatta l'istessa costruzione di prima. Perche in rettangoli AC, EG si suppongono uguali, e gli angoli in B, ed F sono uguali, i lati intorno à gli angoli uguali B ed F, o sono reciprochi; e perciò il lato AB al lato EF farà come FG à BC; cioè le quattro rette AB, EF, FG, BC sono proporzionali, ch'era da dimostrarsi.

b 14. del 6.

COROLLARIO I.

Da quel che s'è detto, è manifesto, che quando quattro linee rette sono proporzionali, ancora il parallelogrammo contenuto dalle estreme è uguale al parallelogrammo equiangolo contenuto dalle medie.

Poiche se i parallelogrammi AC, EG non sono rettangoli, basta che gli angoli in B, ed F siano uguali, ed i lati intorno à questi angoli uguali siano reciprochi, acciò che i parallelogrammi AC, EG siano fra di loro uguali. E parimente basta, che i parallelogrammi AC, EG siano uguali, e gli angoli in B, ed F siano uguali, acciò che i lati intorno à questi angoli uguali siano reciprochi.


COROLLARIO II.

Dall'antecedente proposizione si caua il modo da conoscere se quattro date rette linee sono proporzionali.

THEOREMA XII. PROPOSITIONE XVII.

Se tre linee rette sono proporzionali, il rettangolo contenuto dalle estreme, è uguale al quadrato della media; e se il rettangolo contenuto dalle estreme è uguale al quadrato della media, quelle tre rette linee sono proporzionali.

Siano le tre rette linee AB, EF, BC; e prima habbia AB ad EF l'istessa proportion, quale hà la medesima EF à BC. Dico che il rettangolo contenuto dalle estreme AB, BC, è uguale al quadrato della media EF; si faccia la retta FG uguale alla retta EF; sarà il quadrato di EF uguale al rettangolo contenuto dalle due uguali EF, FG. In oltre perche AB ad EF, per ipotesi, è come EF à




K k

BC,

BC, e la retta FG è vguale ad EF; farà AB ad EF, come FG à BC; e per l'antecedente proposizione, il rettangolo contenuto dalle estreme AB, BC, farà vguale al rettangolo contenuto dalle medie EF, FG; cioè vguale al quadrato della media EF, che era da dimostrarsi nel primo luogo.

Di nuouo, supposto che il rettangolo contenuto dalle estreme AB, BC, sia vguale al quadrato della media EF. Dico, che la proportionione di AB ad EF, farà come quella di EF à BC. Con le estreme

AB, BC si costituisca il rettangolo AC; e sopra la media EF^a si faccia il quadrato EG, farà EF vguale ad FG. Perche il parallelogrammo AC è posto vguale al parallelogrammo EG, e gli angoli in B, ed F sono vguali, stanteche sono retti; i parallelogrammi AC, EG^b haueranno i lati intorno à gli angoli vguali reciprochi; e perciò AB ad EF farà come FG à BC: ma FG è vguale ad EF; farà AB ad EF, come la medesima EF à BC. Per la qual cosa le tre rette linee AB, EF, BC sono proportionali, ch'era da dimostrarsi.



a 46. del 1.

b 14. del 6.

COROLLARIO.

Da quel, che s'è detto, è manifesto, che se tre rette linee sono proportionali, il parallelogrammo contenuto dalle estreme, è vguale al rombo equiangolo descritto sopra la media; e se il parallelogrammo contenuto dall'estreme è vguale al rombo descritto sopra la media, le tre rette linee sono proportionali; stante che se EG farà Rombo, & AC parallelogrammo, equiangolo al rombo, se hanno i lati reciprochi, sono frà di loro vguali; e se sono frà di loro vguali, hanno i lati reciprochi: e perciò le tre rette AB, EF, BC sono proportionali.

S C O L I O.


Aggiungo in questo luogo il seguente Problema del Peletario, però con altra solutione più breue.

Data vna retta linea diuisa in due parti come si vuole,

diui-

diuidere vna di quelle parti in modo, che le tre siano continue proportionali.

Sia la retta AB diuisa come si vuole in C , e si voglia diuidere la parte CB in modo, che le tre parti in AB siano continue proportionali. Si diuida AB in due parti uguali in D , fatto centro in D , coll'intervallo AD , ouero DB , si descriua il mezzo circolo AEB ; nel punto C si erigga CE ^b perpendicolare ad AB ; sarà CE ^c media proportionale fra le due AC , CB ; ed il rettangolo contenuto dalle due AC , CB ^d sarà uguale al quadrato di CE . Si diuida AC in due parti uguali in F , si tiri la retta FE ; poi si faccia FG ^e uguale ad FE . Dico che le tre AC , CG , GB sono continue proportionali.



Nel triangolo ECF , angolo retto in C , il quadrato di EF ^a è uguale a i quadrati de' due lati EC , CF ; fu fatta la retta FG uguale ad EF ; sarà il quadrato di FG uguale a i quadrati delle due EC , CF : ma il quadrato di FG ^b è uguale a i quadrati delle parti FC , CG col doppio rettangolo contenuto dalle medesime FC , CG ; i quadrati dunque delle parti FC , CG , col doppio rettangolo contenuto dalle rette FC , CG , sarà uguale a i quadrati de' lati EC , CF : se ne leui il commune quadrato di CF , resta il quadrato di EC uguale al doppio rettangolo contenuto dalle due FC , CG , col quadrato di CG ; ma il doppio rettangolo contenuto dalle due GC , CF ^c è uguale al rettangolo contenuto da GC , & CA (stante che CF , FA sono uguali) sarà il rettangolo contenuto dalle due AC , CG , col quadrato di CG , uguale al quadrato di CE . Fu dimostrato il quadrato di CE uguale al rettangolo contenuto dalle due AC , CB ; sarà il rettangolo contenuto dalle due AC , CB uguale al rettangolo contenuto dalle due AC , CG , col quadrato di CG . Si consideri AC come non diuisa, e la retta CB diuisa in G ; sarà il rettangolo contenuto dalle due AC , CB , uguale a i due rettangoli contenuti da AC , & CG , e da AC , & GB : ma si disse, che il rettangolo contenuto dalle due AC , CB , è uguale al rettangolo contenuto dalle due AC , CG , col quadrato di CG ; i due rettangoli dunque contenuti da AC , & CG , e da AC , & GB insieme giunti, sono uguali al rettangolo contenuto dalle due AC , CG , col quadrato di CG . Se ne leui il commune rettangolo contenuto dalle due AC , CG ; resta il quadrato di CG uguale al rettangolo contenuto dalle due AC , GB ; e per l'antecedente propos. AC a CG sarà come CG a GB ; cioè le tre rette AC , CG , GB sono continue proportionali, che era da farsi, e dimostrarsi.

Per le cose, che possono bisognare, non sarà inutile aggiungere il seguente Teorema.

Se qualche retta AB sia diuisa in qualunque modo in C ;

K k a

e nel


e nel punto C si erigga la retta CD perpendicolare ad AB; in modo che il rettangolo contenuto dalle parti AC, CB sia vguale al quadrato della perpendicolare CD; il punto D sarà nella circonferenza di quel circolo, il di cui diametro è AB.

a 10. del 1.

Si diuidi AB^a in due parti vguali in E, e fatto centro in E, coll'intervallo EA, ouero EB, si descriva vn mezzo circolo. Se la circonferenza di quel mezzo circolo non passa per il punto D, o passerà sotto, o sopra al punto D, come fà la circonferenza AFB. Si continui C D fino che concorra con la circonferenza AFB in qualche punto F; sarà FC^b

b 13. del 6.


media proportionale fra le due AC, CB; e per l'antecedente proposizione, il rettangolo contenuto dalle estreme AC, CB, è vguale al quadrato della media FC: ma per ipotesi il medesimo rettangolo contenuto dalle parti AC, CB è vguale al quadrato di CD; sarà il quadrato di CD vguale al quadrato di CF; e la retta CD sarà vguale alla retta CF: la parte vguale al tutto, ch'è impossibile; non dunque la circonferenza passa sopra, ne sotto al punto D. Per la qual cosa il punto D è nella circonferenza di quel circolo, del quale AB è diametro, ch'era da dimostrarsi.



PROBLEMA VI. PROPOSITIONE XVIII.

Descrivere sopra vna data retta linea vn rettilineo simile, e similmente posto ad vn'altro rettilineo dato.

Sia data la retta AB, ed il rettilineo CDEFG, e si voglia sopra la retta AB descrivere vn rettilineo simile, e similmente posto al dato rettilineo CDEFG. Da vno degli angoli del dato rettilineo, come dall'angolo F, si tirino rette linee a gli angoli opposti, che fiano le rette FC, FD in



a 23. del 1.

modo, che il dato rettilineo resti diuiso in tanti triangoli, come FGC, FCD, FDE; poi sopra la retta AB, nel punto A, si faccia l'angolo BAI^a vguale all'angolo DCF; e nel puto B si poga l'angolo ABI vguale all'angolo CDE; perche gli angoli FCD, FDC^b sono minori di due angoli retti; perciò i due angoli IAB, IBA sono minori di due angoli retti; si che continue le rette AI, BI^c concorreranno in qualche punto I; ed il rimanente angolo AIB^d sarà vguale al rimanente angolo CFD; dal che il triangolo ABI sarà equiangolo al triangolo FCD. Di nouo sopra la retta AI, nel punto A, si costituisca l'angolo IAK, e vguale all'angolo FCG; e nel punto I si ponga l'angolo AIK vguale all'angolo CFG: si di-

b 17. del 1.

a Scol. alla
31. del 1.
d 31. del 1.

c 23. del 1.

mostra-

mostrerà come prima, che le rette AK, IK concorrono in qualche punto K, e che l'angolo AKI è vguale all'angolo CGF. Similmente sopra la retta IB, nel punto B, si faccia l'angolo IBH ^f vguale all'angolo FDE, e nel punto I si costituisca l'angolo BIH vguale all'angolo DFE; e si dimostrerà come prima, che le rette B H, I H concorrono in qualche punto H, e che l'angolo IHB è vguale all'angolo FED. Col medesimo ordine si procederà se nel rettilineo CDEFG vi fossero più triangoli. Dico che il rettilineo ABHIK è simile, e similmente posto al rettilineo CDEFG. Perchè gli angoli IAB, IAK sono fatti vguali à gli angoli FCD, FCG, tutto l'angolo KAB sarà vguale à tutto l'angolo GCD. Similmente gli angoli IBA, IBH, per costruzione, sono vguali à gli angoli FDC, FDE; dal che tutto l'angolo ABH vguale à tutto l'angolo CDE; di più, perchè i tre angoli KIA, AIB, BIH sono fatti vguali alli tre angoli GFC, CFD, DFE; sarà tutto l'angolo KIH è vguale à tutto l'angolo GFE: gli angoli K, ed H sono mostrati vguali à gli angoli G, ed E; sarà il rettilineo ABHIK equiangolo al rettilineo CDEFG. Si considerino i triangoli equiangoli KAI, GCF, de' quali l'angolo KAI è vguale all'angolo GCF; sarà KA ad AI ^g come GC à CF. Similmente essendo i triangoli IAB, FCD equiangoli, sarà IA ad AB ^h come FC à CD; e per l'vgnalità KA ad AB ^k sarà come GC à CD; d'alche i lati intorno à gli angoli vguali KAB, GCD sono proporzionali. In oltre essendo il triangolo IAB equiangolo al triangolo FCD, ed il triangolo IBH equiangolo al triangolo FDE; sarà AB à BI ^l come CD à DF; ed IB à BH, come FD à DE; e per l'vgnalità AB à BH ^m sarà come CD à DE: ed essendo il triangolo DEF equiangolo al triangolo BHI, ed il triangolo CGF equiangolo al triangolo AKI, sarà DE ad EF ⁿ come BH ad HI; e sarà CG à GF, come AK à KI. Finalmente essendo i tre triangoli HIB, BIA, AIK equiangoli à i corrispondenti tre triangoli DEF, DFC, CFG; sarà HI ad IB, ^o come EF ad FD; e BI ad IA sarà come DF, ad FC; e sarà AI ad IK come CF ad FG; e per l'vgnalità, HI ad IK ^p sarà come EF ad FG. Per la qual cosa i rettilinei ABHIK, CDEFG sono equiangoli, ed hanno i lati intorno à gli angoli vguali proporzionali; e perciò sono q fra di loro simili, e sono ancora similmente posti, stante che l'angoli vguali sono sopra i lati homologhi ch'era da farsi, e dimostrarsi.

fig. del 1.

g 4. del 6.

h 4. del 6.

K 22. del 5.

l 4. del 6.

m 22. del 5.

n 4. del 6.

o 4. del 6.

p 22. del 5.

q 1. de sin. del 6.

ANNOTATIONE.

Prima d'inoltrarmi nella compositione delle proportioni, dottrina tanto più difficile ad essere intesa, quanto che nasce da principio non dimostrato sin' ad hora, ne da Euclide, ne, che io sappia, da alcun'altra persona; parmi necessario spiegare alcune cose, che possono facilitarci la strada all'intera cognitione di tal principio, e perciò fare premetto le seguenti notizie.

DEFINITIONE I.

Qualunque cosa, che si dice una, ouero vno, generalmente si chia-

ma unità; donde ne segue, che ogni linea retta può prendersi come unità.

DEFINITIONE II.

Moltiplicare due quantità fra di loro è il trouare una terza quantità, la quale habbia tal proportionione ad una delle quantità da moltiplicarsi, quale bñ l'altra all'unità; e la quantità trouata si chiama Prodotto.

DEFINITIONE III.

Diuidere una quantità per un'altra è il trouare una terza quantità, che habbia tal proportionione all'unità, quale bñ la quantità diuisa al diuisore, e la quantità trouata si chiama Quotiente.

L E M M A I.


Date due qualunque quantità è possibile moltiplicare l'una per l'altra.

Siano le quantità date A , & B , e si voglia moltiplicare l'una per l'altra.

S'intenda tirata la retta CD , alla quale sia inclinata la retta ED a qualunque angolo EDC . Se le quantità date sono linee rette, Si faccia DF uguale ad A ; e si tagli DG uguale a B : si prenda in DF qualunque punto H e presa DH come unità, si tiri la retta HG ; dal punto F si tiri la retta FE parallela ad HG .

Dico che ED sarà il prodotto di tal moltiplicazione secondo l'unità DH . Nel triangolo EDF la retta GH , per costruzione, è parallela ad EF , dal che IG a GD sarà come FH ad HD ; e componendo, ED a DG sarà come FD a DH ; e permutando, ED a DF sarà come DG all'unità DH : Per costruzione DF , DG sono uguali alle rette A , & B da moltiplicarsi, e perciò la retta ED dalla retta da moltiplicarsi FD , ouero A , sarà come G a D , cioè B (ch'è l'altra quantità da moltiplicarsi) all'unità HD ; e per la seconda delle antecedenti definitioni, ED sarà il prodotto della moltiplicazione di A nella quantità B secondo l'unità HD , ch'era da farsi nel primo luogo.

Se le quantità AB non sono linee rette, si prenda in CD qualunque parte FD , e si concepisca nella proportionione di A a B essere FD ad un'altra, che sia DG ; inueniendo B ad A sarà come GD a DF . Nella retta FD si prenda qualunque altra parte DH ; si tiri la retta HG ; dal punto F sia tirata la retta FE parallela ad HG , che continuata concorrerà con DE in qualche puo-



a 3. del 1.

b 31. del 1.

c 7. del 6.
d 18. del 5.
e 16. del 5.

f Corollario
alla 4. del 5.

g 31. del 1.

to E: se concepiremo HD come unità, sarà, per quel che s'è dimostrato, ED il prodotto della moltiplicazione di FD in DG; si concepisca siccome FD à DE, così A ad un'altra quantità del medesimo genere, che sia K; e siccome G D à DH si concepisca B ad un'altra quantità del medesimo genere, che sia I.

Perche FD à DG, per costruzione, è come A à B; e la proportion di G D à DH è come B ad I; per l'egualità, h sarà FD à DH come A ad I. Di nuovo, perche GD à DF è come B ad A; ed FD à DE è come A à K; per l'egualità, GD à DE, K sarà come B à K; ed inuertendo, ED à DG i sarà come K à B: mà ED à DG è come FD à DH; sarà K à B m come FD à DH. Fù dimostrata FD à DH come A ad I, sarà K à B, n come A ad I; e permutando, K ad A o sarà come B ad I: cioè la quantità K alla quantità A, da moltiplicarsi, come l'altra quantità B, da moltiplicarsi, all'unità I; e per la seconda definizione, la quantità K sarà il prodotto fatto dalla moltiplicazione della quantità A nella quantità B, secondo l'unità I, ch'era da farsi, e dimostrarsi.

h 22. del 5.

K 22. del 5.

Coroll. alla

4. del 6.

m 11. del 5.

n 11. del 5.

o 16. del 5.

L E M M A II.

Se due quantità sono moltiplicate per vna medesima quantità, secondo vn'istessa unità, i prodotti sono frà di loro come le quantità moltiplicate; e quei prodotti li chiameremo vguai multipli delle quantità moltiplicate.

Siano due qualunque quantità A, B, e secondo qualsivoglia unità D, sia moltiplicata A da qualche quantità C, ed il prodotto sia E: e colla medesima unità D sia moltiplicata B, per l'istessa

$$\begin{array}{cc} \frac{A}{D} & \frac{B}{C} \\ \hline E & F \end{array}$$

quantità C, ed il prodotto sia F. Dico che E ad F è come A à B. Perche la quantità E rappresenta il prodotto fatto dalla moltiplicazione di A per C, secondo l'unità D, per la seconda delle antecedenti definizioni, sarà il prodotto E alla quantità A, come C all'unità D. E per l'istessa ragione sarà il prodotto F alla quantità B come C à D: per la qual cosa E ad A sarà come F à B; e permutando il prodotto E al prodotto F b sarà come A à B, ch'era da dimostrarsi. I prodotti E, F li chiameremo vguai multipli delle quantità A, & B:

a 21. del 5.


b 16. del 5.

L E M M A III.

Se quattro quantità sono proportionali, il prodotto fatto dalla prima, e quarta, è vguale al prodotto fatto dalla seconda, e terza.

Sia-

Siano le quattro quantità A, B, C, D , proporzionali; cioè che A à B sia come C à D . Dico che il prodotto fatto dalla multiplicatione delle estreme A , & D , è uguale al prodotto fatto dalle medie B & C . Per il primo Lemma si moltiplichino le estreme A , & D , ed il prodotto sia F ; similmente si moltiplichino le medie B , & C , ed il prodotto sia E ; e nell'istesso modo si moltiplichino le due A , & C , ed il prodotto sia G ; il tutto si faccia con una medesima unità.



Perche D , moltiplicata per A , produce F ; e la quantità C , moltiplicata per la medesima A , produce G ; le due G , ed F , per l'antecedente Lemma, saranno uguali multipli delle due C , & D ; dalche la proporzione di G ad F sarà come quella di C à D ; mà C à D , per ipotesi, è come A à B , sarà G ad F come A à B .

a Lem. anteced.
b 11. del 5.

In oltre perche B moltiplicata per C , per costruzione, produce E ; e la quantità A moltiplicata per la medesima C , produce G ; le due G , & E saranno uguali multipli delle due A , & B ; e perciò la proporzione di G ad E sarà come quella di A à B ; mà su dimostrata A à B esser come G ad F ; sarà G ad E , come la medesima G ad F : per la qual cosa E , ed F sono fra di loro uguali: mà per costruzione la quantità E rappresenta il prodotto fatto dalle estreme A , & D ; e la quantità F rappresenta il prodotto fatto dalle medie B , & C ; sarà dunque il prodotto delle estreme A , & D , uguale al prodotto delle medie B , & C , che era da dimostrarsi.


c Lem. 8.
d Lem. 2.
e 11. del 5.
f 9. del 5.

L E M M A IV.

Se faranno tre quantità, il prodotto fatto dalla multiplicatione della prima nel prodotto della seconda, e terza, è uguale al prodotto fatto dalla multiplicatione della terza, nel prodotto della prima, e seconda.

Siano esposte le tre quantità A, B, C . Dico che il prodotto fatto dalla multiplicatione della prima A nel prodotto delle due B, C , è uguale al prodotto fatto dalla multiplicatione della terza C nel prodotto delle due A, B .

Si prenda qualunque quantità H del medesimo genere alle quantità A, B, C , e si intenda H come unità, con la quale, per il primo Lemma, si moltiplichino le due A, B , ed il prodotto sia D .




Di nuovo con la medesima unità si moltiplichino le due C, D, ed il prodotto sia E; e similmente con l'unità H si moltiplichino le due B, C, ed il prodotto sia F; e si moltiplichino le due A, F, ed il prodotto sia G.

Perchè dalla moltiplicazione delle due A_2 & B_2 , se ne produce D , sarà per la seconda delle antecedenti definizioni, il prodotto D alla quantità A_2 , come B all'unità H . Similmente perchè dalla moltiplicazione delle due B_2 & C ne viene il prodotto F , sarà il prodotto F alla quantità C , come B all'unità H ; ma si disse B ad H essere come D ad A_2 ; sarà D ad A_2 come F a C ; e per l'antecedente Lemma, il prodotto delle estreme D_2 & C sarà uguale al prodotto delle medie A_2 & F . E perchè il prodotto delle medie A_2 ed F , per costruzione, è la quantità G ; ed il prodotto delle estreme D_2 & C è la quantità E ; in conseguenza i prodotti E , & G sono fra di loro uguali. Per la qual cosa il prodotto fatto dalla prima A nel prodotto della seconda B , e terza C , è uguale al prodotto fatto dalla prima A nel prodotto della seconda B e terza C nel prodotto delle altre due A_2 & B_2 , che era da dimostrarsi.

L E M M A V.

Date due qualunque quantità è possibile diuidere l'vna per l'altra.

Habbiafi da di-
uidere la quantità
A per la quantità B.
S'inclinino le rette
ED, CD a qualun-
que angolo EDC:
se le quantità date
sono linee rette, si
faccia DE^a uguale




alla retta A , da dividerli; e si faccia DF uguale al divisore B ; si tiri la retta FE : poi si prenda nella retta FD qualunque punto H , dal quale si tira la retta HG $\parallel$ parallela ad EF . Dico che, presa DH come unità, sarà DG il quoziente di tal divisione.

Essendo GH parallela ad EF, sarà EG à GD^c come FH ad HD; e componendo, ED à DG^d sarà come FD à DH; ed inserendo, DG à DE^c sarà come DH à DF; e permutando, GD à DH^e sarà come E D à D F, cioè come A à B: per la qual cosa la quantità A da dividerfi al diuisore B, è come il quoziente GD all'unità H D; e per la terza delle antecedenti definizioni, GD sarà il quoziente di tal diuisione, secondo l'unità HD.

Se le proposte quantità A, B non sono linee rette; si prenda in CD qualunque parte DF , e si concepisca siccome la proporzione di B ad A , così FD ad un'altra, che sia ED : sarà, inuertendo, A à B come ED à DF . Sitiri la retta EF . Preso poi in FD qualunque punto H , dal quale sia tirata la retta HG parallela ad EF , segnerà ED in qualche punto G : se concepiremo $H D$ come unità, per qual che s'è dimostrato antecedentemente, $G D$ sarà il quoziente della divisione fatta di $D E$ per $F D$. In oltre si concepisca siccome

ED à DG, così A ad un'altra quantità del medesimo genere K, e siccome F D à DH, così B ad un'altra quantità del medesimo genere I.

Perche GH è parallela ad EF, sarà EG à GDK come FH ad HD; e componendo ED à DG, sarà FD à DH; ma ED à DG è come A à K, hauerà A à K m l'istessa proportion, che ha FD à DH: si disse F D à D H essere come B ad I, sarà A à Kⁿ come B ad I; e permutando, A à B^o sarà come K ad I. In oltre essendo A à B, per costruzione, come ED à DF, e A à B è come K ad I; sarà K ad I^o come E D à DF; e la proportion di ED à DF è come GD à DH, sarà GD, à D H^o come K ad I: ed inuertendo, HD à DG: sarà come I à K: ma HD è supposta unità rispetto à GD, sarà la quantità I unità rispetto alla quantità K; e per quel, che s'è dimostrato, la quantità A, da diuidersi, alla quantità B, diuifore, sarà come K all'unità I; e per la terza delle antecedenti definitioni, sarà K il quoziente, che nasce dalla diuisione di A per B, come fu proposto fare, e dimostrare.




LEMMA VI.

Moltiplicandosi il quoziente per il diuifore, il prodotto è uguale alla quantità diuifa.

Sia diuifa la quantità A per la quantità B, ed il quoziente sia la quantità C. Dico che il prodotto fatto dalla moltiplicatione del quoziente C nel diuifore B, è uguale alla quantità diuifa A.

Sia D l'unità, rispetto alla quale è fatta la diuisione di A per B; si faccia la moltiplicatione di C per B, rispetto all'unità D, ed il prodotto sia E; per la seconda delle antecedenti definitioni, sarà E à B come



C all'unità D. In oltre perche diuifa A per B, il quoziente, per ipotesi, è C; per la terza delle antecedenti definitioni, la quantità diuifa A al diuifore B è come il quoziente C all'unità D: ma C à D, per quel che s'è dimostrato, è come E à B; sarà E à B^o come A alla medesima B; per la qual cosa A^o è uguale ad E; ma E, per costruzione è il prodotto fatto dalla moltiplicatione del quoziente C nel diuifore B; sarà il prodotto fatto dal quoziente C nel diuifore B, uguale alla quantità diuifa A, che era da dimostrarsi.

a 18. del 5.
b 9. del 5.

SCOLIO

S C O L I O.

Quando si vuol vedere che proportionè sia frà due quantità del medesimo genere, non s'intende far altro, se non che conoscere di quanto l'antecedente è maggiore, o minore del conseguente; o pure conoscere se l'antecedente è uguale al conseguente; il che si fa col detrarre il conseguente dall'antecedente tante volte, che si può, e se vi resta avanzo, vedere che rispetto hà al conseguente. Come per esempio, habbia si da trouare che proportionè sia frà l'antecedente A, ed il conseguente B; se A è maggiore di B, dalla quantità A se ne detraggano le parti AC, CD, DE, EF, e quante altre se ne può, uguali al conseguente B; se non resta cosa alcuna, diremo, che l'antecedente A contiene tante volte il conseguente B, per quante sono le parti in AF; e se soprauanza qualche cosa minore di B, come FG, all'hora si dirà, che l'antecedente A contiene tante volte il conseguente B, per quante parti sono in AF, e che soprauanza la quantità FG, ch'è tante parti esprimibili, o non esprimibili di B. E perche questa continua detrazione è l'istessa cosa, che diuidere la quantità A per la quantità B, stante che la diuisione è una abbreviatura di questa continua detrazione, perciò diuidendo l'antecedente A per il conseguente B, il quoziente indicherà il valore della proportionè, che hà l'antecedente A al conseguente B. E per l'auuenire, quando si vorrà trouare il valore della proportionè, che hà un antecedente ad un conseguente, si diuiderà l'antecedente per il conseguente, ed il quoziente si chiamerà denominatore della proportionè.

G
F
E
D
C
A B


L E M M A VII.

Se faranno quante si voglia quantità del medesimo genere, la proportionè della prima all'ultima è composta dalle proportioni intermedie.

Siano espòste le quantità A, B, C. Dico che la proportionè della prima A alla terza C è composta dalle proportioni di A à B, e di B à C. Per il quarto lemma si diuida la quantità A per la quantità B, ed il quoziente sia D; sarà D, per l'antecedente Scolio, la valuta della proportionè, che hà la quantità A à B. Similmente si diuida B per la quantità C, ed il quoziente sia E; sarà E la valuta della proportionè, che hà B à C. Poi, per il primo lemma, si multipli D per la quantità E, ed il prodotto sia F; sarà F, per la decima definizione del 5. libro, la

a Lem. 5.


b Lem. 5.



e Lem. 5.
d Scol. ap-
poco.

proporzione composta dalle due proporzioni di A à B , e di B à C . Oltre à ciò si diuisa A per C , ed il quoziente sia G ; sarà G il valore della proporzione, che hà la quantità A alla quantità C .

Perche diuisa la quantità A per B il quoziente è D , moltiplicando il quoziente D per il diuisore B , il prodotto, per il lemma 6. sarà uguale alla quantità A . Similmente essendosi diuisa la quantità B per C , n'è venuto il quoziente E ; moltiplicando il quoziente E per il diuisore C , il prodotto sarà uguale alla quantità B : tanto il prodotto di E in C , quanto la quantità B , che gli è uguale, si moltiplichi per la medesima quantità D ; sarà il prodotto fatto dalla moltiplicazione della quantità D nel prodotto di E in C , uguale al prodotto di D in B : ma il prodotto di D in B è uguale ad A , sarà il prodotto, fatto dalla moltiplicazione di D nel prodotto di E in C , uguale ad A . Fù dimostrato nel quarto lemma, che il prodotto fatto dalla moltiplicazione della quantità D nel prodotto di E in C , uguale al prodotto fatto dalla moltiplicazione della quantità C nel prodotto di E in D ; sarà il prodotto, fatto dalla moltiplicazione della quantità C nel prodotto di E in D , uguale ad A ; ma il prodotto di E in D , per costruzione, è la quantità F ; sarà il prodotto, fatto dalla moltiplicazione di F in C , uguale ad A . Finalmente perche, diuisa la quantità A per C , il quoziente per costruzione è G , sarà per il Lem. 6. il prodotto, fatto dal quoziente G nel diuisore C , uguale ad A : si disse che il prodotto, fatto da F in C , è uguale alla medesima quantità A ; sarà il prodotto fatto da F in C uguale al prodotto fatto da G in C ; dal che G è uguale ad F : Ma G , per quel che s'è detto, è il valore della proporzione di A à C , sarà F il valore della proporzione di A à C : ma F è la proporzione composta dalle proporzioni D , ed E . E perche la quantità D rappresenta la proporzione di A à B ; e la quantità E rappresenta la proporzione di B à C , sarà dunque la proporzione della prima A alla terza C , composta dalle proporzioni intermedie, cioè della proporzione di A à B , e della proporzione di B à C , che era da dimostrarsi nel primo luogo.



Se faranno più di tre quantità, come A , B , C , D . Dico similmente che la proporzione della prima A all'ultima D , è composta dalle proporzioni di A à B , di B à C , e di C à D .

Per il lemma 5. si diuisa A per B , ed il quoziente sia E ; sarà E il valore della proporzione di A à B . Similmente si diuisa B per C , ed il quoziente sia F ; sarà F la valuta della proporzione di B à C : e si diuisa C per D , il quoziente sia G , sarà G la valuta della proporzione di C à D . In oltre si moltiplichi, per il primo lemma, la quantità E nella quantità F , ed il prodotto sia H ; poi si moltiplichi H per G , ed il prodotto sia K , per la 10. defn. del 5. libro, la quantità K rappresenterà la proporzione composta dalle tre proporzioni E , F , G .

Si diuida finalmente A per D, ed il quoziente fia L, sarà L il valore della proporzione di A à D, ed il prodotto fatto dalla multiplicazione di L in D, per il lemm. 6, sarà uguale ad A.

Perche E rappresenta la proporzione di A à B, ed F rappresenta la proporzione di B à C; essendo H il prodotto fatto dalla multiplicazione di E in F, sarà H, per la decima definizione del 5. la proporzione composta dalle due E, ed F; cioè H rappresenterà la proporzione composta dalle proporzioni di A à B, e di B à C: ma, per quel che s'è dimostrato nella prima parte, la proporzione di A à C è composta delle medesime due proporzioni di A à B, e di B à C; in conseguenza la quantità H sarà uguale alla proporzione di A à C. Per la qual cosa, diuisa A per C, il quoziente sarà H, ed il prodotto fatto dalla multiplicazione del quoziente H nel diuifore C, per il lemm. 6, sarà uguale alla quantità A. In oltre perche diuisa la quantità C per la quantità D, il quoziente è G; il prodotto fatto dalla multiplicazione di G in D è uguale alla quantità C; tanto il prodotto di G in D, quanto la quantità C, si multiplichi per H, il prodotto fatto da H, nel prodotto di G in D, sarà uguale al prodotto di H in C: Ma il prodotto di H in C è uguale ad A; sarà il prodotto fatto dalla multiplicazione di H nel prodotto di G in D, uguale ad A. E perche il prodotto fatto dalla multiplicazione di H nel prodotto di G in D, per in Lemma 4, è uguale al prodotto fatto dalla multiplicazione di D, nel prodotto di G in H, uguale ad A: ma il prodotto di G in H, per costruzione è uguale à K, sarà il prodotto di D in K uguale ad A. Si disse che il prodotto di L in D è uguale ad A; sarà il prodotto di K in D uguale al prodotto di L nella medesima D; e perciò le quantità L, & K sono frà di loro uguali. E perche la quantità L si disse essere il valore della proporzione di A à D, sarà K il valore della proporzione di A à D: ma K è la proporzione composta delle tre proporzioni E, F, G; sarà la proporzione di A à D composta delle tre proporzioni E, F, G; si disse nel principio, che la notata E rappresenta il valore della proporzione di A à B; e la notata F rappresenta il valore della proporzione di B à C; come anco G rappresenta il valore della proporzione di C à D; sarà la proporzione di A à D composta dalle proporzioni intermedie di A à B, di B à C, e di C à D, che era da dimostrarsi.

Perche E rappresenta la proporzione di A à B, ed F rappresenta la proporzione di B à C; essendo H il prodotto fatto dalla multiplicazione di E in F, sarà H, per la decima definizione del 5. la proporzione composta dalle due E, ed F; cioè H rappresenterà la proporzione composta dalle proporzioni di A à B, e di B à C: ma, per quel che s'è dimostrato nella prima parte, la proporzione di A à C è composta delle medesime due proporzioni di A à B, e di B à C; in conseguenza la quantità H sarà uguale alla proporzione di A à C. Per la qual cosa, diuisa A per C, il quoziente sarà H, ed il prodotto fatto dalla multiplicazione del quoziente H nel diuifore C, per il lemm. 6, sarà uguale alla quantità A. In oltre perche diuisa la quantità C per la quantità D, il quoziente è G; il prodotto fatto dalla multiplicazione di G in D è uguale alla quantità C; tanto il prodotto di G in D, quanto la quantità C, si multiplichi per H, il prodotto fatto da H, nel prodotto di G in D, sarà uguale al prodotto di H in C: Ma il prodotto di H in C è uguale ad A; sarà il prodotto fatto dalla multiplicazione di H nel prodotto di G in D, uguale ad A. E perche il prodotto fatto dalla multiplicazione di H nel prodotto di G in D, per in Lemma 4, è uguale al prodotto fatto dalla multiplicazione di D, nel prodotto di G in H, uguale ad A: ma il prodotto di G in H, per costruzione è uguale à K, sarà il prodotto di D in K uguale ad A. Si disse che il prodotto di L in D è uguale ad A; sarà il prodotto di K in D uguale al prodotto di L nella medesima D; e perciò le quantità L, & K sono frà di loro uguali. E perche la quantità L si disse essere il valore della proporzione di A à D, sarà K il valore della proporzione di A à D: ma K è la proporzione composta delle tre proporzioni E, F, G; sarà la proporzione di A à D composta delle tre proporzioni E, F, G; si disse nel principio, che la notata E rappresenta il valore della proporzione di A à B; e la notata F rappresenta il valore della proporzione di B à C; come anco G rappresenta il valore della proporzione di C à D; sarà la proporzione di A à D composta dalle proporzioni intermedie di A à B, di B à C, e di C à D, che era da dimostrarsi.

Nell'istesso modo se faranno più di quattro quantità si dimostrerà, che la proporzione della prima all'ultima è composta dalle proporzioni intermedie.

LEMMA VIII.

Se faranno quante si voglia quantità continue proporzionali, la proporzione della prima all'ultima è multiplice.

del-

della proporzione della prima alla seconda, per quanto è la moltitudine delle proporzioni intermedie.

Ultimo es-
empio.

Siano quante si voglia quantità A, B, C, D, E, F , continue proporzionali; cioè che A à B sia come B à C ; che B à C sia come C à D ; che C à D sia come D ad E ; e che D ad E sia come E ad F . Dico che la proporzione della prima A all'ultima F è moltiplice della proporzione della prima A alla seconda B , per quanta è la moltitudine delle proporzioni intermedie; cioè che la prima A alla terza C ha duplicata proporzione di quella, che ha la prima A alla seconda B ; che la prima A alla quarta D ha triplicata proporzione di quella, che ha la prima A alla seconda B ; che la prima A alla quinta E ha quadruplicata proporzione di A à B ; che la prima A alla sesta F ha quintuplicata proporzione, che A à B ; e con quest'ordine per tutte le altre.

Si considerino prima le sole tre quantità A, B, C continue proporzionali. Essendo la proporzione di A à B come quella di B à C , sarà la proporzione di A à B uguale alla proporzione di B à C ; dal che le due proporzioni di A à B , e di B à C , composte insieme, producono il duplicato della proporzione di A à B ; mà la proporzione di A à C , per l'antecedente Lemma, è composta delle medesime due proporzioni di A à B , e di B à C ; sarà la proporzione di A à C duplicata della proporzione di A à B , ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

$A, B, C,$

Di nuovo si considerino la quattro quantità A, B, C, D continue proporzionali. Dico che la prima A alla quarta D ha triplicata proporzione di quella, che ha A à B . Perché le quantità A, B, C, D si suppongono continue proporzionali, sarà A à B come B à C , e sarà B à C come C à D ; e perciò le tre proporzioni di A à B di B à C , e di C à D , sono frà di loro uguali; le quali, composte insieme, producono il triplicato di una; cioè il triplicato della proporzione di A à B : mà la proporzione di A à D , per l'antecedente lemma, è composta delle medesime tre proporzioni di A à B , di B à C , e di C à D ; sarà la proporzione di A à D triplicata di quella, che ha la prima A alla seconda B , che era da dimostrarsi nel secondo luogo.

A, B, C, D

Similmente si considerino le cinque quantità A, B, C, D, E continue proporzionali. Dico che la prima A alla quinta E ha quadruplicata proporzione di quella, che ha la prima A alla seconda B .

Perché le proposte quantità sono continue proporzionali, le quattro proporzioni, cioè di A à B , di B à C , di C à D , e di D ad E , sono frà di loro uguali; le quali, composte insieme, sono il quadruplicato d'una, cioè il quadruplicato della proporzione di A à B : mà, per l'antecedente lemma, la proporzione di A ad E è composta delle medesime quattro proporzioni di A à B , di B à C , di C à D , e di D ad E ; sarà la proporzione di A ad E quadruplicata di quella, che ha la prima A alla seconda B .

$A, B, C, D, E,$

Finalmente si considerino le sei quantità A, B, C, D, E, F continue proporzionali. Dico che la prima A alla sesta F ha quintuplicata proporzione di quella, che ha la prima A alla seconda B . Essendo, per ipotesi, le quantità A, B, C, D, E, F continue proporzionali, le cinque proporzioni intermedie, cioè di A à B , di B à C , di C à D , di D ad E , e di E ad F , sono frà di loro uguali;

le


le quali, composte insieme, producono il quintuplicato d'una; cioè il quintuplicato di A à B ; ma la proporzione di A ad F , per il lemma antecedente, è composta dalle medesime cinque proporzioni; cioè di A à B di B à C , di C à D , di D ad E , e di E ad F ; sarà la proporzione di A ad F quintuplicata della proporzione, che hà la prima A alla seconda B . Nell'istesso modo si dimostrerà se le quantità continue proporzionali saranno più di sei, che la prima alla settima hà settuplicata proporzione, che la prima alla seconda; che la prima all'ottava hà settuplicata proporzione di quella, che hà alla seconda, e così per le altre, il che era da dimostrarsi.

A, B, C, D, E, F

THEOREMA XIII. PROPOSITIONE IX.

I simili triangoli hanno scambievolmente duplicata proporzione, che i loro lati homologhi.

Siano i triangoli simili ABC , DEF , de' quali l'angolo B sia vguale all'angolo E ; l'angolo C all'angolo F ; e l'angolo A vguale all'angolo D . Dico che il triangolo ABC al triangolo DEF hà duplicata proporzione, che il lato BC all'homologo lato EF ; ouero



che il lato AB all'homologo DE , ouero AC à DF . Supposto prima, che i lati BC, EF siano frà di loro vguali. Perche i triangoli sono simili, e gli angoli B, E sono supposti vguali; sarà CB à BA come FE ad ED : ma la prima BC è posta vguale alla terza EF ; sarà la seconda BA vguale alla quarta DE . Nell'istesso modo si dimostrerà, che AC è vguale ad FD ; dache i triangoli ABC, DEF sono frà di loro vguali; fu supposto il lato BC vguale al lato EF ; sarà il triangolo ABC al triangolo DEF , d come il lato BC al lato EF . Si faccia come BC ad EF , così EF ad un'altra, che sia G ; sarà G terza proportionale; e perche BC ad EF è come EF à G ; escendo $B C$ vguale ad $E F$, sarà $E F$ vguale à G ; e presa $B C$ come terza quantità, hauerà BC ad EF e l'istessa proporzione, che hà la medesima BC à G : ma BC ad EF , per quel che s'è dimostrato, e come il triangolo ABC al triangolo DEF ; sarà il triangolo ABC al triangolo DEF come BC à G : e perche la prima BC alla terza proportionale G , per il Lemma antecedente, hà duplicata proporzione, che la prima BC alla seconda EF ; hauerà il triangolo ABC al triangolo DEF duplicata proporzione, che il lato BC all'homologo lato EF , ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

a 4. del 6.
b 14. del 5.

c 4. del 1.
d Corollar.
alla 7. del 5.
e 12. del 6.

f 14. del 5.
g 7. del 5.

h 12. del 5.

K 22. del 6.

114. del 6.

m 7. del 2.

n 1. defn.

del 6.

o 16. del 5.

p 10. del 5.


q 15. del 6.

r 7. del 5.

t 8. del 6.

u 17. del 5.

Di nuovo non sia il lato BC
vguale al lato EF, ma sia BC
maggiore; presa BC come pri-
ma, & EF come seconda, ^k e si
troua la terza proportionale G;
sarà BC ad EF come EF à G:
ma BC è maggiore di EF, sarà
EF¹ maggiore di G, ed il lato
BC sarà molto maggiore di G.



Si tagli BH^m vguale à G; sarà
BC ad EF, come EF à BH: si tiri la retta AH. Perche i triangoli ABC,
DEF sono frà di loro simili, sarà AB à BCⁿ come DE ad EF; e per-
mutando, AB à DE^o sarà come BC ad EF; ma BC ad EF è come la me-
desima EF à BH; sarà AB à DE^p come EF à BH. Si considerino i due
triangoli ABH, DEF, de'quali l'angolo ABH, per ipotesi, è vguale
all'angolo DEF; ed i lati intorno à questi angoli vguali sono reciprochi;
stante che s'è dimostrato, che AB à DE è come EF à BH; perciò i tri-
angoli ABH, DEF^q sono frà di loro vguali; prescò il triangolo ABC,
come terza quantità, sarà il triangolo ABC al triangolo ABH, ^r come il
medesimo triangolo ABC al triangolo DEF. In oltre si considerino i tri-
angoli ABC, ABH, i quali hanno vna medesima altezza, e sarà il trian-
golo ABC al triangolo ABH, ^t come la base BC alla base BH; ma il
triangolo ABC al triangolo ABH, per quel che s'è dimostrato, e come il
medesimo triangolo ABC al triangolo DEF; sarà il triangolo ABC al
triangolo DEF^u come BC à BH; cioè come BC alla retta G: ma la pri-
ma BC alla terza G, per l'antecedente Lemma, ha duplicata propor-
tione, che la prima BC alla seconda EF; il triangolo ABC al triangolo
DEF (ch'è come la prima BC alla terza G) haucrà duplicata propor-
tione, che il lato BC all'homologho lato EF. Nell'istesso modo si di-
mostrerà, che il triangolo ABC al triangolo DEF ha duplicata propor-
tione, che il lato AB al homologho lato DE; e che ha duplicata propor-
tione, che il lato AC all'homologho lato DF, ch'era da dimostrarsi.


S C O L I O.

Da quel che s'è detto nell'antecedente Lemma, e dalla decima De-
finizione del quinto Libro, è manifesto, che quando si dice il triangolo
ABC al triangolo DEF, hauere duplicata proportionione di quella, che
ha il lato BC al lato EF, vuol dire, che la proportionione del triangolo
ABC al triangolo DEF è composta dal prodotto fatto dalla multi-
plicatione della proportionione di BC ad EF nella medesima propor-
tione di BC ad EF; cioè moltiplicandosi la proportionione di BC ad EF,
per la medesima proportionione di BC ad EF, il prodotto sarà il valo-
re della proportionione del triangolo ABC al triangolo DEF.

THEOREMA XIV. PROPOSITIONE XX.

I simili poligoni si diuidono in triangoli simili, di moltitudine vguale, ed homologhi ad essi poligoni: ed il poligono al poligono hà duplicata proportionc, che il lato homologo al lato homologo.

Siano i simili poligoni ABCDE, FGHK, de' quali l'angolo B sia vguale all'angolo G, l'angolo BCD, vguale all'angolo GHI, l'angolo CDE vguale all'angolo HIK, l'angolo E vguale all'angolo K, e l'angolo F all'angolo A. Dico prima,



che questi poligoni si diuidono in triangoli simili, e di moltitudine vguale. Da gli angoli A, & F à gli angoli opposti, si tirino le rette AC, AD, FH, FI. Perche i proposti poligoni sono simili, tanti lati sono in vno, quanti ne sono nell'altro; e perciò tante rette si tirano dall'angolo A à gli angoli opposti, per quante se ne tirano dall'angolo F à gli angoli opposti; dache in tanta moltitudine di triangoli si diuide l'vno, per quanta moltitudine di triangoli si diuide l'altro. Si considerino i triangoli ABC, FGH, de' quali l'angolo B è supposto vguale all'angolo G: La proportionc di AB à BC, per la similitudine de' poligoni, è come FG à GH; e perciò i triangoli sono equiangoli, e farà l'angolo BCA vguale all'angolo GHF, e l'angolo BAC vguale all'angolo GFH; i lati intorno à gli angoli vguali sono proportionali, e però il triangolo BCA farà simile al triangolo FGH. Similmente perche l'angolo E è vguale all'angolo K, e la proportionc di AE ad ED, per la similitudine de' poligoni, è come quella di FK à KI; i triangoli AED, FKI sono equiangoli, hanno i lati intorno à gli angoli vguali e proportionali, e perciò sono fra di loro simili; e farà l'angolo EDA vguale all'angolo KIF; se da gli vguali angoli EDC, KIH, se ne leuano gli vguali angoli EDA, KIF, resta l'angolo ADC vguale all'angolo FIH. Similmente da gli vguali angoli BCD, GHI se ne leuano gli vguali angoli BCA, GHF, resta l'angolo ACD vguale all'angolo FHI; ne i triangoli ACD, FHI, i due angoli ACD, ADC sono vguali à i due angoli FHI, FIH: farà il rimanente angolo CAD è vguale al rimanente angolo HFI, i triangoli ACD, FHI sono equiangoli, hanno i lati intorno à gli angoli vguali proportionali; e perciò sono simili. Il medesimo si prouerà se in essi poligoni vi fossero più triangoli.

Oltre à ciò dico, che questi triangoli sono homologhi à i poligoni interi; cioè che tal proportionc hà ciascun triangolo in vno de' poligoni à

a 6. del 6.

b 4. del 6.

c 1. defin. del 6.

d 6. del 6.

e 4. del 6.

f 1. defin. del 6.

g 31. del 1.

h 4. del 6.

K 1. defin. del 6.

ciascuno de i corrispondenti triangoli nell'altro poligono, quale hà tutto vn poligono à tutto l'altro poligono. Perche i triangoli ABC, FGH sono frà di loro simili, il triangolo ABC al triangolo FGH, per l'antecedente propositione, hà duplicata proportione, che il lato homologo AC al lato homologo FH. Similmente essendo i triangoli ACD, FHI frà di loro simili, hauerà il triangolo ACD al triangolo FHI la medesima duplicata proportione, che hà il lato homologo AC al lato homologo FH; e perciò il triangolo ABC al triangolo FGH è come il triangolo ACD al triangolo FHI. Per l'istessa ragione il triangolo ACD al triangolo FHI hà duplicata proportione, che il lato homologo AD al lato homologo FI; ma il triangolo AED al simile triangolo FKI hà la medesima duplicata proportione, che il lato homologo AD al lato homologo FI; farà il triangolo ACD al triangolo FHI, come il triangolo ADE al triangolo FKI; dal che l'antecedente ABC al conseguente FGH, è come l'antecedente ACD al conseguente FHI; e l'antecedente ACD al conseguente FHI è come l'antecedente ADE al conseguente FKI; faranno tutti gli antecedenti, cioè il poligono ABCDE, à tutti i conseguenti, cioè al poligono FGHK, come vno antecedente ad vn conseguente; cioè come il triangolo ABC al triangolo FGH; ouero come il triangolo ACD al triangolo FHI; ò pure come il triangolo ADE al triangolo FKI.

Finalmente dico che il poligono al poligono hà duplicata proportione, che il lato homologo al lato homologo. Perche il poligono ABCDE al poligono FGHK è come il triangolo ABC al triangolo FGH; ed il triangolo ABC al simile triangolo FGH hà duplicata proportione, che il lato homologo AB al lato homologo FG; per l'egualità hauerà il poligono ABCDE al poligono FGHK duplicata proportione, che il lato homologo AB al lato homologo FG, ch'era da dimostrarsi.

C O R O L L A R I O.

Dall'antecedente propositione è manifesto, che i poligoni simili sono come i quadrati de i loro lati homologhi, stante che tutti i quadrati sono simili frà di loro; e così i quadrati de' lati CD, HI hanno duplicata proportione, che i loro lati homologhi CD, HI: ma i poligoni simili ABCDE, FGHK hanno la medesima duplicata pro-


portio-

portione de i loro lati homologhi CD, HI, farà il poligono ABCDE al poligono FGHK, come il quadrato di CD al quadrato di HI.

S C O L I O.

Si può qui facilmente prouare, che gli uguali poligoni simili hanno i lati homologhi uguali; e de i poligoni simili ineguali, il lato homologolo del maggiore è maggiore del lato homologolo del minore.

Siano prima i poligoni simili Z ed X fra di loro uguali, e sia l'angolo A uguale all'angolo C, e l'angolo B uguale all'angolo D;



faranno i poligoni Z, ed X similmente posti a i lati AB, CD; dal che AB, CD sono i lati homologhi; e sarà il poligono Z al simile poligono X, per l'antecedente Corollario, come il quadrato del lato homologolo AB al quadrato del lato homologolo X; ma i poligoni Z, ed X sono supposti fra di loro uguali; saranno i quadrati de' lati AB, CD fra di loro uguali, e perciò il lato AB sarà uguale al lato CD.

Di nuovo se il poligono Z sarà maggiore del poligono X, sarà il quadrato di AB maggiore del quadrato di CD, e perciò il lato AB sarà maggiore del lato CD, ch'era da dimostrarsi.


a 14. del 5.
b Scol. alla
46. del 2.
c 46. del 5.
d Scol. alla
46. del 1.

THEOREMA XV. PROPOSITIONE XXI.

I retti linee che sono simili ad vn medesimo rettilineo, sono ancora simili fra di loro.

Sia il rettilineo A simile al rettilineo B, ed il rettilineo C simile al medesimo rettilineo B. Dico che i rettilinei A, & C sono fra di loro simili

Perche i rettilinei A, & B sono fra di loro simili, perciò sono equiangoli. Similmente essendo i rettilinei B, & C simili, faranno equiangoli; ma il rettilineo A è equiangolo al rettilineo B; i rettilinei dunque A, & C sono equiangoli, per la qual cosa hanno a i lati intorno a gli angoli uguali proporzionali; e per la prima definizione di questo, sono fra di loro simili, ch'era da dimostrarsi.



a 4. del 6.

THEOREMA XVI. PROPOSITIONE XXII.


Se quattro linee rette sono proporzionali, i rettilinei simili,

M m 2

c simil-

e similmente descritti sopra di esse, sono proportionali: e se quattro rettilinei simili sono proportionali, le linee rette, sopra le quali sono similmente descritti, saranno proportionali.

Siano prima le quattro rette linee AB, CD, EF, GH, proportionali: cioè che AB à CD sia come EF à GH; e sopra le due AB, CD, siano descritti i rettilinei M, N simili, e similmente posti; come ancora sopra le due EF, GH siano descritti due altri rettilinei Y, Z simili frà di loro, e similmente posti. Dico che il rettilineo M al simile rettilineo N hà Pistessa proportionione, quale hà il rettilineo Y al simile rettilineo Z.



a 10. del 6.

b 13. del 5.

c 12. del 5.

d 10. del 6.

Perche i rettilinei simili M, N sono similmente posti sopra le rette AB, CD; saranno le rette AB, CD lati homologhi di essi rettilinei: e per Pistessa ragione le rette EF, GH sono lati homologhi de' i simili rettilinei Y, Z. Hor essendo i rettilinei M, N frà di loro simili, il rettilineo M al simile rettilineo N^a hà duplicata proportionione, che il lato homologo AB al lato homologo CD; ma, per ipotesi, AB à CD è come EF à GH; hauerà il rettilineo M al rettilineo N^b duplicata proportionione di quella, che hà EF à GH; ma il rettilineo Y al simile rettilineo Z hà la medesima duplicata proportionione, che hà EF à GH; hauerà il rettilineo M al simile rettilineo N, e Pistessa proportionione, che hà il rettilineo Y al rettilineo Z, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.


Di nouo siano i rettilinei M, N frà di loro simili, e similmente posti sopra le rette AB, CD, ed i rettilinei Y, Z siano frà di loro simili, e similmente posti alle rette EF, GH; ed habbia il rettilineo M al rettilineo N Pistessa proportionione, che hà il rettilineo Y al rettilineo Z. Dico che AB à CD sarà come EF à GH. Perche i rettilinei M, ed N sono frà di loro simili, il rettilineo M al rettilineo N^a hà duplicata proportionione, che il lato homologo AB al lato homologo CD; ma per ipotesi, il rettilineo M al rettilineo N è come il rettilineo Y al rettilineo Z; hauerà il rettilineo Y al rettilineo Z duplicata proportionione di quella, che hà AB alla retta CD; e perche il rettilineo Y al simile rettilineo Z, hà duplicata proportionione, che il lato homologo EF al lato homologo GH; farà AB à CD come EF à GH, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA XVII. PROPOSITIONE XXIII.

Se due parallelogrammi sono equiangoli, haueranno la proportionione composta delle proportioni de i lati, che sono intorno à gli angoli vguali:

Siano

Siano i parallelogrammi equiangoli $ABCD$, $CEFG$; e sia l'angolo B CD uguale all'angolo E CG . Dico che la proporzione del parallelogrammo AC al parallelogrammo CF , è composta di due proporzioni; cioè della proporzione del lato BC al lato CG ; e della proporzione del lato DC al lato CE .



Si adattino i proposti parallelogrammi AC , CF , in modo che si tocchino secondo gli angoli uguali C ; e che i lati BC , CG costituiscano la sola retta linea BCG ; e per il Corollario alla 14. propos. di questo, i lati EC , CD , costituiranno vna sola retta linea: si prolunghino i lati AD , FG sino che concorrano in qualche punto H . Poi si prenda qualunque retta linea I , e si faccia I come BC a CG , così I ad vn'altra, che sia K : e similmente si faccia I come DC a CE , così K ad vn'altra, che sia L . Perche i parallelogrammi AC , DG hanno vna medesima altezza, sarà il parallelogrammo AC al parallelogrammo DG , come la base BC alla base CG : ma per costruzione, BC a CG è come I a K ; sarà il parallelogrammo AC al parallelogrammo DG come I a K . Similmente, essendo i parallelogrammi DG , CF sotto d'vna medesima altezza, il parallelogrammo DG al parallelogrammo CF sarà come la base DC alla base CE ; ma per costruzione, DC a CE è come K ad L ; sarà il parallelogrammo DG al parallelogrammo CF , come K ad L . Si considerino sei quantità, tre da vna parte, cioè i parallelogrammi AC , DG , CF ; e tre da vna'altra parte, cioè le rette I , K , L . Perche la prima AC alla seconda DG , è come la prima I alla seconda K ; e la seconda DG alla terza CF è come la seconda K alla terza L ; sarà, per l'egualità, la prima AC alla terza CF , come la prima I alla terza L : ma la prima I alla terza L , per il lemma 7. doppo la 18. propos. di questo, hà la proporzione composta delle proporzioni di I a K , e di K ad L ; hauerà il parallelogrammo AC al parallelogrammo CF la proporzione composta delle proporzioni di I a K , e di K ad L : ma la proporzione di I a K , è come quella di BC a CG ; e la proporzione di K ad L è come quella di DC a CE ; hauerà il parallelogrammo AC al parallelogrammo CF la proporzione composta delle proporzioni di BC a CG , e di DC a CE , come si propose dimostrare.

S C O L I O.

Il medesimo si verifica in due triangoli, de' quali vn angolo dell'vno sia uguale ad vn angolo dell'altro, come nel seguente Theorema.

I triangoli, de' quali vn angolo dell'vno è uguale ad vn

angolo

angolo dell'altro, hanno la proportione composta delle proportioni de'lati intorno à gli angoli vguali.

Siano i triangoli ABC , DEF , e sia l'angolo B vguale all'angolo E . Dico che la proportione del triangolo ABC , al triangolo DEF è composta delle proportioni, cioè di AB à DE , e di BC ad E F . Dal punto C si tiri la



a 31. del 1.

b 34. del 1.


c 15. del 5.

retta CG , ^a parallela ad AB ; e dal punto A si tiri la retta AG parallela al lato BC , le quali concorreranno in qualche punto G : e sarà fatto il parallelogrammo BG , il quale ^b sarà il doppio del triangolo ABC ; nell'istesso modo si compisca il parallelogrammo EH , che sarà il doppio del triangolo DEF ; dal che tutto il parallelogrammo BG à tutto il parallelogrammo EH , e sarà come la metà ABC alla metà DEF ; ma per l'antecedente proposizione la proportion del parallelogrammo BG al parallelogrammo equiangolo EH , è composta delle proportioni di AB à DE , e di BC ad EF ; sarà la proportion del triangolo ABC al triangolo DEF composta delle proportioni di AB ad ED , e di BC ad EF , ch'era da dimostrarsi.

Qui aggiunge il Commandino il seguente Theorema, che noi più breuemente dimostreremo col P. Clauio.

I triangoli, che hanno vn angolo vguale ad vn angolo, sono come i rettangoli contenuti dai lati intorno à gli angoli vguali.

Siano i triangoli ABC , DEF , de quali l'angolo B sia vguale all'angolo E . Dico che il triangolo ABC al triangolo DEF è come il rettangolo contenuto da i due lati AB , BC , al rettangolo contenuto da i lati DE , EF . Perché gli




angoli in B , ed E sono frà di loro vguali, per l'antecedente Scolio, la proportion del triangolo ABC al triangolo DEF , è composta delle proportioni di AB à DE , e di BC ad EF ; ma il rettangolo, contenuto dalle rette AB , BC , al rettangolo contenuto dalle rette DE , EF , per l'antecedente proposizione, hà la proportion composta dalle medesime due proportioni, cioè di AB à DE , e di BC ad EF ; hauerà dunque il triangolo ABC al triangolo DEF l'istessa proportion; quale hà il rettangolo contenuto dai lati AB , BC , al rettangolo contenuto dai lati DE , EF , ch'era da dimostrarsi.

COROLLARIO.

Da quel che s'è detto è manifesto, che i parallelogrammi equian-

equiangoli hanno l'istessa proportione frà di loro, quale hanno i rettangoli contenuto da i lati intorno, à gli angoli vguali.


Come ne i parallelogrammi BD, FH equiangoli, sia l'angolo B uguale all'angolo F, tirate le diagonali AC, EG, sarà il parallelogrammo BD il doppio del triangolo ABC; ed il parallelogrammo FH sarà il doppio del triangolo EFG; e perciò il parallelogrammo BD al parallelogrammo FH b sarà come il triangolo ABC al triangolo EFG: ma, per quel che s'è dimostrato antecedenemente, il triangolo ABC al triangolo EFG, è come il rettangolo contenuto da i lati AB, BC, al rettangolo contenuto da i lati EF, FG, sarà il parallelogrammo BD al parallelogrammo FH, come il rettangolo contenuto da i lati AB, BC, al rettangolo contenuto da i lati EF, FG, come si disse.



Un altro Teorema del Commandino, che qui dimostrano con maggior breuità.

I triangoli, e parallelogrammi, hanno frà di loro la proportione composta delle proportioni delle loro basi, ed altezze.

Siano i triangoli ABC, DEF, ed i parallelogrammi GBCA, HEFD; da gli angoli A, & D si facciano cadere le rette AI, DK, perpendicolari alle basi BC, EF. Dico che il triangolo ABC al triangolo DEF, ouero



il parallelogrammo GBCA al parallelogrammo HEFD, bà la proportione composta dalle proportioni della base BC alla base EF; e dell'altrezza AI all'altrezza DK. Da i punti B, C, E, F si facciano cadere le rette BL, CN, EM, FO, perpendicolari alle rette GA, HD, le quali sono parallele alle basi BC, EF; i quadrilateri LBCN, MEFO saranno parallelogrammi rettangoli; e perche gli angoli AIC, NCI sono retti, sarà AI parallela ad NC, & il quadrilatero AICN sarà parallelogrammo rettangolo, e perciò AI sarà uguale ad NC. Nell'istesso modo si dimostrerà, che DK è uguale ad OF. In oltre perche il rettangolo LBCN, ed il triangolo ABC, hanno una medesima base, e sono frà se medesime parallele, sarà il rettangolo LBCN b il doppio del triangolo ABC. Nell'istesso modo si pro-


e 25. del 5.

d 23. del 6.

rà, che il rettangolo $MEFO$ è il doppio del triangolo DEF , e sarà il rettangolo $LBCN$ al rettangolo $MEFO$, come il triangolo ABC al triangolo DEF ; ma il rettangolo $LBCN$

al rettangolo $MEFO$, ha la proporzione composta delle proporzioni di BC ad EF , e di CN ad FO ; bauerà il triangolo ABC al triangolo DEF , la proporzione composta delle proporzioni di BC ad EF , e di CN ad F

O ; ma CN è uguale ad AI , ed OF è uguale ad DK ; la proporzione dunque del triangolo ABC al triangolo DEF sarà composta delle proporzioni della base BC alla base EF , e dell'altezza AI all'altezza DK . E perchè la proporzione del triangolo ABC al triangolo DEF è come quella del parallelogrammo $GBCA$ al parallelogrammo $HEFD$ (stante che i parallelogrammi sono il doppio de i detti triangoli); la proporzione dunque del parallelogrammo $GBCA$ al parallelogrammo $HEFD$, sarà composta delle proporzioni della base BC alla base EF , e dell'altezza AI all'altezza DK , ch'era da dimostrarsi.



COROLLARIO

Da quel che s'è detto è manifesto, che il rettangolo contenuto dall'altezza del triangolo, e dalla base è il doppio del medesimo triangolo; stante che NC è uguale all'altezza AI , ed il rettangolo $LBCN$ è il doppio del triangolo ABC .

Il Teorema seguente non sarà inutile per le cose, che dimostreremo ne gli Elementi Comici.

Se faranno otto quantità, cioè quattro da vna parte, e quattro da vn'altra parte proporzionali; il rettangolo contenuto dalle due prime al rettangolo contenuto dalle due seconde, sarà come il rettangolo contenuto dalle due terze al rettangolo contenuto dalle due quarte: e se il rettangolo delle due prime al rettangolo delle due seconde è come il rettangolo delle due terze al rettangolo delle due quarte, e le prime quattro sono proporzionali; ancora le altre quattro faranno proporzionali.


Siano

Siano le quattro quantità A, B, C, D , da una parte, e le altre quattro E, F, G, H , da un'altra parte; ed habbia prima A à B l'istessa proporzione, quale hà C à D ; e similmente E ad F sia come G ad H . Dico che il rettangolo contenuto dalle due prime A , ed E , al rettangolo contenuto dalle due seconde B , ed F , è come il rettangolo contenuto dalle due terze C , & G , al rettangolo contenuto dalle due quarte D , ed H .

Con le due A , ed E si faccia il rettangolo M ; con le due B , ed F , si faccia il rettangolo N ; con le due G , & C , si costruisca il rettangolo R ; e con le due D , ed H si faccia il rettangolo S . Perchè la proporzione del rettangolo M al rettangolo N , è composta delle due proporzioni, cioè di A à B , e di E ad F ; e per ipotesi, la proporzione di A à B , è come quella di C à D ; e la proporzione di E ad F è come quella di G ad H ; la proporzione dell' rettangolo M al rettangolo N sarà composta delle proporzioni di C à D , & di G ad H : mà la

proporzione del rettangolo R al rettangolo S è composta delle medesime due proporzioni di C à D , e di G ad H ; la proporzione dunque del rettangolo M al rettangolo N sarà l'istessa, che quella del rettangolo R al rettangolo S ; cioè il rettangolo contenuto dalle due prime A , ed E , al rettangolo contenuto dalle due seconde B , ed F , sarà come il rettangolo delle due terze C , & G , al rettangolo delle due quarte D , ed H , che era da dimostrarsi nel primo luogo.

Di nuovo dico che, se il rettangolo contenuto dalle due A , ed E , al rettangolo delle due B , ed F , è come il rettangolo contenuto dalle due C , & G , al rettangolo contenuto dalle due D , ed H ; e la proporzione di A à B è come quella di C à D , sarà ancora E ad F come G ad H ; l'intenda fatta la medesima costruzione di prima. Se la proporzione di E ad F non è come quella di G ad H , sarà E ad F come G ad un'altra, ò maggiore, ouero minore di H ; sia prima maggiore come la notata HI ; si compisca il rettangolo SKI . Perchè il rettangolo M al rettangolo N hà la proporzione composta di A à B , e di E ad F , e la proporzione di A à B , per ipotesi, è come quella di C à D : ed ancora E ad F , per costruzione, è come G ad HI ; la proporzione del rettangolo M al rettangolo N sarà composta delle proporzioni di C à D , e di G ad HI : mà la proporzione del rettangolo R al rettangolo S è composta delle medesime proporzioni di C à D , e di G ad HI ; bauerà il rettangolo M al rettangolo N l'istessa proporzione, che il rettangolo R al rettangolo SKI ; mà per ipotesi, il rettangolo M al rettangolo N è come il rettangolo R al rettangolo S ; sarà il rettangolo R al rettangolo S , come il medesimo rettangolo R al rettangolo SKI ; dal che i rettangoli S , & SKI sono fra di loro uguali; la parte uguale al tutto, ch'è impossibile; non dunque E ad F è come G ad una maggiore di H . Nell'istesso modo si prouerà, che E



ad F non è come G ad una minore di H. Per la qual cosa E ad F sarà come G ad H, ch'era da dimostrarsi.

Sarà giueuole porre in questo luogo i due seguenti Theoremi dimostrati da Tolomeo nel primo Libro del suo Almagesto.

I.

Se due rette linee, come AB, CB, contengono qualche angolo ABC, e da gl'estremi A, & C sono inclinate due rette linee come AD, CE, le quali segandosi scambievolmente in qualche punto F, concorrino con le rette AB, CB, come in E, & D; la proportionione di CB à BD sarà composta di due proportioni, cioè della proportionione di CE ad EF, e della proportionione di AF, ad AD.

a 36. del 2.


b 4. del 6.

c 16. del 5.

d 4. del 6.

e 16. del 5.

Dal punto D^a si tiri la retta DG, parallela alla retta EC, e per il Corollario alla propositione quarta di questo, il triangolo BGD sarà simile al triangolo BEC; e la proportionione di BC à CE^b sarà come quella di BD à DG; e permutando, sarà CB à BD^c come CE à GD. Similmente essendo EF parallela à GD il triangolo AEF, per il citato Corollario, sarà simile al triangolo ADG; e sarà AF ad FE^d come AD à DG; e permutando, AF ad AD^e sarà come



EF à GD. Si considerino tre quantità, cioè la prima CE, la seconda EF, e la terza GD; e per il settimo Lemma dopo la 18. propositione di questo, la proportionione della prima CE alla terza GD è composta delle proportioni di CE ad EF, e di EF à GD; mà EF à GD, per quel che s'è dimostrato, è come AF ad AD; perciò la proportionione di CB à BD sarà composta delle due proportioni cioè di CE ad EF, e di AF ad AD, che era da dimostrarsi. Nell'istesso modo si dimostrerà, che la proportionione di AB à BE è composta delle proportioni di AD à DF, e di CF à CE.

I I.

Supposto le medesime cose. Dico che la proportionione di CD à DB è composta delle due proportioni cioè di CF ad FE, e di AE ad AB.


a 31. del 2.

b 29. del 2.

Dal punto B^a si tiri la retta BG parallela alla retta AD, la quale concorrerà con la retta CE continuata in qualche punto G. Perche le rette AD, BG sono frà di loro parallele, segate dalla retta GF, b gli angoli alterni AFE,

BGE,

BGE, sono frà di loro uguali. Similmente, essendo le parallele BG, AD segate dallaretta AB, gli angoli alterni GBE, FAE sono frà di loro uguali; mà gli angoli al vertice AEF, GEB sono frà di loro uguali; saranno i triangoli GEB, AEF frà di loro equiangoli; e la proporzione di GE ad EB^d sarà come quella di FE ad EA; e permutando GE ad EF sarà come BE ad EA; e componendo GF ad FE^f sarà come BA ad AE; ed inuertendo, FE ad FG sarà come AE ad AB. In oltre essendo FD parallela à GB, sarà CD à DB^h come CF ad FG: frà le due CF, FG si ponga per intermedia F E, per il Lemma settimo dopo la 18. di questo, la proporzione della prima CF alla terza FG, sarà composta delle proporzioni di CF ad FE, & di FE ad FG: mà FE ad FG, per quel che si è dimostrato, è come AE ad AB; la proporzione dunque di CD à DB sarà composta delle proporzioni di CF ad FE; e di AE ad AB, come fu proposto dimostrare. Nell'istesso modo si dimostrerà, che la proporzione di AE ad EB è composta delle proporzioni di AF ad FD, e di CD à CB.



c 15. del 2.

d 4. del 6.

e 16. del 5.

f 18. del 5.


g Coroll. alla 4. del 5.

h 2. del 6.

THEOREMA XVIII. PROPOSITIONE XXIV.

In ogni parallelogrammo quei parallelogrammi, che sono intorno al diametro, sono simili frà di loro; ed ogn'vno è simile à tutto il parallelogrammo.

Sia il parallelogrammo ABCD, diuiso ne i parallelogrammi EF, BI, GH, ID, de'quali s'iano i due EF, GH intorno al diametro AC. Dico che i parallelogrammi EF, GH sono simili frà di loro, ed ogn'vno è simile à tutto il parallelogrammo ABCD. Perche la retta EH è parallela al lato BC, sarà l'angolo esterno AEI, vguale all'angolo B interno, ed opposto; e sarà l'angolo esterno AIE vguale all'angolo ACB interno, ed opposto. Similmente perche la retta FG è parallela al lato DC, sarà l'angolo esterno AFI^b vguale all'angolo D interno, ed opposto; e l'angolo AIF esterno, vguale all'angolo ACD interno, ed opposto; e perciò tutto l'angolo EIF sarà vguale à tutto l'angolo BCD; l'angolo A è commune ad ambidue i parallelogrammi EF, BD; saranno i parallelogrammi EF, BD frà di loro equiangoli. Nell'istesso modo si pro-



a 29. del 2.

b 29. del 1.

uerà che il parallelogrammo GH è equiangolo à tutto il parallelogrammo BD; e perciò farà ancora equiangolo al parallelogrammo EF.

In oltre perche la retta EI è parallela al lato BC, per il Corollario alla 4. proposizione di questo, il triangolo AEI è simile al triangolo ABC: e similmente essendo FI parallela al lato CD, farà il triangolo AIF simile al triangolo ACD; e farà la proporzion di EI ad IA come quella di BC à CA; e la proporzion di A I ad I F come quella di



d 1. defin.
del 4:

c 22. del 5.


f 29. del 5.

AC à CD; e per l'egualità, EI ad IF sarà come BC à CD; e così i lati intorno à gli angoli vguali EIF, BCD sono proporzionali. Come ancora farà IF, ad FA come CD à DA; ed IE ad EA come CB à BA; e così i lati intorno à gli angoli vguali AEL, ABC, ouero AFI, ADC, sono proporzionali. Di più farà FA ad AI come DA, ad AC, & AI ad AE come CA ad AB, e per l'egualità, FA ad AE sarà come DA ad AB; per la qual cosa i parallelogrammi EF, BD sono frà di loro simili. Nell'istesso modo si dimostrerà, che il parallelogrammo GH è simile à tutto il parallelogrammo BD; e perciò i parallelogrammi EF, GH sono frà di loro simili, ed ognuno è simile à tutto il parallelogrammo BD, ch'era da dimostrarsi.

PROBLEMA VII. PROPOSITIONE XXV.

Dati due rettilinei, costruirne vn terzo simile ad vno de i dati, ed vguale all'altro.

Siano dati i due rettilinei A, & B, e si voglia costruire vn altro rettilineo simile al rettilineo A, ed vguale al rettilineo B. Al lato CD, si applichi il parallelogrammo CDEF, secondo qualunque angolo; poi si applichi al lato DE il parallelogrammo DH vguale al rettilineo B, e che habbia l'angolo EDG vguale all'angolo FCD; frà le due rette CD, DG si trovi vna media proportionale, che sia IK; sopra la retta IK si descriva il rettilineo L simile, e similmente posto al rettilineo A. Dico che il rettilineo L è vguale al rettilineo B.



a 45. del 1.

b 45. del 1.

c 13. del 6.

d 19. del 6.

c 29. del 1.

Perche l'angolo EDG, per costruzione è vguale all'angolo FCD; vguilmente s'aggiunga l'angolo EDC; i due angoli EDG, EDC saranno vguali à i due angoli EDC, FCD; ma i due angoli EDC, FCD sono

vguale al
rettilineo
A


vguali

vguali à due angoli retti; perciò i due angoli EDG, EDC sono vguali à due angoli retti; e le rette CD, DG ^f costituiscono vna sola retta linea; per la qual cosa i parallelogrammi CE, DH sono sotto vna medesima altezza; ed il parallelogrammo CE al parallelogrammo DH ^g sarà come la base CD alla base DG. In oltre perche IK, per costruzione, è media proportionale fra le due CD, DG, per il Lemma 8. dopo la 18. propositione di questo, la prima CD alla terza DG hà duplicata proportione di quella, che hà la prima CD alla seconda IK: ma il rettilineo A al simile rettilineo L ^h hà la medesima duplicata proportione, che hà CD ad IK; ha uerà il rettilineo A al rettilineo L ^h l'istessa proportione, che hà CD à DG; fù dimostrata la proportione di CD à DG essere come il parallelogrammo CE al parallelogrammo DH; sarà il rettilineo A al rettilineo L, ^k come il parallelogrammo CE al parallelogrammo DH; ma il rettilineo A, per costruzione, è vguale al parallelogrammo CE; sarà il rettilineo L ⁱ vguale al parallelogrammo DH: e perche il parallelogrammo DH è fatto vguale al rettilineo B; sarà il rettilineo L vguale al rettilineo B, ch'era da farsi, e dimostrarsi.

THEOREMA XIX. PROPOSITIONE XXVI.

Se da vn parallelogrammo sia detratto vn parallelogrammo simile, e similmente posto, che habbia vn angolo commune con tutto il parallelogrammo; l'vno, e l'altro parallelogrammo sarà intorno al medesimo diametro.

Dal parallelogrammo ABCD, ne sia detratto vn parallelogrammo simile, e similmente posto, com'è il parallelogrammo EBGF, che habbiano l'angolo EBG commune. Dico che tirato il diametro BD quello passa per il punto F. Se il diametro BD non passa per l'angolo F, ò segará il lato EF, ouero il lato FG; seghi, s'è possibile, il lato EF in qualche punto H, e sia il diametro la linea DHB; dal punto H si tiri la retta HI, ^a parallela al lato AB, sarà il quadrilatero EBHI parallelogrammo, il quale, per quel che s'è detto, e intorno al diametro D H B; e perciò il parallelogrammo EBHI ^b sarà simile à tutto il parallelogrammo AC; ma il parallelogrammo EBGF è supposto simile al medesimo parallelogrammo AC, i parallelogrammi dunque EBGF, EBHI ^c sono simili fra di loro, e la proportione di EB à BG, ^d sarà come quella della medesima EB à BI: per la qual cosa le rette BI, BG e sono fra di loro vguali, la parte è vguale al tutto, ch'è impossibile: non dunque il diametro DB sega il lato EF. Nell'istesso modo si dimostrará, che non sega il lato FG; e perciò passa per il punto F, ed i parallelogrammi EBGF, ABCD sono intorno al medesimo diametro DB, ch'era da dimostrarsi.



f 14. del 2.

g 1. del 6.

h 11. del 5.

k 11. del 5.

i 14. del 5.

a 31. del 1.

b 14. del 6.

c 31. del 6.

d 1. defn.


d el 6.

e 9. del 5.

THEOREMA XX. PROPOSITIONE XXVII.

Di tutti i parallelogrammi applicati alla medesima retta linea, che mancano a compire quella retta linea d'un parallelogrammo simile, e similmente posto a quello, ch'è descritto sopra la metà; il massimo è il parallelogrammo descritto sopra la metà.

Sia la retta linea AB , divisa in due parti uguali in C , e sopra la retta AC sia descritto qualunque parallelogrammo AD ; dal punto B si tiri la retta BE parallela ad AH , ouero CD , la quale concorrerà con HD continuata in qualche punto E . Perchè la retta DC è parallela ad AH , l'angolo EDC esterno b è uguale all'angolo DHA interno, ed opposto; e per l'istessa ragione l'angolo BCD sarà uguale all'angolo A . Similmente essendo DC parallela ad EB , l'angolo HDC esterno c sarà uguale all'angolo E interno, ed opposto; e l'angolo ACD sarà uguale all'angolo CBE ; dal che i parallelogrammi AD, CE sono equiangoli. E perchè CB è uguale ad AC , però DE sarà uguale ad HD ; come ancora EB, DC, HA sono fra di loro uguali. Per la qual cosa CD à DE d sarà come AH ad HD , e così per tutti gli altri lati intorno a gli angoli uguali. Si che i parallelogrammi AD, CE sono simili fra di loro, ed il parallelogrammo AD , descritto sopra la retta AC , ch'è metà della retta AB , sarà applicato alla retta AB , e gli manca per compire la retta AB , tutto il parallelogrammo $DCBE$ simile, e similmente posto ad esso parallelogrammo AD . Dico che il parallelogrammo AD è il massimo di tutti gli altri parallelogrammi applicabili alla medesima retta AB , che ogn'vno manchi per compire la retta AB d'un parallelogrammo simile ad AD .



Si tiri il diametro DB , nel quale sia preso qualunque punto G ; e per il punto G si faccia passare la retta IF parallela ad AB , e per il medesimo punto G si faccia passare la retta LK parallela ad EB ; e sarà diviso il parallelogrammo CE in quattro parallelogrammi, de' quali i due KI, ML sono intorno al diametro DB ; e perciò e sono simili fra di loro, ed ogn'vno è simile al parallelogrammo CE ; cioè simile al parallelogrammo AD , descritto sopra la retta AC , ch'è metà della retta AB : sarà dunque applicato alla retta AB il parallelogrammo AG , il quale manca, per compire la retta AB , per quanto è il parallelogrammo KI simile al parallelogrammo AD , descritto sopra di AC , metà di AB . Dico che il parallelogrammo AG è minore del parallelogrammo AD . Perchè i complementi CG, GE , h sono fra di loro uguali, se gli aggiunga il comune KI , ne viene il parallelogrammo CI uguale al parallelogrammo KE : ma il parallelo-

grammo

grammo CI κ è vguale al parallelogrammo CF (stante che hanno vguaii basi, e sono frà le medesime parallele) farà il parallelogrammo CF vguale al parallelogrammo KE; vgualmente se gli aggiunga il parallelogrammo CG, ne viene tutto il parallelogrammo AG vguale allo gnomone CBELGM; ma questo gnomone è minore del parallelogrammo CE, cioè minore del parallelogrammo AD; farà il parallelogrammo AG minore del parallelogrammo AD. E perche il punto G è preso ad arbitrio, ouunque il punto G farà preso in DB, sempre si dimostrerà il medesimo. Per la qual cosa di tutti i parallelogrammi applicabili ad AB, che ogn'vno manchi à compire la linea AB per vn parallelogrammo simile ad AD, il parallelogrammo AD farà il massimo, ch'era da dimostrarsi.


K 31. del 6.

PROBLEMA VIII. PROPOSITIONE XXVIII.

Ad vna data retta linea applicare vn parallelogrammo vguale ad vn dato rettilineo, che manchi à compire la linea d'vn parallelogrammo simile ad vn dato parallelogrammo; è necessario però, che il dato rettilineo non sia maggiore del parallelogrammo descritto sopra la metà, simile al dato parallelogrammo.

Sia data la retta linea AB, il rettilineo C, ed il parallelogrammo D; e s'habbia d'applicare alla data retta AB vn parallelogrammo vguale al dato rettilineo C, che manchi à compire la retta AB per vn parallelogrammo simile al dato parallelogrammo D. Diuisa AB in due parti vguali in E, sopra la metà AE si descriua il parallelogrammo AF, simile, e similmente posto al parallelogrammo D; e si compisca tutto il parallelogrammo AG. Si dimostri, come si fece nel principio dell'antecedente propositione, che il parallelogrammo EG è simile, e similmente posto al parallelogrammo AF, ouero D. Se il parallelogrammo AF farà vguale al rettilineo C, haueremo applicato alla retta AB il parallelogrammo AF, che manca per compire la

a 10. del 1.
b 12. del 6.




retta AB quanto è il parallelogrammo EG, simile, e similmente posto al parallelogrammo D, ch'era da farsi. Ma se il parallelogrammo AF non è vguale al rettilineo C, perche nell'antecedente propof. s'è dimostrato, che il parallelogrammo AF è il massimo di tutti gli applicabili ad AB, che habbiano la mancanza simile ad AF; perciò qualunque parallelogrammo applicato ad AB, secondo le dette conditioni, farà minore di

AF, do-

AF; dovendosi dunque applicare ad A B vn parallelogrammo vgnale al rettilineo C, con le dette conditioni, non essend' C vgnale ad AF è necessario, che sia minore; altrimenti l'applicazione da farsi è impossibile. Supposto dunque, che il rettilineo C sia minore di AF per la quantità del rettilineo I; si descriva il parallelogrammo NL simile, e similmente posto al parallelogrammo D^c ed vgnale al rettilineo I; sarà il parallelogrammo NL^d simile, e similmente posto al parallelogrammo EG; dal che

l'angolo EFG sarà uguale all'angolo NKL. In oltre perché sottraendo dal parallelogrammo AF il rettilineo C, avanzza il rettilineo I, cioè NL, perciò i due C, & NL, insieme giunti, sono uguali al parallelogrammo AF, ouero EG; per la qual cosa il parallelogrammo EG sarà maggiore del pa-

il parallelogrammo NL; e per lo Solio alla 20. proposizione, il lato FG è maggiore di KL, ed il lato FE sarà maggiore di KN. Si tagli da FG e la parte FQ uguale ad LK; e da FE si tagli la parte FO uguale ad NK; dal punto Q si tirì la retta QT parallela alla retta GB, e per il punto O si faccia passare la retta SR parallela ad AB. Perchè i lati OF, FQ sono uguali à i lati NK, KL, e l'angolo OFQ è uguale all'angolo K; farà il parallelogrammo OQ uguale, simile, e similmente posto al parallelogrammo NL; ma il parallelogrammo NL è simile, e similmente posto al parallelogrammo EG; saranno i parallelogrammi EG, OQ frà di loro simili, e similmente posti; hanno l'angolo EFG comune; perciò tirato il diametro FB, & quello passa per il punto P; ed il parallelogrammo TR sarà intorno al diametro FB; dal che sarà simile al parallelogrammo EG; cioè simile al parallelogrammo AF, ouero D. Si è dunque alla retta AB applicato il parallelogrammo AP, che manca à compire la retta AB, per quanto è il parallelogrammo TR simile al parallelogrammo dato D. Dico che il parallelogrammo AP è uguale al rettilineo C.



c 25. del 6.

1846.

ਦੇ ਨੇ. ਦੀਨੀ ਨੇ.

431. del 1.

g Scol. alla
4. del 6.

b2x,del 6.

N. 26. del 6.

124 del 6.

13. del 1.


n 36. del 1.

PROBLEMA IX. PROPOSITIONE XXIX.

Applicare ad vna data retta linea vn parallelogrammo vguale ad vn dato rettilineo, che superi la retta data d'vn parallelogrammo simile ad vn altro dato parallelogrammo.

Sia data la retta linea AB, alla quale si voglia applicare vn parallelogrammo vguale al dato rettilineo C, che superi la retta AB, per quanto è vn parallelogrammo simile al parallelogrammo dato D. Si diuidi AB in due parti vguali, e sopra la metà E B si descriua il parallelogrammo GE simile, e similmente posto al parallelogrammo D. S'aggiunga il parallelogrammo EG, col rettilineo C in modo, che costituiscano vn solo

rettilineo, come il notato H; poi si costruiscia il parallelogrammo MK vguale al rettilineo H; e che sia simile, e similmente posto al parallelogrammo D: farà il parallelogrammo MK simile, e similmente posto al parallelogrammo EG; e perciò l'angolo EFG sarà



vguale all'angolo I. Hor perche il parallelogrammo MK è vguale al rettilineo H, ed il rettilineo H è vguale à i due rettilinei EG, & C giunti insieme; farà il parallelogrammo MK maggiore del simile parallelogrammo EG; per la qual cosa il lato IK, farà maggiore di FG, ed il lato IM farà maggiore di FE. Si continui FG verso N, e si faccia FN vguale ad IK; e si continui il lato FE verso O, e si faccia FO vguale ad IM; dal punto N si tiri la retta NP^h parallela ad FO; e per il punto O si faccia passare la retta SP parallela ad AB, la quale concorrerà con NP in qualche punto P; dal punto A si tiri la retta AS^k parallela ad FO, la quale concorrerà con PS in qualche punto S; si prolunghi AB fino che concorra con NP in qualche punto Q; e si prolunghi GB fino ad R. Perche l'angolo OFN è vguale all'angolo MIK, ed i lati OF, FN sono vguali à i due MI, IK; farà il parallelogrammo ON^l simile, e similmente posto, ed vguale al parallelogrammo MK; dal che i due parallelogrammi ON, EG^m sono frà di loro simili, e similmente posti; hanno l'angolo F comune, e perciò tirato il diametro FP, ⁿ quello passa per il punto B; dal che il parallelogrammo RQ sarà intorno al diametro FP: per la qual cosa sarà ^o simile à tutto il parallelogrammo FOPN, cioè farà ^p simile al pa-

a 20. del 1.
b 28. del 6.
c 45. del 2.

d 35. del 6.

e 22. del 6.

f Scol. alla
20. del 6.
g 3. del 1.

h 32. del 2.

k 32. del 2.

l 4. del 6.


m 22. del 6.

n 26. del 6.

o 24. del 6.
p 22. del 6.

parallelogrammo dato D, farà dunque applicato alla retta AB il parallelogrammo SQ, il quale supera la retta AB, per quanto è il parallelogrammo RQ, simile al parallelogrammo D. Dico che il parallelogrammo SQ è vguale al dato rettilineo C.

I parallelogrammi AO, OB hanno vguali basi, e sono fra le medesime parallele, e perciò sono fra di loro vguali; ma OB, è vguale al complemento BN, farà il piano AO vguale al piano BN; vguualmente se gli aggiunga il piano OQ, ne viene il parallelogrammo SQ vguale allo gnomone OPNGBE. In oltre perche il parallelogrammo ON è vguale al parallelogrammo MK; ed il parallelogrammo MK è vguale à i due rettilinei EG, & C insieme; farà il parallelogrammo ON vguale à i due piani EG, & C, giunti insieme; se ne leui il comune EG; resta il rettilineo C vguale allo gnomone OPNGBE; ma questo gnomone fu dimostrato vguale al parallelogrammo SQ; farà il parallelogrammo SQ vguale al dato rettilineo C, eh'era da farsi, e dimostrarsi.



PROBLEMA X. PROPOSITIONE XXX.

Diuidere vna data retta linea terminata secondo l'estrema, e media proportione.

Sia data la retta terminata AB, la quale si voglia diuidere secondo l'estrema, e media proportione; cioè che tutta alla maggior parte, habbia l'istessa proportione, quale ha la maggior parte al rimanente: Sopra la retta AB si deferua il quadrato AC, e si applichi al lato AD il parallelogrammo EG, vguale al quadrato AC, e che superi la retta AD per vn parallelogrammo simile al medesimo quadrato AC; cioè che superi la retta AD per vna figura quadrata, il lato EF segará la retta AB in qualche punto H. Dico che AB ad AH è come AH ad HB.

Perche il parallelogrammo DF, per costruzione, è vguale al quadrato AC; leuatone il comune rettangolo AE, resta il quadrato AF vguale al rettangolo EB. In



oltre,

oltre, essendo i rettangoli AF, EB frà di loro vguali, e gli angoli ad H retti; i lati intorno a gli angoli vguali ^b sono reciprochi; e perciò EH ad HF sarà come AH ad HB: ma EH è vguale à CB, cioè vguale ad AB; sarà A B ad F H come A H ad H B; E perche il lato F H è vguale al lato A H (stante che AF è quadrato) sarà AB ad AH, come A H ad H B. Per la qual cosa la retta A B è diuisa secondo l'estrema, e media proportion, ch'era da farsi, e dimostrarsi.

b 14. del 6.


S C O L I O.

Volendo diuidere qualunque retta AB secondo l'estrema, e media proportion con modo facile, si operi come si disse nell' 1. proposizione del secondo Libro.

THEOREMA XXI. PROPOSITIONE XXXI.

Ne i triangoli rettangoli, la figura descritta sopra del lato opposto all'angolo retto, è vguale alle figure simili, e similmente descritte sopra i lati, che contengono l'angolo retto.

Sia il triangolo A B C, angolo retto in A, e sopra i lati BC, CA, AB siano descritte figure rettilinee simili, e similmente poste, che siano le notate BD, CH, BG. Dico che la figura BD descritta sopra del lato B C, opposto all'angolo retto, è vguale alle figure CH, BG, descritte sopra i lati AB, AC, che contengono l'angolo retto A. Dall'angolo retto A si faccia cadere la retta AK ^a perpendicolare al lato B C, e



per il Corollario 2. all'8. proposizione di questo, la retta AC è media proportionale frà le due BC, CK; e la retta AB è media proportionale frà le due CB, BK; dalche BC ad AC sarà come AC à CK; e per il Lemma 8. dopo la 18. proposizione di questo, la prima BC alla terza CK, ha duplicata proportion di quella, che ha BC à CA: Ma il rettilineo EC al simile rettilineo CH ^c ha la medesima duplicata proportion, che ha BC ad AC; hauerà BC à CK l'istessa proportion, quale ha il rettilineo EG al rettilineo CH; ed inuertendo CK à CB ^d sarà come il rettilineo CH, al rettilineo CE. Similmente essendo AB media proportionale frà le due CB, BK, hauerà C B à BK duplicata proportion di quella, che ha C B ad A B: ma il rettilineo EC al simile rettilineo BG ^e ha la medesima duplicata proportion di quella, che ha CB à BA, hauerà C B à BK l'istessa proportion, che ha il rettilineo DB al rettilineo BG; ed inuertendo; BK à B C, sarà come il rettilineo B G al rettilineo B D ^f. Si considerino sei

a 12. del 1.

c 20. del 6.

b Corollario del 5.


f 20. del 6.

uguale alla base BC; sarà l'angolo DAC uguale all'angolo BAC, ma l'angolo DAC, per costruzione è retto; l'angolo dunque BAC sarà retto, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA XXII. PROPOSITIONE XXXII.

Se due triangoli, che hanno due lati proporzionali a due lati, siano composti secondo vn angolo talmente, che i lati homologhi siano frà di loro paralleli, e l'angolo, secondo il quale sono composti, sia alterno a gli angoli contenuti da i lati proporzionali; i restanti due lati faranno in vna medesima dirittura, e costituiranno vna sola retta linea.

Siano i due triangoli ABC, DCE, composti secondo l'angolo ACD, il quale sia alterno a gli angoli A, & D; e la proportion di BA ad AC sia come quella di CD a DE; e siano i lati homologhi AB, DC frà di loro paralleli; come ancora i lati homologhi AC, DE siano frà di loro paralleli. Dico che i



lati BC, CE costituiscono vna sola retta linea BE. Perche i lati AB, DC sono paralleli, e sono segati dalla retta AC, l'angolo BAC sarà uguale all'angolo alterno ACD; similmente essendo i lati AC, DE frà di loro paralleli, sarà l'angolo EDC uguale all'angolo alterno ACD; per la qual cosa l'angolo A sarà uguale all'angolo D. In oltre perche gli angoli A, & D sono uguali, e la proportion di BA ad AC, per ipotesi, è come quella di CD a DE; i triangoli ABC, DCE sono equiangoli; e sarà l'angolo ACB uguale all'angolo E, e l'angolo DCE uguale all'angolo B. Hor all'angolo DCE s'aggiunga l'angolo DCA; ed all'angolo B s'aggiunga l'angolo A; sarà tutto l'angolo ECA uguale a i due angoli A, & B, giunti insieme. Se tanto all'angolo ECA, quanto alla somma de i due angoli A, & B, s'aggiunga l'angolo ACB, i due angoli ECA, ACB, saranno uguali alli tre angoli del triangolo ABC: ma i tre angoli del triangolo ABC sono uguali a due angoli retti, i due angoli dunque ECA, ACB sono uguali a due angoli retti, e le rette BC, CE costituiscono la sola retta linea BE, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA XXIII. PROPOSITIONE XXXIII.

Ne i circoli uguali gli angoli a i centri, ouero alle cir-

confe-

c 8. del 1.

a 29. del 1.


b 6. del 6.

c 31. del 1.

d 14. del 1.

conferenze, come ancora i settori, hanno la medesima proporzione, che gli archi, à i quali insistono.

Siano i due circoli v-
guali ABC, EFC , i di cui
centri D , ed H ; e siano
due qualunque angoli a i
centri, come BDC, FHG ,
e due altri alla circonfere-
nza, come BAC, FEG ,
i quali siano opposti à gli
archi BMC, FG . Dico,
che l'angolo BDC all'



angolo FHG ; ouero l'angolo BAC all'angolo FEG ; come ancora il set-
tore $DBMC$ al settore FHG , è come l'arco BMC all'arco FG .

a 23. del 1.

Sopra la retta HG , nel punto H , si faccia l'angolo $G H K$ vguale all'
angolo $G H F$; e sopra la retta $H K$ si costituisca l'angolo $K H L$, vguale
all'angolo $F H G$, ouero $G H K$; e col medesimo ordine se ne costituiscano
quanti altri se ne vogliano. Similmenre nel circolo ABC , sopra la retta
 CD , nel punto D , si costituisca l'angolo CDI , vguale all'angolo BDC ;
e se ne costituiscano col medesimo ordine, quanti altri si vogliano, ogn'
vno vguale all'angolo BDC ; faranno gli archi FG, GK, KL , frà di loro
vguali; e tante volte l'angolo FHL sarà misurato dall'angolo FHG , per
quante volte l'arco FL è misurato dall'arco FG : per la qual cosa l'ango-
la FHL è moltiplice dell'angolo FHG , come l'arco FL è moltiplice dell'
arco FG . Nell'istesso modo si dimostrerà, che l'angolo BDI è multipli-
ce dell'angolo BDC , come l'arco BI è moltiplice dell'arco BC . Se dun-
que l'angolo BDI è vguale all'angolo FHL , sarà l'arco BI vguale all'

b 21. del 1.

c 26. del 3.

arco FL ; se l'angolo BDI è maggiore dell'angolo FHL , per il Corollario
alla 26. proposizione del terzo Libro, l'arco BI sarà maggiore dell'
arco FL ; e se l'angolo BDI è minore dell'angolo FHL , l'arco BI sarà
minore dell'arco FL . Si considerino quattro quantità; cioè l'angolo BDC
prima, l'angolo FHG seconda, la terza sia l'arco BC , e la quarta l'arco
 FG . Gli vguali moltiplici della prima, e terza, sono l'angolo BDI , e l'ar-
co BI ; e gli vguali moltiplici della seconda, e quarta sono l'angolo FHL ,
e l'arco FL : perche l'angolo BDI , ch'è moltiplice della prima, se è mag-
giore dell'angolo FHL , ch'è moltiplice della seconda, ancora l'arco BI ,
ch'è moltiplice della terza, è maggiore dell'arco FL , ch'è moltiplice della
quarta; e se l'angolo BDI è minore, è vguale all'angolo FHL , anco-
ra l'arco BI è minore, è vguale all'arco FL , e per la sesta definizione del
quinto Libro, la prima alla seconda hauerà l'istessa proporzione, che la
terza alla quarta; cioè l'angolo BDC all'angolo FHG sarà, come l'arco
 BC all'arco FG . In oltre perche l'angolo BDC al centro è il doppio
dell'angolo BAC alla circonfenza; e l'angolo FHG al centro è il dop-
pio dell'angolo FEG alla circonfenza; faranno gli angoli BDC, FHG ,
vguali moltiplici degli angoli BAC, FEG ; e perciò l'angolo BDC all'

ango-

angolo FHG^d è come l'angolo BAC all'angolo FEG; ma si è dimostrato, che l'angolo BDC all'angolo FHG è come l'arco BC all'arco FG; farà l'angolo BAC all'angolo FEG e come l'arco BC all'arco FG. Per la qual cosa ne i circoli vguali gli angoli à i centri, ouero alle circonferenze sono come gli archi, à i quali insistono.

Finalmente dico, che il settore BDC al settore FHG, è come l'arco BC all'arco FG. Si tirino le rette BC, CI. Perche gli archi BC, CI sono frà di loro vguali, le rette ancora BC, CI^f sono frà di loro vguali. Proueremo prima, che effendo gli archi BC, CI frà di loro vguali, che i settori ancora DBC, CDI sono frà di loro vguali. Ne gli archi BC, CI si prendano due qualunque punti M, & N, e si tirino le rette BM, MC, CN, NI. Perche gli archi BMC, CNI sono frà di loro vguali, i rimanenti di tutta la circonferenza, cioè gli archi BAIC, CBAI sono frà di loro vguali: ma gli archi vguali^g si oppongono ad angoli vguali; gli angoli dunque BMC, CNI sono frà di loro vguali; dalche le portioni BMC CNE^h sono frà di loro simili: ma sono poste sopra le rette vguali BC, CI; perciò K sono frà di loro vguali. In oltre si considerino i triangoli DBC, DCI. Perche i due lati BD, DC sono vguali à i due lati CD, DI, e l'angolo BDC è vguale all'angolo CDI; farà il triangolo DBC i vguale al triangolo DCI; à i quali s'aggiungano le vguali portioni BMC, CNI, ne viene il settore DBMC vguale al settore DCNI. Nell'istesso modo si prouerà che i settori HFG, HGK, HKL sono frà di loro vguali: e se l'arco BCI è vguale all'arco FKL, nell'istesso modo si dimostrerà, che il settore BDIC è vguale al settore FHLG. D'onde facilmente si può dimostrare, che se l'arco BCI è maggiore, ò minore dell'arco FGL; ancora il settore BDIC farà maggiore, ò minore del settore FHLG. Hor perche tanti sono gli archi vguali FG, GK, KL, per quanti sono gli vguali settori HFG, HGK, HKL; farà il settore FHLG multiplice del settore HFG, come l'arco FL è multiplice dell'arco FG. E per l'istessa ragione sarà il settore BDIC multiplice del settore BDC, come l'arco BCI è multiplice dell'arco BC. Si considerino quattro quantità, la prima sia il settore DBC, la seconda il settore HFG, la terza l'arco BC, e la quarta l'arco FG. Gli vguali multipli della prima, e terza, sono il settore BDIC, e l'arco BI; gli vguali multipli della seconda, e quarta sono il settore FHL, e l'arco FL; e perche se il settore BDI è vguale al settore FHL ancora l'arco BI è vguale all'arco FL; e se il settore BDI è maggiore, ò minore del settore FHL, ancora l'arco BI è maggiore, ò minore dell'arco FL, per la sesta definizione del quinto Libro, farà la prima, cioè il settore DBC alla seconda, ch'è il settore HFG, come la terza, cioè l'arco BC, alla quarta, ch'è l'arco FG, come fu proposto dimostrare.

COROLLARIO I.

Effendo l'arco BC all'arco FG, come l'angolo BDC all'angolo FHG; cioè come l'angolo BAC all'angolo FEG; farà manifesto, che il settore DBC al settore HFG è come

l'ango-

d 15. del 5.

e 11. del 5.

f 29. del 3.

g 27. del 3.

h 10. defin. del 3.

K 24. del 3.


l 4. del 1.

l'angolo BDC all'angolo FHG; ed è ancora come l'angolo BAC all'angolo FEG.

COROLLARIO II.

Dall'antecedente propof. è parimente manifefto, che l'angolo al centro à quattro angoli retti è come l'arco oppofto all'angolo nel centro à tutta la circonferenza del circolo; ed al contrario, i quattro angoli retti hanno l'ifteffa proporzionone all'angolo nel centro, quale hà tutta la circonferenza all'arco, al quale infifte l'angolo nel centro.

Nel circolo ABCD, il di cui centro E, & i diametri AC, BD fi fighino ad angoli retti in E; faranno gli archi AB, BC, CD, DA, 2 frà di loro eguali. Si prenda nell'arco CD qualunque punto F, e fi tiri la retta FE. Per l'antecedente propofitione l'angolo CED all'angolo FED farà come l'arco CD all'arco FD; e perche i quattro angoli retti DEA, AEB, BEC, CED sono multipli dell'angolo retto CED; come i quattro archi DA, AB, BC, CD sono multipli dell'arco CD; per il Corollario alla 24. propofitione del 5. libro, li quattro angoli retti DEA, AEB, BEC, CED, all'angolo retto CED, hanno l'ifteffa proporzionone, che i quattro archi DA, AB, BC, CD, cioè che tutta la circonferenza ABCD all'arco CD: ma l'angolo CED all'angolo FED è come l'arco CD all'arco FD, per l'egualità, i quattro angoli retti DEA, AEB, BEC, CED all'angolo FED, b sono come tutta la circonferenza ABCD all'arco FD; ed inuertendo, l'angolo al centro FED è à i quattro angoli retti DEA, AEB, BEC, CED, sono come l'arco FD à tutta la circonferenza, come fi diffe.



S C O L I O.


Non farà inutile fpiagare qui col Clauio il fequente Theorema.

I.

Se da due qualunque circoli fi taglino portioni fimili; la proporzionone dell'arco à tutta la circonferenza del fuo circolo, è come quella dell'altro arco à tutta la circonferenza del fuo circolo.

Ne i circoli ABCD, EFGH, i di cui centri I, & K, fiano tagliate le portioni fimili BAD, FEH. Dico che l'arco BAD à tutta la circonferenza

za $ABCD$, è come l'arco FEH à tutta la circonferenza $EFGH$. Da i centri I , & K si tirino le rette IB , ID , KF , KH . Perche le porzioni BAD , FEH sono simili, perciò gli angoli BAD , FEH , ^a alle circonferenze sono frà di loro uguali; & i loro dupli, cioè gli angoli BID , FKH , à i centri, sono frà di loro uguali; e tal proportione hauerà l'angolo I à quattro angoli retti, ^b quale hà l'angolo K à quattro angoli retti: ma, per l'antecedente Corollario, l'angolo I à quattro angoli retti è come l'arco BCD à tutta la circonferenza $ABCD$; e l'angolo K à quattro retti è come l'arco FGH à tutta la circonferenza $EFGH$; sarà l'arco BCD à tutta la circonferenza $ABCD$, ^c come l'arco FGH à tutta la circonferenza $EFGH$; ed inuertendo, tutta la circonferenza $ABCD$ all'arco BCD , sarà come tutta la circonferenza $EFGH$ ^d all'arco FGH ; e per la conuerfione della proportionne, tutta la circonferenza $ABCD$ all'arco BAD ^e è come tutta la circonferenza $EFGH$ all'arco FEH ; ed inuertendo, l'arco BAD à tutta la circonferenza $ABCD$ ^f è come l'arco FEH à tutta la circonferenza $EFGH$, ch'era da dimostrarfi.



a 10^a defin.
del 3.

b Coroll.al.
la 7. del 5.

c 11. del 5.

d Corollalla 4. del 5.
e Corollalla 19. del 5.
f Corollalla 4. del 5.

COROLLARIO.

Sarà manifesto dal quel, che s'è detto, che gli archi delle simili porzioni sono come le circonferenze de'loro circoli, e sono ancora come i restanti archi.

Perche essendosi dimostrato, che l'arco BAD à tutta la circonferenza $ABCD$ è come l'arco FEH à tutta la circonferenza $EFGH$; sarà, permutando, l'arco BAD all'arco FEH ^a come la circonferenza $ABCD$ alla circonferenza $EFGH$: ma tutta la circonferenza $ABCD$ à tutta la circonferenza $EFGH$, per quel che s'è dimostrato, è come l'arco BCD all'arco FGH ; sarà l'arco BAD all'arco FEH ^b come l'arco BCD all'arco FGH , come si disse.

g 16. del 5.

h 11. del 5.

Per facilitare le cose che seguono pongo qui li seguenti due Theoremi.

I I.

Se sarà qualunque triangolo ABC , e sarà fatto l'angolo DAC vguale all'angolo B ; sarà il triangolo ABD simile al triangolo ACD , oltre à ciò la retta AD farà media propor-

P p

tionale

tionale frà le rette BD, DC, e la proportionione di BA ad AC sarà come quella di BD à DA, ouero come quella di AD ad AC; e se AD è media proportionale frà le rette BD, DC, l'angolo DAC sarà vguale all'angolo B.

Supposto prima, che l'angolo DAC sia vguale all'angolo B. Dico che i triangoli ABD, ACD sono frà di loro simili; che la retta AD è media proportionale frà le rette BD, DC; e che BA ad AC è come BD à DA. Perche l'angolo CAD



è vguale all'angolo B, vguualmente s'aggiunga l'angolo BAC, i due angoli CAB, CBA^a saranno vguali à tutto l'angolo BAD. Nel triangolo ABC, il lato BC è continuato in D, dal che l'angolo esterno DCA^b è vguale à i due angoli CBA, CAB interni, ed opposti; ma i due angoli CBA, CAB, insieme giunti, per quel che s'è dimostrato, sono vguali all'angolo BAD; sarà l'angolo DCA^c vguale all'angolo BAD; l'angolo D è commune ad ambidue i triangoli ABD, ACD; saranno i due triangoli ABD, ACD equiangoli; per la qual cosa^d haueranno i lati intorno à gli angoli vguali proportionali, e perciò sono frà di loro simili, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

Perche dunque i triangoli ABD, ACD sono simili, ed hanno l'angolo D commune, sarà BD à DA^e come AD à DC, e la retta AD sarà media proportionale frà le due BD, DC, ch'era da dimostrarsi nel secondo luogo.

In oltre, essendo i triangoli ABD, ACD frà di loro simili, e l'angolo CAD è vguale all'angolo B; sarà AB à BD^f come AC ad AD; e permutando, AB ad AC^g sarà come BD à DA, ouero come AD à DC, ch'era da dimostrarsi.

Di nuouo, supposto che AD sia media proportionale frà le due BD, DC. Dico che l'angolo CAD è vguale all'angolo B. Perche AD è media proportionale frà le due BD, DC, sarà BD à DA come AD à DC; si che i triangoli ABD, ACD hanno i lati proportionali intorno all'angolo commune D, e perciò^h sono equiangoli, e gli angoli vguali saranno DCA, BAD, che sono opposti à i lati homologhi AD, DB; e similmente gli angoli CAD, DBA, che sono opposti à i lati homologhi CD, DA sono frà di loro vguali, ch'era da dimostrarsi.

COROLLARIO.

Da quel che s'è detto è manifesto, che douendosi inclinare vna retta, come AD, che sottenda l'angolo esterno ACD, e che AD sia media proportionale frà le rette BD, DC, basta à fare l'angolo CAD vguale all'angolo B.


In qualunque triangolo ABC, del quale l'angolo BAC

fia

sia diuiso in due parti vguali con la retta AD, ed in punto A sia fatto l'angolo DAE vguale all'angolo ADE; e prolungata la retta AE concorra con BC in qualche punto E. Dico che la retta DE, ouero AE, farà media proportionale frà le due BE, EC; ed il triangolo ACE sarà simile al triangolo BAE.

Nel triangolo ABD il lato BD è continuato verso E; sarà l'angolo ADE ^a esterno vguale à i due angoli DAB, DBA interni, ed opposti: ma l'angolo ADE ^b è vguale all'angolo DAE; sarà l'angolo DAE v-

guale à i due angoli DAB, DBA; ma per ipotesi, l'angolo DAC è vguale all'angolo DAB; sarà il rimanente angolo CAE vguale all'angolo B; e per l'antecedente Theorema, sarà AE media proportionale frà le due BE, EC; ed il triangolo ACE sarà simile al triangolo BAE, ch'era da dimostrarsi.



a 31. del 1.


b 5. del 1.

Di Pappo propof. 119, lib. 7.

I V.

Se sarà qualche triangolo ABC, del quale continuato il lato BC verso D in modo, che BD à DC sia come il quadrato di BA al quadrato di AC, tirata la retta AD. Dico che il rettangolo BDC è vguale al quadrato di AD.

Dal punto C si tiri la retta CE ^a parallela ad AB; sarà il triangolo DEC ^b equiangolo al triangolo ABD; e sarà BD ad AB ^c come DC, à CE; e permutando, BD à DC ^d sarà come BA à CE; e prese le rette AB, EC come basi di due rettangoli, e l'altezza comune sia AB; sarà



il quadrato di AB al rettangolo contenuto dalle due AB, CE ^e come la base AB alla base CE; cioè ^f come BD à DC; ma BD à DC, per ipotesi, è come il quadrato di AB al quadrato di AC; sarà il quadrato di AB al rettangolo contenuto dalle due AB, CE, come il medesimo quadrato di AB ^g al quadrato di AC; e perciò il quadrato di AC ^h sarà vguale al rettangolo contenuto dalle due AB, CE; donde le tre rette BA, AC, CE ^k sono proporzionali; e sarà AB ad AC come AC à CE. Si considerino i triangoli ABC, ACE; essendo i lati AB, CE, per costruzione, frà di loro paralleli, gli angoli alterni BAC, ECA ^l sono frà di loro vguali. Si disse che BA ad AC è come AC à CE; i lati dunque intorno à gli angoli vguali sono proporzionali; e perciò i triangoli ABC, EAC ^m

a 31. del 1.
b Corollalla
4. del 6.c 4. del 6.
d 16. del 5.e 1. del 6.
f 11. del 5.

g 11. del 5.

h 9. del 5.

k 17. del 6.

l 19. del 1.

m 6. del 6.


sono equiangoli; e sarà l'angolo CAE uguale all'angolo B ; e per l'antecedente theorema, la retta AD sarà media proportionale frà le due BD, DC ; ed il rettangolo contenuto dalle due BD, DC sarà uguale al quadrato di AD , che tra da dimostrarfi.

Il seguente theorema è la conuersa all'antecedente, la quale dimostreremo con Pietro Herigonio nel seguente modo.

V.

Se il rettangolo contenuto dalle due BD, DC , è uguale al quadrato di AD ; sarà BD à DC , come il quadrato di AB al quadrato di AC .

Perche il rettangolo contenuto dalle due BD, DC è uguale al quadrato di AD ; sarà AD media proportionale frà le due BD, DC ; e per il secondo degli antecedenti theoremi, l'angolo DAC sarà uguale all'angolo B ; il triangolo ACD sarà simile à tutto il triangolo ABD ; e la proportion di BA ad AC sarà come quella di BD à DA ; ouero di AD à D C. Hor essendo AD media proportionale frà le due BD, DC , bauerà BD à DC duplicata proportion di quella, che hà BD à DA ; ma BD à DA è come BA ad AC , bauerà BD à DC duplicata proportion, che BA ad AC . E perche il quadrato di BA al quadrato di AC hà la medesima duplicata proportion, che BA ad AC ; sarà dunque BD à DC come il quadrato di BA al quadrato di AC , come fu proposto dimostrare.



a 17. del 6.

b 4. del 6.
e 11. del 5.
e 8. Lemma
dopo la 18.
prop. del 6.
f 13. del 5.
g 10. del 6.

Dimostrà Pietro Herigonio il seguente Theorema di Pappo propo^s. 154. del lib^{ro} 7. nel modo, che segue.


V I.

Se da qualche punto preso fuori del circolo sono tirate più rette linee, delle quali vna tocchi il circolo, e le altre lo seghino; e dal contatto cada vna retta perpendicolare à quel diametro, che continuato passi per il punto preso; la proportion di tutta la segante alla parte esterna, sarà come le parti interposte frà la perpendicolare, e la circonferenza di esso circolo.

Sia il circolo ABC , e da qualche punto D , fuori del circolo, siano tirate le rette DB, DF, DA ; cioè che DB tocchi il circolo in qualche punto B , e le rette

$DF,$

DF, DA lo fegbino; e paffi la retta DA per il centro del circolo; dal con-
tato B cada la retta BE, perpendicolare al diametro AC, la quale fegbi la retta
DF in qualche punto
G. Dico che AD à DC
è come AE ad EC; e
che FD à DK è come
FG à GK. Si prolun-
ghi BE fino ad H; fa-
rà $\square$ BE uguale ad
EH, ed il rettangolo
contenuto dalle due BE,
EH farà uguale al
quadrato di BE. Si ti-
rino le rette BA, BC.
Perche la retta DB
tocca il circolo ABC,



farà il rettangolo contenuto dalle due AD, DC $\square$ uguale al quadrato di DB; e
per l'antecedente Teorema, AD à DC è come il quadrato di AB al quadra-
to di BC. In oltre effendo l'angolo ABC nel mezzo circolo retto, e dall'an-
golo retto B cade la retta BE perpendicolare ad AC, la retta BE divide il
triangolo ABC in due triangoli ABE, BEC simili fra di loro, e simili à
tutto il triangolo ABC; e per il primo Corollario all'ottava propofitione di que-
flo, farà BE media proportionale fra le due AE, EC; e perciò la proportion
della prima AE alla terza EC è duplicata di quella, che hà la prima AE alla
feconda EB; mà il quadrato di AE al quadrato di EB $\square$ hà la medefima du-
plicata proportion, che hà AE ad EB; bauerà il quadrato di AE al quadrato
di EB l'ifteffa proportion, che hà AE ad EC. Di più, effendo i triangoli ABC,
AEB fra di loro simili, farà AB à BC, come AE ad EB; ed il quadrato di AB
al quadrato di BC $\square$ farà come il quadrato di AE al quadrato di EB; fu dimo-
ftrato il quadrato di AB al quadrato di BC effere come AD à DC; ed il qua-
drato di AE al quadrato di EB, come AE ad EC; farà dunque $\square$ AD à DC
come AE ad EC; ch'era da dimoftrarfi nel primo luogo.

Di nuouo dico che FD à DK è come FG à GK. Sopra la retta FK fi de-
fcriua il mezzo circolo FMK; nel punto G¹ fi erigga la retta GM, perpendi-
colare alla retta FK; e fi tirila retta DM. La retta HB è diuifa in due
parti uguali in E, ed in due inguali in G, il rettangolo contenuto dalle due
HG, GB, col quadrato di EG, $\square$ è uguale al quadrato di EB; ugualmente,
fi aggiunga il quadrato di ED; farà il rettangolo delle due HG, GB, con li
due quadrati GE, ED, cioè $\square$ col quadrato di GD, uguali à i quadrati de i
due lati BE, ED, cioè $\square$ uguali al quadrato di BD; mà il quadrato di BD
è uguale al rettangolo contenuto dalle due AD, DC, cioè al rettangolo delle
due FD, DK; farà il rettangolo contenuto dalle due HG, GB, col quadrato
di GD, uguale al rettangolo contenuto dalle due FD, DK; e perche il rettan-
golo delle due HG, GB $\square$ è uguale al rettangolo contenuto dalle due FG, GK;
ed il rettangolo delle due FG, GK $\square$ è uguale al quadrato di GM (fante che
GM è media proportionale fra le due FG, GK) faranno i quadrati de i due
lati MG, GD, cioè $\square$ il quadrato di MD, uguale al rettangolo contenuto dal-

a 3. del 3.

b 36. del 3.

c 31. del 3.

d 8. del 6.

e Lemma 8.
dopo la 18.
prop. del 6.
f 10. del 6.

g 4. del 6.

h 22. del 6.

K 11. del 5.

l 17. del 1.

m 5. del 1.

n 47. del 1.

o 47. del 1.

p 16. del 3.

q Corol. alla

36. del 3.

r 35. del 3.

t 17. del 6.

u 47. del 1.


a 97. del 1.

le due FD, DK : per la qual cosa la retta DM $\propto$ tocca il circolo nel punto M : ma per costruzione, dal contatto M cade la retta MG perpendicolare al diametro FK , per quel che si è dimostrato nella prima parte, la proporzione di FD à DK è come quella di FG à GK , come fu proposto dimostrare.

V I I.

Se sarà qualunque triangolo ABC , del quale sia cōtinuato il lato BC verso E , e dal punto A sia inclinata la retta AE in modo, che AE sia media proportionale frà le due BE, EC , e fatto centro in E , coll'interuallo EA , si descriva il circolo DAF ; preso nella circonferenza DAF qualunque punto F , dal quale à i punti B, D, C , si tirino le rette FB, FD, FC . Dico che l'angolo BFD è vguale all'angolo DFC .

Si tiri la retta EF ; perche le rette EA, EF sono frà di loro vguali, e la retta EA , per ipotesi, è media proportionale frà le due BE, EC ; sarà la retta EF media proportionale fra le due BE, EC , e per il secondo de gli antecedenti Theoremi, l'angolo EFC sarà vguale all'angolo FBC . Nel triangolo FBD , il lato BD è continuato verso E , e perciò



a 91. del 1.

b 5. del 1.

l'angolo EDF esterno è vguale à i due angoli DFB, DBF Interni, ed opposti: ma l'angolo EDF è vguale all'angolo EFD (stante che le rette EF, ED sono frà di loro vguali) sarà l'angolo EFD vguale à i due angoli DBF, DFB . Fù dimostrato l'angolo EFC vguale all'angolo DBF ; sarà il rimanente angolo CFD vguale al rimanente angolo DFB . E perche il punto F è preso ad arbitrio, perciò da qualunque altro punto preso nella circonferenza DAF , tirate rette linee à i punti B, D, C sempre faranno angoli vguali nel punto F ; ch'era da dimostrarsi.

COROLLARIO.

Da quel, che s'è detto, è manifesto, che se nella circonferenza DAF sia preso qualunque punto F , dal quale siano tirate à i punti B, D, C , le rette FB, FD, FC , sempre la proportion di BF ad FC farà come quella di BD à DC ; e questo perche l'angolo BFC sarà sempre diuiso dalla retta FD in due parti vguali.


Di

Di Tolomeo nel libro 1. del suo *Almagesto*.

V I I I.

Se dentro d'un circolo sia descritto qualunque quadrilatero, i rettangoli contenuti da i lati opposti, giunti insieme, sono uguali al rettangolo contenuto dalle diagonali di esso quadrilatero.

Nel circolo $ABCD$ sia iscritto qualunque quadrilatero $ABCD$, e le diagonali siano le rette AC , BD . Dico che il rettangolo contenuto da i due lati BC , AD , col rettangolo contenuto da i due lati AB , DC , è uguale al rettangolo contenuto dalle diagonali AC , BD . Nel punto A , sopra la retta AB , si faccia l'angolo BAE , ^a uguale all'angolo CAD ; e si continui AE fino che segghi il lato BD in qualche punto E . Si considerino i triangoli AEB , ACD , de' quali l'angolo BAE , per costruzione, è uguale all'angolo CAD ; e gli angoli ABE , ACD ^b nella medesima porzione, sono fra di loro uguali; e perciò il rimanente angolo ADC ^c è uguale al rimanente angolo AEB , ed i triangoli AEB , ADC sono equiangoli. Di nuovo, essendo l'angolo EAB uguale all'angolo CAD , s'aggiunga all'uno, ed all'altro il comune angolo EAC , ne viene tutto l'angolo BAC uguale all'angolo EAD : ma gli angoli ADE , ACB , ^d nella medesima porzione, sono fra di loro uguali; sarà il terzo angolo AED ^e uguale al rimanente angolo ABC , ed il triangolo AED sarà equiangolo al triangolo ABC ; e la proporzione di AD , a DE ^f sarà come quella di AC a CB ; dalche il rettangolo delle estreme AD , BC ^g è uguale al rettangolo contenuto dalle medie AC , ED . Similmente, essendosi dimostrato il triangolo AEB equiangolo al triangolo ACD , la proporzione di AB a BE ^h sarà come quella di AC a CD ; ed il rettangolo contenuto dalle estreme AB , DC , ^k sarà uguale al rettangolo contenuto dalle medie BE , AC : ma si è dimostrato, che il rettangolo contenuto dalle due ED , AC , è uguale al rettangolo delle due AB , BC ; saranno i rettangoli, cioè uno contenuto dalle due AD , BC , e l'altro contenuto dalle due AB , DC , insieme, giunti, uguali a i due rettangoli, cioè uno contenuto dalle due BE , AC , e l'altro contenuto dalle due ED , AC ; ma i rettangoli contenuti da AC , ED , e dalle due AC , EB , ^l sono uguali a tutto il rettangolo contenuto dalle due AC , BD ; i rettangoli dunque contenuti da i lati opposti, cioè il rettangolo contenuto da i due lati AD , BC , ed il rettangolo contenuto da i lati AB , DC , giunti insieme, sono uguali al rettangolo contenuto dalle diagonali AC , BD , come fu proposto dimostrare.



a 23. del 1.

b 27. del 3.

c 32. del 1.

d 21. del 3.

e 32. del 1.

f 4. del 6.

g 16. del 6.

h 4. del 6.

k 16. del 6.

l 1. del 2.

Fine del Sesto Elemento.

EVCLIDE RESTITVTO

D A

VITALE GIORDANI

ELEMENTO SETTIMO.



DEFINITIONI.

I.

L'vnità è quella, secondo la quale ciascheduna delle cose, che sono, si dice vna, ouero vno.

I I.

Il numero è moltitudine composta di vnità.



ACCIOCHE si faccia distinzione dal proferire qualche cosa, ch'è considerata sola, e separata dall'altre, al proferirne più insieme; è uso commune, quella, la quale è considerata sola, esprimere con questa voce, Vna, ouero Vno; come quando si proferisce vn huomo, vna naue, vna linea &c. Hor questa particola Vna, ouero Vno (cui che s'esprime la cosa nominata esser sola) è quella, ch'Euclide chiama, vnità, la quale si segna con questa nota. 1. si che in luogo di notare vn huomo, vna pietra, vna superficie &c. si esporrà 1. huomo, 1. pietra, 1. superficie &c. E notifsche l'vnità, nella quantità discreta, è indiuisibile, come è indiuisibile il punto nella quantità continua; con questa differenza, che l'vnità è principio della quantità discreta, ed il punto non è principio della quantità continua, ma termine della quantità continua: cioè la quantità discreta comincia con l'vnità, e la quantità continua comincia dal punto.

Le cose poi, che sono più d'vna, per proferirle con voci distinte da quelle, che sono considerate sole, volgarmente si dicono essere molte; e questa pluralità, o composto di più vnità, si chiama Numero. Notisi però, che questa voce Numero è nome generico à tutte le moltitudini di qual si sia grandezza, si che tanto se la moltitudine sarà composta di due vnità, quanto s'è composta di tre vnità, quanto s'è composta di quattro, o più vnità, sempre quella moltitu-

dine si chiama numero : è ben vero che , se quella moltitudine è composta di due sole unità , s'esprime con questa voce numero due , e si segna con la seguente nota 2. se sarà composta di tre unità , si dice numero tre , e si nota col seguente carattere 3. s'è composta di quattro unità si dice numero quattro , e si nota 4. s'è di cinque unità , si dice numero cinque , e si nota 5 ; e con quest'ordine il numero sei si nota 6 ; il numero sette si nota 7 ; il numero otto si nota 8 ; e s'è composta di nove unità si dice numero nove , e si nota 9. Questi esposti numeri , come anco l'unità , e la nota 0 (che si chiama zero , la qual voce significa nulla) cioè 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. si chiamano *Digit*i , co' quali si compongono gli altri numeri , come i notati 10. 11. 12. &c. 20. 21. 22. 23. &c. 30. 31. 32. &c.

Perche dunque s'è detto che il numero è una moltitudine composta di unità , e l'unità è indivisibile , perciò la minima parte di qualunque numero sarà l'unità : per la qual cosa il numero hanerà tante minime parti , per quante sono le unità , che lo compongono . Per esempio il numero 7 , il quale è composto di sette unità , si divide in sette minime parti , e ciascheduna si dice essere la settima parte di esso numero ; similmente il numero 60 , ch'è composto di sessanta unità , si divide in sessanta parti minime , e ciascheduna di quelle si dice essere la sessantesima parte di esso numero : ed il simile s'intende di tutti gli altri numeri.

Ogni numero dunque si risolve nelle sue unità , e l'unità misura tante volte quel numero , per quante sono l'unità , che lo compongono : dal che l'unità è misura comune di tutti i numeri , e per conseguenza tutti i numeri sono frà di loro commensurabili ; stante che le quantità si dicono commensurabili , quando hanno una comune misura , cioè quando l'una è l'altra è misurata giustamente da una terza quantità , che si chiama comune misura , come a suo luogo più chiaramente si spiegherà .

Ogni quantità , sì continua , come discreta , può essere considerata come unità , la quale è sempre indivisibile . Per esempio , la linea B considerata come una sola , per quel che s'è detto , sarà denominata dall'unità : e benchè l'unità sia indivisibile , non è per questo , che la linea B , per essere denominata dall'unità , cioè considerata come una , debba essere indivisibile , stante che non la linea B è unità , mà ben si la linea B è quella cosa , che chiamiamo una ; e perciò la linea B come quantità continua è divisibile , e l'unità è sempre indivisibile . Si che dividendo si la linea B , non per questo si divide l'unità ; mà si divide quella cosa , che chiamiamo una . E per maggior chiarezza , siano espresse le linee A , B , frà di loro ineguali ; perche la linea A è una sola , perciò sarà denominata dall'unità .

E similmente essendo la linea B una sola , sarà anco denominata dall'unità ; si pongano insieme queste due unità , ne viene il numero 2. che denota le linee A , & B in moltitudine essere due . Donde è manifesto , che nella quantità discreta non s'attende all'ugualità , ò irregualità delle cose , che si numerano , mà alla moltitudine di esse ; e perciò non si deve dire , che una unità è maggiore , ò minore dell'altra ; mà ben si le cose che si dicono una , ouero uno , possono essere uguali , e possono ancora essere ineguali . Dal che la cosa la quale è chiamata una , non è unità , mà è denomi-

nata dall'unità; cioè è considerata come una sola, e separata dall'altre. Similmente s'intenda divisa la linea AB in quante si voglia parti AC, CD, DB. Perchè AC è una sola parte, perciò sarà denominata dall'unità; e per Pistefsa ragione CD sarà denominata dall'unità, come



ancora DB. E considerando AD come una sola linea, sarà AD considerata come unità. Parimente la linea CB, considerata come una, sarà denominata dall'unità, e Pistefso s'intende di tutta la linea AB. Hor se ciascuna delle linee AC, CD, DB, AD, CB, AB, è considerata come una, cioè come unità; poste insieme queste unità compongono il numero 6, che denota il numero delle linee, che si contano in AB, essere composto di sei unità, senza che s'abbia riguardo all'ineguaglianza delle dette linee; ma si ha solo considerazione alla di loro moltitudine. Quindi è (come sopra si disse) che la cosa, considerata come unità, s'è indivisibile per sua natura, si divide in tutte le sue parti, e l'unità resta sempre intatta, e libera da qualunque divisione.

In oltre se le parti AC, CD, DB sono fra di loro uguali, sarà AC una terza parte di tutta la linea AB, che si nota $\frac{1}{3}$: ma la parte AC, si considerata come unità, ne segue $\frac{1}{3}$ ancora poter si considerare come unità; il medesimo s'intende se AC fosse la quarta, o quinta, o altra parte di AB. Di più perchè AC è la terza parte di AB, e CD è ancora la terza parte di AB; sarà AD i due terzi di AB, che si notano $\frac{2}{3}$: ma AD si considerata come unità, li $\frac{2}{3}$ dunque si possono considerare come unità; ed il medesimo s'intende di tutti gli altri rotti, avvertendo sempre, che quando si dice $\frac{1}{3}$, o $\frac{1}{4}$, o vero $\frac{1}{5}$ &c. non s'intende essere la terza, o quarta, o quinta parte dell'unità, ma ben se è la terza, o quarta, o quinta parte di quella cosa, che consideriamo essere una sola.

Finalmente sia esposto qualunque numero, come per essempio 10, il quale è composto di dieci unità. Perchè esso numero 10 ci rappresenta essere una decina, per questa voce Vna lo possiamo considerare come unità. Hor essendo il numero 10 composto di dieci unità, non sarà esso numero 10 l'unità; ma ben se esso numero 10 sarà quella cosa, che chiamiamo una. Si che diviso il numero 10 nelle sue unità, o in altre parti possibili, non sarà divisa l'unità, ma sarà divisa quella cosa, che chiamiamo una. Ed il medesimo si deve intendere di tutti gli altri numeri considerati come unità.

Si conchiude dunque, che l'unità non è numero, ma principio, e fondamento del numero; stante che, essendosi definito il numero essere una moltitudine composta di unità, è necessario che siano più unità insieme acciò che formino il numero. Di più, che la cosa la quale chiamiamo una, o vero uno, non è unità; ma l'unità è quella singolarità, secondo la quale nominiamo quella cosa da per sé essere una sola; e perciò quella cosa, che si dice una, o vero uno, può essere divisibile nelle sue parti; e l'unità, secondo la quale ciascheduna delle cose, che si dicono uno, o una, è sempre indivisibile: oltre à ciò ogni quantità, si continua, come discreta, può essere considerata come unità; e questo non solo accade negli interi, ma ancora ne' rotti; e finalmente tutti i numeri sono commensurabili, stante che tutti sono misurati dall'unità.

I I I.

Il numero minore è parte del maggiore , quando misura il maggiore giustamente .

Il numero minore si dice misurare il numero maggiore giustamente , quando detratto il minore dal maggiore , e da quel che resta , se ne detrae il medesimo numero minore , e dall'auanzo se ne leua di nuouo il minore , e con questo ordine sempre da ogn'auanzo se ne detrae il minore , finalmente nell'ultima detrazione non resta cos'alcuna ; come per essemplio : Sia il numero minore 3 , ed il maggiore sia 12 , sottraendo dal maggiore 12 il minore 3 , resta il numero 9 ; da questo se ne detragga il minore 3 , resta 6 ; e da questo se ne leui il minore 3 , resta 3 ; e finalmente leuato da questo auanzo il minore 3 , non resta cos'alcuna ; in tal caso il numero minore 3 si dice misurare giustamente il numero maggiore 12 : ed il simile s'intende di tutti gli altri numeri . Quando poi dalla continua sottrattione nel modo , che antecedentemente s'è fatto , resta qualche numero composto di minor moltitudine d'unità di quelle , che sono nel numero minore , all' hora il numero minore non si può sottrarre da quell'auanzo ; ed in tal caso il numero minore non si dice misurare giustamente il maggiore ; come se il numero minore fosse 5 , ed il maggiore 13 , detratto dal numero maggiore 13 il minore 5 , resta 8 ; e detratto da questo auanzo il minore 5 , resta 3 : e perchè da questo auanzo non se ne può sottrarre il minore 5 , perciò il numero 5 non misura giustamente il maggiore 13 : e l'istesso s'intende de gli altri numeri . Hor Euclide in questa definizione spiega , che all' hora il numero minore si dice esser parte del numero maggiore , quando il minore misura giustamente il maggiore ; come per essemplio , il numero minore 4 , il quale misura giustamente il maggiore 28 sette volte , e non auanza cos'alcuna , si dice esser parte del numero 28 . E nell'istesso modo ciascuno de' numeri 2 . 3 . 4 . 6 . 12 sarà parte del numero 24 , stante che il 2 misura il 24 dodici volte ; il 3 misura il medesimo 24 giustamente otto volte ; il 4 lo misura sei volte ; ed il numero 6 lo misura quattro volte ; ed il numero 12 lo misura giustamente due volte . Il medesimo s'intende di tutti gli altri numeri .

Notisi che la parte prende il nome dal numero , secondo il quale il minore misura il maggiore , cioè se il minore misura il maggiore due volte , si dice il minore essere la metà del maggiore ; se il minore misura il maggiore tre volte , si dice essere la terza parte del maggiore ; se lo misura quattro volte , si dirà essere la quarta parte del maggiore , e con questo ordine in infinito .

I V.

Il numero minore si dice esser parti del maggiore , quando il minore non misura giustamente il maggiore .

Due casi possono succedere in due dati numeri ineguali ; cioè , ò che il minore misuri giustamente il maggiore , ouero che non lo misuri giustamente ; ma che soprauanti qualche cosa . Se il numero minore misura giustamente il maggiore , per quel che s'è detto nell'antecedente definizione , il minore si dice esser parte del maggiore ; ma se non lo misura giustamente , vuole Euclide che il minore si dica esser parti del maggiore . Per essemplio , siano esposti i numeri 3 ,

Chè 7; perchè il numero minore 3 non misura giustamente il maggiore 7, si dirà il minore 3 essere parti del 7, cioè essere tre di quelle parti, delle quali nel maggiore ne sono sette. Similmente se il minore fosse 9, ed il maggiore 11, si direbbe il minore essere nove di quelle parti, che nel maggiore sono undici: ed il simile s'intenda negli altri.

V.

Il numero maggiore è multiplice del minore, quando è misurato dal minore giustamente.

Quando il numero minore misura giustamente il numero maggiore; se si fa la comparatione dal minore al maggiore, si dice il minore esser parte del maggiore, come fu spiegato nella definizione terza; e se si farà la comparatione dal maggiore al minore, si dirà il maggiore essere multiplice del minore.

V I.

Il numero paro è quello, che si diuide in due parti vguali.

Tutti i numeri, che si possono diuidere giustamente in due parti vguali, si dicono numeri pari; come i numeri 4, 8, 10, 20, 50, 100, 1000 &c. i quali si dicono numeri pari, stante che ogn'uno si diuide giustamente in due parti vguali, e le loro metà sono 2, 4, 5, 10, 25, 50, 500.

V I I.

Numero disparo è quello, che non si diuide in due parti vguali; ouero, è quello ch'è differente dal numero paro per vna vnità.

A distinctione del numero pari, chiama Euclide numero disparo quello, che non si diuide in due parti vguali, ouero ch'è differente dal numero paro per vna sola vnità; come sono i numeri 3, 5, 7, 9, 11, 15, 47, 101, 1001, i quali sono differenti da i seguenti numeri pari 2, 4, 6, 8, 10, 14, 46, 100, 1000, ouero 4, 6, 8, 10, 12, 16, 48, 102, 1002 per quanto è vna sola vnità.

V I I I.

Numero parimente paro è quel numero, ch'è misurato da vn numero paro, per volte pari; cioè per vn numero paro.

Siano esposti i numeri 64, e 32, questi, secondo la definizione d'Euclide, sono ambidue numeri parimente pari, stante che il numero 64 è misurato dal 4, ch'è numero pari, sedici volte; cioè per il numero pari 16; e similmente il numero 32 è misurato dal numero paro 8 quattro volte, cioè per il numero paro 4.

I X.

Numero parimente disparo si chiama quello , ch'è misurato da vn numero paro per numero disparo .

Sia esposto il numero 30 , il quale è misurato dal numero paro 6 per il numero disparo 5 ; e questo numero 30 , secondo l'antecedente definizione , si chiama numero parimente disparo . Il medesimo si deuè intendere d'ogn' altro numero , che haueà le medesime condizioni .

E d'auuertirsi che si trouano de i numeri come il 20 , il 24 , e simili , i quali hanno le medesime condizioni d'ambidue l'antedette definizioni , cioè sono numeri parimente pari , ed ancora parimente dispari . stante che il numero 20 è misurato dal numero paro 2 , per il numero paro 10 , e per l'ottaua definizione il numero 20 è numero parimente paro : e perche il medesimo numero paro 20 è misurato dal numero paro 4 per il numero disparo 5 , per quel che prima s'è detto , il numero 20 sarà numero parimente disparo . Il medesimo succede al numero 24 , il quale è misurato dal numero paro 4 per il numero paro 6 ; ed ancora è misurato dal numero paro 8 per il numero disparo 3 , e benchè alcuni Commentatori hanno stimato , che simili numeri non siano parimente pari , ne meno parimente dispari , con tutto ciò vniformandomi con l'interpretatione del P. Clauio , dico che simili numeri sono parimente pari , ed ancora parimente dispari ; stante che se Euclide hauesse voluto escludere questi dal significato , e condizioni del numero parimente paro , non hauerebbe definito il numero parimente paro esser quello , ch'è misurato da vn numero paro per numero paro , mà hauerebbe detto numero parimente paro è quello , del quale tutti i numeri , che lo misurano , sono numeri pari ; ed in tal caso hauerebbe esclusi da questi i numeri 20 , 24 , e simili : mà hauendo fatta la definizione più generica , dobbiamo senza dubio stimare , ch'Euclide non habbia escluso da i numeri parimente pari i numeri 20 , 24 , e simili , e così diremo ; che i numeri 20 , 24 , e simili , sono numeri parimente pari , e sono ancora numeri parimente dispari .

X.

Numero disparimente disparo è quel numero , ch'è misurato dal numero disparo per vn numero disparo ; ouero è quel numero , del quale tutti i numeri , che lo misurano , sono numeri dispari .

Quando tutti i numeri , che misurano vn numero , sono numeri dispari , quello si dice numero disparimente disparo . Per essempio sia esposto il numero disparo 135 , il quale è misurato da i seguenti numeri dispari 3 , 5 , 9 , 15 , 27 , 45 , cioè è misurato dal 3 per il numero 45 , è misurato dal 5 , per il numero 27 , & è misurato dal 9 , per il numero 15 , i quali tutti sono numeri dispari ; in tal caso il numero 135 , d' altro , che habbia le medesime condizioni , si chiama numero disparimente disparo .

X I.

Primo numero è quello, ch'è misurato solamente dall'vnità.

Tutti i numeri, che non possono essere misurati giustamente da altri numeri, cioè che non sono numeri parimente pari, ne parimente dispari, ne meno disparimente dispari, mà che possono essere misurati solamente dall'vnità, si dicono numeri primi: come sono i seguenti 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 &c. Notisi però, che nessun numero misura il numero primo, eccettuato, che si misuri da se medesimo; come il numero 2 è misurato dal medesimo 2; il 3 è misurato dal medesimo 3; mà nessun altro numero lo può misurare, e l'istesso si deue intendere di tutti gli altri numeri primi.

X I I.

Quei numeri si dicono essere frà di loro primi, de' quali la commune misura è solamente l'vnità.

Si come, quando vn numero è misurato dalla sola vnità, si dice numero primo; così quando due, o più numeri, hanno per commune misura la sola vnità, si dicono essere frà di loro primi. Per essemplio siano esposti i numeri 4, e 9; benchè il numero 4 sia misurato dal 2, ed il numero 9 sia misurato dal 3 contutto ciò, non potendo il numero 3 misurare ambidue i numeri 4, e 9, e ne meno il 2 può misurare ambidue essi numeri 4 & 9; tanto il numero 3, come il numero 2, non sarà commune misura de i numeri 4, e 9; mà ben si la commune misura sarà solamente l'vnità: ed in tal caso i numeri 4, e 9 si chiamano numeri frà di loro primi. Similmente i numeri 5, 8, 21, sono frà di loro primi, stante che la di loro commune misura è solamente l'vnità; e l'istesso s'intende di tutti gli altri, che hanno per commune misura solamente l'vnità.

X I I I.

Numero composto è quello, ch'è misurato da qualche numero.

Perche ogni numero è misurato dall'vnità, e non tutti sono misurati da altri numeri, perciò Euclide, volendo fare diffinitione frà il numero, ch'è misurato dalla sola vnità, e quello, ch'oltre l'essere misurato dall'vnità, è ancora misurato da qualche numero; chiama numero primo quello, ch'è misurato dalla sola vnità; e numero composto chiama quello, il quale non solo è misurato dall'vnità, mà ancora da qualche numero: come il numero 24, il quale, oltreche è misurato dall'vnità, è ancora misurato da tutti i numeri seguenti 2, 3, 4, 6, 8, 12. Parimente il numero 15 è misurato dall'vnità, ed ancora da i seguenti numeri 3, & 5; e questi numeri 24 & 15, come ancora altri, che sono misurati da qualche numero, si dicono numeri composti. E notisi, che tutti i numeri parimente pari, parimente dispari, e disparimente dispari, sono numeri composti.

Quei

X I V.

Quei numeri si dicono frà di loro composti, i quali hanno per commune misura qualche numero.

Il numero, che misura giustamente due, ò più numeri, si chiama commune misura de i numeri misurati, come altroue si disse. Per essemplio, i numeri 9, & 12, sono ambidue misurati giustamente dal numero 3: poiche il 3 misura il 9 tre volte, e misura il 12 quattro volte; e secondo quel, che s'è detto, il numero 3 sarà commune misura de i due 9, & 12; e così per gli altri. Hor perche i numeri 9, & 12, hanno per commune misura il numero 3, essi numeri 9, & 12, si chiameranno numeri frà di loro composti. E similmente i numeri 15, & 40 sono frà di loro composti, stante che la loro commune misura è il numero 5; ed i numeri 7, 28, 35, si dicono ancora frà di loro composti à causa, che il numero 7 è loro commune misura.

X V.

Vn numero si dice moltiplicare vn altro numero, quando si prende tante volte il numero moltiplicato, per quante vnità sono nel moltiplicante; e quel numero composto si chiama Prodotto.

Quando vn numero si moltiplica per vn'altro numero, quello, che moltiplica, si chiama moltiplicante, e l'altro si dice numero moltiplicato. Siano dunque esposti i numeri 5, & 9; sia 5 il moltiplicante, ed il numero moltiplicato sia 9: perche nel moltiplicante sono cinque vnità, prendendo il numero 9 cinque volte, il composto di queste cinque volte il 9 sarà 45; e così diremo che il 9 si è moltiplicato per il 5, ed il prodotto è 45. All'incontro se porremo il 9 come numero moltiplicante, ed il 5 sarà il numero moltiplicato; essendo nel moltiplicante noue vnità, si prenderà noue volte il numero moltiplicato 5, che similmente produrrà il numero 45; e diremo, ch'il numero 5 s'è moltiplicato per il numero 9, ed il prodotto è 45. E questo intende Euclide per la voce Moltiplicare, cioè trouare vn numero, che sia composto di tante volte il numero moltiplicato, per quante vnità sono nel numero moltiplicante.

All' antecedente definizione si può aggiungere la seguente.

Dicesi diuidere vn numero per vn altro numero, quando si troua vn numero composto di tante vnità, per quante volte il diuifore misura il numero diuiso; e quel numero trouato si chiama Quotiente.

Siano esposti due qualunque numeri, come 7, & 21; all'hora il numero 7 si dice diuidere il numero 21, quando si troua vna quantità, nella quale siano tante vnità, per quante volte il numero 7 misura il numero 21. E perche,

il 7 misura il numero 21 tre volte, il numero 3, in questo esempio, sarà quello, nel quale sono tante unità, per quante volte il 7 misura il 21; ed il numero 3 sarà quello, che si chiama Quotiente. Notisi che quel numero, che divide, si chiama diuifore, e l'altro si chiama numero diuiso; come per esempio hauendosi à diuidere il numero 32 per 8, perche il numero 8 è quello, che divide, perciò il numero 8 si chiamerà diuifore, ed il numero 32 sarà il numero diuiso. Si veda dunque quante volte il numero 8 misura il 32, e trouaremo quattro volte, e così il numero 4 sarà il quoziente; cioè sarà quello, che indica essere di tante unità, per quante volte il diuifore misura il numero diuiso.

X V I.

Quando due numeri, multiplicandosi scambievolmente frà di loro producono, altro numero, quel prodotto si dice numero piano, ed i numeri multiplicati si chiamano lati di quel piano.

Siano due qualunque numeri AB, BC , le unità de' quali siano disposte in lunghezza, e larghezza con uguali distanze, rappresenteranno un parallelogrammo rettangolo, come il notato $ABCD$, i di cui lati saranno i dati numeri AB, BC , ed il prodotto, fatto dalla loro multiplicazione, saranno l'unità, che occupano il piano $ABCD$. Quindi è, che Euclide definisce il numero piano esser quello, ch'è prodotto dalla multiplicazione di due numeri, e quei due numeri, multiplicati scambievolmente frà di loro, gli chiama lati di quel piano. Quando dunque nelle cose auuenire si dirà il prodotto contenuto da un numero in un altro numero, si concepirà un parallelogrammo rettangolo, formato dalla disposizione delle unità, che sono nel prodotto con uguali distanze, tanto in lunghezza, come in larghezza, ed i numeri multiplicati saranno i lati di esso prodotto.

Benchè i numeri piani possano essere infiniti, cioè possano formare innumerabili figure piane, come triangolari, pentagonali, &c. con tutto ciò Euclide s'è contentato di parlare solamente di quei numeri piani, che formano le figure parallelogramme rettangole, tralasciando l'altre come non necessarie al suo fine: di questi numeri però, come triangolari, pentagonali, esagonali, &c. ne parleremo nell'Aritmetica pratica, e qui proseguiremo la spiegazione delle sole cose poste da Euclide.

Perche il numero, che forma il piano rettangolo $ABCD$, cioè il prodotto fatto dalla multiplicazione di AB in BC , per la 15. definizione, è composto di tante volte il numero delle unità, che sono in BC , per quante unità sono in AB , perciò il numero BC misura tante volte il numero piano $ABCD$, per quante unità sono nel lato AB . Similmente, essendo il numero piano $ABCD$, per la 15. definizione di questo, composto di tante volte il numero AB , per


quante

quante unità sono in BC , tante volte il numero AB misurerà il numero piano $ABCD$, per quante unità sono nel lato BC ; la onde per quel, che si disse nella 15. definizione, dividendo il numero piano $ABCD$ per le unità, che sono in BC , cioè per il numero, che rappresenta il lato BC , il quoziente sarà il lato AB : ed all'incontro, diviso il numero piano $ABCD$ per il lato AB , il quoziente sarà il lato BC .

X V I I.

Quando tre numeri, moltiplicandosi scambievolmente frà di loro, producono vn altro numero, quel numero prodotto si chiama numero solido, ed i numeri moltiplicati si dicono esser lati di quel numero solido.

Siano i tre numeri BC, CE, CD , le di cui unità siano disposte con uguali distanze in lunghezza, larghezza, ed altezza in modo, che il prodotto fatto da i due BC, CD , formi il piano rettangolo $ABCD$; ed il prodotto de i due DC, CE faccia il piano rettangolo $DCEF$; come, anco il prodotto de i due BC, CE formi il piano rettangolo $BCEH$, sarà fatto tutto il solido $GBCF$ contenuto da sei piani rettangoli; e perciò le unità del prodotto fatto dalla moltiplicatione de i tre numeri BC, CD, CE , disposte con uguali distanze il lunghezza, larghezza, e profondità, formeranno il solido $GBCF$. Quindi è, ch' Euclide definisce il numero solido esser quello, ch'è prodotto dalla scambievole moltiplicatione di tre numeri frà di loro; cioè dalla moltiplicatione del primo nel secondo, ed il prodotto nel terzo; ed i numeri BC, CD, CE , moltiplicati si chiamano lati del prodotto numero solido. Qui ancora Euclide, tralasciando ogn'altro numero solido, hà definito solamente quelli, che sono contenuti da piani rettangoli, le di cui faccie opposte sono parallele; e perciò nelle cose, che seguono, quando si dirà il numero solido contenuto dal prodotto fatto dalla moltiplicatione di tre numeri frà di loro, doueremo concepire le unità del prodotto talmente disposte in lunghezza, larghezza, e profondità, che formino una figura come la notata $GBCF$, i di cui lati vengano rappresentati dalle unità de i numeri moltiplicati.



X V I I I.


Numero quadrato è quello, ch'è vgualmente vguale, cioè ch'è contenuto da due numeri vguali.

Definisce Euclide il numero quadrato esser quello, ch'è vgualmente vguale; cioè che le sue unità formano vn piano d'uguale lunghezza, e larghezza,

R r

ed


ed è l'istesso, come se diceffimo, che le sue unità occupano un piano quadrato; come il notato ABCD, i di cui lati AB, BC sono frà di loro uguali; e perebe, dalla multiplicatione del numero AB nell' uguale numero BC, ne nasce il piano AB CD quadrato, dalla multiplicatione ancora del lato AB nel medesimo lato AB, si produrrà l'istesso numero quadrato ABCD. Quindi è, che multiplicandosi qualunque numero in se medesimo, il prodotto, che ne viene, è numero quadrato; ed il numero, che fu multiplicato in se medesimo è il lato di quel numero quadrato, che generalmente si chiama radice quadrata. Si che nelle figura ABCD, il numero quadrato è il composto delle unità, che formano il quadrato ABCD, ed il lato, è radice quadrata è il notato AB, ouero BC.



X I X.

Chiamasi numero Cubo quello, ch'è contenuto da tre numeri uguali; cioè che vien prodotto dalla continua multiplicatione di tre numeri uguali.

Siano i tre numeri uguali AB, BD, D E, e dalla multiplicatione de i due uguali AB, BD ne venga il numero quadrato ABDH, et il quale, multiplicato dal numero ED, ne venga il numero solido F ABE. E perebe i lati AB, BD, DE, sono frà di loro uguali, perciò il numero solido F ABE sarà ugualmente uguale in lunghezza, larghezza, e profondità; e questo Euclide lo chiama numero Cubo; ed ogn' uno de i numeri uguali AB, BD, DE,



etc. si chiama lato del numero cubo F ABE. E perebe dalla continua multiplicatione de i tre lati uguali AB, BD, DE se ne produce il numero cubo F ABE; dalla multiplicatione ancora d'uno di questi lati, come AB, in se medesimo, e dal prodotto, multiplicato per il medesimo lato AB, se ne produrrà l'istesso numero cubo F ABE. e perciò multiplicandosi qualunque numero in se medesimo, ed il prodotto multiplicandosi per l'istesso numero, quel, che ne viene, si chiamerà numero Cubo; e quel numero multiplicato in se medesimo, e di nuovo multiplicato per il prodotto, si chiamerà lato di quel numero Cubo, che volgarmente si chiama ancora Radice cuba. Si che, nella figura F ABE, il composto delle unità, che formano il solido F ABE, si chiama numero Cubo, ed ogn'uno de i suoi lati AB, BD, DE, etc. si chiama Radice cuba, ouero lato del Cubo F ABE.

Nume-

X X.

Numeri proportionali sono , quando il primo è multiplice , o parte , o parti del secondo , come il terzo è multiplice , o parte , o parti del quarto : o pure , quando il primo contiene vgualmente il secondo , come il terzo contiene il quarto , e di sopra più il primo , e terzo , contengono vguali parte , o parti del secondo , e quarto .

Dopo ch'Euclide hà definito che cosa sia numero , e come s'intenda un numero esser multiplice , o parte , o parti d'un altro numero ; ed oltre à ciò che cosa dobbiamo intendere per numero piano , e che cosa per numero solido ; spiega in questa definizione quali condizioni deuno bauerre quattro numeri , acciò che siano proportionali ; cioè acciò che frà di loro cada proportionalità : e , supponendo quel , che disse nella settima definizione del quinto Elemento , cioè Le quantità , che hanno la medesima proportionione si dicono proportionali , definisce qui solamente quali siano quei numeri , che douremo chiamare proportionali ; cioè quali condizioni deuno bauerre quattro numeri , acciò che la proportionione del primo al secondo sia come quella del terzo al quarto numero . E dice che all' hora quattro numeri si diranno essere proportionali , quando il primo è vgualmente multiplice del secondo , come il terzo è multiplice del quarto ; ouero , quando il primo è vgualmente parte , o parti del secondo , come il terzo è parte , o parti del quarto : o pure quando il primo , e terzo contengono vgualmente il secondo , e quarto , e di sopra più la medesima parte , o le medesime parti del secondo , e quarto . Verbi gratia siano i quattro numeri A, B, C, D ; se il primo A è multiplice del secondo B , come il terzo C è multiplice del quarto D , come nel primo effempio : ouero , se il primo numero A è parte del secondo B come il terzo C è parte del quarto D (come nel secondo effempio) : ouero il primo A sia tante parti del secondo B per quante parti è il terzo C del quarto D , come nel terzo effempio ; o finalmente il primo A contenga il secondo B , come il terzo C contiene il quarto D ; e li due A, & C contengano di sopra più vguali parte , o parti di B, & D , come nel quarto , e quinto effempio . In tutt' i detti casi li quattro numeri A, B, C, D, si dicono numeri proportionali . E perche fu definito nel quinto Libro le quantità proportionali esser quelle , le quali hanno la medesima proportionione , chiamando Euclide i notati A, B, C, D , numeri proportionali , farà la proportionione di A à B , come quella di C à D . Dond' è manifesto , che la proportionione frà due numeri è la , scambiuole relatione , secondo la quale l'uno è multiplice , o parte , o parti dell' altro ; o che l' uno contenga l' altro , e di sopra più contenga vguale parte , o parti dell' altro .

A	B
24	8

12	4
C	D

A	B
6	30

9	45
C	D

A	B
6	8

9	12
C	D

A	B
12	8

6	4
C	B

A	B
30	8

15	4
C	D

DIVISIONE DELLE PROPORZIONI.

I numeri, frà quali cade la proporzione, si chiamano *Termini della proporzione*, de' quali quello, che si nomina nel primo luogo, si chiama *Antecedente*, e l'altro, che si nomina nel secondo luogo, si chiama *Consequente*: come; facendosi la comparatione da 9 à 7; i numeri 9, e 7 si chiamano termini della proporzione, ed il numero 9, che habbiamo nominato nel primo luogo, si chiama *Antecedente*; l'altro, cioè il numero 7, posto nel secondo luogo, si chiama *Consequente*.

Denominatore della proporzione si chiama quel numero, che ci rappresenta che parte, ò parti, ouero moltiplice, è l'antecedente del consequente; ò pure, come l'antecedente contiene il consequente, e con che parte, ò parti di più lo contiene. E perche diuidendosi un numero per un altro numero, per la natura della diuisione, il quoziente ci mostra qual parte, ò parti, ò moltiplice, è il numero diuiso del diuisore; perciò quando saranno proposti due numeri, e si voglia ritrouare qual proporzione sia frà l'antecedente, e consequente, cioè si voglia ritrouare quella quantità, che ci mostra qual parte, ò parti, ò moltiplice, sia l'antecedente del consequente, la quale habbiamo chiamato *denominatore della proporzione*, sempre si diuiderà l'antecedente per il consequente, ed il quoziente sarà il denominatore della proporzione; cioè sarà quel numero, dal quale prenderà il nome quella proporzione. Per esempio siano esposti i numeri 18, & 6, perche diuidendo l'antecedente 18 per il consequente 6, il quoziente 3 ci mostra la grandezza dell'antecedente 18 esser tanta, per quanto è tre volte il consequente 6, per ciò il quoziente 3 sarà il denominatore della proporzione. Similmente habbiamo da ritrouare il denominatore della proporzione, ch'è da 25 à 7, si diuida l'antecedente 25 per il consequente 7, il quoziente sarà 3 $\frac{4}{7}$, il quale rappresenta la grandezza dell'antecedente 25 esser tanta, per quanto è tre volte il consequente 7, e di più quattro settime parti del medesimo consequente 7; e questo numero 3 $\frac{4}{7}$ sarà il denominatore della proporzione, ch'è da 25 à 7. In oltre douendosi trouare il denominatore della proporzione, ch'è da 5 à 9; perche l'antecedente 5 non è misurato dal 9, sarà l'antecedente 5 nove parti del consequente, che si nota $\frac{5}{9}$; e questo sarà il denominatore della proporzione, ch'è da 5 à 9; e l'istesso s'intende di tutti gli altri numeri.

La proporzione si diuide nella proporzione d'uguaglià, e d'ineguaglià.

Dicesi *proporzione d'uguaglià*, quando l'antecedente è uguale al consequente, come se si farà la comparatione da 7 à 7, ouero da 13 à 13 &c.

La *proporzione d'ineguaglià* è quando l'antecedente è ineguale al consequente, come se si farà la comparatione da 3 à 7; ouero da 7 à 3 &c.

La *proporzione d'ineguaglià* si diuide nella proporzione di maggiore inegualità, e nella proporzione di minore inegualità.

Quando l'antecedente è maggiore del consequente, la proporzione, che cade frà quei due termini, si chiama *proporzione nella maggiore inegualità*; e se l'antecedente sarà minore del consequente, si dirà *proporzione nella minore inegualità*.

La *proporzione nella maggiore inegualità* si diuide in cinque generi di proporzioni, de' quali tre sono semplici, e due composti. Il primo di semplici si chia-

ma Multiplice; il secondo Superparticolare; ed il terzo Superpartiente. De i due composti il primo si dice Multiplice superparticolare (per esser composto del multiplice, e del superparticolare,) l'altro si chiama Multiplice superpartiente (stante che è composto del multiplice, e del superpartiente.)

La proporzion multiplice si divide in infinite proporzioni multiplici; e questo è quando l'antecedente è misurato dal conseguente più d'una volta, e non avanza cosa alcuna. Come se si farà la comparatione da 6 à 3; perchè l'antecedente 6 è misurato dal conseguente 3. due volte, e non avanza cosa alcuna, cioè diuiso l'antecedente 6 per il conseguente 3, il quoziente è 2; sarà il quoziente, due il denominatore della proporzion; cioè indicherà che l'antecedente contiene il conseguente due volte: e questa si chiamerà proporzion dupla. Similmente habbiasi da fare la comparatione da 12 à 4, perchè, diuiso l'antecedente 12 per il conseguente 4, il quoziente è tre; perciò la proporzion di 12 à 4 si dirà esser Tripla. Se poi, diuidendosi l'antecedente per il conseguente, il quoziente sarà 4, tal proporzion si chiamerà Quadrupla. E se il quoziente sarà 5, si dirà Quintupla, e con quest'ordine in infinito.

La proporzion superparticolare si divide in infinite proporzioni superparticolari: e questo è quando l'antecedente è misurato dal conseguente una volta, ed avanza uno, come se si farà la comparatione da 3 à 2, che, diuiso l'antecedente 3 per il conseguente 2, il quoziente sarà $1\frac{1}{2}$: e questa proporzion si dice Sesiqualtera. Di nuovo douendosi fare la comparatione da 4 à 3, si diuida l'antecedente 4 per il conseguente 3, il quoziente, è denominatore della proporzion sarà $1\frac{1}{3}$; e tal proporzion si chiama sesquitercia. Se poi, diuiso l'antecedente per il conseguente, il quoziente sarà $1\frac{1}{2}$, si dirà proporzion sesquiquarta. Se il quoziente sarà $1\frac{1}{4}$ si dirà sesquiquinta; e con quest'ordine per l'altre proporzioni superparticolari.

La proporzion superpartiente si divide in infinite proporzioni superpartienti: e questo è quando l'antecedente è misurato dal conseguente una volta, ed avanza più di uno: come se si farà la comparatione di 5 à 3, che diuiso l'antecedente 5 per il conseguente 3 il quoziente sarà $1\frac{2}{3}$; e tal proporzion si dice superbipartiente tertìa. Se diuidendosi l'antecedente per il conseguente il quoziente sarà $1\frac{3}{4}$, si dirà proporzion supertripartiente quarta. Se il quoziente sarà $1\frac{4}{5}$, si dirà supertripartiente quinta. Se sarà $1\frac{5}{6}$ si dirà superquadrupartiente quinta; e con quest'ordine si procederà in tutte l'altre del medesimo genere.

La proporzion multiplice superparticolare si divide in infinite proporzioni multiplici superparticolari: e questo è quando l'antecedente è misurato dal conseguente più d'una volta, ed avanza uno; come se si farà la comparatione di 5 à 2, che diuidendo l'antecedente 5 per il conseguente 2, il quoziente sarà $2\frac{1}{2}$; e questa proporzion si dice dupla sesiqualtera. Similmente facendosi la comparatione di 7 à 3, diuiso l'antecedente 7 per il conseguente 3, il quoziente sarà $2\frac{1}{3}$; e tal proporzion si chiamerà dupla sesquitercia. Se poi diuidendosi l'antecedente per il conseguente il quoziente sarà $3\frac{1}{2}$, si dirà tripla sesquitercia. Se il quoziente sarà $4\frac{1}{2}$, si dirà quadrupla sesquiseptima, e con quest'ordine si procederà per tutte l'altre del medesimo genere.

La proporzion multiplice superpartiente si divide in infinite proporzioni multiplici superpartienti: e questo è quando l'antecedente è misurato dal con-

seguen-

seguinte più d'una volta, ed auanza più di uno: come se si farà la comparatione da 8 à 3, che diuiso l'antecedente 8 per il conseguente 3, il quoziente sarà $2 \frac{2}{3}$; e tal proportione si dice dupla superbipartiente tertia, e diuidendosi l'antecedente per il conseguente, se il quoziente sarà $2 \frac{2}{3}$, si dirà dupla supertripartiente quarta. Se il quoziente sarà $3 \frac{1}{2}$, si dirà tripla supertripartiente quarta. Se sarà $4 \frac{1}{2}$, si dirà quadrupla superbipartiente tertia, e se sarà $5 \frac{1}{2}$, si dirà quintupla superseptipartiente ottaua; e con quest'ordine si procederà in infinito.

La proportione nella minore inegualità si diuide ne i medesimi cinque generi come s'è fatto nella maggiore inegualità, con la sola differenza, che in questa di minore inegualità vi s'aggiunge sempre la particola Sotto. E così diremo, sumultiplice, susuperparticolare, susuperpartiente, sumultiplice, susuperparticolare, sumultiplice superpartiente, sudupla, sutripla, suquadrupla &c. susesquialtera, susesquitercia, susesquiquarta &c. susuperbipartiente tertia, susupertripartiente quarta &c. sudupla sesquialtera, sudupla sesquitercia, sutripla sesquitercia &c. sudupla superbipartiente tertia, sudupla supertripartiente quarta, sutripla superbipartiente quinta, suquadrupla superquadrupartiente nona &c.

Per esempio si sia proposta fare la comparatione di 1 à 2, si diuida l'antecedente 1 per il conseguente 2, il quoziente sarà $\frac{1}{2}$; e questa si dice proportione sudupla; se il quoziente sarà $\frac{1}{3}$, si dirà sutripla, se sarà $\frac{1}{4}$, si dirà suquadrupla, e con quest'ordine per le altre del medesimo genere. E per maggior facilità, quando s'ino proposti due numeri nella minore inegualità, cioè che l'antecedente sia minore del conseguente, e si voglia vedere qual specie di proportione sia, si permutino i termini, e si ponga il conseguente in luogo dell'antecedente, e l'antecedente in luogo del conseguente, e si veda qual specie di proportione è in questa dispositione della maggiore inegualità; se nella maggiore inegualità si trouasse essere in proportione tripla, vi s'aggiunga la particola Sotto, se si dirà, che i numeri dati sono nella proportione sutripla; se nella maggiore inegualità fosse nella proportione sesquialtera, o sesquitercia &c. si dirà che nella minore inegualità sono nella proportione susesquialtera, ouero susesquitercia &c. Per esempio, habbiassi da fare la comparatione da 7 à 25; perche l'antecedente è minore del conseguente, i proposti numeri saranno esposti nella minore inegualità; si permutino questi termini, facendo dell'antecedente conseguente, e del conseguente antecedente, saranno esposti nel seguente modo 25 à 7: si diuida il 25 per il 7; il quoziente sarà $3 \frac{4}{7}$, e perciò i numeri 25, & 7 esposti nella maggiore inegualità sono nella proportione, che si dice tripla superquadrupartiente settima, vi s'aggiunga la particola Sotto, e così diremo, che la proportione di 7 à 25 è sutripla superquadrupartiente settima; ed il denominatore di tal proportione sarà $\frac{7}{25}$, stante che sempre si diuide l'antecedente per il conseguente; tenendo per regola ferma, ch'il denominatore della proportioni di due termini, che sono nella minore inegualità, in qualunque genere di proportione, sempre sarà un rotto senza intero alcuno; e nella maggiore inegualità sempre sarà, o semplicemente intero, ouero sarà intero accompagnato da qualche rotto.

DELLE PROPORTIONALITÀ.

L Aproporzionalità spiegata da Euclide nella quarta definizione del quinto, si divide in tre generi, e si dicono Medietà, che sono Medietà, Arismetica, Geometrica, ed Armonica.

La proporzionalità, o Medietà Arismetica è quando tre, o più numeri, si avanzano con uguali differenze, come sono i seguenti 5. 8. 11. 14. 17. &c. ouero 3. 5. 7. 9. 11. 13. &c. Donde si vede, che il secondo supera il primo, come il terzo supera il secondo, ed il quarto supera il terzo &c. Questa medietà, o è continua, ouero discontinua. Continua si dice, quando sono più di tre termini nella Medietà Arismetica, i quali continuatamente, e senza interrompimento alcuno, ognuno supera il suo prossimo antecedente con uguale differenza, come appare negli essempli antecedenti. E si dice Discontinua, quando nella progressione de' numeri, si fa interrompimento in modo, che la differenza fra il primo, e secondo, è uguale alla differenza fra il terzo, e quarto, e fra il quinto, e sesto, e con quest'ordine presta due a due: ma non è uguale alla differenza fra il secondo, e terzo, ne fra il quarto, e quinto &c. come appare ne' seguenti numeri 3. 7. 9. 13. 12. 16. doue la differenza fra i due 3. 7. è uguale alla differenza, ch'è fra i due 9. 13. ed ancora è uguale alla differenza, ch'è fra i due 12. 16. ma non è uguale alla differenza, ch'è fra i due 7. 9. ne a quella, ch'è fra i due 13. 12.

La proporzionalità, o Medietà Geometrica è quando sono tre, o più numeri, i quali successivamente sono nella medesima proporzione; cioè, che la proporzione del primo termine al secondo, sia l'istessa, che la proporzione del secondo al terzo, e del terzo al quarto, e con quest'ordine per tutti i termini, come sono i seguenti 2. 4. 8. 16. 32. 64. &c. ouero 12. 6. 18. 54. 162. &c. che nel primo essemplio s'avanzano tutti successivamente nella proporzione dupla; e nel secondo essemplio s'avanzano nella proporzione tripla. Questa proporzionalità ancora o è continua, ouero discontinua. Proporzionalità continua si dice quando il primo termine al secondo è come il secondo al terzo, ed il terzo al quarto, &c. come ne' gli essempli antecedenti: e si chiama discontinua quando si fa interrompimento in modo, che sono proporzionali a due a due; cioè il primo al secondo è come il terzo al quarto, ed ancora come il quinto al sesto, &c. come per essemplio 2. 4. 5. 10. 12. 24, doue apparisce, che la proporzione de' due 2. 4. è l'istessa, che la proporzione de' due 5. 10, e de' due 12. 24; ma la proporzione de' due 2. 4. non è l'istessa, che la proporzione de' due 4. 5, ne come quella de' due 10. 12, &c.

La proporzionalità, o Medietà Armonica, è quando tre numeri sono talmente disposti, che la proporzione del massimo al minimo sia l'istessa, quale è quella fra la differenza del massimo, e medio, alla differenza fra il medio, e minimo in modo, che le differenze fra i prossimi non siano uguali, come nella medietà Arismetica, ne siano nella medesima proporzione, come si disse nella medietà Geometrica. Come per essemplio sono i tre numeri 3. 4. 6, doue apparisce, che la proporzione del numero 6 al numero tre è l'istessa, che la proporzione, che ha la differenza fra il 6, e 4 alla differenza fra il quattro, ed il 3; poichè la proporzione del 6 al 3 è dupla, ed ancora la proporzione della


dis-

differenza frà il 6, e 4, ch'è 2, alla differenza frà il 4 e 3, ch'è 1, è dupla. E questi non hanno successivamente la medesima differenza, ne meno il primo al secondo hà l'istessa proportionione, che il secondo al terzo, come richiede la medieta Geometrica; questa proportionalità si chiama Armonica, stante che i numeri esposti secondo tal disposizione; per lo più hanno quelle proportioni, che si richiedono alle consonanze della Musica; come nel sopraposto esempio, doue la proportionione del 4 à 3 è sesquitercia, la quale costituisce la consonanza, che si dice Diatessaron, ouero quarta. In oltre la proportionione del 6 al 4 è sesquialtera, e questa costituisce la consonanza, che si dice Diapente, ouero quinta: e la proportionione del 6 al 3 è dupla, la quale costituisce la consonanza che si chiama Diapason, ouero ottaua. Circa poi al modo di ritrouare quanti si voglia numeri nella proportionalità Arismetica, o Geometrica, o Armonica, si veda la mia Arismetica Pratica, doue si trouerà il tutto diffusamente spiegato,

X X I.

Quei numeri piani, o solidi; si dicono essere frà di loro simili, i quali sono contenuti da lati proportionali.

Siano esposti i due numeri piani ABCD, EFGH, ed il numero piano ABCD, sia prodotto dalla multiplicatione de i numeri AB, BC; similmente il numero piano EFGH sia prodotto dalla multiplicatione de i due numeri EF, FG; definisce Euclide, che se i numeri, o lati AB, BC, EF, FG sono proportionali, cioè se la proportionione del numero AB al numero BC è come quella del numero EF al numero FG, i numeri piani ABCD, EFGH, contenuti da quelli, si dicono essere frà di loro simili. Il medesimo s'intende de' numeri solidi, cioè se i numeri, da quali sono prodotti, sono proportionali, quei numeri solidi si dicono essere frà di loro simili. E però da notarsi, ch'Euclide nel definire i numeri piani simili, ed i numeri solidi simili, non assegna altre conditioni, se non che chiama simili quelli, che hanno i lati proportionali, stante che parla solo de' piani rettangoli, e de' solidi contenuti da piani rettangoli,



X X I I.

Numero perfetto è quello, ch'è vguale alle sue parti giunte insieme.

Quando vn numero è misurato da più numeri, quelli, che rappresentano le quantità delle volte, che lo misurano, si chiamano parti aliquote. Per esempio il numero 12 è misurato da tutti i seguenti numeri 12. 6. 4. 3. 2. cioè

è mi-

è misurato dal 12 una volta; dal 6 due volte; dal 4 tre volte; dal 3 quattro volte; e dal due sei volte. Hor quelli, che rappresentano le volte, che il numero 12 è misurato da i numeri 12. 6. 4. 3. 2. si chiamano parti aliquote, ch'in questo essemplio sono 1. 2. 3. 4. 6. e secondo questa spiegazione si devono intendere le parti, delle quali parla Euclide in questa definizione; e così diremo, che se le parti aliquote, secondo le quali un numero è misurato da tutti i numeri, che lo possono misurare, giunte insieme, sono frà di loro vguali al medesimo numero misurato, tal numero si chiamerà numero perfetto, come è il numero 6, le di cui parti aliquote sono 1. 2. 3. le quali giunte insieme fanno giustamente 6. Similmente il numero 28 si dirà essere numero perfetto, stante che le sue parti aliquote 1. 2. 4. 7. 14, le quali, giunte insieme, fanno giustamente il medesimo numero 28.

Se tutte le parti aliquote d'un numero, giunte insieme, sono minori del medesimo numero, all'hora quel numero si chiamerà numero diminuto; com'è il numero 8, il quale è misurato da i numeri 8. 4. 2; e le parti aliquote sono 1. 2. 4, che, giunte insieme, fanno il numero 7 minore del proposto numero 8.

Quando poi tutte le parti aliquote d'un numero, giunte insieme, sono maggiori del medesimo numero; in tal caso quel numero si chiama numero abbondante; come è il numero 12, il quale è misurato da i seguenti numeri 12. 6. 4. 3. 2, e le parti aliquote sono 1. 2. 3. 4. 6, che, giunte insieme, fanno il numero 16 maggiore del proposto numero 12.

Dopo spiegate le definitioni d'Euclide stimo bene aggiungere qui i seguenti postulati, ed assiomi introdotti da altri Autori per maggior spiegazione di quel che segue.

P O S T U L A T I.

I.

Si prende per concesso poter si pigliare quanti si voglia numeri, ò vguali, ò multiplici à qualunque altro numero.

I I.

Che si possa prendere vn numero maggiore di qualunque altro numero.

Benchè il numero non si può diminuire in infinito, stante che Ponità è la sua minima parte, con tutto ciò questo non impedisce, che non si possa accrescere quanto si vuole, coll'aggiungere sempre più, e più unità: donde è manifesto, che à qualunque dato numero se gli può trouare altro numero maggiore, e più maggiore, quanto si vuole.

A S S I O M I.

I.

Tutti i numeri, che sono vguali multiplici d'un medesimo, ò d'altri numeri vguali; sono frà di loro vguali.

I I .

Quei numeri, de' quali vn medesimo è vguualmente multiplice, ouero de' quali gli vguualmente multipli sono vguuali, ancor essi sono frà di loro vguuali.

Se il numero *A* è vguualmente multiplice de' due *B*, & *C*, i due numeri *B*, & *C* sono frà di loro vguuali; ouero se i numeri vguuali *D*, & *E* sono vguuali multipli de' due *B*, *C*, i numeri *B*, & *C* sono frà di loro vguuali.

A

28

B 7

7 C

D 35

35 E

I I I .

Tutti i numeri, che sono la medesima parte, ò le medesime parti dell'istesso numero, ouero di numeri vguuali, sono frà di loro vguuali.

I V .

I numeri, de' quali il medesimo numero, ouero numeri vguuali, sono la medesima parte, ò le medesime parti, sono frà di loro vguuali.

V .

L'vnità misura ogni numero secondo le vnità, che lo compongono, cioè lo misura tante volte, per quante sono le vnità, che lo compongono.

V I .

Ogni numero misura se medesimo secondo vna sola vnità, cioè lo misura vna sol volta.

V I I .

Se vn numero, multiplicato per vn altro, produce qualche numero, il multiplicante misura il prodotto secondo le vnità, che sono nel multiplicato, ed il multiplicato misura il medesimo, secondo le vnità, che sono nel multiplicante.

V I I I .

Se vn numero misura vn altro numero, quello, secondo il quale lo misura, misurerà il medesimo secondo le vnità, che sono in quello, che misura.

Per

Per esempio il numero 4 misura il numero 12 secondo le unità del numero 3; ed il numero 3 misura il medesimo numero 12 secondo le unità del numero 4; cioè il numero quattro entra tre volte nel numero 12, ed all'incontro il numero 3 entra quattro volte nell'istesso numero 12.

I X.

Ogni numero, che misura vn altro numero, se moltiplica quello, secondo il quale egli lo misura, ò è moltiplicato da quello, produce il medesimo numero misurato.

Per esempio il numero 7 misura il numero 28 per il numero 4; se il numero 7 moltiplica il numero 4, ouero il numero 4 moltiplica il numero 7, sempre il prodotto sarà uguale al numero 28.

X.

Se vn numero misura due, o più numeri, misurerà ancora il composto da quelli.

X I.

Qualunque numero, che misura vn altro numero, misurerà ancora il misurato da quello.

Se il numero 4 misura il numero 12, ed il numero 12 misura il numero 24; il numero 4 misurerà ancora il numero 24.

X I I.

Qualunque numero, che misura il tutto, e misura la parte detratta, misurerà ancora il rimanente.

Cioè se il numero AB misura tutto il numero CF, e misura la parte CD. Dico che misurerà ancora l'auanzo DF. Se il numero AB non misura l'auanzo DF, si detragga dal numero DF quanto si può il numero AB, e quel che resta sia EF; sarà EF minore di AB. Perche AB, per ipotesi, misura CD, e per costruzione misura DE, per il 10 assuma, misurerà ancora tutto il numero CE; s'aggiunga à CE la parte EF minore di AB; il numero AB non misurerà giustamente CF, ch'è contro all'ipotesi, essendosi supposto, ch'il numero AB misura tutto CF. Donde è manifesto, che se AB misura il tutto CF, e misura la parte CD, misurerà ancora il rimanente DF, ch'era da dimostrarsi:

C.....D....E..F
A....B

THEOREMA I. PROPOSITIONE I.

Sed i due proposti numeri ineguali si detrae sempre quanto si può il minore dal maggiore reciprocamente, ed

il rimanente mai misuri quello, che l'antecede, fin tanto, che si peruenga all'vnità; i due numeri proposti saranno frà di loro primi.

Siano proposti i due numeri ineguali AB, CD, e dal maggiore AB, ne sia detratto quante volte si può il numero CD, e quel che resta, sia EB, sarà EB minore di CD; sia poi detratto da CD quanto si può il numero EB, e quel che resta sia FD; sarà FD minore di EB; similmente da E B ne sia detratto quanto si può il numero FD, e l'auanzo sia GB, e con questo ordine si proceda fin che si può; se in questa continua detrazione reciprocamente fatta, nissun auanzo misura il numero antecedente, ma, che in questa continuata detrazione l'ultimo auanzo, come GB, sia l'vnità. Dico che i numeri AB, CD sono frà di loro primi; cioè che la loro commune misura è solamente l'vnità.

Se i numeri A B, C D non sono primi A E . . G . B
frà loro, qualche numero sarà loro comune misura; cioè l'vno, e l'altro sarà
C . . . F . . D
H

misurato da qualche numero. Sia, s'è possibile, quel numero, che li misura, il notato H. Perche il numero H, per la supposizione fatta, misura il numero CD; ed il numero CD, per ipotesi, misura il numero AE, il numero H dunque ^a misurerà il numero AE: ma il numero H, per ipotesi, misura il tutto AB, il numero H misurerà ancora ^b il rimanente EB. In oltre perche il numero E B, per ipotesi, misura CF; perciò il numero H ^c misurerà CF. Per supposizione il numero H misura il tutto CD; il numero H dunque misurerà ancora ^d il rimanente FD, E perche FD, per ipotesi, misura EG, in conseguenza il numero H ^e misurerà EG. Di più essendosi dimostrato, che il numero H misura il tutto EB; misurerà ancora ^f il rimanente GB; ma per ipotesi, GB rappresenta l'vnità, il numero H dunque misurerà l'vnità GB; il tutto misura la parte, ch'è impossibile. Non dunque alcun numero, fuor che l'vnità, misura i due numeri AB, CD; e perciò i numeri AB, CD sono frà di loro primi, ch'era da dimostrarli.

a 11. assioma
del 7.

b 12. assioma
del 7.

c 11. assioma
del 7.

d 12. assioma
del 7.

e 11. assioma
del 7.

f 12. assioma
del 7.

S C O L I O.

La conuersa dell'antecedente proposizione la fa il Campano nel seguente modo.

Se di due proposti numeri frà di loro primi si detrae sempre, quanto si può, il minore dal maggiore, con reciproca detrazione; nissuno degli auanzi, prima che si peruenga all'vnità, misurerà il numero antecedente.

Sieno i due numeri AB, CD, frà di loro primi, e dal maggiore AB se ne

detrage-

detragga quanto si può il minore CD, e l'auanzo sia EB; sarà EB minore di CD. Similmente dal numero CD se ne detratta quanto si può il numero EB, e l'auanzo sia FD, sarà FD minore di EB; poi dal numero EB se ne detratta quanto si può il numero FD; e quel che resta sia GB. Dico ch' in questa continua detrazione reciprocamente fatta, mai alcun' auanzo, prima di peruenire all'unità, misurerà il numero antecedente. Misuri s'è possibile prima, che si peruenza all'unità, l'auanzo GB il numero antecedente FD; perche FD, per ipotesi, misura EG, dunque l'auanzo GB a misurerà ancora il numero EG; ma l'auanzo GB misura se medesimo; perciò b misurerà ancora tutto il numero EB. In oltre perche GB misura EB; ed il numero EB, per ipotesi, misura CF; in conseguenza GB c misurerà CF: mà, per il supposto fatto, GB misura FD, dunque GB d misurerà CD. Il numero CD, per ipotesi, misura AE, perciò l'auanzo GB e misurerà AE. Di più perche GB misura AE, e per quel che s'è dimostrato, misura ancora EB; dunque GB f misurerà il tutto AB. Mà, per quel, che s'è dimostrato, GB misura tutto il numero CD; perciò l'auanzo GB sarà commune misura de i due proposti numeri AB, CD; per la qual cosa i numeri AB, CD e sono frà di loro composti, ch'è contro all'ipotesi; mentre furono supposti frà di loro primi. Non dunque alcun' auanzo, prima, che si peruenza all'unità, misura il numero antecedente, ch'era da dimostrarsi.

a 11. assioma del 7.
b 1a. assioma del 7.
c 1. assioma del 7.
d 10. assioma del 7.
e 11. assioma del 7.
f 10. assioma del 7.

g 14. defin. del 7.

Il P. Clauio aggiunge la seguente dimostrazione.

Se di due proposti numeri frà di loro composti, si detrae sempre quanto si può il minore dal maggiore con reciproca detrazione; la detrazione non peruerà sino all'unità, ma peruerà à tale auanzo, che misurerà il numero precedentemente detratto.

Perche se la detrazione peruiene sino all'unità; cioè se l'ultimo auanzo sarà l'unità, per la prima proposizione di questo, i numeri proposti saranno frà di loro primi, ch'è contro all'ipotesi: non dunque la detrazione peruiene all'unità, mà si peruiene à tale auanzo, che misura il numero precedentemente detratto, ch'era da dimostrarsi.

PROBLEMA I. PROPOSITIONE II.

Dati due numeri non primi frà loro, ritrouare la loro massima commune misura.

Siano i due dati numeri, non primi frà loro AB, CD, e si voglia ritrouare la loro massima commune misura. Dal maggiore A B se ne detratta quanto si può il minore CD, e qualche resta sia EB; sarà EB mi-

nore

m 7. del 7.

a 11. affom.
del 9.b 10. affom.
del 7.c 11. affom.
del 7.
d 10. affom.
del 7.e 11. affom.
del 7.f 12. affom.
del 7.g 11. affom.
del 7.h 12. affom.
del 7.

nore di CD. Similmente dal numero CD se ne detragga quanto si può il numero EB, e quel che resta sia FD: e continuandosi questa reciproca detrazione, col sottrarre sempre il minore dal maggiore fin à tanto, che si pervenga ad vn auanzo, che misuri il numero antecedente; non potendosi peruenire all'vnità, stante che se l'ultimo auanzo fosse l'vnità, i numeri AB, CD ^m farebbero frà di loro primi, ch'è contro all'ipotesi. Sia dunque FD quell'auanzo, che misura l'antecedente numero EB. Dico che FD sarà la massima comune misura d'ambidue i proposti numeri AB, CD. Perche FD misura il numero EB, e per costruzione il numero EB misura CF; il numero dunque FD ^a misurerà CF: ma FD misura se medesimo, perciò FD ^b misura il tutto CD. In oltre il numero FD, per quel che si è dimostrato, misura il numero CD; il numero CD per costruzione, misura AE; il numero dunque FD ^c misura AE: ma per ipotesi FD misura EB; perciò il numero FD ^d misura il tutto AB. Fù dimostrato, ch'il medesimo numero FD misura il tutto CD, in conseguenza FD sarà comune misura d'ambidue i numeri AB, CD.

A E B
C F D
G —

Dico finalmente che FD è la massima comune misura de' medesimi numeri AB, CD. Perche se FD non è la massima comune misura, qualche altro numero sarà massima comune misura de' due AB, CD. Sia s'è possibile il numero G commune misura de' i numeri AB, CD, e sia, maggiore di FD. Perche G è commune misura de' i due AB, CD, perciò G misurerà CD: ma CD per costruzione misura AE, il numero G ^e dunque misurerà AE; si disse che G misura il tutto AB, in conseguenza G ^f misurerà il rimanente EB. Di più, perche G misura EB, ed il numero EB misura CF, il numero G ^g misurerà, ancora CF; ma G, per suppositione, misura tutta CD; misurerà ^h similmente l'auanzo FD. Fù supposto il numero G maggiore di FD, il maggiore dunque, cioè G, misura il minore FD, ch'è impossibile. Non dunque è maggiore di FD: per la qual cosa FD sarà la massima comune misura de' i numeri AB, CD, ch'era da dimostrarsi.

Se poi detraendo quanto si può il minor numero CD dal maggiore AB, non auanzasse cos'alcuna, all'ora CD sarà la massima comune misura de' i due AB, CD, stante che CD, misurando AB, misurerebbe ancora se medesimo, ch'è quanto si doueva dimostrare.

A B
C D

C O R O L L A R I O

Da quel che s'è detto, è manifesto, che se vn numero misura due altri numeri, misurerà ancora la massima comune misura di quelli.

Nella dimostrazione antecedente supponendo G commune misura de' i due AB, CD, fù dimostrato, ch'il medesimo numero G misura la parte FD; se

dunque

dunque FD sarà la massima comune misura de i due AB , CD ; sarà manifesto, che G , essendo comune misura de i due AB , CD , misurerà ancora la loro massima comune misura FD , come si disse.

PROBLEMA II. PROPOSITIONE III.

Dati tre numeri non primi frà di loro, ritrouare la loro massima comune misura.

Siano dati i tre numeri A, B, C , non primi frà di loro, e si voglia ritrouare la loro massima comune misura. Si troui prima ^a la massima comune misura de i due A , & B , che sia D . Se il numero D misura C , sarà D la massima comune misura de i tre dati numeri A, B, C : perche se non fosse D la massima, che misura i tre A, B, C , farebbe qualche altro numero maggiore di D , che sia per esempio H . Perche D , per costruzione, è massima comune misura de i due A , & B , ed il numero H misura i due A , & B , per l'antecedente Corollario, il numero H misurerà ancora la massima

H.....
A.....
B..... D....
C..... E.. F—

comune misura D ; dalche il numero maggiore misurerebbe il minore, ch'è impossibile; non dunque altro numero maggiore di D è massima comune misura de i tre A, B, C ; ma la massima comune misura sarà il numero D , come si disse. Di nuouo supposto ch'il numero D non misuri il numero C . Perche i tre A, B, C , peripotesi, sono numeri composti; per la 14. definizione di questo, haueranno vna comune misura, la quale, se è comune misura di tutti tre i numeri A, B, C , sarà ancora comune misura de i due A, B ; e per il Corollario antecedente, quello, che misura i due A, B , misurerà ancora la loro massima misura comune D : dal che quello, che misura i tre A, B, C , misura ancora il numero D ; e perciò i due C , & D , sono numeri composti; si troui dunque ^b la massima comune misura de i due C , & D , che sia E . Dico che il numero E è massima comune misura de i tre dati numeri A, B, C . Perche il numero E misura i due C , & D ; ed il numero D misura i due A , & B ; il numero E misurerà i due A , & B : ma per costruzione misura ancora C ; dunque sarà E comune misura de i tre A, B, C . Dico finalmente, che non solo il numero E è comune misura de i tre A, B, C ; ma che è la massima comune misura de i tre A, B, C . Se il numero E non è la massima comune misura, qualche altro numero maggiore di E sarà massima comune misura de i tre A, B, C , sia quello s'è possibile il notato F . Perche F misura i due A , & B , per il Corollario antecedente, misurerà ancora la loro massima comune misura D : ma il numero F , per la supposizione fatta, misura C , perciò F sarà misura comune de i due C , & D ; e per il Corollario antecedente, F misurerà la loro massima comune misura E : per la qual cosa il numero maggiore F misura il numero minore E , ch'è impossibile. Non dunque altro numero maggiore di E è massima comune misura de i tre A, B, C ; ma la loro massima comune misura sarà il numero E ; ch'era da farsi, e dimostrarsi.

a 2. del 7.

b 14. defin.
del 7.
c 2. del 7.

d 11. assom.
del 7.

CO-

COROLLARIO.

Quindi appare, che se vn numero misura tre numeri, misurerà ancora la massima commune misura di quei tre numeri.

Si è dimostrato nell'ultima parte dell'antecedente proposizione, che se F misura i tre A, B, C, misurerà ancora il numero E: ma s'è dimostrato, che il numero E è la massima commune misura de i tre A, B, C; quel numero dunque, che misura i tre A, B, C, misurerà ancora la loro massima commune misura, come si disse.

Col medesimo ordine si può trouare la massima commune misura di più di tre numeri frà di loro non primi: cioè, se saranno quattro numeri, si troua prima la massima commune misura à tre di quelli, come antedecedentemente si è fatto; se poi si troui la commune misura frà vno di quei tre, ed il quarto, quella sarà la massima commune misura di tutti quattro. Se i numeri saranno cinque, si troua prima la massima commune misura di quattro di quelli, e poi si troui la massima commune misura di vno di quei quattro, e del quinto; quella sarà la massima commune misura di tutti cinque. E con quest'ordine si procederà se saranno più di cinque; e sempre quel numero, che misura tutti i numeri, misurerà ancora la loro massima commune misura, come s'è detto nell'antecedente Corollario: poiche la medesima dimostrazione fatta, quando sono tre soli numeri, si può fare quando sono più di tre.

THEOREMA II. PROPOSITIONE IV.

Ogni numero ò è parte, ò è parti d'ogn'altro numero maggiore.

Siano due numeri come A, & B; e sia il numero A minore del numero B. Dico che il numero A ò è parte del numero B, ouero è tante parti del numero B. Siano prima i numeri A, & B frà di loro primi. Perche qualunque vnità del numero A è parte del numero B, conterrà il numero A tante parti di B, per quante vnità sono nel medesimo numero A; per la qual cosa il numero A sarà parti di B, che era da dimostrarsi nel primo luogo.

In oltre non siano A, & B numeri primi; se il numero A misura il numero B, per la terza definizione di questo, sarà A parte di B. Finalmente non sia A parte di B: perche A, & B, per suppositione non sono numeri primi, si troui, per la prima proposizione di questo, la loro commune misura, che sia C. Perche C misura A, perciò A si può diuidere nelle parti vguali à C; si diuida dunque il numero A nelle parti vguali à C, che siano AD, DE, EF. Perche C misura il numero B, ed AD è vguale al numero C; perciò AD

misu-

misurerà il numero B, e per la terza definizione, AD farà parte di B. Nell'istesso modo si dimostrerà, che DE è parte di B, e che EF è parte del medesimo numero B; e perciò i numeri AD, DE, EF saranno tante parti di B, per quante volte C misura AF. Per la qual cosa ogni numero ò è parte, ouero è parti d'ogn'altro numero maggiore, che era da dimostrarsi.

THEOREMA III. PROPOSITIONE V.

Se vn numero è parte d'un numero, ed vn altro numero è la medesima parte d'un altro; i due, che sono parte, giunti insieme, saranno parte degli altri due, come vno è parte di vno, ò l'altro è parte dell'altro.

Sia il numero A parte di BC, come D è parte di EF. Dico che i due numeri A, & D insieme, sono parte di BC, EF insieme, come A è parte di BC, e come D è parte di EF.

Perche A è parte di BC, come D è parte di EF; tante volte A misurerà BC, per quante volte D misura EF. Si diuida il numero BC nelle parti vguagli ad A, che siano BG, GC; e si diuida il numero EF nelle parti vguagli al numero D, che siano EH, HF. Perche A è vguale à BG, ed il numero D è vguale ad EH; al numero A s'aggiunga D, ed al numero BG s'aggiunga EH: i due A, & D insieme giunti, faranno vguali à i due BG, & EH insieme. Nell'istesso modo si dimostrerà, che i due A, & D insieme, sono vguali à i due GC, HF insieme: dal che tante volte A, & D insieme, misura le due BC, EF insieme, per quante volte A misura BC, ouero D misura EF. Per la qual cosa le due A, & D insieme, sono parte de i due BC, EF insieme, come A è parte di BC, e come il numero D è parte di EF; che era da dimostrarsi.

S C O L I O.

Quel, che s'è detto nell'antecedente propos. di due soli numeri, si deue intendere ancora di più di due numeri: cioè, se quanti si voglia numeri di quanti si voglia altri numeri, ciascuno da per se, è la medesima parte del suo corrispondente, tutti insieme sono tal parte di tutti gli altri insieme, come vno è parte di vno. E la dimostrazione è la medesima, che si è fatta antecedentemente.

Qui si può ancora dimostrare che se quanti numeri si vogliano sono vguali multipli di altrettanti numeri, tutti insieme saranno multipli di tutti insieme, come vno è multiplice di vno.

Siano i numeri A , & C uguali multipli de i numeri B , & D . Dico che A è multiplice di B , ouero C è multiplice di D , come i A C
 numeri A & C , insieme, sono multipli de' numeri B , B D
 & D insieme. Perche A è multiplice di B come C è multiplice di D ; tante volte B misura il numero A , per quante volte D misura il numero C ; dal che B è parte di A come D è parte di C ; e per l'antecedente proposizione B , & D insieme sono parti di A & C insieme, come B è parte di A , e come D è parte di C ; per la qual cosa B , & D insieme, misura A , & C insieme, tante volte, per quante volte B misura A ; ouero D misura C ; e perciò A , & C insieme, è multiplice di B , & D insieme, come A è multiplice di B , e come C è multiplice di D , che era da dimostrarsi.

THEOREMA IV. PROPOSITIONE VI.

Se due, ò più numeri, sono vguualmente parti di altrettanti numeri; tutti saranno parti di tutti, come vno è parti di vno.

Sia il numero AB tale parti del numero C , quale parti è DE del numero F . Dico che AB , DE insieme, sono tali parti di C , ed F insieme, quali parti è AB di C ; e quali parti è DE di F . Perche AB è tante $A \dots G \dots B$ $D \dots H \dots E$ parti di C , per quante parti è DE $C \dots \dots \dots F \dots \dots \dots$ di F ; saranno in $A B$ tante parti di C , per quante in DE sono parti di F . Si diuida AB nelle parti di C , e siano AG, GB ; cioè AG sia parte di C , ed anco GB sia parte di C . Similmente si diuida DE nelle parti di F , che siano DH, HE , cioè, che DH sia parte di F , ed anco HE sia parte di F ; la moltitudine delle parti in AB sarà vguale alla moltitudine delle parti in DE . E perche AB è tale parti di C , quale parti è DE di F ; ogn'vna delle parti in AB sarà parte di C , come ogn'vna delle parti in DE è parte di F : dal che AG è parte di C , come DH è parte di F : donde le due insieme AG, DH , saranno parte delle due insieme C , ed F , come AG è parte di C , ouero DH è parte di F . Nell'istesso modo si prouerà, che li due insieme GB, HE sono parte delli due insieme C , ed F , come GB è parte di C , ouero HE è parte di F ; e perciò AB, DE insieme, sono parti di C , ed F insieme, come AB è parti di C , ouero DE è parti di F . L'istesso si dimostrerà se i numeri saranno più di due. Per la qual cosa se due, ò più numeri, sono vguali parti di altrettanti numeri, tutti sono parti di tutti, come vno è parti di vno, che era da dimostrarsi.

THEOREMA V. PROPOSITIONE VII.

Se vn numero è parte d'vn altro numero, come il numero detratto dall'vno è parte del numero detratto dall'al-

tro; il rimanente sarà parte del rimanente, come tutto è parte di tutto;

Sia il numero AB parte di CD come AE è parte di CF. Dico che il rimanente numero EB è parte del rimanente FD, come tutto il numero AB è parte di tutto il numero CD. Si

concepisca il numero CG in modo, che
 EB sia parte di CG, come AE è parte di CF; cioè come tutto il numero AB è

parte di tutto il numero CD. Perché EB è parte di CG, come AE è parte di CF; farà tutto AB ^a parte di tutto GF, come AE è parte di CF; cioè come tutto AB è parte di CD: e perciò sarà il medesimo numero AB tale

parte di GF, quale parte è di CD; per la qual cosa ^b i numeri GF, CD sono frà di loro vguali: se ne leui il comune CF, resta GC vguale ad FD; preso EB come terza quantità, farà EB tale parte di FD, quale è di CG:

ma EB, per costruzione, è parte di CG, come tutto AB è parte di tutto CD; farà il rimanente numero EB, parte del rimanente numero FD, come tutto AB è parte di tutto CD, che era da dimostrarsi.

THEOREMA VI. PROPOSITIONE VIII.

Se vn numero è tante parti d'vn altro numero, per quante parti è il numero detratto dall'vno del numero detratto dall'altro; il rimanente sarà tante parti del rimanente, per quante parti è tutto di tutto.

Sia il numero AB tante parti di CD, per quante parti è il numero AE del numero CF. Dico che il rimanente EB sarà tante parti del rimanente FD, per quante parti è tutto il

numero AB di tutto il numero CD. Si concepisca il numero CG in modo, che EB sia tante

parti di CG, per quante parti è il numero AE di CF; farà tutto il numero AB tante parti di GF, ^a per quante parti è AE di CF: ma, per ipotesi, AE è tante parti di CF, per quante parti è AB di CD; farà AB tante

parti di GF, per quante parti è il medesimo numero AB di CD: per la qual cosa i numeri GF, CD ^b sono frà di loro vguali; se ne leui il comune CF, resta GC vguale ad FD; dal che tante parti è il numero EB di

FD, per quante parti è il medesimo numero EB di GC: ma, per costruzione, EB è tante parti di CG, per quante parti è AE di CF; farà EB tante parti di FD, per quante parti è AE di CF; cioè per quante parti è tutto il numero AB di tutto il numero CD, come fu proposto dimostrare.

THEOREMA VII. PROPOSITIONE IX.

Se vn numero è parte d'vn numero, come vn altro nu-

cioè sarà AG tale parte di C, quale parte è DH di F; e permutando, sarà AG a tale parte, ò parti, di DH, quale parte, ò parti è il numero C del numero F. Nell'istesso modo si prouerà, che tale parte, ò parti è GB di HE, quale parte, ò parti, è C di F. Per la qual cosa tale parte, ò parti è AG di DH, quale parte, ò parti è GB di HE; e perciò tutto AB sarà tale parte, ò parti di tutta DE, quale parte, ò parti è AG di DH. Ma quale parte, ò parti è AG di DH, per quel che si è dimostrato, tale parte, ò parti è C di F; quale parte, ò parti dunque è il numero AB del numero DE, tale parte, ò parti sarà C di F, che era da dimostrarsi.

S A C O L I O.

Prima di passare in altro, stimo bene dimostrare ne i numeri quella medesima passione, che fu dimostrata nel Corollario alla quarta proposizione del quinto Libro.

Se di quattro numeri la proportionione del primo al secondo è come quella del terzo al quarto; inuertendo, il secondo al primo hauerà l'istessa proportionione, che il quarto al terzo.

Siano i quattro numeri A, B, C, D, ed habbia il primo A al secondo B l'istessa proportionione, quale hà il terzo C al quarto D. Dico che, inuertendo, B ad A sarà come D à C. Supposto prima, che A, & C siano minori di B & D. Perche A à B, A..... C..... per ipotesi, è come C à D; sarà A a parte, ò B, ... D..... parti di B, come C è parte, ò parti di D: se A è parte di B, come C è parte di D; sarà B multiplice di A, come D, è multiplice di C; e perciò B ad A, sarà come D à C. Se A è parti di B, come C è parti di D; all'hora B, & D conterranno ugualmente i numeri A, & C; e di più conterranno la medesima parte, ò le medesime parti di A, & C; e per la 20. definitione di questo B ad A sarà come D à C.

Di nouo siano li due A, & C maggiori de i due B, & D. Perche A à B, è come C à D, i due A, & C saranno ò uguali multiplici de i due B, & D; ouero conterranno ugualmente i due B, & D, e di sopra più la medesima parte, ò le medesime parti di B, & D. Se A, & C sono uguali multiplici di B, & D, sarà B parte di A, come D è parte di C: dalche B ad A sarà come D à C. Se poi li due A, & C contengono ugualmente li due B, & D, e di sopra più la medesima parte, ò le medesime parti di B, & D; sarà B parti di A, come D è parti di C. Per la qual cosa B ad A sarà come D à C, come fu proposto dimostrare.

THEOREMA IX. PROPOSITIONE XI.

Se tutto vn numero à tutto vn altro numero è come la parte detratta dall'vno alla parte detratta dall'altro, il rimanente al rimanente farà come il tutto al tutto.

Sia tutto il numero AB à tutto il numero CD, come la parte AE alla parte CF. Dico che l'auanzo EB all'auanzo FD, è come tutto il numero AB à tutto il numero CD. Sia prima AB minore di CD. Perche AB à CD è come AE à CF; farà AB ^a parte, ^a parti di CD, come AE è parte, ^a parti di CF; dal che il rimanente EB, ^b farà parte, ^b parti, del rimanente FD, come tutto AB è parte, ^c parti di tutto CD; e perciò EB ad FD ^c farà come AB à CD.

In oltre sia AB maggiore di CD: perche AB à CD, per ipotesi, è come AE à CF, inuertendo, CD ad AB ^a farà come CF ad AE; e farà CD parte, ^a parti di AB, e come CF è parte, ^a parti di AE; dache il rimanente FD ^c farà parte, ^c parti di EB, come CD è parte, ^c parti di AB; e perciò FD ad EB ^c farà come CD ad AB; ed inuertendo, EB ad FD ^b farà come AB à CD, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA X. PROPOSITIONE XII.

Se quanti si voglia numeri sono proportionali; farà vno antecedente ad vn conseguente, come tutti gl'antecedenti insieme à tutti li conseguenti insieme.

Siano quanti si voglia numeri proportionali A, B, C, D, E, F; cioè sia A à B come C à D, e come E ad F. Dico che tutti gli antecedenti A, C, E, insieme à tutti i conseguenti B, D, F, insieme, sono come l'antecedente A al conseguente B; ouero come C à D, o pure come E ad F. Siano prima i numeri A, C, E minori de i numeri B, D, F. Perche A à B, per ipotesi, è come C à D, farà A ^a parte, ^a parti di B, come C è parte, ^a parti di D; e perciò i due insieme A, & C ^b faranno parte, ^b parti de i due B, D insieme, come A è parte, ^c parti di B, come E è parte, ^c parti di F; similmente perche A à B è come E ad F, farà A ^c parte, ^c parti di B, come E è parte ^c parti di F; ma per quel, che si è dimostrato A è parte, ^a parti di B, come A, C, è parte, ^a parti di B, D; farà A, C parte, ^a parti di B, D, come E è parte, ^c parti di F; dache A, C, E insieme, faranno parte, ^a parti di B, D, F insieme, come A, C, insieme, sono parte, ^a parti di B, D, insieme; cioè, come A è

parte,

parte, ò parti di B. Per la qual cosa la proportionè di A, C, E, insieme, à B, D, F insieme, sarà come A à B.

Di nuouo siano i numeri A, C, E A C E
maggiore de i numeri B, D, F. B D .. F...

che A à B è come C à D, sarà, inuertendo, B ad A, ^f come D à C; e sarà B ^g parte, ò parti di A, come D è parte, ò parti di C. Similmente, perche A à B è come E ad F, inuertendo, B ad A ^h sarà come F ad E; e sarà B parte, ò parti di A, ^k come F è parte, ò parti di E: ma per quel che si è dimostrato, B è parte, ò parti di A, come D è parte, ò parti di C; sarà F parte, ò parti di E, come D è parte, ò parti di C. Per la qual cosa i numeri B, D, F sono vgualemente parte, ò parti de i numeri A, C, E; e per quel che si è dimostrato nel principio, i numeri B, D, F, insieme, à i numeri A, C, E, insieme, sono come il numero B al numero A; ed inuertendo, i numeri A, C, E, insieme, à i numeri B, D, F, insieme, sono come A à B, ch'era da dimostrarli.

S C O L I O.

Qui facilmente, con modo simile à quell' tenuto nell' antecedente propositione si può prouare quel, che dimostra Euclide nell' undecima propositione del quinto Libro; cioè.

Ne i numeri le proportioni; che sono le medesime ad vna terza, sono le medesime frà di loro.

Habbia il numero A al numero B l'istessa proportionè, che il numero C al numero D; e sia E ad F come C à D. Dico che la proportionè di A à B è l'istessa, che quella di E ad F. Siano prima le tre A, C, E minori de i tre B, A C E
D, F. Perche C à D è come A à B; B D F
e similmente C à D è come E ad F;

sarà C parte, ò parti di D, ^a come A è parte, ò parti di B; e come E è parte, ò parti di F; dalche A è parte, ò parti di B, come E è parte, ò parti di F; e perciò A à B ^b sarà come E ad F. Di nuouo siano le tre A, C, E, maggiori delle tre B, D, F. Perche C à D, e come A à B, sarà, inuertendo, D à A C E
C è come B ad A; e similmente D à C B D .. F
sarà come F ad E; e per quel, che si è dimostrato, B ad A sarà come F ad E; ed inuertendo, A à B ^d sarà, come E ad F, ch'era da dimostrarli.

THEOREMA XI. PROPOSITIONE XIII.

et. Se quattro numeri sono proportionali, permutandosi faranno ancora proportionali.

- Siano i quattro numeri A, B, C, D, proportionali; e sia il numero A al

nume-

e 20. defin.
del 7.

f Scol. alla
prop. 10. del
7.

g 20. defin.
del 7.

h Scol. alla
prop. 10. del
7.

k 20. defin.
del 7.

l 5. e 6. del
7.

m Scol. alla
prop. 10. del
7.

a 20. defin.
del 7.

b 20. defin.
del 7.

c Scol. alla
20. prop. del
7.

d Scol. alla
20. prop. del
7.

numero B, come C à D. Dico che, permutandosi, A à C sarà come B à D. Siano prima A, & C minori de i due B, & D; e sia A minore di C, come nella prima figura, Perche A à B è come C à D, farà A^a B.... C.....
 parte, o parti di B, come C è parte, o parti di D; e permutando, il numero A^b farà parte, o parti di C, come B è parte, o parti di D; e perciò A à C farà come B à D. Di nuouo siano A, & C minori de' numeri B, & D, e sia A maggiore di C, come nella seconda figura. Perche A à B è come C à D, farà A^c parte, o parti di B, come C è parte, o parti di D; cioè C farà parte, o parti di D, B..... D....
 come A è parte, o parti di B: e permutando, C^d farà parte o parti di A, come D è parte, o parti di B: per la qual cosa C ad A^e farà come D à B; ed inuertendo, A à C^f farà come B à D. In oltre siano A, & C maggiori di B, & D, e sia A minore di C. Perche A à B è come C à D, inuertendo B ad A^g sarà come D à C; donde B^h sarà tale parte, A.... C.....
 o parti di A, quale è D di C; e permutando, B.... D.....
 Bⁱ sarà parte, o parti di D, come A è parte, o parti di C; cioè A è parte, o parti di C, come B è parte, o parti di D; e perciò la proportionione di A à C^j sarà come quella di B à D. Siano poi li due A, & C maggiori de i due B, & D; e sia A maggiore di C. Perche C à D, per ipotesi, è come A à B; inuertendo, D à C^k sarà B..... D....
 come B ad A; dalche D farà parte, o parti di C, come B è parte, o parti di A; e permutando, D^l farà parte, o parti di B, come C è parte, o parti di A: cioè C è parte, o parti di A, come D è parte, o parti di B; e perciò C ad A^m sarà come D à B; ed inuertendo, A à Cⁿ sarà come B à D.
 Di più se A è vguale à B, ed il numero C A.... C.....
 vguale à D, ed A sia minore di C, farà A B.... D.....
 parte, o parti di C, come B è parte, o parti di D; e perciò A à C^o farà come B à D. Finalmente sia A vguale à B, ed il numero C vguale à D, e sia A maggiore di C; farà C parte, o parti di A, come D A..... C....
 è parte, o parti di B; dalche la proportionione di C ad A^p, q^r sarà come quella di D à B; ed inuertendo, A à C^s farà come B à D, ch'era da dimostrarfi.

THEOREMA XII. PROPOSITIONE XIV.

Se siano quanti numeri si vogliano da vna parte, ed altrettanti d'vguale moltitudine da vn'altra parte, e siano proportionali à due à due; per l'egualità, il primo all'ultimo è come il primo all'ultimo.

Siano quanti numeri si vogliano A, B, C, da vna parte, & altrettanti, co-

me

me D, E, F, da vn altra parte, e sia A à B, come D ad E, e B à C, come E ad F. Dico che per l'egualità, A à C sarà come D ad F. Perche A à B, per ipotesi, è come D ad E,

permutando, A à D^a sarà come B ad E. Similmente, essendo B à C come E ad F; sarà, permutando, B ad E come C ad F: ma B ad E è come A à D, sarà A ad D^c come C ad F; e permutando, A à C^d sarà come D ad F.

Se i numeri proposti saranno più di tre per parte, e sia C à G come F ad H: perche A à C è come D ad F, e C à G è come F ad H, per quel che si è dimostrato, A à G sarà come D ad H. Ed il medesimo si dimostrerà se i numeri proposti saranno più di quattro per parte, il che era da dimostrarsi.

A	D
B	E
C	F
G	H

a 13. del 7.

b 13. del 7.

c Scol. alla
13. proposi-
del 7.
d 13. del 7.

THEOREMA XIII. PROPOSITIONE XV.

Se l'vnità misura vn numero, ed vn terzo numero misura vgualeme^{te} vn altro numero; permutandosi, l'vnità misurerà il terzo numero, come il secondo misura il quarto.

Misuri l'vnità A il numero BC, come il numero D misura il numero EF. Dico che permutandosi, l'vnità A misurerà il numero D, come il numero BC misura il numero EF. Si diuidi B C nelle vnità BG, GH, HC; e si diuidi EF nelle parti vguale al numero D, che siano EI, IK, KF. Perche l'vnità A misura BC, come il numero D misura EF, la moltitudine delle vnità in BC sarà vguale alla moltitudine delle parti in EF: e perche il numero D è vguale ad EI, l'vnità A misurerà il numero D come l'vnità B G misura il numero EI. Nell'istesso modo l'vnità A misura il numero D, come l'vnità G H misura il numero IK; e come l'vnità HC misura il numero KF; e perciò il numero BC misura il numero EF, come l'vnità BG misura l'vnità EI, cioè come l'vnità A misura il numero D; il che era da dimostrarsi.

THEOREMA XIV. PROPOSITIONE XVI.

Se due numeri si moltiplicano scambievolmente, i prodotti sono frà di loro vguale.

Siano due qualunque numeri A, & B, e, moltiplicando il numero A per il numero B, il prodotto sia il numero D; similmente moltiplicando il numero B per il numero A, il prodotto sia il numero C. Dico che i prodotti D, & C, sono frà di loro vguale. Si esponga l'vnità E. Perche moltiplicando il numero A

A ...	E.	B
D		C

Vu

per

a 15. defin.
del 7.

per il numero B il prodotto è il numero D, sarà D composto di tante volte A, ^a per quante vnità sono in B; e perciò

A misura il numero D, come l'vnità E misura il numero B; cioè, l'vnità E misura il numero A... B....
B, come il numero A misura il numero D; e D..... C.....

b 15. del 7.

permutandosi, l'vnità E misura il numero A, b come il numero B misura il numero D. In oltre, perche, moltiplicando il numero B per il numero A, si

c 15. defin.
del 7.

produce il numero C, il prodotto C c sarà composto di tante volte il numero B, per quante vnità sono nel numero A; e perciò l'vnità E misurerà tante volte il numero A, come il numero B misura il numero C: ma si disse, che l'vnità E misura il numero A, come il numero B misura il numero D; il numero dunque B misura vguualmente i numeri D, & C; e perciò i prodotti D, & C d sono frà di loro vguali, ch'era da dimostrarsi.

d 4. assioma
del 7.

THEOREMA XV. PROPOSITIONE XVII.

Se vn numero, moltiplicando due numeri, produce due altri numeri; i prodotti sono frà di loro come i numeri moltiplicati.

Sia il numero A, il quale, moltiplicando il numero B, produca il numero D; e moltiplicando il numero C, produca il numero E. Dico che il prodotto D al prodotto E, è come il numero moltiplicato B al numero moltiplicato C. Si prenda l'vnità F, sarà il prodotto D composto di tante volte il numero B, ^a per quante volte l'vnità F misura

a 15. defin.
del 7.

il numero A; ed il prodotto E sarà composto di tante volte il numero C, b per quante volte l'vnità F misura il numero A: per la qual cosa il numero B misura il numero D, come l'vnità F misura il numero A; ed il numero C misura tante volte il numero E, per quante volte l'vnità F misura il numero A; e perciò il numero B misura il numero D, come il numero C misura il numero E: dal che la proporzione di B à D c sarà come quella di C ad E; e permutando, il numero moltiplicato B al numero moltiplicato C, d sarà come il prodotto D al prodotto E, che era da dimostrarsi.

b 15. defin.
del 7.e 30. defin.
del 7.
d 13. del 7.

THEOREMA XVI. PROPOSITIONE XVIII.

Se due numeri, moltiplicando vn medesimo numero, producono due altri numeri; i prodotti sono frà di loro come i moltiplicanti.

Siano i numeri A, & B; ed il numero A, moltiplicando il numero C, produca il numero D; come ancora il numero B, moltiplicando il medesimo

fimo

finio numero C, produca il numero E. Dico che il prodotto D al prodotto E sarà come A.... B..... il moltiplicante A al moltiplicante B. Perché il prodotto del numero A nel numero D E C è vguale al prodotto del numero C nel numero A; ed il prodotto del numero A nel numero C, per ipotesi, è il numero D; moltiplicando dunque C il numero A, produrrà il numero D: e per l'istessa ragione C moltiplicando il numero B, produrrà il numero E; dal che i numeri A, & B, che prima erano moltiplicanti, à questa seconda esposizione, vengono ad essere numeri moltiplicati; e per l'antecedente proposizione, il prodotto D al prodotto E sarà come il numero A al numero B, ch'era da dimostrarsi.

a 16. del 7.

THEOREMA XVII. PROPOSITIONE XIX.

Se quattro numeri sono proportionali, il prodotto, fatto dalla multiplicatione de gli estremi, è vguale al prodotto fatto dalla multiplicatione de i medij: e se il prodotto fatto dalla multiplicatione degli estremi è vguale al prodotto de i medij; i quattro numeri sono proportionali.

Siano i quattro numeri proportionali A, B, C, D; e sia A à B come C à D. S'intenda moltiplicato il primo A per il quarto D, ed il prodotto sia E. Similmente s'intenda moltiplicato il secondo B per il terzo C, ed il prodotto sia F. Dico che i prodotti E, ed F, sono frà di loro vguali. E per dimostrarlo, si moltiplichino il numero A per il numero C, ed il prodotto sia G. Perché i numeri C, & D sono moltiplicati dal numero A, ed i prodotti sono E, & G; sarà il prodotto E al prodotto G come C à D: ma C à D, per ipotesi, è come A à B; sarà E à G come A à B. In oltre perché i numeri A, & B, moltiplicando il numero C, producono i numeri E, & G; sarà il prodotto F al prodotto G, come A à B: ma fu dimostrato E à G essere come A à B; sarà E à G come F al medesimo numero G: dal che E, ed F, sono vguali multipli di G, ò vgualmente parte, ò le medesime parti &c. di G; e perciò sono frà di loro vguali, il che era da dimostrarsi nel primo luogo.

Di nuovo sia E il prodotto fatto dalla multiplicatione del primo A nel quarto D; ed F sia il prodotto del secondo B nel terzo C; e supposto il prodotto E vguale al prodotto F. Dico che A à B è come C à D. Si moltiplichino di nuovo il numero A nel numero C, ed il prodotto sia G. Perché i numeri C, & D, moltiplicati per il numero A, producono i numeri E, & G; sarà C à D come E à G. Similmente perché i numeri A, & B, moltiplicando il numero C, producono i numeri F, & G; sarà A à B come

a 17. del 7.

b Scol. alla 12. del 7.

c 18. del 7.

d Scol. alla 12. del 7.

e 20. defia. del 7.

f 17. del 7.

g 18. del 7.

F à G. In oltre perche i prodotti E, ed F, sono fra di loro vguali, perciò G come terza quantità, gli vguali numeri E, ed F faranno, ò vgualmente multipli del numero G, ò vgualmente parte, ò le medesime parti, ouero conterranno vgualmente G in qualche parte, ò parti di G; e per la 20. definizione di questo, sarà E à G come F à G: ma F à G, per quel che si è dimostrato, è come A à B; e la proportion di E à G è come C à D; sarà A à B come C à D, il che era da dimostrarsi.

h Scol. alla
12. del 7.

A...
B..
C....
D....
E.....
F.....
G.....

THEOREMA XVIII. PROPOSITIONE XX.

Se tre numeri sono proportionali, quello, che si produce dagli estremi, è vguale à quello, che si produce dal medio, multiplicato in se medesimo; e se quello, che si produce dagli estremi, è vguale à quello, che si produce dal medio, i tre proposti numeri sono proportionali.

Siano i tre numeri proportionali A, B, C; e sia A à B come B à C. Dico prima che il prodotto fatto da gli estremi A, & C, è vguale al prodotto di B in se medesimo; cioè vguale al quadrato di B. Sia esposto il numero D vguale al numero B, sarà D à C, come B al medesimo numero C: ma B à C, per ipotesi, è come A à B; sarà A à B^a come D à C; e per l'antecedente propositione, il prodotto fatto dalla multiplicatione de gli estremi A, & C, è vguale al prodotto de i medij B, & D: ma il prodotto di B in D è vguale^b al prodotto di B in se medesimo; sarà il prodotto de gli estremi A, & C, vguale al prodotto di B in se medesimo, che era da dimostrarsi nel primo luogo.

a Scol. alla
12. del 7.

b 18. defin.
del 7.

A.....
B..... D.....
C....

Di nuouo sia il prodotto fatto dalla multiplicatione de gli estremi A, & C, vguale al prodotto del medio B in se medesimo. Dico che A à B è come B à C. Si prenda di nuouo il numero D vguale al numero B; sarà il prodotto di B in D vguale al prodotto di B in se medesimo: ma il prodotto di B in se medesimo, per ipotesi, è vguale al prodotto de gli estremi A, & C; sarà il prodotto de gli estremi A, & C, vguale al prodotto de i medij B, & D: e per la seconda parte dell'antecedente propositione, sarà A à B come D à C: ma D à C è come B à C (stante che D è vguale à B) sarà A à B^d come B à C, ch'era da dimostrarsi.

c 18. defin.
del 7.

d Scol. alla
12. del 7.

THEOREMA XIX. PROPOSITIONE XXI.

Di tutti i numeri, che hanno la medesima proportion, i minimi misurano vgualmente i maggiori; cioè il minore misura il minore, ed il maggiore misura il maggiore.

Siano

Siano i numeri AB, CD minimi nella proportione di due altri maggiori, come sono i due E, ed F; cioè che AB à CD sia come E ad F; e sia AB maggiore di CD; ed ancora E sia maggiore di F.

Dico che AB misura il maggiore E, come CD misura il minore F; cioè l'antecedente misura l'antecedente, ed il conseguente misura ugualmente il conseguente. Perché

che AB à CD, per ipotesi, è come E ad F; permutando, AB ad E sarà come CD ad F: mà AB è minore di E,

ed il numero CD è minore di F; sarà AB ^b parte di E, come CD è parte di F; stante che i due AB, CD non possono essere parti de i due E, ed F;

perche, se possono esser parti de i due E, ed F, sia diuiso AB nelle parti di E, che siano AG, GB; e sia diuiso ancora CD nelle parti di F, che siano CH, HD: e perche AB ad E è come CD ad F; tale parti farebbe

AB di E, e quale parti è CD di F; e perciò la moltitudine delle parti in AB sarà vguale alla moltitudine delle parti in CD; e sarà A G tale parte di E, quale è CH di F; per la qual cosa AG ad E ^d sarà come CH ad F; e permutando, AG à CH ^e sarà come E ad F: mà, per ipotesi, AB à CD è come E ad F, sarà AG à CH ⁱ come AB, à CD: mà AB, & CD sono maggiori di AG, & CH, non saranno dunque i due AB, CD i minimi nella proportione di AB à CD; mentre nella medesima proportione farebbero i minori AC, CH, ch'è contro all'ipotesi, essendosi supposto i due AB, CD minimi nella proportione di AB, à CD. Non dunque AB è parti di E, come CD è parti F; mà AB è parte di E, come CD è parte di F; è perciò AB misura il numero E, come CD misura F, il che era da dimostrarsi.

THEOREMA XX. PROPOSITIONE XXII.

Se saranno tre numeri da vna parte, e tre altri da vn'altra parte, i quali, presi à due à due, siano nella proportione perturbata; per l'egualità, il primo all'vltimo sarà come il primo all'vltimo.

Siano i tre numeri A, B, C, da vna parte, e tre altri come D, E, F, da vn'altra parte nella perturbata proportione; cioè A à B sia come E ad F; e sia B à C come D ad E. Dico che per l'egualità, A à C è come D ad F.

Perche A à B è come E ad F, il prodotto de gli estremi A, & F, è vguale al prodotto de i medij B, ed E. Similmente perche B à C è come D ad E, il prodotto fatto da gli estremi B, ed E, è vguale al prodotto de i medij C, & D; mà il prodotto de i due B, ed E, fu dimostrato vguale al prodotto de i due A, ed F; sarà il prodotto de i due A, & F, vguale al prodotto de i due C, & D; cioè il prodotto de gli estremi A, ed F, vguale al prodotto de i medij C, & D; e perciò la proportione di A à C ^e sarà come quella di D ad F, come fu proposto dimostrare.

S C O L I O.

Qui si possono aggiungere gli altri modi d'argomentare usati da Euclide nel quinto Libro;

I.

Se quattro numeri sono proportionali, componendo, faranno ancora proportionali.

Sia il numero A al numero B , come il numero C $A \dots\dots B \dots$
 al numero D . Dico che, componendo, A, B , insieme, $C \dots\dots D \dots$
 al conseguente B , sarà come C, D , insieme, al con-
 seguente D . Perchè A à B è come C à D , permutando, A à C sarà come B à D ,
 e perciò A, B insieme, à C, D , insieme, sarà come B à D ; e permutando,
 A, B , insieme, à B, C sarà come C, D , insieme, à D , ch'era da dimostrarsi.

a 13. del 7.

b 12. del 7.

c 13. del 7.

I I.

Se quattro numeri sono proportionali, diuidendo, faranno proportionali.

Habbia A , e B insieme, à B , l'istessa pro- $A \dots\dots B \dots$
 portione, quale hà C , e D insieme, à D : Dico $C \dots\dots D \dots$
 che, diuidendo A à B , sarà come C à D .
 Perchè il numero A, B , al numero B è come il numero C, D al numero D ; e per-
 mutando, A, B , insieme, à C, D , insieme, sarà come la parte B alla parte D ; e
 perciò l'auanzo A , all'auanzo C sarà come A, B , à C, D ; ma A, B , à C, D , è co-
 me B à D ; sarà A à C come B à D ; e permutando A à B sarà come C à D ,
 come fu proposto dimostrare.

a 13. del 7.

b 11. del 7.

e Scol. alla

12. del 7.

d 13. del 7.

I I I.

Se quattro numeri sono proportionali, per la conuerfione della proportion, faranno proportionali.

Habbia il numero AB al numero B l'istessa $A \dots\dots B \dots$
 sa proportion, quale hà il numero CD al $C \dots\dots D \dots$
 numero D . Dico che, per la conuerfione della
 proportion, hauerà AB ad A l'istessa proportion, quale hà CD à C . Perchè,
 AB à B hà l'istessa proportion, quale hà CD à D , diuidendo, A à B , per l'an-
 tecedente dimostrazione, sarà come C à D ; ed inuertendo, B ad A sarà come
 D à C ; e componendo, AB ad A , per la prima delle antecedenti dimostrazioni,
 sarà come CD à C , ch'era da dimostrarsi.

e Scol. alla

10. del 7.

I V.

Se di sei numeri, il primo al secondo è come il terzo al quarto; ed il quinto al secondo è come il sesto al quarto;

il

il numero composto del primo è quinto al secondo, sarà come il numero composto del terzo, e sesto al quarto.

Sia il primo AB al secondo C , come il terzo DE al quarto F ; ed il quinto BG al secondo C , sia come il sesto EH al quarto F . Dico che AG , composto del primo è quinto, al secondo C , sarà come DH , composto del terzo, e sesto, al quarto F . Perchè BG à C è come EH ad F ; inuertendo, C à BG sarà come F ad EH . In oltre, perchè AB à C è come DE ad F ; e si è dimostrato che C à BG è come F ad EH ; per l'egualità, AB à BG sarà come D ad EH ; e componendo, AG à GB , per la prima delle antecedenti dimostrazioni, sarà come D ad HE ; ma per ipotesi BG à C è come EH ad F ; sarà, per l'egualità, AG à C , come DH ad F , ch'era da dimostrarsi.

a Scol. alla

10. del 7.

b 14. del 7.

c 14. del 7.

THEOREMA XXI. PROPOSITIONE XXIII.

Quei numeri, che sono primi frà di loro, sono i minimi di tutti gli altri, che hanno la medesima proporzione.

Siano i numeri A , & B frà di loro primi. Dico che questi sono i minimi di tutti gli altri, che sono nella proporzione di A à B . Se i numeri primi A , & B non sono i minimi nella proporzione di A à B , due altri minori di A , & B , haueranno la medesima proporzione di A à B : siano quelli i notati C , & D . Perchè C , & D sono minori di A , & B , e la proporzione di C à D è come A à B , per la 21. proposizione di questo, C misurerà A come D misura B ; cioè tante volte C misura A , per quante volte D misura B . Sia E il numero delle volte, che C misura A , sarà E il numero delle volte, che D misura B ; dal che tante volte C misura A , ed il numero D misura B , per quante vnità sono nel numero E ; per la qual cosa l'vnità misura tante volte il numero E , per quante volte C misura A ; e permutandosi, l'vnità misura il numero C , come E misura A . Nell'istesso modo si prouerà, che l'vnità misura D , come E misura B . Donde è manifesto, che il numero E misura il numero A , e misura ancora il numero B ; sì che il numero E sarà commune misura de i numeri A , & B ; e perciò i numeri A , & B non sono numeri primi, ma composti, ch'è contro all'ipotesi, mentre i numeri A , & B gli habbiamo supposti frà di loro primi. Non dunque altri numeri minori di AB possono essere nella proporzione di A à B , ed in conseguenza i numeri A , & B sono i minimi, come fu proposto dimostrare.

a 15. del 7.

b 14. defn.

del 7.

THEOREMA XXII. PROPOSITIONE XXIV.

Di tutti i numeri, che sono nella medesima proporzione, i minimi sono frà di loro primi.

Siano

Siano i numeri A, & B, i minimi di tutti quelli, che hanno la medesima proportionione di A à B. Dico che sono frà di loro primi; cioè, che nissun'altro numero gli misura, fuor che l'vnità. Se non sono frà di loro primi, qualche numero sarà loro comune misura; sia quello, se è possibile, il numero C, il quale misuri A tante volte, per quante vnità sono nel numero D; e misuri il numero B tante volte, per quante vnità sono nel numero E. Preso dunque il numero C tante volte, per quante vnità sono in D, ^a produrrà il numero A; e preso il medesimo numero C tante volte, per quante vnità sono in E, produrrà il numero B. Per la qual cosa, moltiplicando il numero C per i numeri D, ed E, i prodotti saranno A, & B; e perciò il prodotto A al prodotto B ^b sarà come il moltiplicante D al moltiplicante E: ma i numeri D, ed E sono minori de i numeri A, & B, stante che sono parti di A, & B; i numeri dunque A, & B, che sono nella proportionione di D ad E, non sono i minimi, ch'è contro all'ipotesi; mentre i numeri A, & B, gli habbiamo supposti minimi di tutti quelli, che sono nella medesima proportionione. Non dunque il numero C è misura comune de i numeri A, & B. Per la qual cosa i numeri A, & B sono frà di loro primi, come fu proposto dimostrare.

THEOREMA XXIII. PROPOSITIONE XXV.

Se due numeri sono primi frà di loro, quel numero, che misura vno di essi, farà numero primo rispetto all'altro.

Siano i numeri A, & B frà di loro primi; ed vn altro numero, come C, misuri il numero A. Dico che i numeri C, & B sono frà di loro primi. Se i numeri C, & B non sono frà di loro primi, qualche numero sarà loro comune misura; sia quello, s'è possibile, il numero D. Perche il numero D misura C, ed il numero C, per ipotesi, misura A; il numero D ^a dunque misurerà il numero A; ma per la suppositione fatta, il numero D misura il numero B; sarà il numero D comune misura de i numeri A, & B: per la qual cosa i numeri A, & B, non sono frà di loro primi, ^b ch'è contro all'ipotesi. Non dunque il numero D è comune misura de i due C, & B; ma i due C, & B sono frà di loro primi, il che era da dimostrarsi.

THEOREMA XXIV. PROPOSITIONE XXVI.

Se due numeri sono primi à qualche numero, il prodotto, fatto dalla loro moltiplicatione, sarà ancora primo al medesimo numero.

Sia ciascuno de' numeri A, & B, primo al numero C; e moltiplicando

A per

a 9. assioma

b 18. del 7.

a 11. assioma
del 7.

b 14. del 7.

A per B, ouero B per A, il prodotto sia D. Dico che i numeri D, & C sono frà di loro primi. Se i numeri D, & C non sono frà di loro primi, qualche numero sarà loro comune misura: sia quello, se è possibile, il numero E, il quale misuri il numero D tante volte, per quante vnità sono nel numero F; composto dunque tante volte il numero E, per quante vnità sono nel numero F, tal composto sarà vguale al numero D; e perciò, moltiplicando il numero E per il numero F, il prodotto sarà il numero D. Ed all'incontro, moltiplicando il numero F per il numero E, il prodotto sarà similmente il numero D; ma il numero D è il prodotto fatto dalla moltiplicatione de i due A, & B; il prodotto dunque fatto dalla moltiplicatione de i due E, & F, sarà vguale al prodotto fatto dalla moltiplicatione de i due A, & B. Posto E come prima quantità, A seconda, B terza, ed F quarta. Essendo il prodotto della prima E, e quarta F, vguale al prodotto della seconda A, e terza B; sarà E ad A come B ad F. In oltre, perche A, & C, per ipotesi, sono frà di loro primi; e per la fatta suppositione il numero E misura il numero C; i due numeri E, & A, saranno frà di loro primi; e perciò i due E, & A e nella loro proportione sono i minimi: ma E ad A è come B ad F, in conseguenza E misurerà B come A misura F. Hor perche E misura B, e per la fatta suppositione, misura ancora C; i due C, & B non sono frà di loro primi, ch'è contro all'ipotesi, mentre i due A, & B furono supposti primi al numero C. Non dunque il numero E è comune misura frà i due D, & C; ma i due D, & C sono frà di loro primi, ch'era da dimostrare.

THEOREMA XXV. PROPOSITIONE XXVII.

Se due numeri sono frà di loro primi, il prodotto fatto da vno in se medesimo, sarà primo all'altro.

Siano i due numeri A, & B frà di loro primi, e dalla moltiplicatione di A in se medesimo se ne produca il numero C. Dico che i numeri C, & B sono frà di loro primi. Si esponga il numero D vguale al numero A; i numeri D, & B saranno frà di loro primi; e per l'antedente propositione, il prodotto di D in A sarà primo al numero B: ma il prodotto di D, A, è vguale al prodotto di A in se medesimo, cioè vguale al prodotto C; sarà il prodotto C primo al numero B. Nell'istesso modo si dimostrerà, che il prodotto fatto dalla moltiplicatione di B in se medesimo è primo al numero A, come fu proposto dimostrare.

THEOREMA XXV. PROPOSITIONE XXVIII.

Se due numeri sono primi à due altri numeri, l'vno all'

X x

altros;

a 9. additione del 7.

b 16. del 7.

c 19. del 7.

d 27. del 7.

e 23. del 7.

f 21. del 7.

g 14. defin. del 7.

altro; ancora i prodotti fatti dalle loro multiplicationi sono frà di loro primi.

Siano i due numeri A, & B, i quali siano primi alli due C, & D; cioè i due A, & B, ogn'vno da per se, sia primo al numero C; ed i medesimi A, & B, separatamente siano primi al numero D; e sia E il prodotto fatto dalla multiplicatione de i due A, & B; come ancora il prodotto fatto dalla multiplicatione de i due C, & D sia F. Dico che i due prodotti E, ed F sono frà di loro primi. Perche i due A, & B, per ipotesi, sono primi al numero C; il prodotto de i due A, & B, cioè il numero E, ^a sarà primo al numero C. Similmente essendo i due A, B, primi al numero D, il prodotto de i due B, A, cioè il numero E, ^b sarà primo al numero D; donde ciascuno de i due C, D, sarà primo al numero E. Hor perche i due C, D, ogn'vno da per se, è primo al numero E, il prodotto de i due C, & D, cioè il numero F, ^c sarà primo al numero E. Per la qual cosa i due prodotti E, ed F sono frà di loro primi, come fu proposto dimostrare.

THEOREMA XXVII. PROPOSITIONE XXIX.

Se due numeri sono primi frà di loro, e ciascuno di questi si multipli in se medesimo, ed ogn'vno multipli il suo prodotto; e di nouo ogn'vno multipli il suo vltimo prodotto, e con quest'ordine in infinito: i primi due prodotti sono frà di loro primi; i secondi due prodotti sono primi frà di loro; e con quest'ordine i terzi sono frà di loro primi; e sempre gli estremi, cioè vltimi prodotti, sono primi frà di loro.

Siano i numeri A, & B frà di loro primi; e sia A 3 2 B
moltiplicato il numero A in se medesimo, ed il C 9 4 D
prodotto sia C; similmente sia moltiplicato il E 27 8 F
numero B in se medesimo, ed il prodotto sia D. G 81 16 H
Dico che i prodotti C, & D sono frà di loro primi. K 243 32 L
Di più sia moltiplicato il prodotto C dal numero A, e ne venga il numero E; e sia moltiplicato il prodotto D dal numero B, e ne venga il numero F. Dico parimente, che i prodotti E, ed F sono frà di loro primi. E finalmente, moltiplicandosi i prodotti E, & F per li numeri A, & B; cioè E si multipli per A, ed il numero F per B; e gli auuenimenti siano G, ed H; e questi moltiplicati per li medesimi numeri A, & B, ne venghino i prodotti K, ed L. Dico che i prodotti G, ed H sono frà di loro primi; come ancora i prodotti K, ed L sono primi frà di loro. Perche i due numeri A, B sono frà di loro primi, il prodotto C, fatto dalla multiplicatione di A in se medesimo ^a sarà primo all'al-

a 26. del 7.

tro

tro numero B. E considerando i due numeri C, & B frà di loro primi, il prodotto fatto del numero B, in se medesimo, cioè il numero D, ^b sarà primo al numero C; dal che i due prodotti C, & D sono frà di loro primi, ch'era prima da dimostrarsi.

Di nuovo, perche B, ed A sono frà di loro primi, il prodotto di B in se medesimo, cioè il numero D, ^c sarà primo al numero A: fu dimostrato il prodotto C essere primo al numero B; faranno i due A, & C, primi al numero B, ed ancora al numero D; e perciò i due A, & C, sono primi à i due B, & D. Per la qual cosa il prodotto de i due A, & C, ^d cioè il numero E, sarà primo al prodotto de i due B, & D, cioè al numero F, e così i due E, ed F sono frà di loro primi. In oltre perche A, & C sono primi al numero B, il prodotto de i due A, & C, cioè il numero E, ^e sarà primo al numero B; similmente perche i due B, & D sono primi al numero A; sarà il prodotto de i due B, & D, cioè il numero F, ^f primo al numero A: ma i due A, et B, per ipotesi, sono frà di loro primi, & i due E, ed F sono stati dimostrati primi frà di loro; in conseguenza i due A, ed E sono primi alli due B, ed F; ed il prodotto fatto da i due A, ed E, cioè il numero G, ^g sarà primo al prodotto fatto da i due B, ed F, cioè al numero H; donde i numeri G, ed H sono frà di loro primi. Finalmente, essendo i due A, ed E primi al numero B; il prodotto fatto da essi, cioè il numero G, ^h sarà primo al numero B. E similmente, perche i due F, & B sono primi al numero A; il prodotto de i medesimi F, & B, ^k cioè H, sarà primo al numero A: mà i numeri A, & B, per ipotesi, sono frà di loro primi; ed i numeri G, H, per quel che si è dimostrato, sono frà di loro primi; i numeri dunque A, & G sono primi à i numeri B, ed H: dal che il prodotto de i due A, & G, cioè il numero K, ⁱ sarà primo al prodotto de i due B, ed H, cioè al numero L. Il medesimo si prouerà, se le multiplicazioni ascenderanno à maggior moltitudine, il che era da dimostrarsi.

THEOREMA XXVIII. PROPOSITIONE XXX.

Se due numeri sono frà di loro primi, giunti insieme, il loro aggregato sarà primo all'vno, ed all'altro; e se l'aggregato di due numeri, giunto insieme, sarà primo ad vno di essi, quei numeri sono frà di loro primi.

Siano prima i numeri AB, BC, frà di loro primi. Dico che, giunti insieme, il loro aggregato AC sarà primo al numero AB, ed ancora al numero BC. Se i numeri AC, AB non sono frà di loro primi, qualche numero sarà loro commune misura; sia quello il numero D; il numero D dunque misura AC, e misura la parte AB; e perciò misurerà ancora l'auanzo BC; ^a si che il numero D sarà misura commune de i due AB, BC; dal che i numeri AB, BC non sono frà di loro primi, ch'è contro all'ipotesi. Non dun-

A..... B..... C
D----

b 27. del 7.

c 27. del 7.

d 28. del 7.

e 26. del 7.

f 26. del 7.

g 28. del 7.

h 26. del 7.

k 26. del 7.

l 28. del 7.

a 22. affirma
del 7.

que il numero D è commune misura de i due AC, AB; mà i due AC, AB sono frà di loro primi. Nell'istesso modo si prouerà, che i due AC, BC sono frà di loro primi, ch'era da dimostrarli nel primo luogo.

Di nououo supposto che il numero AC sia primo al numero AB, ouero BC. Dico $A \dots B \dots C$
che i numeri AB, BC sono frà di loro primi $D \text{ ---}$
mi. Se non sono fra di loro primi, qualche numero farà loro commune misura; sia dunque il numero D la loro commune misura. Perche il numero D misura ambidue i numeri AB, BC; misurerà ancora ^b il tutto AC; dal che il numero D farà commune misura de i due AC, AB; e perciò i numeri AC, AB non sono frà di loro primi, ch'è contro all'ipotesi. Non dunque il numero D è commune misura de i due AB, BC; mà i numeri AB, BC sono frà di loro primi, il che era da dimostrarli.

b po-affirm.
del 7.

COROLLARIO.

Da quel, che si è detto, ne segue, che se vn numero composto di due numeri è primo ad vno di quelli, sarà ancora primo all'altro; poiche se i due AC, AB, sono frà di loro primi, per quel che si è dimostrato nella seconda parte, saranno i due AB, BC frà di loro primi; e per quel che si è dimostrato nella prima parte, i due AC, CB sono frà di loro primi.

THEOREMA XXIX. PROPOSITIONE XXXI.

Ogni numero primo sarà primo ad ogni numero, che non misura.

Sia il numero primo A, il quale non misuri il numero B. Dico che i numeri A, & B sono frà di loro primi. Se i numeri A, & B non sono frà di loro primi, qualche numero, oltre l'vnità, farà loro commune misura; sia quello il numero C; il numero C dunque misurerà il numero B, e misurerà ancora il numero A; dal che il numero A non sarà primo; ch'è contro all'ipotesi: non dunque il numero C è commune misura delli due A & B, mà i numeri A, & B sono frà di loro primi, come fù proposto dimostrare.

THEOREMA XXX. PROPOSITIONE XXXII.

Se due numeri, multiplicandosi frà di loro, producono vn altro numero; ed vn numero primo misuri il prodotto;

quel

quel numero primo misurerà ancora vno di quei numeri moltiplicati.

Siano i due numeri A, & B, i quali, moltiplicandosi frà di loro, produchino il numero C; e supposto che il numero primo D misuri il prodotto C. Dico che il numero primo D, se non misura ambidue i numeri A, & B, almeno ne misurerà vno solo. Supposto che D non misuri il numero A, D... E,.....
i numeri A, & D, ^a saranno primi frà

di loro. In oltre misurando D il numero C, lo misurerà secondo qualche moltitudine di vnità; lo misuri, per esempio, tante volte, per quante vnità sono nel numero E; sarà il prodotto fatto dalla moltiplicatione de i due numeri D, ed E, vguale al numero C: ma il prodotto fatto da i due A, & B, per ipotesi, è il numero C; sarà il prodotto fatto da i due D, ed E, vguale al prodotto fatto da i due A, & B; dal che il primo D al secondo A ^b sarà come il terzo B al quarto E: ma i due D, ed A, ^c per quel che si disse, sono primi frà di loro, in conseguenza ^d saranno i minimi nella loro proportion di D ad A; per la qual cosa misureranno vgualemente gli altri, che sono nella proportion di D ad A: ^e ma si è dimostrato, che D ad A è come B ad E, i minimi dunque D, ed A misureranno vgualemente i numeri B, ed E; cioè l'antecedente D misura l'antecedente B, ed il conseguente A misura il conseguente E. Per la qual cosa se D non misura A, almeno misurerà il numero B, come fu proposto dimostrare.

THEOREMA XXXI. PROPOSITIONE XXXIII.

Ogni numero composto è misurato da qualche numero primo.

Sia qualunque numero composto A. Dico che il numero A è misurato da qualche numero primo. Sia dunque misurato il numero A da qualche numero B; se B è numero primo, si sarà sodisfatto à quanto si è proposto. A.....
Se poi B è numero composto, questo sarà B..... C... misurato da qualche altro numero C, il quale è sarà numero primo, ouero numero composto. Se è numero primo, perchè C misura B, ed il numero B misura A, il numero C ^a misurerà ancora il numero A; ed in tal caso il numero A sarà misurato dal numero primo C, ch'è il nostro proposto. Ma se C non è numero primo, necessariamente qualche altro numero lo misurerà; e perchè il numero non si diminuisce in infinito, si peruerà finalmente à qualche numero, che nessun altro numero lo misurerà; cioè che sarà misurato solamente dall'vnità; per la qual cosa quello sarà numero primo, il quale, perchè misura ^b tutti gl'antecedenti, misurerà ancora il numero composto A, come fu proposto dimostrare.

In altro modo. Perchè A, per ipotesi, è numero composto, perciò sarà misurato da qualche numero, ouero da più numeri. Sia il minimo

a 31. del 7.

b 30. del 7.

c 31. del 7.

d 29. del 7.

e 31. del 7.

a 11. affirma del 7.

b 11. affirma del 7.

di

e 11. assioma
del 7.

di quelli, che lo misurano, il numero B. Dico che il minimo B è numero primo. Sc B non è numero primo, lo misuri, s'è possibile, qualche numero C. Perche C misura il numero B, ed il numero B misura il numero A; il numero C misurerà ancora il numero A: ma il numero B è supposto il minimo di tutti quelli, che misurano il numero A.....
A, sarà dunque C maggiore di B, dal che il numero maggiore C misura il minore B, ch'è impossibile: non dunque il numero B è composto, ma è numero primo, come fu proposto dimostrare.

THEOREMA XXXII. PROPOSITIONE XXXIV.

Ogni numero ò è numero primo, ouero è misurato da qualche numero primo.

Figura an-
tecedente.

Sia proposto qualunque numero A. Dico che il numero A, ò è numero primo, ouero è misurato da qualche numero primo. Perche ogni numero ò è composto, ouero è numero primo; se il numero A è numero primo, il tutto sarà concluso; se poi è numero composto, per l'antecedente proposizione, qualche numero primo lo misura; e perciò ogni numero ò è primo, ouero è misurato da qualche numero primo, come fu proposto.

PROBLEMA III. PROPOSITIONE XXXV.

Dati quanti numeri si vogliano, ritrouare i minimi, che hanno la medesima proportionione con i dati numeri.

Siano quanti numeri si vogliano A, B, C, i quali habbiano quali si siano proportioni; cioè, ò che la proportionione di A à B sia come quella di B à C, ò le proportioni di A à B, e di B à C, non siano simili; e si vogliano ritrouare altrettanti numeri, i quali siano i minimi nelle medesime proportioni di A à B, e di B à C.

Perche i numeri A, B, C, ò sono frà di loro primi, ouero sono composti; se sono frà di loro primi; per la 24. proposizione di questo,

i medesimi A, B, C saranno i minimi nelle loro proportioni di A à B, e di B à C, ch'è il nostro proposto. Se poi non sono frà di loro primi, si troui la loro massima comune misura, che sia il numero D, la quale misuri i numeri A, B, C secondo le vnità dei numeri E, F, G. Dico che i numeri E, F, G, sono i minimi nelle proportioni di A à B, e di B à C. Perche il numero D misura i numeri A, B, C, per li numeri E, F, G, moltiplicando D, ogn'vno de' numeri E, F, G, produrrà i numeri A, B, C; e per la 18. proposizione di questo, i numeri E, F, G, haueranno le

mede-

a 3. del 7.

b 9. assioma
del 7.

medesime proportioni, che hanno i numeri A, B, C. In oltre se i numeri E, F, G non sonq i minimi, altri numeri, nelle medesime proportioni di E ad F, e di F à G, cioè di A à B, e di B à C, minori di E, F, G, faranno i minimi. Siano quelli, s'è possibile, i minimi H, I, K, i quali per la 21. proposizione di questo, misureranno vguualmente i numeri A, B, C. Gli misurino, per effempio, secondo qualche numero L, si che moltiplicando L per li numeri H, I, K, produrrà ^c i numeri A, B, C; ed all'incontro il numero L misurerà ^d i numeri A, B, C, per li numeri H, I, K. Si considerino quattro numeri, de quali il primo sia E, il secondo H, il terzo L, ed il quarto D. Perche il primo E, moltiplicando il quarto D, produce A; ed il secondo H, moltiplicando il terzo L, produce il medesimo numero A; sarà il prodotto del primo E nel quarto D, vguale al prodotto del secondo H nel terzo L: e perciò sarà il primo E al secondo H, come il terzo L al quarto D. Mà il numero E, per la fattasuppositione, è maggiore di H; il numero dunque L farà maggiore di D. Hor perche L misura i numeri A, B, C, essendo maggiore di D, non sarà D la massima comune misura de i numeri A, B, C, ch'è contro all'ipotesi: non dunque altri numeri minori de gli esposti E, F, G, sono minimi nelle proportioni di A à B, e di B à C; mà i medesimi E, F, G sono i minimi nelle proportioni di A à B, e di B à C, che era da farsi, e dimostrarsi.

c 9. assioma
del 7.
d 8. assioma
del 7.

e 19. del 7.

COROLLARIO.

Da quel, che s'è detto, è manifesto, che quanti si voglia numeri sono misurati dalla loro massima comune misura per numeri, i quali sono i minimi nella proportion de i numeri misurati; stante che si è dimostrato, che la massima comune misura D misura i numeri A, B, C, per i numeri E, F, G, i quali sono minimi nella continuata proportion de A à B, e di B à C.

S C O L I O.

Perche spesse volte bisognerà trouare due numeri minimi in una data proportion, perciò aggiungo qui il seguente problema, come fa il Commandino, ed il Clauo.

Dati quanti si voglia numeri contintamente proportionali, ritrouare due numeri minimi nella proportion de i dati numeri.

Siano i dati numeri A, B, C, D, E , in continua proporzione; cioè che A à B sia come B à C ; & B à C come C à D ; & C à D come D ad E ; e si vogliano ritrovare due numeri minimi nella proporzione di A à B . Se i numeri A , & B sono numeri primi, quelli saranno i minimi nella proporzione di A à B ; ma se non saranno numeri primi, si trovi la massima comune misura de' due A , & B , che sia il numero H ; misuri poi H il numero A per il numero F ; ed il medesimo numero H misuri B per il numero G ; per il Corollario antecedente, i numeri F , & G saranno i minimi nella proporzione di A à B , e di B à C .

A	B	C	D	E
16	24	36	54	81
H 8				
	2	3		
	F	G		

PROBLEMA IV. PROPOSITIONE XXXVI.

Dati due numeri, ritrovare il minimo numero, ch'è misurato da quelli.

Siano dati qualunque numeri A , & B , e s'habbia da ritrovare il minimo numero, ch'è misurato da i proposti numeri A , & B . Supposto prima che i dati numeri A , & B siano frà di loro primi, ed il numero A moltiplichi il numero B , ouero il numero B moltiplichi il numero A , e produca il numero C . Dico che il numero C è il minimo di tutti gli altri, che sono misurati da i numeri A , & B . Che i numeri A , & B misurino il numero C , è manifesto; poichè nascendo il numero C dalla multiplicatione di A in B , ò di B in A , sarà il numero C composto di tante volte A , per quante unità sono nel numero B ; e sarà ancora composto di tante volte B , per quante unità sono nel numero A ; e perciò il numero C è misurato dal numero A , per il numero B , ed è misurato dal numero B per il numero A . Che poi C sia il minimo di tutti quelli, che sono misurati da A , & B , lo dimostreremo in questo modo. Se il numero C non è il minimo, qualche altro numero minore di C sarà misurato da i numeri A , & B ; sia quello il numero D , il quale sia misurato dal numero A per il numero E , e sia misurato da B , per il numero F ; sì che A , moltiplicando E , produca il numero D ; ed il numero B , moltiplicando F , produca il medesimo numero D : per la qual cosa il prodotto di A in E sarà uguale al prodotto di B in F . Si considerino i quattro numeri, il primo de' quali sia A , il secondo B , il terzo F , ed il quarto E . Perchè il prodotto del primo A nel quarto E è uguale al prodotto del secondo B nel terzo F , sarà il primo A al secondo B , e come il terzo F al quarto E ; e perchè i due A , & B gli habbiamo supposti numeri primi, perciò A saranno i minimi nella loro proporzione di A à B , ed in conseguenza i numeri A , & B e misureranno ugualmente tutti gli altri, che hanno la medesima proporzione: ma A à B si disse essere come F ad E , i numeri dunque A , & B misurano ugualmente i numeri F , ed E ; cioè

Pante-

a del 7.

a 7. assom.
del 7.b 9. assom.
del 7.

c 19. del 7.

d 27. del 7.

e 21. del 7.

L'antecedente A misura l'antecedente F, ed il conseguente B misura il conseguente E. In oltre perche A, moltiplicando B, produce, per ipotesi, C, e moltiplicando E produce, per costruzione, D, sarà la proporzione di B ad E come quella di C a D: ma B, per quel che si è dimostrato, misura E, dunque C misurerà il numero D; fu supposto D minore di C, il maggiore dunque misurerà il minore, ch'è impossibile. Non dunque i numeri A, & B misurano altro numero minore di C; ma il minimo, che misurano, sarà C, che era da dimostrarsi nel primo luogo.

f 17. del 7.

Di nuovo non siano i numeri A, & B fra di loro primi. Si trouino i due numeri C, & D s minimi nella proporzione di A a B; i quattro numeri A, B, C, D sono proporzionali, ed il prodotto de gli estremi A, & D, sarà vguale al prodotto de i medij C, & B; sia quel prodotto il notato E. Dico che il numero E è il minimo di tutti gli altri, che sono misurati da i due A, & B. Perche A, moltiplicando D, produce il numero E; ed il numero B, moltiplicando C, produce l'istesso numero E; perciò i numeri A, & B misurano il numero E. Che finalmente il numero E sia il minimo di quelli, che sono misurati da A, & B, si proua in questo modo. Se il numero E non è il minimo, qualche altro numero minore di E sarà misurato da A, & B; sia quello, se è possibile, il numero F, il quale sia misurato da A per il numero G, e sia misurato da B per il numero H: il prodotto di A in G sarà vguale ad F; ed il prodotto di B in H sarà vguale all'istesso numero F; e perciò il prodotto di A in G sarà vguale al prodotto di B in H. Si considerino quattro numeri, cioè A primo, B secondo, H terzo, e G quarto. Perche il prodotto del primo A nel quarto G è vguale al prodotto del secondo B nel terzo H, sarà il primo A al secondo B, come il terzo H al quarto G. E perche i numeri C, & D sono minimi nella proporzione di A a B; ouero di H a G; perciò i numeri C, & D misureranno vgualmente i numeri G, ed H; cioè l'antecedente C misurerà l'antecedente H, ed il conseguente D misurerà il conseguente G. Si considerino i due D, & G come numeri moltiplicati, ed A moltiplicante. Perche A moltiplicando D, produce E, ed il medesimo numero A, moltiplicando G, produce F; sarà D a G come E ad F; ma D misura G, per quel che si è dimostrato; il numero E misura il numero F; fu supposto F minore di E; il numero maggiore dunque misura il minore, ch'è impossibile. Non dunque F è il minimo de i numeri misurati da A, & B; ma il minimo sarà il numero E, ch'era da farsi, e dimostrarsi.

g 35. del 7.

h 19. del 7.

K 7. assioma del 7.

l 9. assioma del 7.

m 19. del 7.

n 21 del 7.

o 17. del 7.

COROLLARIO.

Quindi è, che se due numeri, come A, & B, moltiplicano due numeri minimi, come C, & D, che sono nella medesima proporzione; moltiplicando il minore A per il

maggiore D, ed il maggiore B per il minore C, nell'vna, e nell'altra multiplicatione producono il numero E, ch'è il minimo misurato da i due A, & B.

THEOREMA XXXIII. PROPOSITIONE XXXVII.

Se vn numero è misurato da due numeri, farà ancora misurato dal numero minimo, ch'è misurato da quelli due.

Misurino i numeri A, & B qualunque numero CD, e di tutti i numeri, che possono essere misurati da i medesimi A, & B, il minimo sia il notato E. Dico che il numero E misura il numero CD. Se il numero E non misura il numero CD, detraendo dal numero CD tante volte il numero E, per quanto si può, quel, che resta, farà minore del numero E; fatta dunque la dettatione del numero E quanto si può, e resti, s'è possibile il numero FD, minore del numero E, in modo che il numero E misuri il numero CF. Perche tanto il numero A, quanto il numero B, misura il numero E; ed il numero E misura il numero CF; ogn'vno

a 12. assom.
del 7.

b 12. assom.

dunque de i numeri A, & B, misurerà il numero CF; ma ciascuno de' numeri A, & B, per ipotesi, misura tutto il numero CD; ogn'vno de i numeri A, & B, misurerà ancora il rimanente FD; fù supposto il numero FD minore di E, dunque i numeri A, & B misurano vn numero minore di E; per la qual cosa il numero E non è il minimo di tutti quelli, che sono misurati da i numeri A, & B, il che è contro all'ipotesi, mentre il numero E fù supposto il minimo. Non dunque, detratto da CD quanto si può il numero E, resta quantità alcuna minore di E; per la qual cosa il numero minimo E misura il numero CD, come fù proposto dimostrare.

PROBLEMA V. PROPOSITIONE XXXVIII.

Dati tre numeri, ritrouare il minimo numero, che quelli misurano.

a 36. del 7.

Siano dati tre numeri, come A, B, C, e si voglia ritrouare il minimo numero, che misurano i tre A, B, C. Si troui il minimo numero misurato da due di quelli; e supposto che il numero D sia il minimo misurato da i due A, & B; se il numero D è misurato dal numero C, il numero D farà il minimo misurato da i tre A, B, C; se il numero D non è

A... B... C...
D.....
E.....

il minimo, misurino i numeri A, B, C, qualche altro numero E, minore del numero D. Perche i due A, & B, misurano il numero E minore di D, non farà il numero D il minimo misurato da i due A, & B, ch'è contro all'ipotesi, mentre si è supposto il numero D essere il minimo di quelli misurati da i numeri A, & B: non dunque il numero E è il minimo de' numeri che sono misurati da i numeri A, B, C, ma il minimo sarà il numero D.

Di nuovo, supposto che il numero C non misuri il numero D, in tal caso si troui il numero E, che sia il minimo misurato da i numeri C, & D. Dico che il numero E sarà il minimo di quelli, che i numeri A, B, C misurano. Perche i numeri A, & B, per costruzione, misurano il numero D, ed il numero D misura il numero E; i numeri dunque A, & B, misurano il numero E; ma il numero C, per costruzione, misura il numero E; perciò tutti tre i numeri A, B, C misurano il numero E. Finalmente se il numero E non è il minimo di tutti gli altri misurati da i numeri A, B, C, misurino i numeri A, B, C, se è possibile, qualche altro numero F, minore del numero E. Perche il numero D è il minimo di quelli misurati da i due A, & B, ed i numeri A, & B misurano il numero E, ancora il numero D, ch'è minimo, misurerà il numero F. In oltre perche il numero E, per costruzione, è il minimo, ch'è misurato da i due C, & D; ed i numeri C, & D misurano il numero F; il numero E dunque, ch'è minimo, misurerà il numero F: ma il numero F è supposto minore del numero E; il maggiore misurerebbe il minore, il che è impossibile: non dunque il numero F è il minimo di quelli misurati da i tre A, B, C; E... ma il minimo sarà il numero E, che era da farsi, e dimostrarli.

COROLLARIO.

Perche il numero E è il minimo di quelli misurati da i tre numeri A, B, C; e, supponendo, che il numero F sia misurato da i medesimi numeri A, B, C, fu prouato, che il minimo E misura il numero F; sarà manifesto, che se vn numero è misurato da tre numeri, il medesimo sarà ancora misurato dal minimo, ch'è misurato da quei tre numeri.

THEOREMA XXXIV. PROPOSITIONE XXXIX.

Se vn numero misura vn altro numero, il numero misurato hauerà la parte nominata da quello, che misura.

Sia il numero A misurato dal numero B. Dico che il numero A ha la

parte denominata dal numero B. Sia misurato il numero A dal numero B tante volte, per quante vnità sono nel numero C; l'vnità misurerà tante volte il numero C, per quante volte il numero B misura il numero A; e permutando, l'vnità misurerà il numero B, come il numero C misura il numero A; e perciò tal parte sarà l'vnità del numero B, quale parte è il numero C del numero A; ma l'vnità è parte di B denominata dal numero B, come se l'vnità fosse terza, o quarta, o quinta parte, &c. di B; sarà ancora C parte denominata da A; cioè sarà C terza, o quarta, o quinta, o altra parte di A, denominata dal numero B; cioè il numero C sarà tale parte di A, quale denomina B con le sue vnità. Si che se B conterrà quattro vnità, C si dirà essere la quarta parte di A; se B contiene cinque vnità, si dirà C. essere la quinta parte di A; e con quest'ordine se B contenesse più, o meno vnità. Per la qual cosa se vn numero misura vn altro numero, il numero misurato ha la parte denominata dal numero, che misura.

THEOREMA XXXV. PROPOSITIONE XL.

Se vn numero hà qualunque parte, il numero denominato da quella parte, lo misura.

Sia B parte del numero A, dalla quale sia denominato il numero C. Dico che il numero C misura il numero A. Perche B è parte di A, perciò B misura il numero A..... A; e per l'antecedente propositione hauerà A la B... C..... parte denominata da B: ma, per ipotesi, il numero C è la parte denominata da B, in conseguenza C sarà parte di A; per la qual cosa il numero C misura il numero A, che era da dimostrarsi.

PROBLEMA VI. PROPOSITIONE XLI.

Ritrouare vn minimo numero, che habbia le parti date.

Siano le parti proposte A, B, C, e si habbia à ritrouare il minimo numero, che habbia le parti A, B, & C. Siano i numeri D, E, F quelli, che denominano le parti A, B, C; si troui il numero G, che sia il minimo di quelli misurati da i numeri D, E, F. Dico che il numero G è il minimo, che contiene le parti A, B, C. Perche i numeri D, E, F misurano il numero G, hauerà G le parti denominate da essi numeri D, E, F; ma le parti denominate da essi numeri D, E, F, sono le date A, B, C; il numero dunque G hauerà le

parti

parti date A, B, C . In oltre dico che il numero G è il minimo di quelli che contengono le parti A, B, C : perchè se non è il minimo, qualche altro numero minore di G sarà il minimo, che conterrà le parti A, B, C ; sia quello il numero H . Perchè il numero H hà le parti A, B, C , esso numero H sarà misurato da i numeri D, E, F , che sono denominati dalle parti A, B, C ; ma i numeri D, E, F misurano il numero G , essendo H minore di G , non sarà G il minimo, ch'è contro all'ipotesi. Non dunque alcun numero minore di G hà le parti date; ma il numero G sarà il minimo, che hà le parti A, B, C , ch'era da farsi, e dimostrarsi.

c 4. del 7.

Fine del Settimo Elemento.



EVCLIDE RESTITUITO

VITALE GIORDANI

ELEMENTO OTTAVO.



THEOREMA I. PROPOSITIONE I.

Se siano quanti numeri si vogliano continui proporzionali, gli estremi de' quali siano primi frà loro; quelli faranno i minimi di tutti gli altri, che hanno la medesima proporzione.



SI ANO quanti numeri si vogliano A, B, C, D , continui proporzionali, li di cui estremi A , & D siano primi frà loro. Dico che i numeri A, B, C, D sono i minimi di tutti gli altri, che hanno la medesima proporzione. Se i numeri A, B, C, D non sono i minimi, altri numeri nella medesima proporzione saranno minimi; siano quelli, s'è possibile, i notati E, F, G, H . Perche i numeri E, F, G, H hanno la medesima proporzione de' numeri $A, B,$

a 14. del 7.
b 13. del 7.

C, D , sarà per l'egualità, la proporzione di A à D come quella di E ad H ; ma i due A , & D sono minimi nella proporzione di A à D (stante che, per ipotesi

c 27. del 7.

sono numeri primi) i numeri dunque A , & D misureranno v-
gualmente i nu-

A
 B
 C
 D

E —
 F —
 G —
 H —

meri E , ed H ; cioè l'antecedente A misura l'antecedente E , ed il conseguente D misura il conseguente H : ma i due E , ed H sono supposti minimi nella proporzione di E ad H , ouero di A à D ; i maggiori dunque A , & D misurano i minori E , ed H , ch'è impossibile. Non dunque i numeri E, F, G, H sono i minimi nella proporzione de' numeri A, B, C, D ; ma i minimi sono i proposti A, B, C, D , ch'era da dimostrarsi.

S C O L I O.

L'antecedente proposizione si può fare più uniuersale nel seguente modo.

Se siano quanti numeri si vogliano ò continui , ò non continui proporzionali , de' quali gli estremi siano numeri frà loro primi ; quelli sono i minimi di tutti gli altri , che, esposti col medesimo ordine , hanno le medesime proporzioni .

<i>Siano quanti numeri si vogliano ,</i>	A	E —
<i>A, B, C, D, i di cui estremi A, & D</i>	B	F —
<i>siano frà loro primi . Dico che i numeri</i>	C	G —
<i>A, B, C, D sono i minimi di tutti</i>	D	H —

gli altri , che esposti col medesimo ordine , hanno le medesime proporzioni de i numeri A, B, C, D . Se i numeri A, B, C, D non sono i minimi , altri numeri nelle medesime proporzioni saranno i minimi ; siano quelli i notati E, F, G, H . Perche A à B è come E ad F , e la proporzione di B à C è come quella di F à G ; ed ancora C à D è come G ad H ; sarà per l'egualità A à D come E ad H ; ma i due A, & D sono nella loro proporzione minimi, stante che sono primi; perciò misureranno ugualmente i numeri E, ed H ; ma i numeri E, ed H sono supposti i minimi , i numeri dunque A, & D maggiori misureranno i minori E, ed H , ch'è impossibile . Non dunque i numeri E, F, G, H sono i minimi nelle proporzioni di A, B, C, D ; ma i minimi saranno essi numeri A, B, C, D, ch'era da dimostrarsi .

a 14. del 7.

b 23. del 7.

c 21. del 7.

PROBLEMA I. PROPOSITIONE II.

Data qualunque proportionione , ritrouare quanti numeri si vogliano continui proporzionali, che siano i minimi nella data proportionione.

Sia data la proportionione ne i minimi numeri , come A à B, e si habbiano à ritrouare quanti numeri si vogliano continui proporzionali , che siano i minimi nella proportionione di A à B . Si multiplichi il numero A in se medesimo , ed il prodotto sia C ; similmente si multiplichi il numero B in se medesimo, ed il prodotto sia E ;

poi si multiplichi il numero A per il numero B , ed il prodotto sia D . Dico prima che i tre C, D, E sono i minimi nella proportionione di A à B . Si considerino i numeri A , & B come numeri multiplicati , ed A sia il multiplicante ; perche il prodotto del multiplicante A nel numero

	A ²	B ³	
	C ⁴	D ⁶	E ⁹
F ⁸	G ¹²	H ¹⁸	K ²⁷
L ¹⁶	M ²⁴	N ³⁶	P ⁵⁴ Q ⁸¹

mul-

a 17. del 7.

moltiplicato A è il numero C; ed il prodotto del moltiplicante A nel moltiplicato B è il numero D; sarà il prodotto C^a al prodotto D come il moltiplicato A al moltiplicato B. Similmente presi i numeri B, ed A come numeri moltiplicati, ed il moltiplicante sia B. Perche i prodotti fatti dal moltiplicante B ne i numeri moltiplicati B, ed A, sono, per costruzione, E, & D, sarà il prodotto D al prodotto E^b come il numero moltiplicato A al numero moltiplicato B: ma fu dimostrato A à B essere come C à D; sarà C à D^c come D à E; e perciò i tre C, D, E sono continui proporzionali nella proportion di A à B. In oltre perche i numeri A, & B, per ipotesi, sono nella loro proportion minimi, perciò d sono frà di loro primi; e perche dalla multiplicatione de i numeri primi A, & B in se medesimi, ne vengono i prodotti C, ed E; saranno i prodotti C, ed E^c frà loro primi; e per la prima proposizione di questo, i tre numeri proporzionali C, D, E sono i minimi nella loro proportion, di A à B.

b 17. del 7.

e Scot. alla

12. del 7.

d 24. del 7.

e 29. del 7.

Di nuovo si moltiplichi il numero A in ciascuno de i tre prodotti C, D, E, e ne risultino i

	A ²	B ³			
	C ⁴	D ⁶	E ⁹		
F ⁸	G ¹²	H ¹⁸	K ²⁷		
L ¹⁶	M ²⁴	N ³⁶	P ⁵⁴	Q ⁸¹	

prodotti F, G, H; e si moltiplichi il numero B nell'ultimo E, ed il prodotto sia K. Dico che i quattro numeri F, G, H, K sono i minimi nella continua proportion di A à B. Perche il numero A, moltiplicando i tre numeri C, D, E, produce i numeri F, G, H, per la 17. propositione del settimo, i prodotti F, G, H hanno l'istessa proportion, che i numeri moltiplicati C, D, E: ma i numeri C, D, E sono continui proporzionali nella proportion di A à B; i numeri dunque F, G, H sono continui proporzionali nella proportion di A à B. Di nuovo, perche i numeri A, & B, moltiplicando il medesimo numero E, producono i due H, & K, per la 18. propositione del 7, il prodotto H al prodotto K sarà come il moltiplicante A al moltiplicante B, e perciò i numeri F, G, H, K, sono continui proporzionali nella proportion di A à B. Di più, essendo i numeri A, & B minimi nella loro proportion, per la 24. propos. del 7, saranno frà di loro primi. E perche dalle multiplicationi di A, & B in se medesimi, ne sono prodotti i numeri C, ed E; e dalle multiplicationi di A in C, e di B in E, ne sono risultati i numeri F, & K (che sono estremi delle continue proporzionali F, G, H, K) per la 29. propos. del 7, gli estremi F, & K sono primi frà loro; e per la 1. proposizione di questo i numeri F, G, H, K, sono i minimi nella loro proportion, cioè nella proportion di A à B.

a 17. del 7.

b 18. del 7.

Nell'istesso modo, moltiplicando i quattro numeri F, G, H, K per il numero A, e ne vengano i prodotti L, M, N, P, saranno i prodotti L, M, N, P² nella proportion de i numeri moltiplicati F, G, H, K; cioè nella proportion di A à B. Poi si moltiplichi il numero B nel numero K, ed il prodotto sia Q; perche i numeri A, & B, moltiplicando il medesimo numero K, producono i numeri P, Q, sarà il prodotto P al prodotto Q^b come il moltiplicante A al moltiplicante B; dal che i numeri L, M, N, P, Q

sono

sono continui proporzionali nella proporzione di A à B. Finalmente, perche i minimi numeri A, & B sono fra loro primi, e questi moltiplicati in se medesimi producono i numeri C, ed E; e moltiplicando i medesimi A, & B, cioè A in C, & B in E, producono i numeri F, & K; e similmente moltiplicando A in F, & B in K, producono i numeri L, & Q (che sono estremi de i numeri continui proporzionali L, M, N, P, Q) gli estremi L, & Q faranno fra di loro primi, ed in conseguenza i numeri L, M, N, P, Q, faranno i minimi nella proporzione di A à B. Non altrimenti si farà se si volessero trovare altri numeri continui proporzionali, che siano minimi nella proporzione di A à B: poiche moltiplicando i cinque L, M, N, P, Q, per il numero A, e poi moltiplicato l'ultimo Q per il numero B, i sei numeri, che ne verranno, haueranno le medesime condizioni sudette; il che si dimostrerà nel medesimo modo: e con quest'ordine procedendo si possono ritrouare quanti numeri si vogliono minimi nella continua proporzione di A à B; ch'era da farsi e dimostrarsi.

S C O L I O.

Tutto quello che nell' antecedente proposizione si è fatto con le moltiplicazioni del numero A, si può fare col numero B; e quello, che si è fatto col numero B, si farà col numero A; cioè moltiplicando il numero B ne i tre E, D, C, se ne producono i numeri K, H, G; e moltiplicando il numero A per l'ultimo C, se ne produce il numero F; similmente, moltiplicando il numero B ne i numeri K, H, G, F, se ne producono i numeri Q, P, N, M, e moltiplicando il numero A per l'ultimo numero F, se ne produce il numero L.

COROLLARIO I.

Perche dalla multiplicatione di A in se medesimo, e di B in se medesimo, se ne producono i numeri quadrati C, ed E; ed i numeri continui proporzionali C, D, E, sono i minimi nella proporzione di A à B, sarà manifesto, che, quando tre numeri continui proporzionali sono i minimi nella loro proporzione, i loro estremi sono numeri quadrati; similmente, perche moltiplicando il numero A per il suo quadrato C, ed il numero B per il suo quadrato E, se ne producono i numeri cubi F, & K, che sono estremi de i quattro numeri F, G, H, K, minimi nella continua proporzione di A à B; chiaramente apparisce, che se quattro numeri continui proporzionali sono minimi nella loro

proportione, i loro estremi sono numeri cubi. E con quest'ordine, se i minimi numeri continui proportionali sono cinque, i loro estremi sono quadrati; se faranno sei, i loro estremi faranno numeri solidi, che cadono sotto altre denominationi, come à pieno si parlerà nel nostro trattato dell'Algebra.

COROLLARIO II.

Perche i numeri intermedij de gli antedetti numeri continui proportionali nascono dalle multiplicationi de' minimi numeri A, & B; cioè D nasce dalla multiplicatione di A in B, il numero G dalla multiplicatione di D in A; cioè dal prodot-

to di A in B,

moltiplicato per

A; ed il numero

H nasce dalla

multiplicatione di E in A, cioè dal quadrato di B, moltiplicato per A; e nell'istesso modo gli altri medij nascono dalle multiplicationi di A ne i numeri F, G, H, K; perciò tutti i numeri intermedij D, G, H, M, N, P faranno misurati da i minimi numeri A, & B. Dond'è manifesto, che due minimi numeri in vna data proportione misureranno tutti i numeri medij di quanti si voglia numeri continui proportionali, che faranno minimi nella medesima data proportione.

THEOREMA II. PROPOSITIONE III.

Se quanti numeri si vogliano continui proportionali sono i minimi di tutti quelli, che hanno la medesima proportione con essi, i loro estremi faranno frà di loro primi.

Siano i numeri A, B, C, D continui proportionali, i quali siano minimi nella loro proportione di A à B, ouero B à C &c. Dico che gli estre-

mi A,

* quadrati

		A ¹	B ¹	
	C ⁴	D ⁶	E ⁹	
F ⁸	G ¹²	H ¹⁸	K ²⁷	
L ¹⁶	M ²⁴	N ³⁶	P ⁵⁴	Q ⁸¹

mi A, & D, sono frà di loro primi.

Si trouino due numeri come E, A 8 B 12 C 18 D 27
ed F, che siano i minimi nella pro-

portione di A à B, ouero di B à C, G 4 H 6 K 9
o pure di C à D; e secondo il me-

todo tenuto nell'antecedente pro-

posizione, si trouino tre numeri G, H, K continui proporzionali, che siano

minimi nella proporzione di E ad F; e di nouo se ne trouino quattro al-

tri, o cinque altri, e quanti bisognano, fino à tanto, che si peruiene ad

vna moltitudine di termini, vguale alla moltitudine de' termini dati A,

B, C, D; e supposto che si sia peruenuto à quella moltitudine, che si cer-

ca, e siano quelli i notati L, M, N, P; i quali siano continui proporzionali,

e siano minimi nella proporzione di E ad F. Perche la moltitudine de'

termini L, M, N, P è vguale alla moltitudine de' termini A, B, C, D; e gli

vni, e gli altri sono minimi nella proporzione di E ad F; non potendosi

dare il minore del minimo, ciascuno de' termini L, M, N, P farà vguale à

quello, che gli corrisponde ne i dati A, B, C, D; cioè L farà vguale ad A,

il numero M vguale à B, il notato N vguale à C, ed il numero P vguale

al numero D. E perche dalla multiplicatione de' numeri E, ed F in se

medesimi, secondo quel che si disse nell'antecedente proposizione, se ne

producono i numeri G, & K; e dalla multiplicatione di E in G, e di F

in K, se ne producono i numeri L, & P; per la 29. propos. del 7. i nume-

ri L, & P sono frà di loro primi: ma i numeri L, & P sono vguali à i due

A, & D; i due estremi dunque A, & D sono frà di loro primi, ch'era da

dimostrarfi.

PROBLEMA II. PROPOSITIONE IV.

Date quante proporzioni si vogliano ne i minimi numeri; ritrouare i numeri minimi, che successiuamente siano nelle proporzioni date.

Siano date prima due proporzioni ne i minimi numeri, come A à B, e come C à D; e si vogliano ritrouare tre minimi numeri, che successiuamente siano nelle proporzioni

date; cioè che il primo al secondo sia come A à B; e che il secondo al terzo sia come C à D. Si

trouì il minimo numero E, ^a il

quale sia misurato dal secondo B, e dal terzo C. Si espongano poi i numeri

F, & G in modo, che F sia multiplice di A, come E è multiplice di B; e che G sia multiplice di D, come E è multiplice di C; cioè che il numero

A misuri il numero F, come il numero B misura il numero E; e che il numero D misuri il numero G, come C misura il numero E. Dico che

i tre numeri F, E, G sono i minimi nelle proporzioni di F ad E, e di E à G,

cioè nelle proporzioni di A à B, e di C à D. Perche i numeri A, & B,

per costruzione, misurano ugualmente i numeri F, ed E, sarà A parte di F, come B è parte di E, è per la 20. definizione di questo, A ad F come B ad E; e permutando, A a B b è come F ad E. Similmente perche i numeri C, & D misurano ugualmente i numeri E, & G, sarà C a D d come E a G g. Similmente perche i numeri F, E, G non sono i minimi, altri numeri nelle medesime proporzioni faranno i minimi; siano questi i numeri I, K, L, minori de i numeri F, E, G, in modo, che I a K sia come A a B, & K ad L sia come C a D. Perche A a B è come I a K, ed i numeri A, & B sono minimi; i numeri dunque A, & B misurano ugualmente i numeri I, & K, cioè l'antecedente A misura l'antecedente I, ed il conseguente B misura il conseguente K. Nell'istesso modo si dimostrerà, che i numeri C, & D misurano ugualmente i numeri K, ed L; cioè C misura K, ed il numero D misura L; per la qual cosa tanto il numero B, quanto il numero C misura il numero K. Hor perche i minimi numeri B, & C misurano il numero K, ed i medesimi B, & C misurano il minimo numero E; perciò il numero E misura il numero K; ma fu supposto K minore di E; il maggiore dunque misurerà il minore, che è impossibile. Non dunque i numeri I, K, L sono minimi nella data proporzione; ma i minimi sono i numeri F, E, G, che'era da farsi nel primo luogo.

Di nuovo siano date tre proporzioni ne i minimi numeri, e la prima sia come A a B, la seconda come C a D, e la terza come E ad F; e si vogliano ritrovare quattro numeri minimi, che il primo al secondo sia come A a B; che il secondo al terzo sia come C a D; e che il terzo al quarto sia come E ad F. Si trovi, come prima, il minimo numero G, il quale sia misurato dal secondo B, e dal terzo C; si espungano poi i numeri H, & K in modo, che A misuri H, come B misura G; e che D misuri K, come C misura G. O al numero E misura K, onero non lo misura; supposto prima che lo misuri; si espunga il numero L in modo, che F misuri L, come E misura K. Dico che i quattro numeri H, G, K, L sono quelli, che si cercano; cioè che H a G è come A a B; che G a K è come C a D; e che K ad L è come E ad F; e che i numeri H, G, K, L sono i minimi nelle date proporzioni. Perche i numeri A, & B misurano ugualmente i numeri H, & G, sarà A ad H come B a G; e permutando, A a B è come H a G. Similmente, perche i numeri C, & D misurano ugualmente i numeri G, & K, ed i numeri E, & F misurano ugualmente i numeri K, ed L, per l'istessa ragione C a D sarà come G a K; e sarà E ad F come K ad L; per la qual cosa i numeri H, G, K, L sono successivamente nelle proporzioni di A a B; di C a D, e di E ad F. Dico oltre a ciò, che i numeri H, G, K, L sono i minimi nelle date proporzioni. Perche se

b 13. del 7.

c 10. defin. del 7.
d 13. del 7.

e 11 del 7.

f 37. del 7.

g 36. del 7.

h 10. defin. del 7.
K 13. del 7.

non sono i minimi, altri numeri nelle date proporzioni faranno i minimi; siano quelli i notati M, N, O, P, minori de' corrispondenti numeri H, G, K, L, in modo, che M ad N sia come A à B, N ad O come O à D, ed O à P come E ad F; e perche i due A, & B sono per ipotesi minimi, perciò i misureranno vguilmente i numeri M, ed N; cioè l'antecedente A misura M, ed il conseguente B misura N. Similmente essendo C, & D minimi nella loro proporzione; perciò i misureranno vguilmente i numeri N, ed O; cioè l'antecedente C misura l'antecedente N, ed il conseguente D misura il conseguente O; dal che i due B, & C misurano il medesimo numero N; ma i due B, & C misurano il minimo G, in conseguenza il minimo G misura il numero N; fu supposto N minore di G, il maggiore misurerà il minore, ch'è impossibile. Non dunque i numeri M, N, O, P sono i minimi nella data proporzione; ma i minimi faranno i quattro H, G, K, L, come fu proposto fare. *Il rimanente si oppone*

Se poi il numero E non misura il numero K. Si troui il minimo numero L, misurato da i due E, & K, e si esponano i numeri M; N; P in modo, che il numero G misuri il numero M, come K A 6 B 3. C 4. D 3. E 3. F 7. misura il numero L; che H 24. G 20. K 15. misuri N, come G misura M; N 48. M 40. E 30. P 10. e che F misuri P, come B misura L. Perche i numeri H,

G, K misurano vguilmente i numeri N, M, L, farà H à G come N ad M; e farà G à K, come M ad L; ma H à G, & G à K sono come A à B, e come C à D; farà N ad M come A à B; ed M ad L come C à D. Similmente perche i due E, ed F misurano vguilmente i numeri L, & P, farà E ad F come L à P. Per la qual cosa i quattro numeri N, M, L, P sono successiuamente nelle date proporzioni. Dico che sono i minimi nelle medesime date proporzioni. Perche se non sono i minimi, altri numeri nelle medesime proporzioni faranno i minimi; siano quelli i notati Q, R, T, V, minori de' corrispondenti numeri N, M, L, P; e farà A à B come Q ad R; ed ancora C à D come R à T; e farà E ad F come T ad V. E perche C, & D sono minimi, perciò i misureranno vguilmente i due R, & T; cioè l'antecedente C misura l'antecedente R, ed il conseguente D misura il conseguente T. Similmente, essendo i numeri E, & F minimi, il numero E misurerà T, ed il numero F misura V; dal che i due D, ed E misurano il medesimo numero T. In oltre perche i due D, ed E, per costruzione, misurano il minimo numero L, ed i medesimi D, ed E misurano il numero T; perciò il numero L misura il numero T: fu supposto T minore di L, il maggiore misurerà il minore, ch'è impossibile. Non dunque i numeri Q, R, T, V sono i minimi nelle date proporzioni; ma i minimi sono i quattro N, M, L, P, ch'era da farsi.

Se faranno date quattro proporzioni, si trouino prima i minimi numeri proporzionali nelle tre date proporzioni; come sopra si è fatto, e con la quarta proporzione si faccia l'istesso; che antecedentemente si fece con la terza proporzione data; e ne verranno i cinque minimi numeri proporzionali; che si cercano. Per esempio; oltre le date tre proporzioni

l. 21. del 7.

m. 21. del 7.

n. 37. del 7.

o. 36. del 7.

p. 20. defin. del 7.

q. Scol. l. 1. del 7.

r. 21. del 7.

t. 21. del 7.

u. 37. del 7.

ni, sia data la quarta proporzionc come X ad Y. Si trouino prima i quattro minimi numeri N, M, L, P, che siano successiuamente nelle medesime prime tre proporzioni di A à B, A 6 B 5. C 4 D 3. E 2 F 7. X 3 Y 2 di C à D, e di E N 48 M 40 L 30 P 105 Q 70 ad F: poi, se X

x 36. del 7.

mifura P, si esponga il numero Q in modo, che Y mifuri il numero Q, come X mifura P; sarà X ad Y come P a Q; ed i cinque numeri N, M, L, P, Q faranno successiuamente i minimi proporzionali, secondo le date proporzioni. Se poi il numero X non mifura il numero P, si troui il minimo numero Q,

che sia mifurato da i A 6 B 5 C 4 D 3 E 2 F 7. X 9 Y 2 due P, ed X, e si esponga i numeri R V 144 T 120 R 90 Q 305 Z 70 T, V, Z in modo,

che il numero L mifuri il numero R, come P mifura Q; che M mifuri T, come L mifura R; che N mifuri V, come M mifura T; e che Y mifuri Z, come X mifura Q; ed i numeri V, T, R, Q, Z faranno i minimi nelle proporzioni date: il che si dimostra col procedere, come sopra s'è fatto. Ed il medesimo ordine si terrà se le proporzioni date faranno più di quattro, il che era da farli, e dimostrarli.

THEOREMA III. PROPOSITIONE V.

I numeri piani hanno la proporzionc composta da i loro lati.

a 17. del 7.

Siano i due numeri piani A, B, e siano i lati del numero A i notati C, D, ed i lati del numero B siano E, F. Dico che la proporzionc del numero piano A al numero piano B è composta di due proporzioni, cioè della proporzionc del lato C al lato E, e della proporzionc del lato D al lato F. Si multiplichino i numeri D, E, frà di loro, ed il prodotto sia il numero G. Perche D, multiplicando i due C, ed E, produce i numeri

b 19. del 7.

A & G, sarà il prodotto A al prodotto G, come il numero multiplicato C al numero multiplicato E. Similmente perche E, multiplicando i numeri D, & F, produce i due G, & B, C 4 D 6. E 2 F 16. sarà il prodotto G al prodotto B come il numero multiplicato D al numero multiplicato F, per la qual cosa i tre A, G, B sono successiuamente proporzionali nelle proporzioni di C ad E, e di D ad F. In oltre, presi i numeri A, & B, come estremi, ed il numero G sia intermedio; la proporzionc di A à B sarà composta delle proporzioni di A à G, e di G à B: mà la proporzionc di A à G è come C ad E, e la proporzionc di G à B è come D ad F; la proporzionc dunque del numero piano A al numero piano B sarà composta delle proporzioni di C ad E, e di D ad F. Per la qual cosa i numeri piani hanno la proporzionc composta da i loro lati, il che era da dimostrarli.

c Lem. 7. do.
pola 18. pro
pos. del 6:

Nell'

Nell'istesso modo si prouerà, che il numero piano A al numero piano B hà la proportionione composta delle proportioni di C ad F, e di D ad E: Poiche moltiplicando il numero D per il numero F, ed il prodotto sia G; per le ragioni antedette, sarà A à G come C ad F, e sarà G à B come D ad E; ma la proportionione di A à B è composta delle proportioni di A à G, è di G à B; sarà la proportionione di A à B composta delle proportioni di C ad F, e di D ad E, ch'era da dimostrarsi.

A 24

B 48

G 96

C 4. D 6. F 16. E 3.

THEOREMA IV. PROPOSITIONE VI.

Di quanti si voglia numeri continui proportionali, se il primo non misura il secondo, niun'altro di quelli misurerà alcuno de gli altri.

Siano i numeri continui proportionali A, B, C, D, E, ed il primo A non misuri il secondo

A 16

B 24

C 36

D 54

E 81

F 4

G 6

H 9

B. Dico che niun altro di loro misurerà alcuno de gli altri. Perche i proposti numeri sono continui proportionali, sarà A à B come B à C, ouero C à D, & D ad E; si che se A misurasse B, per la 20. definizione, B misurerebbe vglualmente C, ed il numero C misurerebbe vglualmente D; come ancora D misurerebbe vglualmente E; ma, per ipotesi, A non misura B, ne meno B misurerà il numero C, ne C misurerà D, &c. e perciò niuno misura il suo prossimo seguente.

In oltre si prendano tre numeri continui proportionali, che siano i minimi nella proportionione di A à B, come F, G, H in modo, che F à G sia come A à B, & G ad H sia come F à G, cioè come B à C, e per l'egualità, sarà F ad H, come A à C. In oltre perche A à B è come F à G, se A misura B, il numero F misurerà vglualmente G; ma A per ipotesi, non misura B, ne meno F misurerà G; per la qual cosa F non sarà l'vnità; perche se fosse l'vnità misurerebbe il numero G, stante che l'vnità misura tutti i numeri: ma si è dimostrato, che F non misura G, perciò F non è l'vnità. E perche i numeri F, G, H sono i minimi nella proportionione di F à G, cioè di A à B, gli estremi F, ed H sono numeri primi; dal che F non misura H; ma F ad H è come A à C, ed il numero F, non misura H, ne meno A misurerà C. Nell'istesso modo si dimostrerà, che B non misurerà il numero D, ne meno C misurerà il numero E. E se in luogo de i tre F, G, H, si prenderanno quattro numeri continui proportionali, che siano minimi nella proportionione di A à B, proseguendo col medesimo metodo di prima, si prouerà, che il primo A non misura il quarto D, ne B misura E, come anco C non misurerà quello, che segue dopo il numero E. E se i numeri F, G, H saranno cinque, si prouerà, che A non misura il quinto termine E, ne meno niun altro misurerà il suo quinto termine; e con quest'ordine procedendo, sarà prouato, che se A non misura B, niuno de' numeri A, B, C, D &c. misurerà gli altri, il che era da dimostrarsi.

22. del 2.

b 12. del 7.

c 20. defin. del 7.

d 3. del 8.

THEO-

THEOREMA V. PROPOSITIONE VII.

Di quanti si voglia numeri continui proporzionali, se il primo misura l'ultimo, misurerà ancora il secondo.

Siano i numeri continui proporzionali A, B, C, D, E, ed il primo A misuri l'ultimo E. Dico che A misurerà il secondo B. Se il primo A $A_3 B_6 C_{12} D_{24} E_{48}$ non misura il secondo B, per l'antecedente proposizione, ne meno misurerà alcun'altro de' numeri B, C, D, E, ch'è contro all'ipotesi, mentre si è supposto, che A misura l'estremo E. Per la qual cosa il primo A misurerà il secondo B, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA VI. PROPOSITIONE VIII.

Quanti numeri continui proporzionali cadono fra due proposti numeri, altrettanti ne caderanno fra gli altri numeri, che sono nella medesima proporzione.

Frà due qualunque numeri A, & B cadano i medij continui proporzionali C, & D; e siano altri numeri, cioè E, F, che habbiano la medesima proporzione, quale ha il numero A al numero B. Dico che frà i numeri E, F cadono tanti

A 24	C 36	D 54	B 81
G 8	H 12	K 18	L 27
E 32	M 48	N 72	F 108

medij proporzionali, per quanti ne cadono frà i numeri A, & B. Si trouino tanti minimi numeri continui proporzionali, nella proporzione di A à C, per quanti sono i termini A, C, D, B, che siano i notati G, H, K, L, e per l'egualità, b sarà G ad L come A à B, e come E ad F: perche i numeri G, H, K, L continui proporzionali, sono per costruzione minimi, gli estremi G, ed L sono e frà di loro primi; e per la 23. del settimo, i numeri G, ed L sono minimi nella loro proporzione, cioè nella proporzione di G ad L: ma G ad L è come E ad F, perciò i numeri G, ed L ^d misureranno vguilmente i numeri E, ed F; cioè l'antecedente G misura l'antecedente E, ed il conseguente L misura il conseguente F.

E perche G, H, K, L, sono continui proporzionali, quante volte i due G, L misurano i due E, F, altrettante volte i numeri H, K misureranno altri numeri, come per effempio M, N. Per la qual cosa i numeri G, H, K, L misureranno vguilmente i corrispondenti E, M, N, F; e per la 20. definit. del 7, sarà G ad E come H ad M, e come K ad N, ed L ad F; e permutandosi, i numeri G, H, K, L, e hanno successiuamente le medesime proporzioni de' numeri E, M, N, F; ma i numeri G, H, K, L, per costruzione, sono continui proporzionali; perciò i numeri E, M, N, F saranno ancora.

CONTI-

a 2. del 8.

b 22. del 7.

c 3. del 8.

d 21. del 7.

e 13. del 7.

continui proporzionali; e tanti faranno i termini E, M, N, P, per quanti sono i termini G, H, K, L; cioè per quanti sono i termini A, C, D, B. E perciò quanti termini medij sono frà i due A, B, altrettanti ne faranno frà i due E, F, come fu proposto dimostrare.

THEOREMA VII. PROPOSITIONE IX.

Quanti medij continui proporzionali cadono frà due numeri frà loro primi, altrettanti ne cadono frà vno di essi, e l'vnità.

Siano i due numeri frà loro primi A, B, frà quali cadano i medij continui proporzionali C, D. Dico che altrettanti medij continui proporzionali caderanno frà l'vnità, ed il numero A, e frà l'vnità, ed il numero B. Si trouino due numeri minimi ^a nella proporzione di A à B, che siano E, ed F; e nella medesima proporzione si trouino tre altri minimi numeri cōtinui proporzionali come G, H, K; e similmente se

$$\begin{array}{ccccccc} A & 8 & C & 12 & D & 18 & B & 27 \\ & & & & & \text{vnità} & & \\ & & & & & 1 & & \\ & & & & E & 2 & F & 3 \\ & & G & 4 & H & 6 & K & 9 \\ L & 8 & M & 12 & N & 18 & P & 27 \end{array}$$

ne trouino quattro altri, come L, M, N, P, e con quest'ordine fin che si peruen- ga à tanta moltitudine di termini, per quanta è la moltitudine de' termini A, C, D, B. Perche gli estremi A, B, per ipotesi, sono primi frà loro, i numeri A, C, D, B faranno i minimi nella proporzione di E ad F: ma perche altrettanti termini L, M, N, P, per costruzione, sono ancora minimi nella proporzione di E ad F, non potendosi dare il minore del minimo, i numeri L, M, N, P, faranno vguale à i corrispondenti numeri A, C, D, B; cioè L vguale ad A, il numero M vguale à C, il numero N vguale à D, ed il numero P vguale à B. In oltre perche nel trouare i numeri minimi G, H, K, ouero L, M, N, P, per la 20. propositione di questo, si è prodotto G dalla multiplicatione di E in se medesimo, e si è prodotto L dalla multiplicatione di E nel numero G; il numero G ^b sarà misurato da E per il medesimo numero E, ed il prodoto L sarà misurato da G per l'istesso numero E; ma il numero E è misurato dall'vnità ^c per il medesimo numero E, in conseguenza i numeri L, G, E, e l'vnità, si misureranno vgualmente; cioè l'vnità misura E, come E misura G, ed il numero G misura L; per la qual cosa la medesima parte sarà l'vnità di E, qual'è il numero E di G; ed il numero G di L. Nell'istesso modo si dimostrerà, che la medesima parte è l'vnità di F, quale è F di K, ed il numero K di P, e perciò l'vnità, ed i numeri E, G, L, come ancora l'vnità, ed i numeri F, K, P ^d sono continui proporzionali. E perche, come apparisce nella 2. propos. di questo, i termini L, M, N, P sono sempre vno più de' termini L, G, E, ouero P, K, F, aggiunta à i termini L, G, E l'vnità per primo termine, faranno tanti i termini continui proporzionali L, G, E, con l'vnità, per quanti sono i termini L, M, N, P; ma i termini L, M, N, P, sono tanti, per quanti sono i termini A, C, D, B, tanti dunque faranno i termini con-

a. del 8.

b 7. assioma del 7.

c 5. assioma del 7.

d 20. defin. del 7.

A a a

tinui

tinui proportionali L, G, E, coll'vnità, per quanti sono i termini A, C, D, B. Per la qual cosa tanti medij continui proportionali cadono frà i due A, & B, per quanti ne cadono frà l'vnità, ed il numero A, ch'è vguale ad L. Nell'istesso modo si prouerà, che tanti sono i numeri medij, che cadono frà i due A, & B, per quanti sono quelli, che cadono frà l'vnità, ed il numero B, che fù dimostrato vguale à P, come fu proposto dimostrare.

THEOREMA VIII. PROPOSITIONE X.

Quanti medij continui proportionali cadono frà l'vni-
tà, e ciascuno di due numeri, altrettanti ne caderanno frà
i medesimi due numeri.

Frà i due numeri A, & B, e l'vnità Z cadano quanti numeri si vogliano continui proporzionali, cioè frà l'vnità Z, ed il numero A cadano i medij C,D,E; e frà l'vnità Z, ed il numero B, ne cadano altrettanti, come F,G,H. Dico che quanti medij cadono frà l'vnità Z, ed il numero A; ouero frà l'vnità Z, ed il numero B, altrettanti medij continui proporzionali cadono frà i numeri A, & B. Si multiplichino i due C, F scambievolmente, ed il prodotto sia K; poi si multiplichi C per li due K, & G, ed i prodotti siano L, ed M; ed il medesimo numero C multiplichi i tre L,M,H, ed i prodotti siano N,P,Q; i quali, essendo tanti, per quanti sono i medij, che cadono frà l'vnità, ed il numero A, ouero frà l'vnità, ed il numero B, si pongano frà i numeri A, & B. Dico che i numeri A, N,P,Q,B sono continui proporzionali. Perche, per ipotesi, l'vnità Z à C è come C à D, & D ad

a 30. defm.
del 7.

b 5. a Mem.
del 7.

c 9. affirma
del 7.

d 17.dcl 7.

e 17 del 7.

A 81 N 162 P 324 Q 648 B 1296
E 27 L 54 M 108 H 216
D 9 K 18 G 36
C 3 F 6
1
Z

il numero C, e perciò $\frac{D}{C}$ misura D, il numero D misura E, ed E misura A per il medesimo numero C. Per la qual cosa $\frac{C}{C}$, moltiplicando se medesimo, produce D; ed il medesimo C, moltiplicando D, produce E; e moltiplicando E, produce A. Nel medesimo modo si dimostrerà, che F, moltiplicando se medesimo, produce G, e moltiplicando G, produce H, ed ancora, moltiplicando H, produce B. In oltre perche C, moltiplicando C, & F, produce D, e K; sarà D à K $\frac{C}{C}$ come C ad F. Similmente, perche F, moltiplicando C, ed F, produce K, & G; la proportion di K à G $\frac{C}{C}$ sarà come quella di C ad F, cioè come quella di D à K; e perciò i tre D, K, G sono

con-

continui proporzionali nella proporzione di C ad F. Di nuovo perche C moltiplicando i tre D, K, G, produce i numeri E, L, M, i numeri E, L, M faranno nella medesima continua proporzione de i numeri moltiplicati D, K, G; cioè la medesima proporzione di C ad F. E perche i due C, ed F, moltiplicando il medesimo numero F, producono i numeri M, ed H; sarà la proporzione di M ad H come quella de i moltiplicanti, cioè come quella di C ad F; dalehe i numeri E, L, M, H sono continui proporzionali nella proporzione di C ad F. Finalmente perche C, moltiplicando i quattro E, L, M, H, produce i numeri A, N, P, Q; faranno i numeri A, N, P, Q, nella continua proporzione de i numeri E, L, M, H; cioè nella proporzione di C ad E. E similmente i numeri C, F, moltiplicando il medesimo numero H, hanno prodotti i numeri Q, & B; la proporzione di Q a B sarà come quella di C ad F; cioè come quella, che successivamente hanno i numeri A, N, P, Q. Per la qual cosa i numeri A, N, P, Q, B sono continui proporzionali; e perciò frà i due numeri A, & B, cadono tanti medij continui proporzionali, per quanti ne cadono frà l'vnità Z, ed i numeri A, & B, ch'era da dimostrarli.

THEOREMA IX. PROPOSITIONE XI.

Frà due numeri quadrati cade vn numero medio proporzionale: ed il numero quadrato al numero quadrato, hà duplicata proporzione, che il lato al lato.

Siano i due numeri quadrati A, & B, i di cui lati, ò radici, siano i numeri C, & D. Dico che frà i numeri quadrati A, & B, cade vn numero medio proporzionale; e che il numero quadrato A al numero quadrato B, hà duplicata proporzione, che il lato C al lato D. S'intendano moltiplicati i numeri C, D, scambievolmente, ed il prodotto sia E. Perche C è lato di A, moltiplicato C in se medesimo produce A, e per simile ragione, moltiplicato D in se medesimo, il prodotto sarà B. In oltre perche i numeri C, & D, moltiplicati per il medesimo numero C, producono i numeri A, & E; sarà la proporzione di A ad E, come quella di C a D. Similmente perche i numeri C, & D, moltiplicati per il medesimo numero

$$\begin{array}{ccc} A 9 & E 21 & B 49 \\ & C 3 & D 7 \end{array}$$

D, producono i numeri E, & B; sarà E a B, come C a D; cioè come A ad E: per la qual cosa i tre A, E, B sono continui proporzionali, nella proporzione di C a D; e perciò frà i due numeri quadrati A, & B, cade vn solo numero E medio proporzionale. Finalmente perche i tre numeri A, E, B sono continui proporzionali; la proporzione del primo A al terzo B, è duplicata di quella, che hà il primo A al secondo E; ma per quel, che si è dimostrato, la proporzione di A ad E è come quella di C a D, hauerà il numero quadrato A al numero quadrato B, duplicata proporzione di quella, che hà il lato C al lato D, come fu, proposto dimostrare.

COROLLARIO.

Da quel, che si è detto, è manifesto, che se due numeri si moltiplicano in se medesimi, e si moltiplicano frà di loro, i prodotti sono in continua proporzione de i numeri moltiplicati.

THEOREMA X. PROPOSITIONE XII.

Frà due numeri cubi cadono due medij continui proporzionali; ed il cubo al cubo hà triplicata proporzione, che il lato al lato.

Siano i due numeri cubi A, & B, i di cui lati, ò radici, siano i numeri C, & D. Dico che frà i numeri cubi A, & B, cadono due medij continui proporzionali; e che il numero cubo A al numero cubo B hà triplicata proporzione di quella, che hà il lato C al lato D.

$$\begin{array}{ccccccc} A & 27 & H & 36 & K & 48 & B & 64 \\ & & E & 9 & G & 12 & F & 16 \\ & & & C & 3 & D & 4 & \end{array}$$

Si moltiplichino C in se medesimo, ed il prodotto sia E; e moltiplicando D in se medesimo, si produca F; poi si moltiplichino i due C, & D scambievolmente, ed il prodotto sia G; e finalmente i due numeri C, & D moltiplichino il medesimo numero G, ed i prodotti siano H, & K. Perche il numero C, moltiplicando i due C, & D, produsse i numeri E, & G; farà E à G, come C à D. Similmente perche il numero D, moltiplicando i due C, & D, produsse i numeri G, ed F; farà G ad F, come C à D, cioè e come E à G; dal che i tre E, G, F sono continui proporzionali nella proporzione di C à D. In oltre, per la definizione del cubo, C moltiplicando E, produce A; mà il numero C, moltiplicando G, produsse H; farà A ad H, come E à G; cioè e come C à D. Similmente, per la definizione del cubo, D, moltiplicando F, produce B; mà, per costruzione, D, moltiplicando G, produsse K; farà K à B, come G ad F, cioè come C à D, ouero come A ad H. Di più, perche i due C, & D moltiplicando il medesimo numero G, produssero i numeri H, & K; farà H à K, come C à D: per la qual cosa i numeri A, H, K, B sono continui proporzionali, de' quali i medij sono H, & K, che, per la costruzione fatta, sono due solamente, e perciò frà i due numeri cubi A, & B, cadono due soli medij continui proporzionali. Finalmente perche i quattro numeri A, H, K, B sono continui proporzionali, il primo A al quarto B, hà triplicata proporzione di quella, che hà al secondo H: mà la proporzione di A ad H è come quella di C à D, hauerà il numero cubo A al numero cubo B, triplicata proporzione di quella, che hà il lato C al lato D, come fu proposto dimostrare.

a 17. del 7.

b 17. del 7.

c Scol. alla 12. del 7.

d 17. del 7.

e Scol. alla 12. del 7.

f 17. del 7.

g 18. del 7.

h Lemma 7 dopo la 18. del 6.

COROLLARIO.

Nell'antecedente proposizione appare, che moltiplicati i lati di due numeri cubi, come C, D in se medesimi, e moltiplicati frà di loro in modo, che produchino le continue proporzionali E, G, F; poi li due C, D, moltiplicandoli nel medesimo numero G, i prodotti H, K, con i cubi A, & B, cioè A, H, K, B, sono continui proporzionali nella proporzione di C à D.

THEOREMA XI. PROPOSITIONE XIII.

Se, di quanti si voglia numeri continui proporzionali, ogn'vno è moltiplicato in se medesimo, i prodotti faranno similmente continui proporzionali; e se i numeri posti nel principio si moltiplicaranno ne i loro prodotti, i numeri, che ne risultano, saranno continui proporzionali; e sempre, moltiplicando i numeri, posti nel principio, per gli vltimi prodotti, quelli, che ne risultano, sono continui proporzionali.

Siano i numeri continui proporzionali A, B, C, ciascuno de' quali si moltiplichi in se medesimo, ed i prodotti siano i numeri D, E, F.

	A 2	B 4	C 8			
	D 4	N 8	E 16	O 32	F 64	
G 8	P 16	Q 32	H 64	R 128	S 256	I 512
K 16,	T 32,	V 64,	X 128,	L 256,	Y 512,	Z 1024, & 2048, M 4096,

Di nouo si moltiplichino questi per li primi A, B, C, cioè A moltiplichi D, il numero B moltiplichi E, ed il numero C moltiplichi F; ed i prodotti siano G, H, I. Similmente si moltiplichino questi vltimi prodotti, col medesimo ordine, per li numeri A, B, C, e ne vengano i numeri K, L, M, e con quest'ordine si proceda quanto si vuole. Dico che i numeri D, E, F sono continui proporzionali: e similmente i numeri G, H, I, come ancora i numeri K, L, M, sono continui proporzionali. Si moltiplichino i due A, & B scambievolmente, ed il prodotto sia N; e moltiplicando i due B, C scambievolmente, se ne produca il numero O. Di nouo moltiplichino A i due N, E, ed i prodotti siano P, Q. Di più, moltiplichino B i numeri O, F, e si produchino i numeri R, S. Similmente A moltiplichino i tre P, Q, H, e faccia i prodotti T, V, X; ed il numero B moltiplichino i tre R, S, I, e faccia i prodotti Y, Z, &. Perche A, moltiplicando se medesimo,

defimo,

- a 17. del 7. defimo, è multiplicando ancora B, produsse i numeri D, ed N; sarà D ad N, ^a come A à B. Similmente B, multiplicando A, e multiplicando se medesimo, produsse i due N, ed E; sarà N ad E, ^b come A à B, cioè c come D ad N; e perciò i tre D, N, E sono continui proporzionali; nella proporzione di A à B. Di nuouo, perche B, multiplicando se medesimo, e multiplicando C, produsse E, ed O; sarà B à C, ^d come E ad O. Similmente C, multiplicando B, e multiplicando se medesimo, produsse O, ed F; sarà O ad F ^e come B à C; sì che i tre, E, O, F sono continui proporzionali nella proporzione di B à C; cioè di A à B; ma li tre D, N, E sono continui proporzionali nella medesima proporzione di A à B; sarà D ad N, come E ad O; & N ad E, come O ad F; e per l'egualità, D ad E ^f sarà come E ad F; per la qual cosa i tre primi prodotti D, E, F sono continui proporzionali.

A 2 B 4 C 8
D 4 N 8 E 16 O 32 F 64
G 8 P 16 Q 32 H 64 R 128 S 256 I 512
K 1024, T 32, V 64, X 128, L 256, Y 512, Z 1024, & 2048, M 4096,

- Di nuouo, perche A, multiplicando i tre D, N, E, produsse i tre G, P, Q, saranno i prodotti G, P, Q, ^g nella medesima proporzione de i tre D, N, E; cioè nella proporzione di A à B. Parimente, perche A, & B, multiplicando il medesimo numero E, produssero i due Q, ed H; sarà Q ad H ^h come A à B; dal che i quattro G, P, Q, H sono continui proporzionali nella proporzione di A à B. Oltre à ciò, perche B, multiplicando i tre E, O, F, produsse i tre H, R, S; saranno i tre H, R, S, ^k proporzionali, nella proporzione de i tre E, O, F; cioè nella proporzione di B à C ouero di A à B. E similmente, perche, multiplicando i due B, C, per il medesimo numero F, produsse i due S, ed I; sarà S ad I ^l come B à C, cioè come A à B; per la qual cosa i quattro numeri H, R, S, I sono continui proporzionali nella proporzione di A à B; ma i quattro G, P, Q, H sono similmente continui proporzionali nella medesima proporzione di A à B; saranno i quattro G, P, Q, H nella medesima continua proporzione de i quattro H, R, S, I; e per l'egualità, sarà G ad H ^m come H ad I, e perciò i secondi prodotti G, H, I sono continui proporzionali. Nell'istesso modo si dimostrerà che i tre vltimi prodotti K, L, M sono continui proporzionali, che era da dimostrarsi.

THEOREMA XII. PROPOSITIONE XIV.

Se vn numero quadrato misura vn altro numero quadrato, il lato dell'vno misurerà il lato dell'altro; e se il lato d'vn numero quadrato misura il lato d'vn altro numero quadrato, il quadrato dell'vno, misurerà il quadrato dell'altro.

Siano i numeri quadrati A, & B, i di cui lati siano C, & D; e prima, il numero quadrato A misuri il numero quadrato B. Dico che il lato C misurerà il lato D. Si moltiplichino i numeri C & D scambievolmente, ed il prodotto sia E, per

$$A\ 4 \quad E\ 16 \quad B\ 64$$

 il Corollario all'vndecima proposizione di questo, i tre numeri A, E, B sono continui proporzionali, nella proporzione di C à D; ma il primo A, per ipotesi, misura il terzo B; per la settima di questo, il primo A misurerà ancora il secondo numero E: e perchè A ad E è come C à D, ed il numero A misura E, il numero C^a misurerà ancora il numero D, che era da dimostrarsi nel primo luogo.

a 30. defin.
del 7.

Di nuovo, supposto che il lato C misuri il lato D. Dico, che il quadrato A misurerà il quadrato B. S'intenda fatta l'istessa costruzione, faranno i tre numeri A, E, B continui proporzionali, nella proporzione di C à D; e perciò A ad E è come C à D; ma il numero C misura, per ipotesi, il numero D; il numero A ancora^b misurerà il numero E. Finalmente perchè A ad E è come E à B, ed il numero A misura E, ancora il numero E^c misurerà B; per la qual cosa il numero quadrato A^d misurerà il numero quadrato B, come fu proposto dimostrare.

b 30. defin.
del 7.

c 30. de fin.
del 7.
d 11. all'oma
del 7.

THEOREMA XIII. PROPOSITIONE XV.

Se vn numero cubo misura vn altro numero cubo, il lato di vno misura il lato dell'altro; e se il lato misura il lato, ancora il cubo misurerà il cubo.

Siano i numeri cubi A, & B, i di cui lati siano C, & D: Dico che, se il cubo A misura il cubo B, ancora il lato C misurerà il lato D; e se il lato C misura il lato D, ancora il cubo A misurerà il cubo B. Si moltiplichino in se medesimi i numeri C, & D, ed i prodotti siano E, ed F; poi si moltiplichino i numeri C, D scambievolmente, ed il prodotto sia G, per il Corollario all'11. proposizione, i tre numeri E, G, F saranno continui proporzionali, nella proporzione di C à D. Di nuovo, i numeri C, & D moltiplichino il numero

G, ed i prodotti siano H, $A\ 8 \quad H\ 24 \quad K\ 72 \quad B\ 216$
 & K; sarà H à K^a come C $E\ 4 \quad G\ 12 \quad F\ 36$
 à D; ed i quattro numeri $C\ 2 \quad D\ 6$
 A, H, K, B, per il Corollario

a 18 del 7.

alla 12. proposizione di questo, sono continui proporzionali, nella proporzione di C à D. E perchè il primo termine A misura l'ultimo B, perciò il medesimo numero A^b misurerà il secondo H; ma la proporzione di A ad H è come C à D, misurando A il numero H, e ancora C misurerà il numero D, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

b 7. del 8.
c 30. defin.
del 7.

Di nuovo, supposto che il lato C misuri il lato D. Dico che il cubo A misurerà il cubo B. Si concepisca fatta la medesima costruzione, e per il Corollario alla 12. proposizione di questo, i numeri A, H, K, B sono

con-

d 10. defin.
del 7.

e 30. defin.
del 7.
f 11. assioma
del 7.

continui proporzionali nella proporzione di C à D; dal che A ad H farà come C à D: mà C misura

D, per ipotesi, perciò A
misurerà H. In oltre per-
che i numeri A, H, K, B,
sono continui proportio-

A 8 H 24 K 72 B 216
E 4 G 12 F 36
C 3 D 6

nali, ed A misura H, ancora H ^e misurerà vguualmente K, ed il numero K
misurerà B. Hor perche A misura H, ed H misura K, il numero A ^f mi-
surerà K; mà K misura B, dunque A misurerà B, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA XIV. PROPOSITIONE XVI.

Se il numero quadrato non misura il numero quadrato,
ne meno il lato misura il lato; e se il lato d'un quadrato
non misura il lato d'un altro quadrato, ne meno quel qua-
drato misura l'altro quadrato.

Siano i numeri quadrati A, B, i di cui lati siano C, D. Dico prima, che
se il quadrato A non misura il quadrato B, ne meno il lato C misurerà il
lato D. Misuri C, s'è possibile, il lato D, per l'an-
tecedente propositione, il quadrato A misure-
rà il quadrato B, ch'è contro all'ipotesi. Non
dunque C misura D, ch'era da dimostrarsi nel
primo luogo.

A 16 B 81
C 4 D 9

Di nuovo Dico che, se il lato C non misura il lato D, ne meno il
quadrato A misurerà il quadrato B. Perche, se il quadrato A misurasse
il quadrato B, per l'antecedente propositione, il lato C misurerebbe il
lato D, ch'è contro all'ipotesi. Non dunque il quadrato A misura il qua-
drato B, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA XV. PROPOSITIONE XVII.

Se il numero cubo non misura vn altro numero cubo,
ne meno il lato dell'vno misurerà il lato dell'altro; e se il la-
to d'un numero cubo non misura il lato d'un altro numero
cubo, ne meno il cubo dell'vno, misurerà il cubo dell'
altro.

Siano i numeri cubi A, B, i di cui lati siano i
numeri C, D. Dico prima, che se il cubo A non
misura il cubo B, ne meno il lato C misurerà il

A 8 B 27
C 2 D 3

a 15. del 8.

lato D. Perche se il lato C misurasse il lato D, il cubo A ^a misurerebbe
il cubo B, ch'è contro all'ipotesi. Non dunque C misura il lato D.

Supposto che il lato C non misuri il lato D. Dico che il cubo A non
misura il cubo B. Misuri il cubo A, s'è possibile, il cubo B, per la 15.

propo-

proposizione di questo, il lato C misurerà il lato D, ch'è contro all'ipotesi. Non dunque il cubo A misura il cubo B, come fu proposto dimostrare.

THEOREMA XVI. PROPOSITIONE XVIII.

Frà due numeri piani simili cade vn medio proportionale; ed il numero piano al simile numero piano, hà duplicata proportionione, che il lato homologo dell'vno al lato homologo dell'altro.

Siano i numeri piani simili A, B, ed i lati del piano A siano C, & D; come ancora i lati del piano B siano E, F, in modo, che moltiplicandosi i due C, D scambievolmente, produchino il piano A; e moltiplicandosi i due E, F, produchino il piano B. Perche i piani A, & B sono simili, perciò i loro lati * saranno proportionali, e sarà C à D come E ad F. Dico prima, che frà i due A, & B cade vn medio proportionale. Si moltiplichino i due D, E scambievolmente, ed il prodotto sia G. Perche C à D è come E ad F, permutando, ^a C ad E C 6 D 2 E 9 F 3; farà come D ad F. Hor perche D,

a 21. defin. del 7.

b 13. del 7.

c 17. del 7.

d Scol. alla

a. del 7.

e 17. del 9.

moltiplicando i due C, ed E, produce i due A, & G; sarà A à G, e come C ad E, cioè ^d come D ad F: e perche E, moltiplicando i due D, ed F, produce i due G, & B; sarà G à B e come D ad F; cioè come A à G: dal che i tre A, G, B sono continui proportionali; e perciò frà i numeri piani A, & B cade vn solo medio proportionale, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

Di nouo Dico, che il numero piano A al simile numero piano B, hà duplicata proportionione, di quella che hà il lato homologo C al lato homologo E; ouero di quella, che hà il lato homologo D al lato homologo F; cioè che hà l'antecedente all'anecedente, ò il conseguente al conseguente. Perche i tre numeri A, G, B sono continui proportionali, il primo A al terzo B ^f hà duplicata proportionione di quella, che hà il primo A al secondo G: ma A à G, per quel che si è dimostrato, è come C ad E, ouero come D ad F; hauerà il numero piano A al numero piano B duplicata proportionione, di quella che hà C ad E, ouero D ad F, come fu proposto dimostrare.

f Lemma 7.

d opo la 18.

del 7.

THEOREMA XVII. PROPOSITIONE XIX.

Frà due numeri solidi simili cadono due medij continui proportionali; ed il numero solido al numero solido simile hà triplicata proportionione, che il lato homologo dell'vno al lato homologo dell'altro.

Siano i numeri solidi simili A, & B; i lati del solido A siano i notati C, D, E, ed i lati del solido B siano i notati F, G, H; e perche i solidi A, & B sono simili, perciò haueranno i lati proporzionali; cioè C à D, come F à G, & D ad E come G ad H. Dico prima, che frà i due A, & B cadono due medij proporzionali. Si multiplichino i due C, D scambievolmente, ed il prodotto sia K. Parimente si multiplichino i due F, G scambievolmente, ed il prodotto sia L; e multiplicandosi i due D, F scambievolmente producano il numero P. In oltre multiplicando i due E, H, per il medesimo numero P, produchino i numeri M, N. Perche i tre C, D, E sono proporzionali à i tre F, G, H, permutandosi, ^a saranno ancora proporzionali; cioè Cad F sarà come D à G, e come E ad H. Di più, perche D, multiplicando i due C, ed F, produsse i due K, & P, ^b sarà K à P come Cad F. Similmente perche F, multiplicando i due D, & G, produsse i due P, ed L; sarà Pad L ^c come D à G; per la qual cosa i tre K, P, L sono continui proporzionali nella proportion di Cad F, ouero di D à G, ò pure di E ad H. E perche il solido A è prodotto dalla multiplicatione de i tre lati C, D, E, ed il numero K nasce dalla multiplicatione de i due C, D, multiplicando il numero K per l'altro lato E, produrrà il numero A. Oltre à ciò perche il solido B vien fatto ^d dalla multiplicatione de i tre lati F, G, H, ed il numero L è fatto dalla multiplicatione de i due F, G multiplicando H il numero L, produrrà il numero B. E perche E, multiplicando i due K, P, produsse i due A, M; sarà il numero A al numero M, ^e come K à P; cioè come Cad F, ouero come D à G, ò pure come E ad H. Similmente H, multiplicando P, ed L, produsse i due N, B; farà N à B ^f come Pad L, cioè come Cad F, ouero D à G, ò pure E ad H. Finalmēte perche i due E, H, multiplicando P, produssero M, ed N, la proportion di M ad N ^g sarà come quella di Pad L; cioè come Cad F, ouero D à G, ouero E ad H: per la qual cosa i quattro A, M, N, B, sono continui proporzionali nella proportion di Cad F, ouero di D à G, ò pure di E ad H; e perciò frà i numeri solidi simili A, & B, cadono due numeri medij proporzionali, ch'era da dimostrarfi nel primo luogo.

Di nouo. Dico che il solido A al solido simile B, hà triplicata proportion di quella, che hà il lato homologò C al lato homologò F, ouero D à G, ouero E ad H. Perche i quattro numeri A, M, N, B sono continui proporzionali, il primo A al quarto B, ^h hà triplicata proportion di quella, che hà il primo A al secondo M: ma il primo A al secondo M è come Cad F, ouero D à G, ouero E ad H; il solido dunque A al simile solido B, hauerà triplicata proportion di quella, che hà Cad F, ouero D à G, ouero E ad H, ch'era da dimostrarfi.

h Lemma 7.
depo la 18.
del 7.

e fra due numeri piani cade vn medio proportionale ;
 numeri sono piani simili.

Frà i due numeri A, & B, cada il numero C, medio proportionale. Dico che i numeri A, & B sono piani simili. Si prendano i due numeri D, ed E in modo, che siano ^ai minimi nella proportion di A à C, ouero C à B, perche i due D, E sono minimi nella proportion di A à C, perciò i numeri D, ed E ^bmisurano vglualmente i due A, & C, per qualche numero F. Similmente perche A à C, peripotesi, è come C à B, sarà D ad E come C à B: ma i numeri D, E, per costruzione, sono i minimi nella proportion di C à B, perciò misurano i numeri C, & B ^d vglualmente per qualche numero G. Hor perche D misura il numero A per il numero F, multiplicando F nel numero D, ^eil prodotto sarà A, ed il medesimo numero F, multiplicando il numero E, produrrà C. Di più, perche i numeri D, E misurano vglualmente i numeri C, B, per il numero G, multiplicando G per D, ^fprodurrà il numero C; e multiplicando G per E, produrrà il numero B. Oltre à ciò, perche i due F, & G, multiplicando il medesimo numero B, produrranno i numeri C, & B, sarà C à B, come F à G; mà C à B è come D ad E, sarà D ad E come F à G; e permutando, D ad E come F à G. In oltre, perche F, multiplicando D, produce il numero A, sarà A numero piano, i di cui lati sono D, ed F. Similmente, multiplicando G per E, si produce il numero B, è perciò B ^g sarà numero piano, i di cui lati sono E, & G: mà questi quattro lati furono dimostrati proportionali, cioè D ad E come F à G; i numeri dunque A, & B ^h sono piani simili, come fu proposto dimostrare.

a Sent. alla
35. del 7.

b 1 i. del 7.

Scot. alla
A.2. del 7.

d. 11. del 7.º
e 9.º. asimismo
del 7.º.

f 9. a fioma
del 7.

18. 15. 1974

Scol. alla 12. del 7.

X 13-del 7-
1 10. de 60.

del 7. 0-7 201
m 16. def n

del 7.

del 7.°

Se fra due numeri cadono due medij continui proporzionali, quei numeri saranno solidi simili:

Frà i due numeri A, & B. A 24 C 72 D 216 B 648
 cadano i due medij conti- E 1 F 3 G 9
 nui proporzionali C, & D. H 1 K 1 M 34 P 3 L 3 N 72
 Dico che i numeri A, & B
 sono solidi simili. Si prendano i tre E, F, G minimi nella proporzione
 de' i numeri A, C, D, B faranno i tre E, F, G continui proporzionali; e
 perche frà i due E, & G eade vn medio proportionale F, faranno i due
 E, & G b piani simili. Hor siano li due H & K i lati del piano E, ed i
 due P, ed L i lati del piano G;
 farà H à K come P ad L, e per- A 8 C 12 D 18 B 27
 consequendi, H à P, farà come K E 4 F 6 G 9
 ad L; e perche i tre E, F, G sono H 2 K 2 M 2 P 3 L 3 N 3
 i minimi nella proporzione de' i

a 25. del 2

10 del 8.

7. Car. defn.
del 2.

del 13. del 2

c 21. del 7.

f 21. del 7.

g 17. defin.
del 7.

h 18. del 7.

K 17. del 7.
18. del 7.
m 18. del 8.n Lemma 7.
dopo la 18.
del 6.o Scol. alla
12. del 7.p 22. defin.
del 7.

a 20. del 8.

numeri A, C, D, perciò i numeri E, F, G, misureranno ugualmente i numeri A, C, D, per qualche numero M. Similmente perchè i numeri E, F, G sono i minimi nella proporzione de i tre C, D, B, perciò misureranno ugualmente i numeri C, D, B, per qualche numero N in modo, che M, moltiplicando i numeri E, F, G produrrà i numeri A, C, D; ed il numero N, moltiplicando i medesimi E, F, G produrrà i numeri C, D, B. E perchè dalla moltiplicazione de i due lati H, K è fatto il numero E; e dalla moltiplicazione de i

due P, L, è fatto il numero A 24 C 72 D 216 B 648
ro G; ed il numero A è E 1 F 3 G 9
fatto dalla moltiplicazione di M in E, in conseguenza il numero A sarà fatto dalla moltiplicazione de i tre H, K, M.

Nell'istesso modo si prouerà, che il numero B è fatto dalla moltiplicazione de i tre numeri P, L, N; per la qual cosa i numeri A, & B sono numeri solidi; l di cui lati sono H, K, M, & P, L, N.

In oltre perchè M, N moltiplicando il medesimo numero F, per quel che si è dimostrato producono i numeri C, D sarà C a D, come M ad N. Similmente perchè N, moltiplicando i due E, F produrrà i due C, & D; sarà E ad F, K come C a D; ma C a D è come M ad N; sarà E ad F, come M ad N. Di più essendo i numeri E, & G piani simili, haueranno duplicata proporzione de' loro lati homologhi, cioè hauerà E a G duplicata proporzione di quella, che ha il lato homologho H al lato homologho P ouero di quella, che ha K ad L; ma E a G ha duplicata proporzione che il medesimo numero E ad F (stante che E, F, G sono continui proporzionali) perciò E ad F sarà come H a P, ouero come K ad L: ma E ad F, per quel che si è dimostrato; è come M ad N; sarà H a P, o come K ad L; e K ad L come M ad N: dal che i tre lati H, K, M sono proporzionali a i tre lati P, L, N, per la qual cosa il solido A, prodotto da i tre lati H, K, M sarà simile al solido B, prodotto da i tre lati P, L, N, come fu proposto dimostrare.

THEOREMA XX. PROPOSITIONE XXII.

Se tre numeri sono continui proporzionali, ed il primo sia numero quadrato; ancora il terzo sarà numero quadrato.

Siano i tre numeri A, B, C continui proporzionali, ed il primo A sia numero quadrato. Dico che il terzo C sarà ancora numero quadrato. Perchè fra gli A 9 B 34 C 324 estremi A, & C cade il numero medio proporzionale B, i due A, & C, saranno piani simili; ma il piano A è suppo-

sto

sto quadrato, in conseguenza il simile piano C sarà quadrato, che era da dimostrarli.

THEOREMA XXI. PROPOSITIONE XXIII.

Se quattro numeri sono continui proporzionali, ed il primo sia numero cubo, ancora il quarto sarà numero cubo.

Siano i quattro numeri A, B, C, D continui proporzionali, ed il primo A sia numero cubo. Dico che il quarto D sarà ancora numero cubo. Perche fra gli estremi A, & D cadono due medij continui proporzionali; perciò i due A, & D sono solidi simili; ma il numero A è supposto numero cubo: farà il numero D, che gli è simile, ancora numero cubo, ch'era da dimostrarli.

THEOREMA XXII. PROPOSITIONE XXIV.

Se due numeri hanno fra di loro l'istessa proportion, che hà vn numero quadrato ad vn altro numero quadrato; se il primo è numero quadrato, ancora il secondo sarà numero quadrato.

Siano i due numeri A, & B da vna parte, e due numeri quadrati C, & D da vn'altra parte; ed habbia il numero A al numero B l'istessa proportion, quale hà il numero quadrato C al numero quadrato D; e sia A numero quadrato. A 36 F 48 B 64 Dico che B sarà ancora numero quadrato. C 9 E 12 D 16 Cada fra i due numeri quadrati C, & D vn medio proportionale, che sia E. Similmente cada fra i due numeri A, & B vn medio proportionale, che sia F. Perche i tre A, F, B sono continui proporzionali, ed il primo A è numero quadrato, farà ancora il terzo B numero quadrato, il che era da dimostrarli.

THEOREMA XXIII. PROPOSITIONE XXV.

Se due numeri hanno fra di loro l'istessa proportion, che hà vn numero cubo ad vn altro numero cubo, ed il primo di quelli è numero cubo, ancora il secondo sarà numero cubo.

Habbia il numero A al numero B, quella proportionione, che hà $A 8 \quad C 12 \quad E 18 \quad B 27$
 il numero cubo C al numero cubo D, ed il numero A sia cubo. Dico che il numero B sarà ancora lui cubo. Frà i due numeri cubi C, & D² cadano due medij continui proportionali, come E, ed F, e frà i due numeri A, & B³ cadano due medij continui proportionali, come G, ed H. Perche i quattro A, G, H, B sono continui proportionali, de' quali il primo A, per ipotesi, è numero cubo, farà ancora il quarto B³ numero cubo, come fu proposto dimostrare.

a 12. del 8.

b 8. del 8.

c 3. del 8.

THEOREMA XXIV. PROPOSITIONE XXVI.

I simili numeri piani sono frà di loro, come i numeri quadrati.

Siano i simili numeri piani A, & B. Dico che il numero piano A al simile numero piano B, è come qualche numero quadrato ad vn altro numero quadrato. Perche i numeri A, & B sono piani simili, caderà frà di loro vn medio proportionale; sia quello il numero C. Si prendano tre numeri, come D, E, F, che siano minimi nella continua proportionione di A, C, B, per il primo Corollario alla 2. propositione di questo, gli estremi D, ed F sono numeri quadrati. Hor perche A à C è come D ad E, e C à B è come E ad F, per l'egualità, il numero piano A² al simile numero piano B è come il numero quadrato D al numero quadrato F, ch'era da dimostrarsi.

a 8. del 7.

b 35. del 7.

c 14. del 7.

S C O L I O.

La conuersa dell' antecedente propositione facilmente la dimostreremo col P. Clauio nel seguente modo.

I numeri, che hanno la medesima proportionione, quale hanno i numeri quadrati, sono piani simili.

Habbia il numero A al numero B l'istessa proportionione, quale hà il numero quadrato C al numero quadrato D. Dico che i numeri A, & B sono piani simili. Perche frà i numeri quadrati C, & D² cade vn medio proportionale, e la proportionione di C à D è come A à B, caderà frà i due A, & B³ vn medio proportionale, perciò i numeri A, & B³ sono piani simili, ch'era da dimostrarsi.

a 12. del 8.

b 8. del 8.

c 30. del 8.

THEOREMA XXV. PROPOSITIONE XXVII.

I numeri solidi simili sono frà loro, come i numeri cubi.

Siano

Siano i numeri solidi simili A, & B. Dico che il numero A al numero B è come qualche numero cubo ad vn altro numero cubo. Perche i numeri A, & B sono solidi simili, frà essi caderanno 2 due medij cō-

A 240	C 360	D 540	B 810
E 8	F 12	G 18	H 27

 rinui proportionali, che siano C, E & D: si prendano poi quattro numeri minimi nella continua proportione de' numeri A, C, D, B; faranno gli estremi E, ed H, per il primo Corollario alla seconda proposizione di questo, numeri cubi. E perche i numeri E, F, G, H sono nella continua proportione de i numeri A, C, D, B, per l'egualità, sarà E ad H^c come A à B; cioè il numero solido A al simile solido B, come il numero cubo E al numero cubo H, che era da dimostrarfi.

a 191 del 8.

b 35 del 7.

c 24 del 7.

S C O L I O.

La conuersa di questa proposizione è facilissima nel seguente modo.

I numeri, che hanno l'istessa proportione de' numeri cubi, sono soli di simili.

Habbia il numero A al numero B l'istessa proportion, quale hà il numero cubo C al numero cubo D.

A 16	B 54
C 64	D 216

 Dico che i numeri A, & B sono solidi simili. Perche A à B, per ipotesi, è come C à D, ed i numeri C, & D sono cubi, caderanno frà i due C, & D, 2 due medij continui proportionali: mà il cubo C al cubo D è come A à B, caderanno ancora frà i due A, & B, due medij continui proportionali, e per la 21. proposizione di questo, gli estremi A, & B sono solidi simili, come sù proposto dimostrare.

a 12 del 8.

b 8. del 8.

S C O L I O.

Per le cose da dimostrarfi non sarà inutile il seguente problema.

Ritrouare due numeri piani, i quali non habbiano la proportione del numero quadrato al numero quadrato.

Si prendano due numeri primi, ouero due numeri frà di loro primi, che nissuno sia numero quadrato, e siano per essempio li notati A & B. Dico che il numero A al numero B non è come il numero quadrato al numero quadrato; se il numero A al numero B è come il numero quadrato al numero quadrato, li numeri A & B, per la 26. di questo, faranno piani simili, e per la 18. di questo, frà li due A & B cade vn medio proportionale; e perche li due estremi A & B, per ipotesi, sono numeri primi, non hanno alcuna commune misura fuor che l'unità; per la quale cosa li due estremi A & B, ed il medio, non hanno commune misura, e perciò sono frà di loro primi, e per la prima proposizione di questo sono i minimi nella

loro proportione , e per il Corollario primo alla propositione seconda di questo, li due estremi *AB* & *B* sono numeri quadrati, ch'è contro all'ipotesi, mentre si è supposto, che niſſun de'li due sia quadrato; non dunque il numero *A* al numero *B* è come il numero quadrato al numero quadrato, che era da dimostrarsi.

C O R O L L A R I O I.

Da quel che si è detto è manifesto , che li numeri primi non sonò come i numeri quadrati.

C O R O L L A R I O II.

Dall'antecedente propositione si caua il modo da ritrouare due numeri , che non siano piani simili l'aggregato de quali non sia numero quadrato , ne habbia proportione à ciascuno di loro, come numero quadrato à numero quadrato; poiche, se si diuiderà vn numero non quadrato in due numeri primi, ouero frà di loro primi, il loro aggregato non sarà numero quadrato , ed il medesimo aggregato, per la 30. propositione del settimo, sarà primo à ciascuno di quelli, e per l'antecedente Scolio, l'aggregato à ciascuno di quelli non sarà come numero quadrato à numero quadrato.

Fine del Ottauo Elemento.

EVCLIDE RESTITVTO

DA

VITALE GIORDANI

ELEMENTO NONO.



THEOREMA I. PROPOSITIONE I.

Se dalla scambieuole multiplicatione di due numeri piani simili, se ne produce qualche numero, il prodotto farà numero quadrato.



SI A N O i due numeri piani simili A, & B, i quali multiplicandosi scambieuolmente, produchino il numero C.

A 6 B 54
D 36 E 108 C 324

Dico che il prodotto C è numero quadrato. Si multipli il numero A in se medesimo, ed il prodotto sia il numero quadrato D. Perche A, multiplicando i due A, & B, produce i numeri D, & C, farà il numero A al numero B, come D à C: ma frà i piani simili A, & B cade vn medio proportionale, caderà ancora frà i due D, & C vn medio proportionale, sia dunque quello il numero E; faranno i tre D, E, C continui proportionali. Hor essendo i tre numeri D, E, C continui proportionali, ed il primo D, per costruzione, è quadrato, farà ancora il terzo C numero quadrato, come fù proposto dimostrare.

a 27. del 7.
b 28. del 6.
c 8. del 8.
d 29. del 8.

THEOREMA II. PROPOSITIONE II.

Se due numeri, multiplicandosi scambieuolmente, producono vn numero quadrato; quelli sono piani simili.

Siano i due numeri A, & B, i quali, multiplicandosi scambieuolmente, produchino il numero quadrato C. Dico che i numeri A, & B sono

Ccc piani

piani simili. Si multiplichi il numero A in se medesimo, ed il prodotto sia D. Perche A, multiplicando B, e multiplicando se medesimo, produce i due D, & C; farà A à B come D à C; ma frà i due quadrati D, & C, cade vn medio proportionale; caderà ancora frà i due A, & B vn medio proportionale; per la qual cosa i numeri A, & B sono piani simili. che era da dimostrarli.

THEOREMA III. PROPOSITIONE III.

Se vn numero cubo, multiplicando se medesimo, produce qualche numero, quel prodotto farà numero cubo.

Sia il numero cubo A, il quale, multiplicato in se medesimo, produca il numero B. Dico che il numero B è cubo. Sia C il lato del cubo A, e multiplicando C in se medesimo, si produca il numero D; si che C, multiplicando D, produca il numero cubo A. Perche C, multiplicando se medesimo, produce D; perciò il numero C misurerà il numero D per il numero C; ma l'vnità Z misura C per il medesimo numero C, perciò tale parte è l'vnità Z di C, quale parte è C di D; e la proportionc dell'vnità Z à C farà come quella del numero C al numero D; per la qual cosa l'vnità Z, ed i numeri C, D sono continui proportionali. Similmente perche C, multiplicando D, produce A; perciò D misurerà A per il numero C; ma C misura D per il medesimo numero C; il numero C dunque misura D, come D misura A; dalehe C à D sarà come D ad A; ma C à D è come l'vnità Z à C; l'vnità Z dunque, ed i numeri C, D, A sono continui proportionali; per la qual cosa frà l'vnità Z, ed il numero A, cadono due medij proportionali, che sono C, & D. In oltre perche A, multiplicando se medesimo produce B, perciò A misura B per il numero A; ma l'vnità Z misura A per il medesimo numero A; l'vnità dunque misura A, come A misura B; dalehe tale parte è l'vnità di A, quale parte è A di B; donde la proportionc, che hà l'vnità Z ad A, hauerà il numero A à B; ma frà l'vnità Z, ed il numero A, per quel che si è dimostrato, cadono i due medij C, & D proportionali; trà i due dunque A, & B, caderanno ancora due medij continui proportionali, come F, ed E. Hor perche i quattro A, E, F, B sono continui proportionali, ed il primo A, per ipotesi, è numero cubo, farà ancora il quarto B numero cubo; che era da dimostrarli.

THEOREMA IV. PROPOSITIONE IV.

Se vn numero cubo multiplica vn altro numero cubo, il prodotto farà ancora numero cubo.

Siano

Siano esposti i numeri cubi A, & B, e dalla loro scambieuoale multiplicatione se ne produca il numero C. Dico che C è numero cubo. S'intenda moltiplicato il numero A A^8 B 2^7 in se medesimo, ed il prodotto fra D, sarà D 6^4 C 2^{16} a 3. del 9.
 ro cubo. Perche A, moltiplicando se medesimo, e moltiplicando B, produce i numeri D, & C, hauerà A à B, l'istessa proportionione, quale ha D à C; ma fra i due numeri cubi A, & B ^{c} cadono due medij proportionali; fra i due numeri dunque D, & C ^{d} caderanno ancora due medij proportionali: e perche il numero D fu dimostrato numero cubo, in conseguenza il numero C ^{e} sarà ancora numero cubo, ch'era da dimostrarfi.

THEOREMA V. PROPOSITIONE V.

Se vn numero cubo, moltiplicando qualche altro numero, produce numero cubo; il numero moltiplicato sarà cubo.

Sia il numero cubo A, il quale, moltiplicando qualche numero B, produca il numero cubo C. Dico che il numero moltiplicato B è numero cubo. Moltiplichi il numero A se medesimo, e produca il numero D. Perche A è numero cubo, sarà ancora D ^{a} numero cubo. In oltre, perche A, moltiplicando se medesimo, e moltiplicando B, produce i due D, & C, sarà A à B ^{b} come D à C: ma fra i due numeri cubi D, & C, ^{c} cadono due medij proportionali; fra i due numeri ancora A, & B ^{d} caderanno due medij proportionali; fu supposto A numero cubo, in conseguenza B ^{e} sarà ancora numero cubo, il che era da dimostrarfi.

THEOREMA VI. PROPOSITIONE VI.

Se dalla multiplicatione d'un numero in se medesimo se ne produce vn numero cubo, il numero moltiplicato sarà cubo.

Sia il numero A, il quale moltiplicando se medesimo, produca il numero cubo B. Dico che A è numero cubo. Dalla multiplicatione di A in B se ne produca il numero C. Perche A, moltiplicando se medesimo, produce B, e da nouo A moltiplicando B produce C, per la 19. definitione del 7. il numero C sarà cubo. Hor perche B, per ipotesi, è numero cubo, e dalla multiplicatione del numero cubo B, nel numero A, se ne produce il numero cubo C, il numero A, per l'antecedente propositione, sarà cubo, il che era da dimostrarfi.

ne del 7. il numero B farà quadrato. Di più, perche i tre numeri B, C, D sono continui proporzionali, ed il primo B, per quel che si è dimostrato è quadrato, il terzo ancora D^d farà quadrato. Nell'istesso modo, considerando i tre D, E, F continui proporzionali, ed il primo D, per quel che si è dimostrato, è numero quadrato; farà ancora il terzo F^e numero quadrato: per la qual cosa, interponendone sempre vno, gli altri sono quadrati.

Di nouo, perche l'vnità Z ad A è come B à C, tante volte l'vnità Z misurerà A,^f per quante volte B misura C: ma l'vnità Z misura A 5 per il

Z 1. A 5. B 9. C 27. D 81. E 243. F 729. G 2187. H 6561.
K 18683. L 56049. M 168147. N 504441. P 1513323.

medesimo numero A; perciò il numero B misura C per l'istesso numero A; per la qual cosa, moltiplicando A per B, il prodotto farà C; è perche A, moltiplicando se medesimo, produce B, e moltiplicando B, produce C, per la definizione 19. del 7. il numero C farà cubo. In oltre perche i quattro numeri C, D, E, F sono continui proporzionali, ed il primo C è numero cubo; farà il quarto F^h ancora numero cubo. Similmente perche i quattro numeri F, G, H, K sono continui proporzionali, ed il primo F è numero cubo, farà il quarto K^k ancora numero cubo. Ed il medesimo si prouerà de gli altri, e perciò, interponendone sempre due, tutti gli altri sono numeri cubi.

Finalmente, perche il numero F, ch'è il settimo, contando dall'vnità, fu prima dimostrato essere numero quadrato, e poi numero cubo, sarà inconseguenza numero quadrato, e cubo insieme. E nell'istesso modo il numero N, ch'è il settimo, contando da F, essendone interposti cinque, cioè G, H, K, L, M, farà quadrato, e cubo insieme. Ed il medesimo si dimostrerà per tutti gli altri, se i numeri continui proporzionali saranno di maggior moltitudine, come fu proposto dimostrare.

THEOREMA IX. PROPOSITIONE IX.

Se il primo termine, di quanti numeri si vogliano continui proporzionali, è l'vnità, ed il primo, dopo l'vnità, è numero quadrato; tutti gli altri saranno numeri quadrati; e se il primo, dopo l'vnità, è numero cubo, tutti gli altri saranno ancora numeri cubi.

Siano esposti dall'vnità Z quanti si voglia numeri continui proporzionali A, B, C, D, E, F, ed il primo A, dopo l'vnità, sia numero quadrato. Dico che tutti

gli altri B, C, D, Z 1 A 4 B 16 C 64 D 256 E 1024 F 4096 E, F &c. saranno numeri quadrati. Perche i numeri A, B, C, D, E, F sono dall'vnità continui proporzionali, per l'antecedente propositione, il terzo B è numero

qua-

d 22. del 8.

e 21. del 8.

f 20. defin.
del 7.
g 5. assioma
del 7.

h 23. del 8.

K 23. del 8.

eccettuazione B, D, F, H, L, N, Q, &c. Se è possibile, oltre i notati B, D, F, H, L, N, Q, qualcun altro sia numero quadrato, come il numero. E Perche D

Z 1. A 3 B 4 C 8 D 16 E 32 F 64 G 128 H 256
K 512 L 1024 M 2048 N 4096 P 8192 Q 16384

ad E, ouero E ad F, è come A à B, inuertendo, ^a farà E à D, ouero F ad E, come B ad A; dal che B ad A haucrà la proportion del numero quadrato E al numero quadrato D (stante che D, per l'ottaua propositione di questo, è numero quadrato), ouero quella del quadrato F al quadrato E: ma B, essendo il terzo dall'vnità, ^b è numero quadrato, in consequenza il numero A, ^c ch'è il primo, dopo l'vnità, sarà quadrato, il che è contro all'ipotesi. Non dunque il numero E è quadrato. Nell'istesso modo si prouerà, che nessun altro, fuorchè gli eccettuati, è numero quadrato.

Di nouo, supposto che il numero A, contiguo all'vnità, non sia cubo. Dico che non altro sarà cubo, eccettuazione il quarto dall'vnità, e quelli che restano, interponendone sempre due; cioè eccettuazione i seguenti C, F, K, N, &c. Perche, se oltre questi, qualcun altro fusse cubo, che sia per esempio D, essendo i tre A, B, C, continui proporzionali nella continua proportion de i tre D, E, F; per l'egualità ^a farà A à C come D ad F; ed inuertendo, C ad A ^b sarà come F à D: ma il numero F, ^c per quel che si è detto, è cubo, ed il numero D, per supposizione è cubo, essendo C ad A come F à D, i numeri C, A saranno nella proportion del numero cubo F al numero cubo D: e perche il numero C, ^d quarto dall'vnità, è numero cubo, sarà ancora il numero A, ^e ch'è il primo dopo l'vnità, numero cubo, il che è contro all'ipotesi. Non dunque D è numero cubo. Di nouo, supposto, s'è possibile, che il numero E sia numero cubo. Perche i tre A, B, C, sono continui proporzionali, nella continua proportion de i tre C, D, E; ^f farà, per l'egualità, A à C come C ad E, ed inuertendo, C ad A ^g sarà come E à C: E perche C, per l'eccettuazione, è numero cubo, ed E, per supposizione è numero cubo, sarà il numero cubo C ad A, come il numero cubo E al numero cubo C: per la qual cosa il numero A, ^h ch'è il primo dopo l'vnità, sarà numero cubo, il che è contro all'ipotesi. Non dunque E è numero cubo. Si è dunque dimostrato, che i due D, E interposti fra i cubi C, F non sono numeri cubi; e nell'istesso modo si dimostrerà, che i due G, H, interposti fra i cubi F, K, non sono numeri cubi: e che i due L, ed M, interposti fra i cubi K, N, non sono numeri cubi, come fu proposto dimostrare.

THEOREMA XL PROPOSITIONE XL

Se dall'vnità siano quanti numeri si vogliano, continui proporzionali; sempre il minore misura il maggiore per vno de' medesimi numeri proporzionali.

Sia-

a Scol. alla 10. del 7.

b 8. del 9.
c 24. del 8.

d 14. del 7.
e Scol. alla 10. del 7.
f 8. del 9.

g 8. del 9.
h 25. del 8.

i 14. del 7.
j Scol. alla 10. del 7.

k 25. del 8.

Siano esposti dall'vnità Z quanti numeri si vogliano A, B, C, D, E, F, G, H continui proporzionali. Dico che il minore, come C, misura ogn' altro de' maggiori di lui, come per esempio H, per vno de' numeri A, B, C, D, E, F, G, H, cioè per quel termine, tanto lontano dall'vnità, per quanto è lontano il numero misurato da quello, che misura. Hor do-

Z 1. A 3 B 9 C 27 D 81 E 243 F 729 G 2187 H 6561.

uendosi prouare, che il numero C misura H, per vno de' medesimi termini proporzionali. Dico che C misura H per il numero E, ch'è tanto lontano dall'vnità Z, per quanto H è lontano da C. Perche i termini C, D, E, F, G, H sono continui proporzionali, nella continua proportion de' termini Z, A, B, C, D, E, per l'egualità, sarà Z ad E^a come C ad H; e perciò l'vnità Z misura E^b come C misura H: mà l'vnità Z misura E^c per l'istesso numero E, in conseguenza il numero C misura H per il medesimo numero E. Similmente dico, che C misura G per il numero D, il quale è distante dall'vnità Z, per quanto G è lontano da C. Essendo i cinque termini C, D, E, F, G continui proporzionali nella proportion de' cinque termini Z, A, B, C, D, per l'egualità, sarà Z à D^d come C à G; dal che l'vnità Z misurerà D, come C misura G: mà l'vnità Z misurerà D^e per il medesimo numero D, perciò il numero C misura G per l'istesso numero D. Nell'istesso modo si prouerà, che ogn'altro numero minore misura ogn'vno de' maggiori, per vno de' medesimi numeri proporzionali, ch'era da dimostrarli.

a 14. del 7.
b 7. o. defin.
del 7.
c 5. assioma
del 7.

d 14. del 7.

e 5. assioma
del 7.

COROLLARIO.

Nell'antecedente propositione appare, che, se saranno dall'vnità quanti numeri si vogliano continui proporzionali, sempre ciascuno de' minori misura ciascuno de' maggiori, per vno de' medesimi numeri proporzionali, cioè per quel numero, che è tanto distante dall'vnità, per quanto è distante il numero misurato da quello, che misura.

THEOREMA XII. PROPOSITIONE XII.

Se dall'vnità siano quanti numeri si vogliano continui proporzionali, quei numeri primi, che misurano l'ultimo, misureranno ancora il prossimo all'vnità.

Siano esposti dall'vnità Z quanti si voglia numeri continui proporzionali A, B, C, D. Dico che quei numeri primi, che misurano l'ultimo termine D, misureranno ancora il numero A, ch'è prossimo all'vnità. Sia qualunque numero primo E, il quale misuri il numero D. Dico che

il

il numero primo E misura ancora il numero A. Se il numero E non misura il numero A, il numero primo E² sarà primo al numero A, cioè i due A, & E saranno frà di loro primi; e perche E misura il numero D,

Z 1	A 10	B 100	C 1000	D 10000
E 5	H 20	G 200	F 2000	

lo misurerà per qualche numero; lo misuri dunque per il numero F; moltiplicando E il numero F^b produrrà il numero D. Perche D è distante da A come C da Z, per il Corollario antecedente, A misurerà D per il numero C; e perciò A, moltiplicando C, produce D: mà E, moltiplicando F, produce il medesimo D, perciò il prodotto della moltiplicatione di A in C è vguale al prodotto della moltiplicatione di E in F. Si considerino quattro numeri, de' quali il primo sia A, il secondo E, il terzo F, ed il quarto C. Perche il prodotto del primo A, e quarto C, è vguale al prodotto del secondo E, e terzo F; sarà il primo A al secondo E, come il terzo F al quarto C; mà i due A, E sono frà di loro primi, e perciò minimi nella loro proportion, in conseguenza i numeri A, ed E, misureranno vgualmente i due F, & C; cioè l'antecedente A misura l'antecedente F, come il conseguente E misura il conseguente C; e supposto, che il numero E misuri C per G, moltiplicando E nel numero G, produrrà il numero C. In oltre, perche A, per l'antecedente Corollario, misura C per il numero B, moltiplicando A in B^b il prodotto sarà C: mà si disse, che G era prodotto dalla moltiplicatione di E in G, sarà il prodotto di E in G vguale al prodotto di A in B; e sarà A primo ad E secondo, come G terzo à B quarto: mà i numeri A, ed E, sono primi frà loro, in conseguenza sono i minimi nella loro proportion di G à B, per la qual cosa i numeri A, E misurano vgualmente i numeri G, & B, cioè l'antecedente A misura l'antecedente G, ed il conseguente E misura il conseguente B. E supposto, che E misuri B per il numero H, moltiplicando E in H^b il prodotto sarà B. Perche, per il Corollario antecedente, A misura B, per il medesimo numero A (stante che A è distante dall'vnità, come B è distante da A) perciò A, moltiplicando se medesimo, produce B; mà E, moltiplicando H, produce il medesimo B, perciò il prodotto di A in se medesimo è vguale al prodotto di E in H. Si considerino tre numeri, cioè il primo E, il secondo A, ed il terzo H. Perche il prodotto del primo E nel terzo H è vguale al prodotto del secondo A in se medesimo; sarà E ad A, come A ad H: mà i due E, ed A sono frà di loro primi, ed in conseguenza minimi nella proportion di E ad A, ouero di A ad H; perciò i numeri E, A misureranno vgualmente i numeri A, H, cioè l'antecedente E misura l'antecedente A, ed il conseguente A misura il conseguente H. Mà, per ipotesi, E non misura A, il numero dunque E misurerebbe, e non misurerebbe il numero A, ch'è impossibile. Per la qual cosa, se il numero primo E misura il numero D, misurerà ancora il numero A prossimo all'vnità, che era da dimostrarfi.

21. del 7.

b 5. assioma del 7.

c 9. assioma del 7.

d 19. del 7.

e 23. del 7. f 21. del 7.

g 9. assioma del 7.

h 9. assioma del 7.

K 19. del 7.

l 23. del 7. m 21. del 7.

n 9. assioma del 7.

o 20. del 7.

p 23. del 7.

q 21. del 7.

THEOREMA XIII. PROPOSITIONE XIII.

Se dall'vnità siano quanti numeri si vogliano continui proportionali, e quello, ch'è dopo l'vnità, sia primo; niun' altro misurerà il massimo, fuor che quelli, che sono nei proposti numeri proportionali.

Siano esposti dall'vnità Z quanti numeri si vogliano A, B, C, D continui proportionali, de' quali il numero A, ch'è prossimo all'vnità Z, sia numero primo. Dico che niun'altro numero, fuor che i tre A, B, C, misureranno il massimo D. Misuri, s'è possibile, qualche altro numero E il massimo D, il numero E non sarà numero primo; perche se fosse numero primo, misurando il numero D, per l'antecedente proposizione, misurerebbe il numero A, ch'è prossimo all'vnità, il che è impossibile, stante che il numero A è supposto numero primo. Non dunque il numero E è primo, ma è composto, dal che a qualche numero primo lo misura.

Dico che altro numero primo non lo misura, Z 1

A 5	B 25	C 125	D 625
E —	H —	G —	F —

fuor che il primo A. Perche, se qualche altro numero primo, fuor che A, misurasse il numero E, quello b misurerebbe il numero D (ch'è misurato da E) dal che il medesimo c misurerebbe il numero A prossimo all'vnità, ch'è impossibile per essere A numero primo, e perciò non altro numero primo misura E, fuor che il numero A. In oltre, perche E misura D, lo misuri per qualche numero F. Dico che F è diuerso da i numeri A, B, C. Se F sarà il medesimo, che vno de i numeri A, B, C; perche E misura D per il numero F, lo misurerà ancora per vno de' numeri A, B, C; ed all'incontro, d quel numero in A, B, C, che sarà uguale ad F, misurerà il numero D per il numero E; ma il numero D e è misurato da vno de i numeri A, B, C, per vno de i medesimi A, B, C; sarà E vno de i numeri A, B, C, ch'è contro all'ipotesi. Non dunque il numero F è il medesimo, che vno de i tre A, B, C, ma è diuerso. Hor perche E misura D per F, all'incontro F f misura D per E. Dico che F non è numero primo. Perche, se fosse numero primo, misurando l'ultimo D, misurerebbe ancora s il numero A, ch'è prossimo all'vnità, ch'è impossibile (stante che A è numero primo); e perciò F sarà numero composto; per la qual cosa h qualche numero primo lo misura. Dico di nouo non essere altro numero, fuor che il numero A. Se altro numero primo misura il numero F, perche F misura D, quel numero primo k misurerà ancora il numero D, e misurerà i parimente il numero A, prossimo all'vnità, ch'è impossibile; stante che A è numero primo. Non dunque altro numero primo misura F, che il numero primo A. Perche dunque E misura D per F, multiplicando E per F, m il prodotto sarà D. In oltre, perche C è distante dall'vnità, come D è distante da A, per il Corollario all'1. proposizione di questo, A misura D per il numero C; e perciò A, n

multi-

a 33. del 7.

b 11. affom.

del 7.

c 12. del 9.

d 8. affom.

del 7.

e 11. del 9.

f 8. affom.

del 7.

g 12. del 9.

h 33. del 7.

K 11. affom.

del 7.

l 12. del 9.

m 9. affom.

del 7.

n 9. 2. affom.

del 7.

moltiplicando C, produce D: ma il numero D è prodotto dalla moltiplicazione di E in F, sarà il prodotto di A in C vguale al prodotto di E in F; per la qual cosa A primo ad E secondo, sarà come F terzo à C quarto: ma per quel che si è dimostrato, A misura E, il numero F dunque P misurerà il numero C; e supposto che lo misuri per il numero G, si tralasci l'ultimo D, e si consideri C come ultimo.

Se G fosse il medesimo, che vno de i numeri A, & B, vno de i numeri A, & B sarebbe quello, per il quale F misura C; ed all'incontro q vno de i numeri A, & B, misurerà C per il numero F: ma ciascuno de i numeri A, B, misura C per vno de i medesimi numeri A, B; sarà F il medesimo, che vno de i numeri A, B; il che è falso, essendosi dimostrato, che F non è vno de i numeri A, B. Non dunque G è il medesimo di

Z 1 A 5 B 25 C 125 D 625
E — H — G — F —

vno de i numeri A, B. E perche F misura C per G, all'incontro G misurerà C per F. Dico che G non è numero primo. Perche se fosse primo, misurando l'ultimo C, misurerà ancora il numero primo A, " ch'è prossimo all'vnità, il che è impossibile; non dunque G è numero primo, ma è composto, e perciò x qualche numero primo lo misura. Dico che questo non può essere altro numero, che A. Impercioche se altro numero primo, che A, misura G, perche G misura l'ultimo C, quello che misura G, y misurerà ancora l'ultimo C, ed inconseguenza misurerà x parimente il numero primo A, ch'è più prossimo all'vnità, il che è impossibile. Non dunque altro numero primo misura G, fuorchè A: In oltre perche F misura C per il numero G, moltiplicando G per F, il prodotto sarà C. Similmente essendo C distante da A, come B è distante dall'vnità, il numero A misurerà C^b per il numero B; e perciò A, moltiplicando B, e produce C; si disse, che G, moltiplicando F, produce il medesimo C; sarà il prodotto di A in B vguale al prodotto di G in F. Si considerino quattro numeri, il primo sia A, il secondo F, il terzo G, ed il quarto B. Perche il prodotto del primo A, & quarto B, è vguale al prodotto del secondo F, & terzo G, sarà il primo A al secondo F, ^d come il terzo G al quarto B: ma, per quel che si è dimostrato, A misura F, perciò G misurerà il numero B; lo misuri per il numero H, si tralasci l'ultimo C, e si consideri B come ultimo. E tenendo il modo antecedente proueremo, che H è diuerso da A, come si è fatto di F, & G,

Se H è l'istesso, che A, ed il numero G misura B per il numero H, il medesimo numero G misurerà B per il numero A; ed all'incontro A misurerà B per G. In oltre, perche A è distante dall'vnità, come B è distante da A, per il Corollario all' 11. di questo, A misurerà B per il medesimo numero A: ma si disse che A misura B per il numero G, in conseguenza G sarà il medesimo, che A; il che è conero à quel che si è dimostrato. Non dunque H è l'istesso, che A, ma è diuerso. Di più, perche G misura B per H, perciò G, moltiplicando H, g produrrà il numero B. Similmente perche A misura B per il medesimo numero A, moltiplicandosi A in se medesimo, produrrà il numero B: per la qual cosa il

D d d 2

pro-

o 19. del 7.

p 20. defin.
del 7.q 8. assioma
del 7.

r 11. del 9.

t 8. assioma
del 7.

u 12. del 9.

x 33. del 7.

y 12. assioma,
del 7.
z 11. del 9.

a 9. assioma.

b Corol. alla
11. del 9.
c 9. assioma
del 7.d 19. del 7.
e 10. defin.
del 7.f 8. assioma
del 7.g 9. assioma,
del 7.

h 20. del 7.

prodotto di H in G sarà vguale al prodotto di A in se medesimo; e perciò la proportionione del primo H^h al secondo A sarà come il secondo A al terzo G; ed inuertendo, A ad H sarà come G ad A: ma, per quel, che si è dimostrato, A misura H, in conseguenza G misurerà A; il che è impossibile, mentre, per ipotesi, A è numero primo. Per la qual cosa se A è numero primo, nessun'altro numero misurerà il massimo D, che i numeri A, B, C, come fu proposto dimostrare.

THEOREMA XIV. PROPOSITIONE XIV.

Se i numeri primi misurano il minimo di quelli, ch'è misurato da loro; nessun altro numero primo misurerà quel minimo, fuor che i medesimi, che lo misurano da principio.

Sia A il minimo numero, misurato da i numeri primi, B, C, D. Dico, che nessun altro numero primo misurerà il minimo A, fuor che i tre B, C, D. Misuri A minimo A qualunque altro numero primo A
 B .. C ... D
 C, D, che sia E; il quale E — F —
 misuri il numero A per il numero F; il numero E, moltiplicando F, produrrà il numero A. E perchè ciascun numero B, C, D misura il numero A, per la 32. propos. del 7. ciascuno de i numeri B, C, D misurerà vno de i due E, F; e perchè non misurano il numero E, per essere E numero primo, in conseguenza misureranno il numero F, il quale è minore di A, che è contro all'ipotesi, mentre il numero A è supposto il minimo di quelli, misurati da i numeri B, C, D. Non dunque altro numero primo E, diuerso da B, C, D misurerà il numero A; ma i numeri primi B, C, D solamente, misureranno il minimo A, come fu proposto dimostrare.

S C O L I O.

I seguenti dieci Theoremi di Barlaam Monaco, dimostrano ne i numeri quelle medesime passioni, che nelle rette linee dimostra Euclide ne i primi dieci Theoremi del secondo Elemento.

I.

Se saranno due numeri, vno de' quali sia diuiso in quante parti si voglia, il numero piano, fatto dalla multiplicatione de i due proposti numeri, è vguale à i numeri piani, fatti dalle multiplicationi di ciascuna parte del numero diuiso, nel numero non diuiso.

Siano i due numeri AB, & C; e sia AB diuiso nelle parti AD, DE, EB, ed il numero C non diuiso; e sia fatto il numero piano F dalla multiplicatione del numero C nel numero AB; di più, dalla multiplicatione del numero C nella

par-

parte AD sia fatto il numero piano GH; dalla multiplicatione del numero C nella parte DE, sia fatto il piano HK; e dalla multiplicatione del numero C nella parte EB sia fatto il numero piano KL. Dico che il numero piano F è uguale à i numeri piani GH, HK, KL, giunti insieme.

Perche C multiplicando AB produce F, perciò AB misura F^a per il numero C; ma il numero C^b è misurato dall'unità per l'istesso numero C, sarà dunque F misurato da AB, come C è misurato dall'unità; e perciò AB ad F^c è come l'unità à C. Similmente perche C, multiplicando AD, produce GH, perciò AD misura GH^d per il numero C; ma il numero C^e è misurato dall'unità per il medesimo numero C; il numero dunque AD misura GH, come l'unità misura C; e perciò la proporzione di AD à GH^f è come quella dell'unità al numero C. Nell'istesso modo si dimostrerà, che DE ad HK è come l'unità al numero C; e che EB ad LK è come l'unità à C. Per la qual cosa tutto AB à tutto GL^g sarà come l'unità al numero C; ma l'unità al numero C, per quel, che si è dimostrato, è come AB ad F, sarà AB ad F^h come il medesimo numero AB à GL; e perciò i numeri F, & GL sono fra di loro uguali, ch'era da dimostrarsi.

I L.

Se vn numero è diuiso in due parti, i due numeri piani, che si fanno dalla multiplicatione di tutto il numero in ciascuna parte, giunti insieme, sono vguali al numero quadrato, che si fa dalla multiplicatione di tutto il numero in se medesimo.

Sia il numero AB, diuiso nelle due parti AC, CB. Dico che i due numeri piani, cioè uno fatto dalla multiplicatione di tutto il numero AB, nella parte AC, e l'altro dalla multiplicatione di tutto il numero AB nella parte BC, giunti insieme, sono uguali al quadrato di tutto il numero AB. Si esponga il numero D uguale ad AB, sarà il quadrato del numero AB uguale al piano fatto dalla multiplicatione del numero D nel numero AB. In oltre perche il numero AB è diuiso ne i due numeri AC, CB, ed il numero D non diuiso è uguale al numero AB; il piano fatto dalla multiplicatione del numero D, e dalla parte AC, col piano fatto dal medesimo numero D, e dalla parte CB, sarà uguale al piano fatto da tutto il numero AB nella parte AC, col piano fatto dal medesimo numero AB nella parte BC: ma i piani fatti dal numero D, multiplicato in ciascuna delle parti AC, CB, insieme giunti, per l'antecedente dimostrazione, sono uguali al piano fatto dalla multiplicatione del numero D, nel numero AB; saranno i piani fatti dalle multiplicationi del numero AB in ciascuna delle parti AC, CB, uguali al piano fatto dal numero D nel numero AB. E perche il piano fatto dal numero D nel numero AB è uguale al quadrato del numero AB; sarà il quadrato di tutto il numero AB uguale à i due piani fatti dalla multiplicatione del numero AB in ciascuna delle parti AC, CB, come si propose dimostrare.

Se

a 7. assioma del 7.

b 5. assioma del 7.

c 20. defin. del 7.

d 7. assioma del 7.

e 5. assioma del 7.

f 20. defin. del 7.

g 12. del 7.

h Scol. alla 12. del 7.

I I I.

Se vn numero farà diuifo in due parti, il numero piano fatto dalla multiplicatione delle parti, col quadrato d'vna delle parti, è vguale al piano fatto dalla multiplicatione di tutto il numero in quella parte, doue fù fatto il quadrato.

Sia il numero AB , diuifo in due parti, come AC , CB . Dico che il numero piano fatto dalla multiplicatione di tutto il numero AB , nella parte AC , è vguale al piano fatto dalle parti BC , CA , col quadrato della parte CA . Si esponga il numero D , vguale al numero AC , farà il piano fatto del numero D nella parte AC , vguale al quadrato del numero AC . Similmente, essendo D vguale ad AC , il piano, fatto da BC in CA , è vguale al piano fatto da BC in D ; ed il piano fatto da BA in D è vguale al piano fatto da BA in AC . In oltre perche la retta BA è diuisa in C , il piano fatto dalla multiplicatione del numero AB nel numero D , per il primo Teorema, è vguale à i due piani, fatti dalle multiplicationi di AC nel numero D , e di CB nel numero D : mà il piano fatto da AB in D è vguale al piano fatto da BA nella parte AC ; farà il piano fatto da BA in AC , vguale à i due piani fatti da BC in D , e da AC in D : e perche i due piani fatti da BC in D , e da AC in D , sono vguali al piano, fatto da BC in CA , col quadrato di AC ; farà il piano, fatto dalla multiplicatione di tutto il numero AB nella parte AC , vguale al piano, fatto da BC in CA , col quadrato di AC , ch'era da dimostrarfi.

$A \dots C \dots B$
 $D \dots$

I V.

Se vn numero è diuifo in due partiji quadrati delle parti, col doppio piano fatto dalla scambieuoale multiplicatione delle parti, è vguale al quadrato di tutto il numero.

Sia il numero AB diuifo nelle due parti AC , CB , dico che i quadrati delle parti AC , CB , col doppio piano, fatto dalla scambieuoale multiplicatione delle parti AC , CB , è vguale al quadrato di tutto il numero AB .

Perche il numero AB è diuifo nelle due parti AC , CB , i piani fatti dalla multiplicatione di tutto il numero AB , in ciascuna delle parti AC , CB , per il secondo Teorema, è vguale al quadrato di tutto il numero AB ; mà il piano, fatto dal numero AB nella parte AC , per l'antecedente dimostrazione, è vguale al piano fatto da BC in CA , col quadrato di AC ; ed il piano, fatto da tutto il numero AB nella parte CB , è vguale al piano fatto da AC in CB , col quadrato di AC ; faranno i quadrati delle parti AC , CB , col doppio piano, fatto da AC in CB , vguali al quadrato di tutto il numero AB , ch'era da dimostrarfi.

V.

Se vn numero paro è diuifo in due parti vguali, ed il

mede-

medesimo è diuiso in due parti ineguali; il piano, fatto dalle parti ineguali, col quadrato della parte intermedia, è vguale al quadrato della metà del numero.

Sia il numero paro AB , diuiso nelle due parti vguali AC , CB , ed il medesimo numero AB sia diuiso nelle due parti ineguali AD , DB . Dico che il piano fatto dalla multiplicatione delle parti ineguali

$$A \dots C \dots D \dots B$$

AD , DB , col quadrato della parte intermedia CD , è vguale al quadrato di CB , ch'è la metà del numero. Perche AC è vguale a CB , sarà il piano, fatto da CB in BD , vguale al piano fatto da AC in DB , ouero da BD in AC . In oltre, perche il numero AD è diuiso nelle due parti AC , CD , per il primo Theorema, il piano, fatto da BD in DC , col piano contenuto da BD in AC , è vguale al piano contenuto da BD in $D A$; mà il piano contenuto da $B D$ in $A C$, per quel, che s'è detto, è vguale al piano contenuto da CB , in BD ; sarà il piano contenuto da CB in BD , col piano di BD in DC , vguale al piano contenuto da BD in $D A$, ouero da AD in DB ; vguualmente s'aggiuga il quadrato del numero CD , ne viene il piano fatto da AD in DB , col quadrato di CD , vguale al piano fatto da CB in BD , col piano fatto da BD in DC , assieme col quadrato di DC ; mà il piano contenuto da BD in DC , col quadrato di DC , per il 3. Theorema, è vguale al piano contenuto da BC in CD ; sarà il piano contenuto da AD in DB , col quadrato di CD , vguale al piano contenuto da CB in BD , col piano fatto da BC in CD : mà il piano contenuto da CB in BD , col piano di BC in CD , per il secondo Theorema, è vguale al quadrato di CB ; sarà il piano fatto da AD , in DB , col quadrato di CD , vguale al quadrato di CB , come fu proposto dimostrare.

V I.

Se vn numero paro sarà diuiso in due parti vguali, ed à quello se gli aggiunga vn numero ad arbitrio; il piano, che si fa dalla multiplicatione di tutto l'aggregato, nel numero aggiunto, col quadrato della metà del primo numero, è vguale al quadrato del numero composto della metà, e dell'aggiunto.

Sia il numero paro AB , diuiso nelle due parti vguali AC , CB , al quale sia aggiunto il numero BD ad arbitrio. Dico che il piano, fatto dalla multiplicatione di tutto l'aggregato AD nel numero aggiunto DB , col quadrato della metà CB , è vguale al quadrato del numero CD , composto della metà CB , e del numero aggiunto BD .

$$A \dots C \dots B \dots D$$

Perche AC , per ipotesi, è vguale a CB , il piano, fatto dalla multiplicatione di DB in BC , è vguale al piano contenuto da DB in CA , ouero da AC in BD . Si consideri il numero AD , diuiso nelle parti AC , CD , per il primo Theorema, il piano, fatto dalla multiplicatione di tutto il numero AD nel numero DB , è vguale à i due piani contenuti da AC in DB , e da CD in DB : mà il piano

contenuto da AC in BD è uguale al piano de' i due DB, BC; sarà il piano fatto dalla multiplicatione di tutto il numero AD nel numero DB; uguale à i due piani, cioè vno contenuto da CD in DB, e l'altro contenuto da DB in BC; ugualmente s'aggiunga il quadrato di CB, ne viene il piano fatto dal numero AD nel numero BD, col quadrato di CB uguale à i piani contenuti da CD in

A.....C.....B...D

DB, e da DB in BC, col quadrato di CB; mà il piano contenuto da DB in BC, col quadrato di CB, per il 3. Theorema, è uguale al piano fatto DC in CB; sarà il piano contenuto da AD in DB, col quadrato di CB, uguale al piano contenuto da CD in DB, col piano contenuto da DC in CB. E perchè il piano contenuto da CD in DB, col piano contenuto da DC in CB, per il secondo Theorema, è uguale al quadrato di CD; sarà il piano, fatto dalla multiplicatione del numero AD nel numero DB, col quadrato del numero CB, uguale al quadrato del numero CD, come fu proposto dimostrare.

V I I.

Se vn numero è diuiso in due parti, il quadrato di tutto il numero, col quadrato d'vna delle parti, è uguale al doppio piano, fatto dalla multiplicatione di tutto il numero in quella parte, col quadrato del rimanente.

Sia il numero AB diuiso nelle due parti AC, CB. Dico che il quadrato di tutto il numero AB, col quadrato della parte BC, è uguale al doppiopiano fatto dalla multiplicatione di tutto il numero AB nella parte BC, col quadrato del rimanente AC.

A.....C...B

Perchè il numero AB è diuiso nelle due parti AC, CB, il piano contenuto da tutto il numero AB, nel numero BC, col piano contenuto da tutto AB nella parte AC, per il secondo Theorema, è uguale al quadrato di AB: mà il piano, fatto dalla multiplicatione del numero AB in AC, per il terzo Theorema, è uguale al piano contenuto da i numeri BC, CA, col quadrato di AC; sarà il piano, contenuto da i numeri AB, BC, col piano contenuto da i due numeri AC, CB, più il quadrato di AC, uguale al quadrato di AB: ugualmente s'aggiunga il quadrato di CB, ne viene il quadrato di AB, più il quadrato di CB, uguale al piano, contenuto da i numeri AB, BC, col piano contenuto da i numeri AC, CB, più i quadrati delle parti AC, CB: mà il piano contenuto da i due AC, CB, col quadrato di CB, per il terzo Theorema, è uguale al piano, contenuto da i due AB, BC, il doppio piano dunque, contenuto da i due AB, BC col quadrato di AC, sarà uguale al quadrato di AB, col quadrato di CB, ch'era da dimostrarfi.

V I I I.

Se vn numero è diuiso in due parti, il quadruplo piano, contenuto da tutto, e da vna delle parti, col quadrato del rimanente, è uguale al quadrato del numero, composto di tutto, e di quella medesima parte,

Sia

Sia il numero AB , diuiso nelle due parti AC , CB , al quale s'aggiunga il numero BD ; vguale al numero BC . Dico che il quadruplo piano, fatto dalla multiplicatione di tutto il numero AB nella parte BC , col quadrato del rimanente AC , è vguale al quadrato di AD . Perche B D è vguale, per costruzione, à BC , il piano, contenuto da A C ... B ... D tenuto da AB in BD , sarà vguale al piano, contenuto da i numeri AB , BC ; ed il doppio piano, contenuto da i due AB , BD , sarà vguale al doppio piano, contenuto da i due AB , BC . Si consideri il numero AD diuiso ne i due numeri AB , BD ; per il quarto Theorema, il quadrato di tutto il numero AD è vguale al doppio piano, contenuto da i due AB , BD ; con i quadrati de i due AB , BD ; mà il doppio piano, contenuto da i due AB , BD , per quel che si è detto, è vguale al doppio piano, contenuto da i due AB , BC ; sarà il quadrato di AD vguale al doppio piano, contenuto da i due AB , BC , co i quadrati de i due AB , BD , cioè con i quadrati de i due AB , BC ; mà i quadrati de i due AB , BC , per il settimo Theorema, sono vguali al doppio piano, contenuto da i due AB , BC , col quadrato di AC ; sarà il quadrato di AD vguale al quadruplo piano, contenuto da i due AB , BC , col quadrato di AC , ch'era da dimostrarsi.

I X.

Se vn numero paro è diuiso in due parti vguali, ed il medesimo è diuiso in due parti ineguali; i quadrati delle parti ineguali sono il doppio del quadrato della metà, col quadrato del numero intermedio.

Sia il numero paro AB , diuiso nelle due parti vguali AC , CB , ed il medesimo numero AB sia diuiso nelle due parti ineguali AD , DB . Dico, che i quadrati delle parti ineguali AD , DB , sono il doppio del quadrato della metà AC , col quadrato del numero intermedio CD . Perche A C ... D ... B C è vguale à CB , sarà il quadrato di AC vguale al quadrato di CB ; ed il piano contenuto da i due AC , CD , sarà vguale al piano contenuto da i due BC , CD . In oltre perche il numero AD è diuiso nelle due parti AC , CD , per il quarto Theorema, il quadrato di AD sarà vguale à i quadrati delle parti AC , CD , col doppio piano contenuto dalle medesime AC , CD ; mà il doppio piano, contenuto dalle due AC , CD , è vguale al doppio piano, contenuto dalle due BC , CD ; sarà il quadrato di AD vguale à i quadrati delle due AC , CD , col doppio piano contenuto dalle due BC , CD ; vguualmente s'aggiunga il quadrato di BD , ne vengono i quadrati de i due AD , DB , vguali à i quadrati delle tre parti AC , CD , DB , col doppio piano contenuto dalle due BC , CD ; mà il doppio piano contenuto dalle due BC , CD , col quadrato di BD , per il settimo Theorema, è vguale à i quadrati de i due BC , CD ; faranno i quadrati delle due AD , DB vguali à i quadrati delle due AC , CB , col doppio quadrato di CD ; e perche il quadrato di CB è vguale al quadrato di CA ; i quadrati dunque delle due AD , DB , sono vguali al doppio quadrato di AC , col doppio quadrato di CD ; ed in consequenza i quadrati delli due AD , DB , sono il doppio de i semplici quadrati delli due AC , CD , come fu proposto dimostrare.

X.

Se vn numero paro è diuiso in due parti vguali , ed à quello s'aggiunga vna parte ad arbitrio ; il quadrato di tutto l'aggregato , col quadrato della parte aggiunta , è il doppio del quadrato della metà , col quadrato del rimanente dell'aggregato .

Sia il numero paro AB , diuiso nelle due parti vguali AC, CB , al quale sia aggiunta qualunque parte BD . Dico che il quadrato dell'aggregato AD , col quadrato della parte aggiunta BD , è il doppio del quadrato della metà $A \dots\dots C \dots\dots B \dots\dots D$ C , col quadrato del rimanente CD .

Perche AC è vguale à CB , sarà il quadrato di AC vguale al quadrato di CB , ed il piano contenuto dalle due parti AC, CD , sarà vguale al piano contenuto dalle due DC, CB ; dal che il doppio piano contenuto dalle due AC, CD , sarà vguale al doppio piano, contenuto dalle due DC, CB . In oltre s'intenda il numero AD diuiso nelle due parti AC, CD , per il quarto Theorema, i quadrati delle due parti AC, CD , col doppio piano contenuto dalle medesime parti AC, CD , saranno vguali al quadrato di AD : mà il doppio piano contenuto dalle due AC, CD è vguale al doppio piano contenuto dalle due DC, CB ; sarà il quadrato di AD vguale à i quadrati delle due AC, CD , col doppio piano contenuto dalle due DC, CB ; vgualemente s'aggiunga il quadrato di BD ; i quadrati de i due AD, DB , saranno vguali à i quadrati delle tre AC, CD, DB , col doppio piano contenuto dalle due DC, CB ; mà, per il settimo Theorema, il doppio piano contenuto dalle due DC, CB , col quadrato di BD , è vguale à i quadrati delle due DC, CB ; sarà il doppio quadrato di CD , co' i quadrati delle due AC, CB , cioè col doppio quadrato di AC , vguale à i quadrati delle due AD, DB ; ed i semplici quadrati AC, CD saranno la metà de i quadrati de i due AD, DB . Per la qual cosa i quadrati de i due AD, DB , sono il doppio de i quadrati delle due AC, CD , il che era da dimostrarfi.

L E M M A.

Se due numeri sono primi frà loro, il piano contenuto da essi, è primo all'aggregato del medesimo piano, con i loro quadrati; ed è ancora primo al solo aggregato de' loro quadrati.

Siano i numeri DE, EF frà di loro primi. Dico che il piano contenuto da i due DE, EF , è primo all'aggregato del medesimo piano, con i quadrati de i due DE, EF . Perche se non sono primi, qualche numero sarà loro commune misura; sia quello il numero G . Perche G misura il piano contenuto da i due DE, EF , e misura l'aggregato de i quadrati di DE, EF . col piano contenuto

da i medesimi DE, EF, misurerà ancora il loro composto, ^a cioè misurerà l'aggregato de i quadrati di DE, EF, col doppio piano contenuto da i due DE EF; ma i quadrati de i due DE, EF, col doppio piano contenuto da i medesimi DE, EF, per il 4. de gli antecedenti Theoremi, è uguale al quadrato di DF; il numero dunque G misurerà ancora il quadrato di DF: ma per supposizione, misura il piano contenuto da i due DE, EF, in conseguenza il piano contenuto da i due DE, EF, ed il quadrato di DF, sono numeri frà di loro composti. Inoltre, perche i numeri DE, EF, ^b per ipotesi, sono primi frà loro; l'aggregato DF ^c sarà primo tanto a DE, quanto a DF; ed inuertendo ciascuno de i due DE, EF sarà primo ad FD; donde il piano contenuto da i due DE, EF, ^d sarà primo ad FD: per la qual cosa il medesimo piano contenuto da i due DE, EF, ^e sarà primo al quadrato di DF: ma il piano contenuto da i due DE, EF, ed il quadrato di DF, furono dimostrati essere frà di loro composti, saranno dunque primi frà loro, e saranno frà di loro composti, ch'è impossibile. Non dunque il piano contenuto da i due DE, EF, e l'aggregato de i quadrati di DE, EF, col medesimo piano di DE in EF, hanno comune misura, ma sono frà di loro primi.

Dico di nuovo, che il piano contenuto da i due DE, EF, e l'aggregato de i quadrati di DE, EF sono primi frà loro: perche se non sono frà di loro primi qualche numero sarà loro comune misura, sia quello il numero G. Perche il numero G misura l'aggregato de i quadrati de i due DE, EF, e misura, per ipotesi, il piano contenuto da i due DE, EF, misurerà ancora il loro composto, cioè misurerà l'aggregato del piano contenuto da i due DE, EF, con i quadrati de i medesimi; dal che il piano contenuto da i due DE, EF, e l'aggregato de i quadrati de i due DE, EF, col piano contenuto da i medesimi DE, EF, haueranno una comune misura, ch'è contro a quello, che prima si è dimostrato. Non dunque il piano contenuto da i due DE, EF, e l'aggregato de i quadrati de i medesimi DE, EF, hanno comune misura, ma sono frà di loro primi, come fu proposto dimostrare.

THEOREMA XV. PROPOSITIONE XV.

Se tre numeri, continui proportionali, sono i minimi di tutti gli altri, che hanno la medesima proportionione con essi, due, presi come si voglia, giunti insieme, sono primi al terzo.

Siano i tre numeri continui proportionali A, B, C, cioè, che il primo A al secondo B sia come il secondo B al terzo C, i quali siano i minimi di tutti gli altri, che hanno la medesima proportionione con essi. Dico che, due, presi in qualunque modo, sono primi all'altro; cioè, che giunti insieme i due A, C, l'aggregato è primo al numero B; e giunti insieme i due B, C, l'aggregato è primo al numero A; e giunti insieme i due A, & B, l'

a 10. allom. del 7.

b 14. defin. del 7.

c 30. del 7.

d 16. del 7. e 16. del 7.

f 10. allom. del 7.

a 35. del 7. aggregato è primo al numero C. Si prendano ^a i due numeri DE, EF, che siano minimi nella proportionione A à B, ò di B à C. Essendo i due DE, EF minimi nella medesima proportionione de i tre continui proportionali A, B, C, per la 2. propositione dell'8. DE, multiplicando se medesimo, produce il primo termine A; e similmente EF, multiplicando se medesimo, produce il terzo C; e dalla

A B
C
D . . E . . F

scambievole multiplicatione de i due DE, EF, se ne produce il medio B. Perche i numeri DE, EF sono i minimi di tutti quelli, che hanno la medesima proportionione con essi, per la 24. propos. del 7, sono frà di loro primi; e perciò, giunti insieme, sarà tutto il numero DF primo à ciascuno di essi, cioè sarà primo al numero DE, e sarà ancora primo al numero FE: per la qual cosa ^b il prodotto, fatto dal numero FD nel numero DE, sarà primo al numero EF; ma il prodotto, fatto dal numero FD nel numero DE, per il 3. degli antecedenti theoremi, è vguale al prodotto, ò piano, contenuto da i due FE, ED, col quadrato di DE; sarà il prodotto, fatto da FE in ED, col quadrato di DE, primo al numero EF: ma il prodotto de i due FE, ED, è vguale al numero B; ed il quadrato di DE è vguale al numero A; sarà l'aggregato de i numeri A, & B, primo al numero EF. E perche C è il quadrato del numero EF, perciò i due A, B, e insieme giunti, sono primi al numero C, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

Di nuovo, perche i due DE, EF ^d sono frà di loro primi, il loro aggregato FD ^e sarà primo al numero DE; ed il prodotto, ò piano, contenuto da i due DF, FE, ^f sarà primo al medesimo numero DE: ma il prodotto, fatto da i due DF, FE, per il 3. de gli antecedenti Theoremi, è vguale al prodotto de i due DE, EF, col quadrato di EF; il prodotto de i due DE, EF, col quadrato di EF, sarà primo al numero DE: ma il prodotto de i due DE, EF è vguale al numero B; ed il quadrato di EF è vguale al numero C; l'aggregato dunque de i due numeri B, & C, sarà primo al numero DE; ed essendo A il quadrato di DE, sarà l'aggregato de i due B, & C ^g primo al numero A, ch'era da dimostrarsi nel secondo luogo.

Finalmente perche i due DE, EF, per quel, che s'è detto, sono primi frà loro, l'aggregato de i loro quadrati, cioè l'aggregato de i quadrati di DE, EF, per l'antecedente lemma, sarà primo al piano contenuto da i due DE, EF; ma i quadrati de i due DE, EF sono i notati A, & C; ed il piano, contenuto da i due DE, EF, è vguale al numero B, in conseguenza i due A, & C, giunti insieme, sono primi al numero B, come fu proposto dimostrare.

THEOREMA XVI. PROPOSITIONE XVI.

Se due numeri sono frà di loro primi, non è possibile, che il primo al secondo sia, come il secondo ad vn altro numero.

Siano i numeri A, & B, frà di loro primi. Dico che A, à B non può essere

essere come B ad vn altro numero. Sia, se è possibile, A à B, come B ad vn altro numero, per effempio C. Perche i numeri A, & B sono frà di loro primi, perciò sono ^a i minimi nella loro proportionione di A à B; ma la proportionione di B à C è come quella di A à B; i due minimi numeri dunque A, & B, ^b misurano vguualmente i due B, & C; cioè l'antecedente A misura l'antecedente B, ed il conseguente B misura il conseguente C. E perche A ^c misura se medesimo, dunque il numero A è commune misura de i due A, & B; per la qual cosa i due A, & B ^d sono numeri frà loro composti, ch'è contro all'ipotesi, mentre i numeri A, & B, furono supposti primi frà loro. Non dunque A à B è come B ad vn altro numero, ch'era da dimostrarsi.

A.....

B.....

C.....

a 23. del 7.

b 21. del 7.

c 6. affion. del 7.

d 14. defin. del 7.

THEOREMA XVII. PROPOSITIONE XVII.

Se siano quanti numeri si vogliano continui proporzionali, ed i loro estremi siano numeri frà di loro primi, non è possibile, che il primo al secondo sia come l'ultimo ad vn altro numero.

Siano quanti numeri si vogliano A, B, C, D, continui proporzionali, i di cui estremi A, & D siano frà di loro primi. Dico che il primo A al secondo B non è come l'

ultimo D ad vn altro numero. Sia, s'è possibile, A à B, come D ad vn altro numero, per effempio E. Perche i due A, & B sono primi frà loro, perciò sono ^a i minimi nella loro proportionione. E perche D ad E è come A à B, i minimi dunque A, & B ^b misureranno vguualmente i due D, ed E; cioè l'antecedente A misurerà l'antecedente D, ed il conseguente B misurerà vguualmente il conseguente E; ma il numero A ^c misura se medesimo, in conseguenza il numero A è commune misura de i due estremi A, & D; e perciò i due A, & D ^d sono frà loro composti, ch'è contro all'ipotesi, mentre furono supposti frà loro primi. Non dunque A à B è come D ad vn altro numero, il che era da dimostrarsi.

A 8

B 12

C 18

D 27

E.....

a 23. del 7.

b 21. del 7.

c 6. affion. del 7.

d 14. defin. del 7.

PROBLEMA I. PROPOSITIONE XVIII.

Dati due numeri, considerare se à quelli si può trouare il terzo proportionale.

Siano dati i due numeri A, & B, c si A 4 B 6 D 9 C 36 voglia sapere, se à i dati numeri A, & B, si possa ritrouare il terzo proportionale; cioè si voglia conoscere se A à B possa essere, come B ad vn altro numero. O i numeri A, & B sono, o non sono, frà di loro primi; se sono frà di loro primi, farà manifesto, per la 16. propositione di questo, non potersi trouare il terzo proportionale.

Se

Se i numeri A, & B non sono frà loro primi, moltiplicando B se medesimo, produca il numero C. O il numero A misura, ò non misura il numero C; supposto prima, che A misuri il numero C, per il numero D. Dico $A^4 \quad B^6 \quad D^9 \quad C^36$ che si può alli due A, & B, ritrouare il terzo proportionale; e che quello sarà l'istesso numero D. Perche A misura il numero C per il numero D; perciò A, moltiplicando D, ^a produrrà C; ma il numero C è prodotto dalla moltiplicatione di B in se medesimo; sarà il prodotto di A in D vguale al quadrato del numero B: per la qual cosa A à B⁶ sarà come B à D; e perciò il numero D è il terzo proportionale à i due A, & B.

Di nouo, supposto, che A non misuri il numero C. Dico che à i due A, & B non è possibile ritrouare il terzo proportionale. Sia se è possibile, il terzo proportionale D, in modo, che A à B sia come B à D. Perche A à B è come B à D, i tre numeri A, B, D faranno continui proportionali; e $A^6 \quad B^4 \quad D \text{ --- } C^{16}$ perciò il prodotto fatto dalla moltiplicatione degli estremi A, & D, sarà vguale al prodotto del medio B in se medesimo; ma il prodotto di B in se medesimo, per costruzione, è il numero C; sarà il prodotto di A in D vguale à C; per la qual cosa il numero A misurerà C^d per il numero D, ch'è contro all'ipotesi, mentre fu supposto, che A non misura il numero C. Non dunque D è il terzo proportionale, ed in conseguenza à i due A, & B non si può trouare il terzo continuo proportionale. Nell'istesso modo si può inuestigare, se à i numeri B, ed A si possa ritrouare il terzo proportionale, in modo che B ad A sia come A ad vn altro; il che era da farsi, e dimostrarsi.

PROBLEMA II. PROPOSITIONE XIX.

Dati tre numeri, considerare se à quelli si possa ritrouare il quarto numero proportionale.

Siano i dati tre numeri A, B, C, ò continui, ò non continui proportionali, e si voglia considerare se sia possibile ritrouargli vn quarto numero proportionale; cioè se A à B può essere come C ad vn altro numero. Moltiplichì B il numero C, e produca D, ò il numero A misura, ò non misura il numero D, supposto prima, che A misuri il numero D per il numero E. Dico che à i tre A, B, C si può ritrouare il quarto proportionale $A^4 \quad B^8 \quad C^9 \quad E^8 \quad D^{72}$ le; e che il medesimo numero E sarà

il quarto proportionale. Perche A misura D per il numero E, moltiplicando A il numero E, ^a produrrà il numero D: ma B, moltiplicando C, produce il medesimo numero D, il prodotto dunque fatto da gli estremi A, ed E, sarà vguale al prodotto de i medij B, & C; per la qual cosa il primo A al secondo B^b sarà come il terzo C al quarto E; sarà dunque il numero E il quarto proportionale.

Di

Di nouo, supposto che A non misuri il numero D. Dico che non si può trouare il quarto proportionale alli tre A, B, C. Perche, se è possibile, sia quello qualche numero E, in modo, che A à B sia come C ad E; farà il prodotto fatto dalla

la multiplicatione de gli A₃ B₄ C₁₀ E — D₄₀
estremi A, ed E, e vguale

al prodotto de i medij B, & C; ma il prodotto de i medij B, & C, per costruzione, è il numero D; il prodotto dunque de i due A, ed E, sarà vguale al numero D; per la qual cosa A misura D^d per il numero E, ch'è contro all'ipotesi, mentre si è supposto, che A non misura D. Non dunque il numero E è il quarto proportionale, e perciò à i tre numeri A, B, C, non si può trouare il quarto proportionale. Nell'istesso modo si considererà, se à i tre numeri C, B, A, si può trouare il quarto proportionale, in modo, che C à B, sia come A ad vn altro, ed in tal modo s'è considerato se à tre dati numeri si può trouare il quarto proportionale, come fu proposto fare, e dimostrare.

THEOREMA XVIII. PROPOSITIONE XX.

La moltitudine de i numeri primi supera ogni terminata moltitudine di numeri primi.

Sia qualunque terminata moltitudine di numeri primi A, B, C. Dico che i numeri primi superano la moltitudine A, B, C. Si prenda il numero DE^a in modo, che DE sia il minimo di tutti quelli misurati da i proposti A, B, C, al quale s'aggiunga l'vnità EF. O il composto D F è numero primo, ouero è numero composto.

Sia nel primo luogo numero primo, in tal caso i numeri A, B, C, DF sono numeri primi, e perciò la moltitudine de i numeri primi A, B, C, DF supera la moltitudine data, A, B, C.

Di nouo, supposto che il numero DF non sia numero primo, e perciò qualche numero primo lo misurerà; sia quello il numero G. Dico che il numero primo G non è alcuno de' i proposti A, B, C. Se G fosse vno de i proposti A, B, C, perche ciascuno de i tre A, B, C misura il numero DE, ancora il numero G, che rappresenta vno di quei tre, misurerà il medesimo numero DE. Hor se il numero G misura tutto il numero DF, e misura la parte DE, misurerà ancora^b il rimanente EF; cioè il numero G misurerà l'vnità EF; il tutto misura la parte, ch'è impossibile. Non dunque il numero primo G è vno de i proposti A, B, C, ed in conseguenza la moltitudine de i numeri primi A, B, C, G sarà maggiore della moltitudine de' proposti A, B, C. Il medesimo si dimostrerà se sarà data qualunque altra moltitudine di numeri primi; per la qual cosa la moltitudine de i numeri primi supera ogni terminata moltitudine di numeri primi, ch'era da dimostrarsi.

c 19. del 7.

d 7. 2. assom.
del 7.

a 38. del 7.

b 12. assom.
del 7.

COROLLARIO.

Dall'antecedente proposizione si caua il modo di trouare quanti numeri primi si vogliano d'aggiungere ad vna moltitudine terminata di numeri primi.

THEOREMA XIX. PROPOSITIONE XXI.

Se quanti numeri pari si vogliano siano composti insieme, l'aggregato sarà numero paro.

Siano quanti numeri pari $A \dots B \dots C \dots D$ si vogliano AB, BC, CD , i $E \dots F \dots G \dots$ quali, composti insieme, fac-

a 6. defin.
del 7.

b 20. defin.
del 7.

c 12. del 7.

ciano tutto il numero AD . Dico che AD è numero paro. Perche i composti AB, BC, CD sono numeri pari, ogn'vno di loro^a si può diuidere in due parti vguale; sia E la metà di AB , il numero F sia la metà di BC , ed il numero G sia la metà di CD ; sarà AB ad E ,^b come BC ad F , e come CD a G : per la qual cosa AD , ch'è il composto di tutti gl'antecedenti, ad E, F, G insieme, ch'è il composto de i conseguenti, sarà come vn antecedente ad vn conseguente, cioè sarà come AB , ad E ; mà AB è il doppio di E , in conseguenza AD sarà il doppio di E, F, G insieme. Hor essendo E, F, G insieme, la metà di AD , si può dunque da AD prenderne la metà E, F, G , e per la sesta definitione del settimo, il numero AD , composto de i numeri pari AB, BC, CD , è numero paro, che era da dimostrarfi.

THEOREMA XX. PROPOSITIONE XXII.

Se i numeri dispari sono di moltitudine pari, il loro composto sarà numero paro.

Siano quanti numeri dispari si vogliano AB, BC, CD, DE , di moltitudine pari, i quali, composti insieme, facciano il numero AE . Dico che AE è numero paro.

a 7. defin.
del 7.

b 21. del 9.

c 21. del 9.

Perche i numeri AB, BC, CD, DE sono numeri di-

spari, ogn'vno^a è differente dal numero paro per l'vnità; e perciò, detratta da ciascuno l'vnità, i rimanenti sono numeri pari, i quali, giunti insieme, compongono vn numero paro. E perche la moltitudine delle vnità detratte è numero paro, stante che la moltitudine de' termini è supposta paro, se l'aggregato di queste vnità, ch'è numero paro, s'aggiunge all'antecedente composto, che si disse essere numero paro, l'aggregato, cioè il numero AE ,^c sarà numero paro, come si propose dimostrarre.

THEORE-

THEOREMA XXI. PROPOSITIONE XXIII.

Se i numeri dispari sono di moltitudine dispari, il loro composto sarà numero disparo.

Siano quanti numeri dispari si vogliano AB, BC, CD, di moltitudine dispari, i quali, composti insieme, facciano il numero AD. Dico che AD è numero disparo. Perche il numero disparo è differente. $A \dots B \dots C \dots \dots E \dots D$ dal numero paro a per vna sola vnità, detratta l'vnità ED dal numero disparo CD, il rimanente CE sarà numero paro. Perche li numeri dispari AB, BC sono di moltitudine pari, il loro aggregato AC b sarà numero paro; al quale aggiungasi il numero paro CE, ne verrà il composto AE c numero paro; se à questo s'aggiunge l'vnità ED, il numero AD sarà differente dal numero paro AE, per quanto è l'vnità ED; per la qual cosa il composto AD d sarà numero disparo, il che era da dimostrarsi.

a 7. defin.
del 7.

b 22. del 9.

c 22. del 9.

d 7. defin.
del 7.

THEOREMA XXII. PROPOSITIONE XXIV.

Se da vn numero paro se ne detrac vn numero paro, il rimanente sarà numero paro.

Sia il numero paro AB, dal quale se ne detragga il numero paro CB. Dico che l'auanzo AC sarà numero paro. O il numero BC, detratto, è la metà del numero AB, o è maggiore, ouero minore della metà di AB. Sia nel primo luogo CB la metà di AB; perche il numero paro CB è la metà di AB, il rimanente AC sarà vgualc à CB: mà CB è supposto numero paro, sarà ancora AC numero paro, come fù proposto prouare.

Di nuouo, non sia CB la metà di AB, mà sia ò maggiore, ouero minore della metà. Perche i numeri AB, CB, per ipotesi, sono numeri pari, d'ogn'vno di essi a possiamo prenderne la metà: sia dunque DB la metà di AB, ed il numero EB sia la metà del numero CB; sarà AB alla sua metà BD, b come CB alla sua metà BE; e permutando, sarà AB à BC, c come DB à BE; e diuidendo, AC à CB d sarà come DE ad EB; permutandosi di nuouo, AC à DE e sarà come CB à BE; mà CB è, per costruzione, il doppio di BE, sarà AC il doppio di DE. Hor essendo DE la metà di AC, sarà dunque AC f numero paro; per la qual cosa, detratto dal numero paro AB il numero paro CB, resta il numero paro AC, ch'era da dimostrarsi.

a 6. defin.
del 7.

b 20. defin.
del 7.
c 13. del 7.
d Scol. alla
22. del 7.
e 13. del 7.
f 6. defin.
del 7.

THEOREMA XXIII. PROPOSITIONE XXV.

Se da vn numero paro se ne detrae vn numero disparo, quel, che resta, farà numero disparo.

a 7. defin.
del 7.
b 24. del 9.
c 7. defin.
del 7.

Sia il numero paro AB, dal quale ne sia $A \dots C \dots D \dots B$ detratto il numero disparo CB. Dico che il rimanente AC sarà numero disparo. Da CB se ne detragga l'vnità CD, resterà^a il numero paro DB. Perche dunque tutto AB, per ipotesi, è numero paro, detrattone il numero paro DB, resta AD^b numero paro; dal quale, detrattane l'vnità CD, resta AC^c numero disparo, che era da dimostrarsi.

THEOREMA XXIV. PROPOSITIONE XXVI.

Se da vn numero disparo se ne detrae vn numero disparo, il rimanente farà numero paro.

a 7. defin.
del 7.
b 24. del 9.

Sia AB numero disparo, dal quale se ne $A \dots C \dots D \dots B$ detragga il numero disparo CB. Dico che il rimanente AC è numero paro. Da i numeri dispari AB, CB, se ne detragga l'vnità, restano i due AD, CD^a numeri pari; si che dal numero paro AD, detratto il numero paro CD, resta il numero paro AC, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA XXV. PROPOSITIONE XXVII.

Se dal numero disparo se ne detrae vn numero paro, il rimanente farà numero disparo.

a 7. defin.
del 7.
b 24. del 9.
c 7. defin.
del 7.

Sia il numero disparo AB, dal quale $A \dots D \dots C \dots B$ se ne detragga il numero paro CB. Dico che il rimanente AC sarà numero disparo. Dal numero disparo AB se ne detragga l'vnità AD, resta DB^a numero paro, dal quale detrattone il numero paro CB, resta il numero paro DC; al quale s'aggiunga l'vnità AD, sarà AC^c numero disparo, come fu proposto dimostrare.

THEOREMA XXVI. PROPOSITIONE XXVIII.

Se vn numero disparo moltiplica vn numero paro, quel che produce farà numero paro.

a 15. defin.
del 7.

Sia A numero disparo, e B numero paro, ed $A \dots B \dots$ moltiplicando B, ouero B, moltiplicando A, produca C. Dico che il prodotto C è numero paro. Perche A, moltiplicando B produce il numero C, sarà C^a composto di tante volte B, per quante vnità sono nel numero A; e perche B è numero

ro paro, sarà C composto di tante volte il numero paro B, per quante vnità sono nel numero A; mà il numero, composto di più numeri pari, b 21. del 9.
 è numero paro; il numero C dunque, ch'è composto di più volte il numero paro B, sarà numero paro, che era da dimostrarsi.

C O R O L L A R I O I.

Da quel, che si è detto, è manifesto, che se vn numero paro moltiplica vn altro numero paro, il prodotto sarà numero paro,

C O R O L L A R I O II.

D'onde ne segue, che vn numero paro, moltiplicando se medesimo, produce numero paro.

THEOREMA XXVII. PROPOSITIONE XXIX.

Se vn numero disparo moltiplica vn numero disparo, quel, che produce, sarà numero disparo.

Siano i numeri dispari A, & B, ed A moltiplicando B, ouero B, moltiplicando A, produca C. Dico che C è numero disparo. Perché A, moltiplicando B, produce C; il numero C sarà composto di tante volte il numero disparo B, ^a per quante vnità sono nel numero A; e perche tanto il numero A, quanto B, è numero disparo, sarà C composto dal numero disparo B, per moltitudini dispari; mà il numero, ch'è composto da numeri dispari, per moltitudini dispari, b è numero dispa-
 ro; il numero dunque C, ch'è composto dal dispa-
 ro B, per moltitudini
 dispari, sarà numero dispa-
 ro, ch'era da dimostrarsi.

a 15. defia.
del 7.

b 29. del 9.

C O R O L L A R I O.

Appare nell'antecedente propositione, che se vn numero disparo moltiplica se medesimo, quel, che produce, sarà numero disparo.

S C O L I O.

Aggiungo i due seguenti Theoremi del Campano, che seruiranno come Lemmi alle dimostrazioni succedenti.

Se il numero disparo misura il numero paro, lo misura per numero paro.

Sia il numero disparo A, il quale misuri il numero paro B per il numero C. Dico che C è numero paro. Perché, se il numero C sarà numero disparo, il prodotto B, fatto dalla multiplicatione de i numeri dispari A, & C, sarà numero disparo, ch'è contro all'ipotesi. Non dunque C è numero disparo, mà sarà numero paro.

Se il numero disparo misura vn numero disparo, lo misura per numero disparo.

Sia il numero disparo A, il quale misuri il numero disparo B per il numero C. Dico che C sarà numero disparo. Perché, se C fosse numero paro, il numero B, ch'è prodotto dalla multiplicatione del numero disparo A nel numero paro C, sarebbe numero paro, ch'è contro all'ipotesi. Non dunque il numero C è numero paro, mà sarà numero disparo, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA XXVIII. PROPOSITIONE XXX.

Se il numero disparo misura vn numero paro, misurerà ancora la metà di quello.

Sia il numero paro A, misurato dal numero disparo B. Dico che il numero disparo B misurerà ancora la metà del numero paro A. Sia misurato il numero A dal numero B per il numero C, per lo Scolio antecedente, C sarà numero paro; e perciò il numero C si può diuidere in due parti vguali. Hor perché B misura A per il numero C, all'incontro C misurerà A per il numero B, per la qual cosa C farà la parte di A denominata da B, come apparisce nella 3. definitione del 7. In oltre, perché C alla sua metà è come A alla sua metà, permutando, sarà C ad A come la metà di C alla metà del numero A; e perciò tante volte C misura A, e per quante volte la metà di C misura la metà di A: ma C misura tante volte A, per quante vnità sono in B; perciò la metà di C misurerà tante volte la metà di A, per quante vnità sono in B; dal che B multiplicando la metà di C, produce la metà di A. Per la qual cosa B misura la metà di A, come fu proposto dimostrare.

THEOREMA XXIX. PROPOSITIONE XXXI.

Se il numero disparo è primo à qualche numero, sarà ancora primo al doppio di quello.

Sia il numero disparo A, il quale sia primo al numero B, il di cui doppio sia il numero C. Dico che il numero A è primo al numero C. Se il numero A non è primo al numero C, qualche numero farà loro commune misura; sia quello il numero D. Dico

prima

a 4. defin.
del 7.

b 8. assioma

c 20. defin.
del 7.

d 13. del 7.

e 20. defin.
del 7.

f 8. assioma

del 7.

g 9. assioma

del 7.

prima che D è numero disparo. Se D non è numero disparo, necessaria-
mente sarà numero paro, il quale misu-
rando il numero disparo A, lo misurerà A..... B.....
per qualche numero E; e moltiplicando C..... D ---
il numero paro D per il numero E, ^a pro-
durà il numero paro A, ch'è contro all'
ipotesi, mentre si è supposto il numero A disparo. Non dunque D è
numero paro, ma è numero disparo. Hor essendo C il doppio di B, in
conseguenza si può diuidere in due parti uguali, e perciò C ^b è numero
paro; si è supposto C essere misurato da D, dunque il numero disparo D
misura il numero C, e per l'antecedente proposizione, D misurerà la me-
tà di C, cioè misura il numero B: ma per la supposizione fatta, misura
ancora il numero A; sarà dunque D commune misura de i due A, & B:
per la qual cosa i due A, & B ^c sono numeri fra loro composti, ch'è con-
tro all'ipotesi. Non dunque A, & C hanno commune misura, ma sono
fra di loro primi, come fu proposto dimostrare.

a 28. del 9.

b 6. defn.
del 7.c 14. defn.
del 7.

THEOREMA XXX. PROPOSITIONE XXXII.

I numeri, che dal due procedono per il doppio, sono
solamente parimente pari.

Dal numero due, notato A, Z 1 A 2 B 4 C 8 D 16 E 32
crescano per il doppio i numeri

B, C, D, E. Dico che questi sono solamente numeri parimente pari. Si
esponga l'vnità Z; perche i numeri A, B, C, D, E, cominciando dall'vni-
tà Z, successiuamente ogn'vno è doppio dell'antecedente, saranno i
seguenti Z 1. A 2. B 4. C 8. D 16. E 32. nella medesima proportionione,
cioè nella proportionione doppia; in conseguenza il numero A ^a misurerà
tutti gli altri B, C, D, E, e ciascuno de i numeri B, C, D, E, ^b misurerà
il maggiore di lui per qualcheduno de' medesimi A, B, C, D, E. E perche
tutti sono numeri pari; perciò i numeri pari A, B, C, D, E sono misurati da
i numeri pari A, B, C, D, E per li medesimi numeri pari, ed in consecuen-
za i numeri B, C, D, E ^c sono numeri pari.

a 11. assioma
del 7.
b 11. del 9.c 8. defn.
del 7.

Che poi siano solamente numeri parimente pari, è manifesto, poiche
essendo i numeri A, B, C, D, E, dall'vnità continui proportionali, ed il nu-
mero A, ch'è prossimo all'vnità, è numero primo, niſſun' altro numero
misurerà i proposti, ^d fuor che i medesimi A, B, C, D, E, i quali, perche
sono tutti numeri pari, si misureranno l'vn l'altro; cioè i minori misura-
no i maggiori per i medesimi numeri pari; e perciò sono solamente nu-
meri parimente pari.

d 19. del 9.

THEOREMA XXXI. PROPOSITIONE XXXIII.

Se la metà d'un numero è disparo, quello sarà solamen-
te numero parimente disparo.

Sia

Sia la metà del numero A disparo. Dico che il numero A è solamente parimente disparo. Che sia parimente disparo si dimostra. Perche la metà di A è numero disparo, sarà il numero A.....
 A misurato dal numero due; ch'è paro, per vn numero disparo, cioè per la sua metà; e perciò A è numero parimente disparo. Che sia poi solamente numero parimente disparo, lo dimostreremo in questo modo. Sia B la metà del numero A, e sia C il numero due; se A non è parimente disparo solamente, A.....
 sarà ancora parimente paro; e perciò sarà misurato da qualche numero paro per numero paro. B..... C..
 D..... E..
 Intendasi il numero paro D, che misuri il numero A per il numero paro E; si che D, multiplicando E, b produrrà il numero A: ma il medesimo numero A è prodotto dalla multiplicatione del binario C nel B, il prodotto, fatto dal primo C nel quarto B, sarà vguale al prodotto fatto dal secondo D nel terzo E: per la qual cosa il primo C al secondo D c sarà come il terzo E al quarto B: ma il binario C misura il numero paro D; il numero dunque E misurerà il numero B; cioè il numero paro E misura il numero disparo B; ch'è impossibile. Non dunque A è numero parimente paro, ma è solamente numero parimente disparo, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA XXXII. PROPOSITIONE XXXIV.

Se il numero paro non nasce dalla continua duplatione del numero due, ne la sua metà è numero disparo; quello è numero parimente paro, e parimente disparo.

Sia il numero paro A, il quale non sia prodotto dalla continua duplatione del numero due, ne la sua metà sia numero disparo. Dico che il numero A è parimente paro, ed è ancora parimente disparo. Perche la metà del numero paro A è numero paro, perciò il numero due, ch'è numero paro, misura il numero paro A per la sua metà, ch'è numero paro, e per la definizione 8. del 7, il numero A è parimente paro.

Di nouo s'intenda diuiso il numero A in due parti vguale, e similmente la metà sia diuisa in due parti vguale, e la metà di questa in due vguale, e con quest'ordine, fino a tanto, che si peruiene a qualche numero disparo, non potendosi peruenire al numero due, poiche in quel caso il numero A sarebbe prodotto dalla continua duplatione del numero due; ch'è contro all'ipotesi; se si peruiene al numero disparo, sarà il numero A misurato da quel numero disparo a per numero paro, non potendo essere misurato per numero disparo a causa, che i numeri dispari, moltiplicati fra loro, b producono numero disparo, e douerebbero produrre il numero paro A. Hor perche il numero paro A è misurato dal numero di-

sparo

a 9. defin.
del 7.b 9. assioma
del 7.

c 19. del 7.

a Scol alla
prop. 19. del
7.
b 19. del 9.

iparo per numero paro, farà, per la definizione 9. del 7. numero parimente disparo: fù dimostrato essere ancora numero parimente paro, in conseguenza il numero A sarà parimente paro, e parimente disparo, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA XXXIII. PROPOSITIONE XXXV.

Se siano quanti numeri si vogliano continui proporzionali, e dal secondo, & ultimo, se ne detragga il primo numero; quello, che resta dal secondo, al primo, sarà come il rimanente dell'ultimo all'aggregato di tutti i termini, che l'antecedono.

Siano quanti numeri

si vogliano continui pro-

portionali, AB, CD, EF,

GH, e tanto dal secondo

CD, quanto dall'ultimo

GH, se ne detragga il primo AB; e cioè dal secondo CD se ne leui DK,

vguale al primo AB; e dall'ultimo GH se ne leui LH vguale al primo

AB. Dico che il restante CK al primo A è come il rimanente GL all'ag-

gregato de gli antecedenti EF, CD, AB. Dal numero GH se ne detrag-

ga HM vguale al numero CD, e se ne separi HN vguale al numero EF.

Perche MH è vguale al numero CD, ed HL è vguale, per ipotesi, à DK,

il rimanente LM farà vguale al rimanente KC. In oltre perche AB à CD

è come CD ad EF, ed ancora come EF à GH; inuertendo, farà GH ad

EF, come EF à CD, e come CD ad AB; ma NH, per costruzione, è v-

guale ad EF, ed il numero MH è vguale à CD, e similmente il numero

LH è vguale ad AB; farà GH ad HN come HN ad HM, e come HM ad

HL; e, diuidendo, GN ad NH, come NM ad MH, e come ML ad LH;

per la qual cosa tutti gli antecedenti insieme GN, NM, ML, cioè tutto

GL à tutti i conseguenti insieme, NH, MH, LH, e faranno come vno an-

tecedente ad vn conseguente, cioè come ML ad LH: ma i notati NH,

MH, LH sono vguali à i numeri EF, CD, AB, in conseguenza GL à i nu-

meri EF, CD, AB, insieme giunti, farà come ML ad LH. E perche ML

fù dimostrato vguale à CK, ed il numero LH fù fatto vguale ad AB, farà

GL all'aggregato de i numeri EF, CD, AB, come CK al primo numero

AB, il che era da dimostrarsi.

THEOREMA XXXIV. PROPOSITIONE XXXVI.

Se siano dall'vnità quanti numeri si vogliano continui proporzionali nella proportionione dupla, in modo, che l'aggregato di tutti sia numero primo; e questo, multipli-

cato

a Scol. alla
10. del 7.

b Scol. alla
22. del 7.

c 12. del 7.

cato nell'ultimo, produca qualche numero, il prodotto sarà numero perfetto.

Siano dall'vnità Z quanti numeri si vogliano A, B, C, D, nella proporzione dupla, ed il loro aggregato, assieme con l'vnità, sia il numero E, il quale, moltiplicando D, produca il numero F. Dico che F è numero perfetto. Per quanti sono i numeri A, B, C, D, altrettanti se ne prendano nella

Z 1	A 2	B 4	C 8	D 16
E 31	G 62	H 124	K 248	F 496
	K 31			L 31
	M 31			H 465

P — Q —

a 14. del 7.
b 19. del 7.

c 7. assioma
del 7.

d 35. del 9.

e 9. assioma
del 7.
f 11. assioma
del 7.

g 9. assioma
del 7.

la proporzione dupla, cominciando da E, che siano E, G, H, K. Perche i numeri A, B, C, D sono nella medesima proporzione de i numeri E, G, H, K, per l'egualità, A à D è come E à K, ed il prodotto, fatto dalla moltiplicazione de gli estremi A, & K, sarà vguale al prodotto de i medij D, ed E; ma E, moltiplicando D, per ipotesi, produsse F, il prodotto dunque di A in K è vguale al numero F; dal che K è misura F per il numero A, cioè per il numero 2; e perciò F sarà il doppio del numero K, ed i numeri E, G, H, K, F sono continui proporzionali. Dal secondo termine G, e dall'ultimo F, se ne leuino i numeri K, ed L, ogn'vno vguale al numero E, ch'è il primo termine, ed i restanti siano i notati M, ed H; donde i due L, ed H, insieme, saranno vguali al numero F. E perche il numero G è il doppio di E, e dal numero G si è detratto il numero K, vguale ad E; sarà il restante M vguale ad E. In oltre, perche dal secondo termine G, e dall'ultimo F, se n'è detratto vn numero vguale al primo termine E; sarà il restante M al primo termine E, e come il rimanente H all'aggregato de' termini E, G, H, K; ma il numero M, per quel, che si è detto, è vguale ad E; sarà il numero H vguale all'aggregato de i termini E, G, H, K; si aggiunga ad H il numero L, ed all'aggregato de i numeri E, G, H, K, s'aggiunga l'aggregato de i termini Z, A, B, C, D, ch'è vguale ad E, ouero ad L; ne vengano tutti i termini Z, A, B, C, D, E, G, H, K, giunti insieme, vguali à i due L, ed H insieme, cioè vguali al numero F. Di più, perche E, moltiplicando D, produce F, perciò D misura F e per il numero E: ma ciascuno de i termini Z, A, B, C, che sono nella proporzione dupla, misura il massimo D, in conseguenza tutti i termini Z, A, B, C, D, misurano il numero F: e perche ciascun termine E, G, H, K, misura il medesimo numero F (stante che sono continuati nella proporzione dupla) in conseguenza tutti i termini Z, A, B, C, D, E, G, H, K, cioè ogn'vno da per se, misura il numero F. Dico finalmente, che nissun' altro numero, fuor che gli antedetti, misura il numero F.

Lo misuri, s'è possibile, qualche altro numero P per il numero Q, moltiplicando P nel numero Q, il prodotto sarà il numero F: ma E, moltiplicando D, produce il medesimo numero F; sarà il prodotto di E in D vguale al prodotto di P in Q. Si considerino quattro numeri, cioè il pri-

mo E,

mo E, il secondo Q, il terzo P, ed il quarto D. Perche il prodotto del primo E nel quarto D è vguale al prodotto del secondo Q nel terzo P, farà il primo E al secondo Q, ^h come il terzo P al quarto D. E perche i numeri A, B, C, D sono proportionali dall'vnità Z, ed il termine A, più prossimo all'vnità, è numero primo, nissun'altro numero misurerà il massimo D, ^k fuor che gli antecedenti A, B, C; fù supposto il numero P non essere alcuno de i numeri A, B, C; in conseguenza il numero P non misurerà il numero D: si disse, che la proportion di E à Q è come quella di P à D, non misurando P il numero D, ne meno E misurerà il numero Q; per ipotesi, E è numero primo, i due numeri dunque E, & Q ^l sono frà di loro primi, e perciò ^m sono minimi nella proportion di E à Q: mà E à Q è come P à D, i due minimi dunque E, & Q, misureranno vguilmente i due P, & D, cioè l'antecedente E misura l'antecedente P, ed il conseguente Q misura il conseguente D. E perche nissun'altro numero misura D, o fuor che i notati A, B, C; farà il numero Q vno de i numeri A, B, C; e supposto, che sia il medesimo che B, perche i tre E, G, H sono continui proportionali nella continuata proportion di B, C, D, per l'egualità, farà B à D ^p come E ad H; ed il prodotto de gli estremi B, & H, ^q sarà vguale al prodotto de i medij D, ed E: mà il prodotto di D in E, per ipotesi, è vguale al prodotto di P in Q; farà il prodotto di P in Q vguale al prodotto di B in H; e la proportion di Q à B ^r sarà come quella di H à P; fù supposto Q il medesimo, che B, farà dunque H il medesimo che P; il che è contro alla suppositione fatta, mentre fù supposto P diuerso da tutti i numeri A, B, C, D, E, G, H, K. Non dunque altro numero misura il numero F, fuor che l'vnità, ed i numeri A, B, C, D, E, G, H, K, e perche questi, per quel, che si è dimostrato, tutti misurano il numero F, e, giunti insieme, sono vguali al medesimo numero F, per la definitione 22. del settimo, il numero F farà numero perfetto, ch'era da dimostrarsi.

S C O L I O.

Per facilitare le cose à venire aggiungo qui li seguenti due Theoremi.

Frà l'vnità, ed il numero 2, e frà l'vnità, ed il numero 3; come ancora frà l'vnità, ed il numero 5, e frà i numeri, che differiscono d'vna sola vnità, non cade medio proportionale.

Cada prima, se è possibile, frà l'vnità A, ed il A. C — B.. numero 2, notato B, il medio proportionale C; perche C è medio proportionale frà li due A, & B, sarà C maggiore di A, e minore di B; perche se C fosse vguale ad A, essendo A à C come C à B, e l'vnità A è posta vguale à C, sarebbe C vguale à B, per la qual cosa A sarebbe vguale à B, ch'è contro all'ipotesi: nell'istesso modo si dimostrerà che C non è vguale à B in conseguenza C

farà minore di B, e maggiore di A: e perche la minima parte del numero è l'unità, essendo C minore di B, ed il numero B costa di due sole unità, il medio C non sarà maggiore dell'unità, e perciò C sarà uguale ad A, ch'è contro à quello, che si è dimostrato. In oltre essendo C maggiore di A, al minimo sarà C due unità, nel qual caso sarà uguale à B, ch'è contro à quello, che si è dimostrato; non dunque C è maggiore di A, ne meno è minore di B, come ancora non è uguale ad A, ne uguale AB, ed in conseguenza non è medio fra li due A & B, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

Di nuovo sia esposta l'unità A, ed il numero 3 notato B, e cada frà essi, s'è possibile, il medio C, si dimostri, come prima si fece, che il medio C non è uguale ad A, ne meno è uguale al numero B, e perciò

farà maggiore di A, e minore di B; hor essen- A. C — B...

do C minore di B, al più costerà di due unità, e similmente essendo maggiore di A, al minimo C costerà di due unità, e perche il numero 2 è numero paro, perciò il medio C sarà numero paro; hor essendo C medio proportionale fra li due A & B, sarà A à C come C à B; ma l'unità A misura il numero C, per l'istesso numero C, in conseguenza il numero C misura il numero B per l'istesso numero C, dal che il numero paro misura il numero disparo, ch'è impossibile, non dunque C è maggiore di A, ne minore di B, ne meno è uguale ad A, ouero à B, e perciò non è medio fra li due A & B.

In oltre sia esposta l'unità A, ed il numero 5 notato B, e sia C, s'è possibile, medio fra li A. C — B.....

due A & B, si dimostri come prima si fece, che C non è uguale ad A, ne meno è uguale à B, ma C è maggiore di A, e minore di B; sia prima C minore di B per una sola unità; perche B è numero disparo sarà C numero paro, e perche A à C è come C à B, e l'unità A misura C, perciò il numero paro C misurerà il numero disparo B, ch'è impossibile; non dunque C è minore di B d'una sola unità. Sia di nuovo C minore di B di 2 unità, cioè C sia numero ternario, se da B, ch'è 5 unità, se ne detrae il ternario C, e le due unità che restano si detraggono dal ternario C, resta una sola unità, e perciò li due C & B sono numeri primi: e perche A à C è come C à B, e l'unità A misura il numero C, in conseguenza il numero primo C misurerà il numero primo B, ch'è impossibile, non dunque C è minore di B di due unità. Sia dunque C minore di B di tre unità, cioè sia 2, ch'è numero paro; perche A à C è come C à B, e l'unità A misura il numero C, in conseguenza il numero paro C misurerà il numero disparo B, ch'è impossibile, non dunque C è minore di B di tre unità, ne meno è minore di B di quattro unità, perche sarebbe uguale ad A, per la qual cosa C non è medio proportionale fra li due A & B, ch'era da dimostrarsi nel terzo luogo.

Finalmente siano li numeri A & B differenti per una sola unità in modo, che A sia minore di B. Dico che fra essi non cade medio proportionale. Sia, s'è possibile, C medio proportionale, fra li due A & B. Dico prima che C non è uguale ad A, ne meno è uguale al numero B, perche se fosse uguale ad A, essendo A à C come C à B, sarebbe C uguale à B, ma è ancora uguale ad A, in conseguenza A sarà uguale à B, ch'è contro all'ipotesi.

Nell

a 5. assioma
del 7.
b 30. defin.
del 7.

c 5. assioma
del 7.

d 1. dgl 7.

Nell'istesso modo si dimostrerà, che C non è uguale à B ; per la qual cosa C è maggiore di A è minore di B , e perchè li supera A per una sola unità, essendo C maggiore di A , al minimo sarà uguale à B , ch'è contro à quel che si è dimostrato; similmente essendo C minore di B al minimo sarà uguale ad A , ch'è contro à quel che si è dimostrato; non dunque C è maggiore di A , ne meno è minore di B , come ancora non è uguale ad A ; ne uguale à B , per la qual cosa non è medio fra li due A & B , ch'era da dimostrarsi.

I numeri, che sono nella dupla, ò tripla, ò quintupla proportione, ouero differiscono per vna sola unità, non sono come numero quadrato à numero quadrato.

Siano prima i numeri A & B nella proportione dupla, si trouino i minimi nella proportioni di A à B , che siano C & D . Perchè A & B sono nella proportioni dupla, i minimi faranno l'unità, ed il numero 2, fra quali per l'antecedente dimostrazione, non cade medio proportionale, e perciò non sono piani simili, per la qual cosa C à D non è come numero quadrato à numero quadrato, mà C à D è come A à B , non essendo C à D come numero quadrato à numero quadrato, ne meno A à B è come numero quadrato à numero quadrato.

Di nuovo siano i numeri A , & B nella proportioni tripla. Dico che A à B non è come numero quadrato à numero quadrato. Si trouino i minimi numeri d nella proportioni di A à B , che siano C , & D , perchè A , & B , sono nella proportioni tripla, i minimi, cioè C , & D faranno l'unità, ed il numero ternario, fra quali per l'antecedente dimostrazione non cade medio proportionale, e perciò non sono piani simili, e la proportioni di C à D non sarà come numero quadrato à numero quadrato; mà C à D è come A à B , non essendo C à D come numero quadrato à numero quadrato, ne meno A à B è come numero quadrato à numero quadrato. Nell'istesso modo si dimostrerà, che i numeri nella quintupla proportioni non sono come numero quadrato à numero quadrato.

Finalmente siano i numeri A , & B , differenti solamente per una sola unità. Dico che non sono come numero quadrato à numero quadrato. Perchè i numeri A , & B , differiscono per una sola unità, per l'antecedente dimostrazione non cade fra loro alcun medio proportionale, e perciò non sono piani simili, ne meno sono come numero quadrato à numero quadrato, ch'era da dimostrarsi.

Fine del Nono Elemento.

EVCLIDE RESTITVTO

D A

VITALE GIORDANI

ELEMENTO DECIMO.



DEFINITIONI.

I.

Commenfurabili fi chiamano le grandezze, quando sono mifurate da vna medefima mifura.

I I.

Incommenfurabili fi dicono quelle grandezze, delle quali non fi troua alcuna mifura commune.

I I I.

Le linee rette sono commenfurabili in potenza, quando il medefimo fpatio mifura i loro quadrati,




QNI quadrato fi chiama potenza del fuo lato, e perciò, nelle cofe à venire, quando fi dirà la potenza d'vna retta linea, intenderemo l'iffelfo, come fe dicelfimo il quadrato di quella retta linea; e fe per effempio, fi dirà, che delle rette linee *A*, & *B*, in potenza l'vna è dupla all'altra, non fi deue intendere la retta linea *A* effere dupla alla retta linea *B*, ma che la potenza della retta linea *A* è dupla alla potenza della retta linea *B*, cioè, che il quadrato della retta linea *A*, è duplo al quadrato della retta linea *B*. Ed il fimile s'intenderà fe fi dirà tripla, quadrupla &c. fuppofto quefto. Spiega Euclide nella prima definitione, che cofa dobbiamo intendere per quantità commenfurabili, e dice, che le grandezze all'hora fi chiamano commenfurabili, quando sono mifurate da vna medefima quantità, e



non

non importa, che non siano misurate ugualmente, ma basta, che ciascuna sia misurata dalla medesima quantità in modo, che non soprauanzi cosa alcuna; e quella quantità, che misura le grandezze commensurabili, si chiama comune misura. E nota, che in questa prima definizione Euclide parla delle quantità in genere, senza restringersi à particolare alcuno; si che volendola applicare à qualche particolare, come per essempio alle rette linee, si può dire, che le rette linee sono commensurabili in lunghezza, quando sono misurate da una medesima retta linea; ed i piani sono ancora commensurabili, quando un medesimo spatio gli misura: e con modo simile, questa prima definizione si può applicare à tutti i particolari. Spiega poi nella seconda definizione, quali sono le quantità incommensurabili, e, tenendo la medesima generalità in questa, che nella prima, chiama grandezze incommensurabili quelle, delle quali non si troua niuna misura comune; e questa ancora, come si è detto della prima definizione, si può applicare à tutti i particolari, chiamando le rette linee incommensurabili in lunghezza, quando niuna retta linea le misura; ed i piani ancora si dicono incommensurabili, quando non si troua spatio alcuno, che gli misura: e con modo simile si può fare l'applicazione à tutti gli altri generi di quantità.

Premessa la cognitione delle quantità commensurabili, ed incommensurabili, così in genere, passa Euclide al particolare, e con la terza definizione ci spiega, che cosa doueremo intendere, quando si dirà, rette linee commensurabili in potenza; e dice, che all' hora le rette linee si diranno commensurabili in potenza, quando i loro quadrati saranno misurati da un medesimo spatio; come per essempio. Siano esposte le rette linee AB, CD, i di cui quadrati, ò vogliamo dire potenze, siano AE, CF, le quali si concepiscano di tali grandezze, che diuisa AE ne gli spatij uguali, notati X, e diuisa CF ne gli spatij uguali, notati T, ciascuno de gli spatij T sia uguale à ciascuno de gli spatij X; s'intenda poi un altro piano come Z, uguale ad uno de gli spatij X, ouero T; in tal caso lo spatio Z misurerà giustamente il quadrato AE, senza che resti cosa alcuna; ed il medesimo piano Z misurerà giustamente il quadrato CF, senza che resti cosa alcuna: dal che il piano Z sarà comune misura delle due potenze AE, CF, e per la prima definizione, le due potenze AE, CF, saranno commensurabili; e secondo tal ipotesi le rette linee AB, CD, che sono lati di quelle potenze commensurabili, si dicono rette linee commensurabili in potenza, di modo che, ò che le rette linee siano, ò che non siano commensurabili in lunghezza, quando i loro quadrati hanno una comune misura; quelle rette linee si dicono commensurabili in potenza. E notisi, che se i quadrati, ò potenze AE, CF sono commensurabili, ed i loro lati AB, CD sono ancora commensurabili in lunghezza, le medesime rette AB, CD, si chiameranno commensurabili in lunghezza, e si chiameranno ancora commensurabili in potenza; ma se i quadrati AE, CF sono commensurabili, ed i loro lati AB, CD non sono commensurabili in lunghezza; all' hora le rette AB, CD si dicono solamente commensurabili in potenza.



I V.

Le rette linee si dicono incommensurabili in potenza, quando non si troua spatio alcuno, che misura i loro quadrati.

Quando le rette linee sono commensurabili in lunghezza, sono ancora commensurabili in potenza, come si dimostrerà à suo luogo; e quando le rette linee non sono commensurabili in lunghezza, può essere, che siano commensurabili in potenza; e può essere, che non siano; cioè può essere, che qualche spatio misuri i loro quadrati, e può essere, che mai si troui spatio alcuno, che li misuri: se qualche spatio misura i loro quadrati, quelle rette linee si dicono commensurabili in potenza, come si disse nell'antedente definizione; ma se in nessun modo si troua spatio, che misuri i detti quadrati, quelle rette linee si dicono essere incommensurabili in potenza: ed in questo caso saranno incommensurabili in potenza, e saranno ancora incommensurabili in lunghezza, di modo, che, si come, quando due rette linee sono commensurabili in lunghezza, sono ancora commensurabili in potenza, così, quando sono incommensurabili in potenza, sono ancora incommensurabili in lunghezza; il che tutto si dimostrerà à suo luogo.

V.

La retta linea terminata, rispetto alla quale tutte le infinite altre rette linee terminate sono ò commensurabili, ouero incommensurabili, delle quali alcune sono commensurabili in lunghezza, ed in potenza, altre sono solamente commensurabili in potenza, ed altre sono incommensurabili in lunghezza, ed in potenza, si chiama Rationale.

Acciocchè la spiegatione di questa definizione riesca più chiara, la poniamo dopo le seguenti due definizioni.

V I.

Tutte le altre rette linee; che sono à questa commensurabili in lunghezza, e potenza, ouero commensurabili solamente in potenza, si dicono Rationali.

Tutte

V I I.

Tutte quelle rette linee poi, che à questa sono incommensurabili, si chiamano Irrazionali.

In tre generi divide Euclide l'infinita moltitudine delle rette linee, à causa che tre casi solamente si danno in Natura, che riguardano la loro commensurabilità, ed incommensurabilità; cioè, ò le rette linee sono commensurabili in lunghezza, ed in questo caso sono necessariamente commensurabili ancora in potenza, come à suo luogo si dimostrerà; ò non sono commensurabili in lunghezza, ed in quest'altro caso necessariamente ne meno sono commensurabili in potenza, come similmente si dimostrerà in questo decimo Elemento; ouero non sono commensurabili in lunghezza, ma sono commensurabili in potenza. Se non sono commensurabili in potenza (per il che, come si è detto, ne meno sono commensurabili in lunghezza) chiama le rette linee, secondo questo genere, Irrazionali. Se le rette linee sono commensurabili in lunghezza (perchè bisogna ancora commensurabili in potenza) secondo quest'altro genere, le chiama Rationali. E finalmente, quando le rette linee non sono commensurabili in lunghezza, ma sono commensurabili in potenza, le chiama similmente Rationali. Due generi dunque di rette linee rationali si considerano in Natura, ed un solo d'Irrazionali, cioè. Quelle rette linee, delle quali in riguardo à qualche comune misura, se ne possono esprimere le parti, ch'Euclide chiama commensurabili in lunghezza, costituiscono il primo genere delle rette linee Rationali. Quelle rette linee poi, delle quali in riguardo à qualche comune misura, non se ne possono esprimere le parti, per il che si dicono incommensurabili, ò sono, ò non sono commensurabili in potenza; se sono commensurabili in potenza, cioè che delle loro potenze se ne possano in riguardo à qualche comune misura esprimere le parti, queste costituiscono l'altro genere di rette linee, che similmente si dicono Rationali. E se ne meno sono commensurabili in potenza, cioè, che ne in lunghezza, ne in potenza se ne possano esprimere le parti, in riguardo à qualche comune misura, quelle costituiscono il terzo genere, e si dicono Irrazionali. E da qui si caua, che qualunque retta linea, considerata sola, senza comparatione ad altra retta linea, quella non è nè rationale, nè meno irrationale: ma se sarà comparata à qualche altra retta linea, all'hora, secondo le condizioni spiegate di sopra, ò sarà rationale, ouero irrationale. Per esempio, la retta AB, considerata sola, senz'altra comparatione, non è rationale, nè irrationale; ma comparata à qualche altra retta C, se la retta C misura giustamente la retta AB, diuisa AB nelle parti uguali alla retta C, verremo in cognitione di quante parti sono in AB uguali à C; e così potremo esprimere la moltitudine delle parti, che sono in AB, uguali alla retta C; ed in tal caso la retta AB è commensurabile in lunghezza, rispetto alla misura C, cioè la retta linea AB è quella, della quale se ne possono esprimere le parti, rispetto alla misura C; ed in questo caso la retta linea AB si chiama rationale. Se poi la retta linea C non misura giustamente la retta AB, ma si troua qualche retta D, la




quale

quale è commune misura delle due AB , & C , quelle, per la prima definizione, sono commensurabili in lunghezza, e però si dividano le rette AB , & C , nelle parti uguali alla retta D , ed habueremo cognite le parti della retta AB , rispetto alla misura D ; e si sapranno ancora le parti della retta C , rispetto alla medesima retta D ; e, per quel, che si è detto, le rette AB , & C , delle quali sono cognite le parti, rispetto alla commune misura D , si dicono similmente Rationali; e queste sono quelle, che costituiscono il primo genere delle rette Rationali.


Di nuovo, siano le rette AB , CD , frà le quali non cada alcuna misura commune, quelle saranno incommensurabili in lunghezza, ed i loro quadrati siano AE , CF ; e supposto, che lo spatio Z sia commune misura de i quadrati AE , CF , saranno le rette AB , CD , per la terza definizione, commensurabili in potenza. S'intendano diuisi i quadrati AE , CF , ne gli spatij X , ed T , ogn'uno uguale allo spatio Z , ed habueremo cognite le parti delle potenze AE , CF , rispetto alla misura Z ; e per quel, che si è detto, le rette AB , CD sono ancora rationali; e queste costituiscono il secondo genere delle rette Rationali. Quelle rette poi, che non hanno commune misura, ne in lunghezza, ne in potenza, costituiscono l'altro genere, e si dicono Irrationali.

Finalmente, perche qualunque retta linea si può diuidere in quante parti uguali si vuole, perciò ogni retta linea si può stabilire come grandezza cognita, cioè come misura, o norma, alla quale si possono comparare tutte le infinite altre rette linee. Per esempio, sia esposta qualunque retta linea AB , la quale potendosi à nostro arbitrio diuidere in quante parti uguali vogliamo, la possiamo ancora stabilire come grandezza cognita, ed esprimerne quelle parti, nelle quali habueremo diuisa, o altre, nelle quali si può sempre diuidere: e, comparando à questa tutte le infinite altre rette linee, molte di quelle saranno à questa commensurabili in lunghezza, e per quel, che si è detto, saranno ancora commensurabili in potenza: altre saranno solamente commensurabili in potenza; ed altre saranno incommensurabili in lunghezza, ed ancora in potenza; e questa retta linea AB , o altra, che si può porre in suo luogo, stabilita come quantità à noi cognita, alla quale saranno comparate tutte le altre, è quella, che Euclide nella definizione quinta di questo, chiama Rationale; alla quale comparate le altre, quelle, che à questa saranno commensurabili in lunghezza, e potenza; ouero saranno solamente commensurabili in potenza, le chiama nella 6. defin. Rationali. Le altre, che à questa saranno incommensurabili in lunghezza, e potenza, nella 7. defin. le chiama Irrationali.



Per più chiara spiegazione de' suoi riflettere, che, douendosi misurare qualche spatio proposto, questo, come è uso commune, non si fa altrimenti, che con l'aiuto di qualche cognita misura, diuisa in palmi, piedi, e simili: e perche quelli palmi, o piedi, non in tutti i paesi sono uguali, ma sono di differenti lunghezze, è manifesto, che le diuisioni di tali misure sono arbitrarie; e non solo le diuisioni sono arbitrarie, ma sono ancora arbitrarj i nomi delle medesime misure: poiche in alcuni luoghi le loro misure le chiamano Braccia, Cubiti &c. ed in altri le chiamano Canne, Catene, Persiche, Passi, e simili. Hor, non douendo Euclide restringersi in vna delle antedette, o altre misure particolari, per parlare in genere d'ogni misura, o che si usi, o che possa usarsi, intende diuisa qualunque retta in quante parti uguali si voglia, in modo, che questa retta possa rappresentare tutte le misure, che si usano, e quante altre ad arbitrio dell'huomo se ne possono usare; e questa è quella retta, che chiamiamo Rationale, di modo, che sotto questa voce di Rationale dobbiamo intendere, non solo tutte le misure, che attualmente si usano in ogni paese, ma quelle ancora, che a nostro arbitrio si possono usare. E perche, quando con qualche misura usata si misura qualche spatio, non si fa altro, se non che la comparatione fra la cosa misurata, e quella, con la quale si misura; come per esempio se fosse proposta qualunque misura AE , o che sia pertica, o canna, o catena, o braccio, o passo &c. che sempre la chiameremo Rationale, e con questa si hauesse a misurare la lunghezza DE ; questa operatione non è altro, se non che vedere quante volte DE contiene la misura AB ; ouero quante parti è DE di quelle, che sono in AB ; il che è vna semplice comparatione, che si fa tra la lunghezza DE , e la proposta misura AB . Quindi è, ch'Euclide chiama Rationale quella linea, alla quale sono comparate tutte le altre, ed è l'istesso che dire, con la quale si misurano tutte le altre.

Notifi, che quando si è stabilita la linea, che chiamiamo Rationale, come AB ; o altra, la quale arbitrariamente è diuisa in parti uguali, ogn'vna di quelle uguali parti, come BC , per essere singolare, si chiama Vnità. E perche, come s'è detto, la Rationale AB è vna certa misura determinata, alla quale si comparano tutte le altre rette; perciò ogn'vna delle parti uguali, che sono in AB , si considera come vnità determinata; anzi che nelle comparationi da farsi fra la Rationale, e le altre grandezze, basta la cognitione della sola vnità CB ; poco importante, che la Rationale consti di vna sola vnità, o di più vnità; uguali a DB ; atteso che la Rationale si può fare lunga, o breue, quanto si vuole; ed è la medesima cosa dire, che DE consti per esempio, di mille di quelle parti, che in AB sono dieci; quanto è dire, che la retta DE consti di mille vnità, o parti uguali a CB .



V I I L.

Il quadrato della sudetta Rationale, alla quale si comparano tutte le altre, si chiama ancora Rationale.

I X.

Tutti i piani, che sono commensurabili all'antedetto quadrato, si dicono similmente Rationali.

X.

E quei piani, che al medesimo sudetto quadrato sono incommensurabili, si dicono Irrationali.

X I.

Le rette linee poi, i di cui quadrati sono incommensurabili all'istesso sudetto quadrato, si chiamano Irrationali: come ancora quelle rette, i di cui quadrati sono vguali à i piani, che sono incommensurabili à quel medesimo sudetto quadrato, si dicono parimente incommensurabili.

Per effempio sia *AB* quella retta, stabilita come cognita, alla quale si habbiano à comparare tutte le altre; sarà *AB*, come si è detto, quella retta, che chiamiamo Rationale, il di cui quadrato, come vuole Euclidè nell'ottava definitione, si chiamerà Rationale: e tutti i piani che saranno commensurabili al quadrato di *AB*, per qualche spiegata nella 9. definitione, si chiameranno similmente Rationali. Quei piani poi che saranno incommensurabili al quadrato di *AB*, secondo il senso della decima definitione, si chiameranno Irrationali. Finalmente le rette, i di cui quadrati sono incommensurabili al quadrato di *AB*, si dicono irrationali alla retta *AB*; e quelle rette, i di cui quadrati sono vguali à quei piani, che sono incommensurabili al quadrato di *AB*, secondo il tenore dell'11. definitione, si dicono Irrationali alla retta *AB*.

Aggiungo, come fa il P. Clauio, vn solo postulato con alcuni Affissi, de' quali si serue Euclidè in questo Elemento.

P O S T V L A T O.

Si prende per concesso, che di due ineguali grandezze del medesimo genere, la minore si possa tante volte multiplicare, finche ne risulti vna grandezza, che superi la maggiore.

Per-

Perche ogni grandezza terminata si può accrescere in infinito, perciò, moltiplicandosi una proposta grandezza più, e più volte, finalmente si perverrà ad una grandezza, maggiore di qualunque altra terminata grandezza del medesimo genere.

A S S I O M I.

I.

Quella grandezza, che misura molte altre grandezze, misurerà ancora il composto di quelle.

I I.

Se vna grandezza misura vn'altra grandezza, misurerà ancora la misurata da quella.


I I I.

Se vna grandezza misura tutta vn'altra grandezza, e misura vna parte di quella, misurerà ancora il rimanente.


THEOREMA I. PROPOSITIONE I.

Se di due grandezze ineguali dalla maggiore se ne detrac più della metà, e dal rimanente se ne detrac più della metà, e di nuouo da quel, che resta, se ne detrac più della metà, e questo si faccia sempre, finalmente resterà vna grandezza minore dell'altra.

Siano proposte due grandezze ineguali, come AB maggiore, & C minore. Dico che, se dalla maggiore AB se ne detrac più della metà, e dal rimanente se ne detrac ancora più della metà, e di nuouo da quel, che resta, se ne detrac più della metà, e questo si faccia sempre, finalmente resterà vna grandezza minore della data C. Si prenda DE moltiplice di C in modo, che la grandezza DE sia prossima maggiore a di AB, e si diuida nelle parti vguale a C, che siano DF, FG, GE; si detragga dalla grandezza AB più della metà, che sia AH; e dal rimanente HB se ne detragga similmente più della metà, che sia HI; e questa detrazione si faccia tante volte, in modo, che le parti AH, HI, IB siano tante, per quante sono le parti in DE. Dico che l'ultimo auanzo IB è minore di C.



Si prenda KL multiplice di IB, come DE è multiplice di C, e si di-
 uida KL nelle parti vguale ad IB, che siano KM, MN, NL. Perche AH,
 per costruzione, supera la metà di AB, sarà AH mag-
 giore di HB; e molto più della parte IB: ma IB è v-
 guale a KM, sarà AH mag-
 giore di KM. Similmēte per-
 che HI supera la metà di HB,
 sarà HI maggiore di IB; ma
 IB è vguale ad MN, sarà HI
 maggiore di MN; e tutta AI sarà maggiore di tutta la grandezza KN: e
 perche IB è vguale ad NL, sarà tutta AB maggiore di KL: per costr-
 uzione DE è maggiore di AB, sarà DE maggiore di KL.



Finalmente perche DE, per costruzione, è multiplice di C, come LK
 è multiplice di IB, essendo C vguale ad EG, e la grandezza IB vguale
 ad LN, sarà DE multiplice di EG, come KL è multiplice di LN: dal che
 sarà ED ad LK, come GE ad LN: ma DE è dimostrata maggiore di
 LK, sarà GE maggiore di LN, cioè LN minore di GE; e perche LN è
 vguale ad IB, e la grandezza EG è vguale a C, sarà IB minore di C,
 come fu proposto dimostrare.

a 15. del 5.
 e 20. dell'11.
 del 7.

S C O L I O.

Nell'istesso modo si prouerà, che se da AB se ne detrae la metà, e da quel
 che resta se ne detrae la metà, e questo si farà sempre, finalmente l'ultimo
 auanzo, come IB, sarà minore di C. Poiche, supposta la medesima costr-
 uzione, essendo AH la metà di AB, sarà AH maggiore di IB, cioè maggiore
 di KL; e essendo HI la metà di HB, sarà HI vguale ad IB, dal che HB
 sarà vguale ad ML, e tutta AB maggiore di KL: ed, argumentandosi come
 prima si fece, si dimostrerà che IB è minore di C.


THEOREMA II. PROPOSITIONE II.

Se di due grandezze ineguali si detrae sempre la mino-
 re, quanto si può, dalla maggiore, con reciproca detrat-
 tione; se di questa continua detrazione, fatta reciproca-
 mente, mai l'auanzo misuri l'antecedente; quelle gran-
 dezze faranno incommensurabili.

Siano le grandezze ineguali AB, CD, e dalla maggiore CD se ne
 detragga quanto si può la minore AB; ed il rimanente si detragga
 quanto si può da AB, e quel che resta si detragga, quanto si può, da
 FD, e con quest'ordine si proceda sempre; se in questa continua de-
 trazione fatta reciprocamente, mai l'auanzo misura la precedente. Di-
 co che le grandezze AB, CD sono incommensurabili. Se non sono in-
 commensurabili, quelle saranno misurate da qualche misura comune,

che

che sia E, la quale ò sarà vguale, ò minore di AB. Sia dunque detratta da CD, quanto si può, la minore AB, e quel, che resta, sia FD; farà FD minore di AB: e perche AB misura CF, farà CF ò vguale, ouero maggiore di AB; per la qual cosa CF sarà maggiore di FD; e perciò CF farà maggiore della metà di CD. Similmente da AB se ne detragga, quāto si può, l'auanzo FD, e quel, che resta, sia GB; farà GB minore di FD. E perche FD misura AG, farà AG maggiore di FD; e sarà molto maggiore di GB; per la qual cosa AG sarà maggiore della metà di AB. Di nuouo da FD se ne detragga, quanto si può, GB, e con quest'ordine si proceda, fin à tanto, che resti da AB, ò ouero CD, vna grandezza minore di E. Supposto, che sia fatta questa continua detrazione, e sia il rimanente GB, minore della grandezza E. Perche E misura, per supposizione, la quantità AB, e la medesima AB, per costruzione misura CF, in conseguenza la quantità E misurerà^b CF: ma, per la supposizione fatta, misurerà tutta CD; la quantità dunque E misurerà ancora^c il rimanente FD; ma l'auanzo FD, per costruzione, misura AG, perciò la quantità E misurerà^d AG. E perche la medesima E misura tutta AB; la quantità E dunque^e misurerà il rimanente GB; fu supposta GB minore di E, la maggiore misurerà la minore, ch'è impossibile. Non dunque la grandezza E è commune misura delle due AB, CD, ma le due AB, CD sono incommensurabili, che era da dimostrarsi.



a. del 10.


b. 2. assioma
del 10.
c. 3. assioma
del 10.
d. 5. assioma
del 10.
e. 3. assioma
del 10.

S C O L I O.

Faremo la conuersa all'antecedente proposizione col P. Clauio, nel seguente modo.

Se due grandezze faranno incommensurabili, detratta sempre, quanto si può, la minore dalla maggiore, con reciproca detrazione, mai l'auanzo misurerà la precedente.

Siano le grandezze incommensurabili AB, CD, e dalla maggiore CD se ne detragga, quanto si può, la minore AB, e quel, che resta, sia ED, sarà ED minore di AB. Similmente da AB se ne detragga, quanto si può, l'auanzo ED, e quel, che resta, sia FB; sarà FB minore di ED. E con quest'ordine si proceda, sottraendo sempre, quanto si può, la minore dalla maggiore alternatiuamente. Dico che mai resterà auanzo, che misuri l'antecedente.




Dall'auanzo FB sia misurato, se è possibile, l'antecedente ED. Perche FB misura ED, e, per ipotesi, ED misura AF, in conseguenza FB misurerà

a. 2. assioma
del 10.

AF;

b 1. assioma
del 10.
c 2. assioma
del 10.
d 1. assioma
del 10.


AF; ma FB misura se medesima, misurerà ancora ^b il tutto AB. E perche AB misura CE, perciò FB ^c misurerà CE, ma per la fatta supposizione, FB misurerà ED, misurando le due CE, ED, ^d misurerà ancora il tutto CD; ma si è dimostrato, che FB misura tutta AB; sarà dunque FB comune misura delle due AB, CD: per la qual cosa le due AB, CD sono commensurabili, ch'è contro all'ipotesi. Non dunque l'auanzo FB misura la precedente ED, come sù proposto dimostrare.



PROBLEMA I. PROPOSITIONE III.

Date due grandezze commensurabili, ritrouare la loro massima comune misura.

Siano le due date grandezze commensurabili AB, CD, e si habbia à ritrouare la loro massima comune misura. Dalla maggiore CD se ne detragga, quanto si può, la minore AB, e quel che resta, sia ED; sarà ED minore di AB. Poi da AB se ne detragga, quanto si può, l'auanzo ED, e quel che resta, sia FB; sarà FB minore di ED. E similmente da ED se ne detragga FB, e così quest'ordine si proceda sino à tanto, che qualche auanzo misuri l'auanzo precedente, il che non può mancare; perche, se mai si trouerà auanzo, che misuri la precedente, per la seconda propos. di questo, le grandezze AB, CD faranno incommensurabili, ch'è contro all'ipotesi. Sia dunque FB quell'auanzo, che misuri l'auanzo precedente ED. Dico che FB è la massima comune misura delle proposte grandezze AB, CD. Perche FB misura ED, e per costruzione ED misura AF; l'auanzo dunque FB ^a misurerà AF; ma FB misura se medesimo, in conseguenza FB ^b misurerà tutta AB; per costruzione AB misura CE, dunque FB ^c misurerà CE; ma FB misura ancora ED, misurando le due CE, ED, ^d misurerà parimente tutta CD: ma, per quel, che si è dimostrato, FB misura AB, sarà FB comune misura delle due AB, CD.




Dico finalmente, che FB è la massima di tutte le altre, che misurano le grandezze AB, CD. Se FB non è la massima, qualche altra grandezza sarà la massima comune misura delle due AB, CD; sia dunque quella la notata G, la quale, per esser massima sarà maggiore di FB. Perche G misura AB, e per costruzione, AB misura CE, perciò G ^a misurerà CE; ma per supposizione G misura tutta CD, in conseguenza ^b misurerà ancora il rimanente ED; e perche ED misura AF, dunque G ^c misurerà AF; ma G, per supposizione, misura tutta AB, misurando il tutto AB, e la parte AF, ^d misurerà ancora l'auanzo FB: ma G è supposta maggiore di FB, la maggiore misurerà la minore, ch'è impossibile.

a 1. assioma
del 10.
b 1. assioma
del 10.
c 2. assioma
del 10.
d 1. assioma
del 10.

a 1. assioma
del 10.
b 3. assioma
del 10.
c 1. assioma
del 10.
d 1. assioma
del 10.

ibile.

sibile. Non dunque G è la massima comune misura, mà sarà FB. Se poi la minore AB misurasse giustamente la maggiore CD, in modo, che, detratta AB, quanto si può, da CD, non sopravanzasse cosa alcuna, all' hora AB sarà la massima comune misura, stante che AB misurerebbe CD, e misurerebbe ancora se medesima, ch'era da farsi, e dimostrarsi.




COROLLARIO.

Nella seconda parte dell'antecedente proposizione, supponendo G la massima comune misura delle due AB, CD, si è dimostrato, che G misura FB. Hor se supporremo, che G non sia la massima, mà sia vna di quelle, che misura le due AB, CD, procedendosi nell'istesso modo, si prouerà, che G misura la massima FB. D'onde è manifesto, che quella grandezza, che misura le due AB, CD, misurerà ancora la loro massima comune misura.

PROBLEMA II. PROPOSITIONE IV.

Date tre grandezze commenfurabili, ritrouare la loro massima comune misura,

Siano proposte le tre grandezze commenfurabili A, B, C, e si voglia ritrouare la loro massima comune misura. Per l'antecedente proposizione si troui la massima comune misura di due sole, come, per esempio, delle due A, & B, che sia D; se D mi-




sura C, sarà D la massima comune misura delle tre A, B, C; mà se D non misura C, perche le tre A, B, C si suppongono commenfurabili, qualche grandezza le misurerà tutte tre; sia E la loro comune misura. Perche E misura le tre A, B, C sarà dunque comune misura delle due A, & B, e, per l'antecedente Corollario, E misurerà ancora D, ch'è massima comune misura delle due A, & B: mà E misura C, perciò E sarà comune misura delle due C, & D; per la qual cosa le due C, & D sono commenfurabili. Si troui dunque, per l'antecedente proposizione, la massima comune misura delle due C, & D, che sia F. Dico che F è la massima comune misura delle tre A, B, C. Perche F misura D, e per costruzione, D misura le due A, B; perciò F misura le due A, & B: ^{2a} affionza
delto.

ma

mà per costruzione, F misura ancora C, in conseguenza F è comune misura delle tre A, B, C.

Dico finalmente, che F è la massima. Se F non è la massima, qualche altra grandezza sarà la massima misura delle tre A, B, C; sia quella la notata G, sarà G maggiore di F. Perche G misura le due A, B, per il Corollario antecedente, misurerà ancora D, ch'è loro massima comune misura, mà G, per supposizione, misura C, in conseguenza G sarà comune misura delle due C, & D; e per il Corollario antecedente, G misurerà ancora F, ch'è massima comune misura delle due C, & D: mà G è supposto maggiore di F, la maggiore misurerebbe la minore, ch'è impossibile. Non dunque G è la massima; mà la massima sarà F, ch'era da farsi è dimostrarsi.



COROLLARIO.

Essendosi dimostrato, che posta G comune misura delle tre A, B, C misura ancora F, sarà manifesto, che quella grandezza, la quale sarà comune misura di tre altre grandezze, la medesima misurerà la massima comune misura di quelle tre grandezze.

Il medesimo modo tenuto à trouare la massima comune misura à tre grandezze commensurabili, si può ancora tenere, per trouare la massima comune misura à più di tre grandezze commensurabili; cioè, se le date grandezze saranno quattro, si troui prima la massima comune misura à tre di quelle, e poi, frà la massima trouata, e la quarta, si troui vn'altra massima; e se saranno cinque si trouerà prima la massima comune misura à quattro, e con quell'ordine in infinito; e sempre si prouerà, che quella grandezza, che è comune misura di quante si voglia grandezze, misurerà ancora la massima, che misura quelle.

THEOREMA III. PROPOSITIONE V.

Le grandezze commensurabili hanno frà di loro quella proportion, che hà il numero al numero.

Siano le grandezze commensurabili A, & B. Dico che la proportion di A à B è come quella, che hà vn numero ad vn altro numero. Si troui la massima comune misura delle due A, & B, che sia C; e quante volte C misura la grandezza A, tante volte l'vnità F misuri il numero D; come ancora, per quante volte C misura la grandezza B, tante volte l'vnità F misuri il numero E. Perche C misura A, come l'vnità F misu-

ra il numero D, sarà A multiplice di C, come D è multiplice dell'vnità F; e per quel, che si è dimostrato auanti alla sesta definitione del quinto Libro, gli vguali multiplici della prima A, e terza D, secondo qualunque multiplicatione, sono ambidue, presi separatamente, ò maggiori, ò minori, ò vguali à gli vguali multiplici della seconda C, e quarta F, presi secondo qualunque multiplicatione; e per la sesta definitione del quinto

A  D3

C  F.

D  E2

Libro, la prima A alla seconda C è come la terza D alla quarta F; cioè la grandezza A alla grandezza C hauerà la medesima proportionione, quale hà il numero D all'vnità F. Similmente, perche C misura B, come l'vnità F misura il numero E, sarà C à B, come F ad E. In oltre si considerino le tre grandezze A, C, B, delle quali C sia intermedia; e si considerino i numeri D, E, e l'vnità F sia intermedio; la proportionione di A, à B, per il Lemma settimo dopo la 18. del sexto, è composta delle proportioni di A à C, e di C à B: mà A à C è come D ad F, e la proportionione di C à B è come quella di F ad E, la proportionione di A à B sarà composta delle due proportioni, cioè di D ad F, e di F ad E: mà la proportionione del numero D al numero E, per il citato Lemma, è composta delle medesime due proportioni di D ad F, e di F ad E: in consequenza la proportionione di A à B sarà come quella del numero D al numero E, ch'era da dimostrarsi.

COROLLARIO I.

Da quel che si è detto è manifesto, che se faranno tre grandezze da vna parte, come A, C, B, e tre numeri da vn'altra, come D, F, E, e che sia A à C come D ad F, e sia C à B come F ad E, per l'egualità, sarà A à B come il numero D al numero E.

COROLLARIO II.


Da quel, che si è detto nell'antecedente dimostrazione, appare, che, se vna grandezza è misurata da vn'altra grandezza, come vn numero è misurato dall'vnità, sarà la grandezza alla grandezza, come il numero all'vnità.

THEOREMA IV. PROPOSITIONE VI.

Se due grandezze hanno la proportionione frà di loro, quale hà il numero al numero, quelle grandezze saranno cõmensurabili.


Habbia la grandezza A alla grandezza B quella proportionione, che hà il numero C al numero D. Dico che le graudezze A, & B sono frà loro commensurabili. Frà i numeri

C, & D si esponga l'vnità G; e s'intenda diuisa la grandezza A in tante parti vguali, per quante vnità sono nel numero C. Poi sia esposta la grandezza E, vguale ad vna di quelle parti, che sono in A, e si multiplichi la grandezza E, in modo, che



ne venga F, la quale contenga tante volte E, per quante vnità sono nel numero D. Perche A contiene tante volte E, per quante vnità sono nel numero C, conterrà A tante volte E, per quante volte il numero C contiene l'vnità G; e, per il secondo Corollario all'antecedente propositione, la proportionione di A ad E sarà come quella del numero C all'vnità G. Similmente perche F contiene E tante volte, per quante vnità sono nel numero D, sarà E parte di F, come l'vnità G è parte del numero D, per la qual cosa E ad F, per il citato Corollario, sarà come G à D. Hor, essendo A ad E come C à G; e si è dimostrata E ad F essere come G à D, per l'egualità, come si disse nel primo de gli antecedenti Corollarij, sarà A ad F come il numero C al numero D: ma il numero C al numero D, per ipotesi, è come A à B, sarà A ad F a come la medesima grandezza A alla grandezza B; e perciò le grandezze B, ed F b sono frà di loro vguali: per costruzione E misura F, in consequenza E misurerà la grandezza B; ma, per costruzione, misura ancora A, la quantità dunque E sarà comune misura delle due A, & B: per la qual cosa le grandezze A, & B c sono commensurabili, che era da dimostrarsi.

In altro modo più breue. Si diuida A in tante parti vguali, per quante vnità sono nel numero C, e si esponga E vguale ad vna delle parti, che sono in A. Perche E misura A, come l'vnità G misura il numero C, sarà E ad A, come l'vnità G al numero C: ma, per ipotesi, A à B è come C à D, sarà, per l'egualità, come si disse nel Corollario primo all'antecedente propositione E à B come G à D; e perche l'vnità G misura il numero D, perciò E misurerà B; mà E, per costruzione, misura ancora A, sarà E comune misura delle due A, & D: per la qual cosa le due A, & B d sono commensurabili, come fu proposto dimostrare.



COROLLARIO I.

Dalla prima dimostratione dell'antecedente propositione

ne

a 11. del 5.
b 9. del 5.

c 1. defin.
del 10.

d 1. defin.
del 10.

ne si caua il modo di trouare vna retta linea, alla quale vn'altra retta linea sia come vn numero ad vn altro numero. Si replichi la figura della prima dimostrazione, douendosi trouare vna retta linea, alla quale sia A (che quì la supponiamo retta linea) come il numero C al numero D ; si diuida la retta A in tante parti vguali, per quante vnità sono nel numero C , e si prenda la retta F , la quale consti di tante parti vguali alle parti di A , per quante vnità sono nel numero D , e per quel, che si è dimostrato, la retta A alla retta F farà come il numero C al numero D .

COROLLARIO II.

Da quel, che si è detto, è manifesto ancora il modo da ritrouare vna retta linea, al di cui quadrato, sia il quadrato d'vna retta data, come vn numero ad vn altro numero.

Per esempio sia la retta data A , e si habbia da ritrouare vn'altra retta, in modo, che il numero C al numero D sia, come il quadrato della retta A al quadrato della retta da trouarsi. Si troui, come nell'antecedente Corollario, la retta F , in modo, che la retta A alla retta F



sia come il numero C al numero D ; poi frà le rette A , ed F , si troui vna media proportionale, come G . Dico che G è la retta, che si cerca. Perche G è media proportionale frà le due A , ed F , hauerà A ad F , per il Lemma 7. dopo la 18. del 6. duplicata proportione, che A à G : ma il quadrato di A al quadrato di G ha la medesima duplicata proportione, che ha la retta A alla retta G ; sarà il quadrato di A al quadrato di G , come A ad F : ma, per costruzione, A ad F è come C à D , sarà il quadrato di A al quadrato di G , come il numero C al numero D , ch'era da farsi.

a 13. del 6.

b 20. del 6.

c 11. del

THEOREMA V. PROPOSITIONE VII.

Le grandezze incommensurabili non hanno la proportion fra loro, come ha il numero al numero.

Siano le grandezze A , & B incommensurabili. Dico che non sano frà di loro come numero à numero.

Se A à B farà come numero à numero, per l'antecedente propositione, le grandezze A , & B faranno commenfurabili.



I i i 2

bili,

bili, ch'è contro all'ipotesi. Non dunque $A \propto B$ è come va numero a numero; e perciò le grandezze incommensurabili, non sono come numero a numero, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA VI. PROPOSITIONE VIII.

Se due grandezze frà loro non hanno la proportionione, che hà il numero al numero, quelle sono incommensurabili.

Siano le grandezze A , & B , le quali non habbiano frà loro la proportionione, che hà il numero al numero. Dico che sono incommensurabili. Non siano incommensurabili, se è possibile. Perche le due A & B sono commensurabili, per la 5. propositione di questo, haveranno quella proportionione, che hà il numero al numero, ch'è contro all'ipotesi. Non dunque sono commensurabili, ma saranno incommensurabili, ch'era da dimostrarsi.



S C O L I O.


L'antecedente propositione, ch'Euclide dimostra in genere, douendosi applicare alle rette linee, è necessario auuertire, che, potendo le rette linee essere commensurabili in lunghezza, e potenza; e, potendo essere commensurabili in potenza solamente, quando la retta linea alla retta linea, non è come il numero al numero, per quel, che si è dimostrato nell'antecedente propositione, quelle rette linee saranno incommensurabili in lunghezza; ma non ne segue, che non possano essere commensurabili in potenza, mentre que'le, che sono commensurabili in potenza solamente, sono ancora incommensurabili in lunghezza. Si conclude dunque, che quando due rette linee non sono frà loro come numero a numero, quelle sono incommensurabili in lunghezza; e può essere, che siano incommensurabili in potenza, e può essere ancora, che siano commensurabili in potenza.

THEOREMA VII. PROPOSITIONE IX.

I quadrati delle rette linee commensurabili in lunghezza, hanno frà loro la proportionione, che hà il numero quadrato al numero quadrato: ed i quadrati, che frà loro hanno la proportionione, che hà il numero quadrato al numero quadrato, hanno i lati commensurabili in lunghezza. Di più, i quadrati delle rette linee incommensurabili

in lunghezza, non hanno frà loro la proportionione, che hà il numero quadrato al numero quadrato; e de i quadrati, che non hanno frà loro la proportionione, che hà il numero quadrato al numero quadrato, ne meno i lati haueranno le lunghezze commenfurabili.

Siano prima le rette linee AB, CD, commenfurabili in lunghezza. Dico che il quadrato della retta AB al quadrato della retta CD è come vn numero quadrato ad vn altro numero quadrato. Perche le rette AB, CD, per ipotesi, sono commenfurabili in lunghezza, la retta AB, alla retta CD, ^a hauerà quella proportionione, che hà il numero al numero; habbia dunque la



retta AB alla retta CD quella proportionione, che hà il numero E al numero F; ed i quadrati de i numeri E, F siano i notati G, ed H. Perche il quadrato di AB al quadrato di CD ^b hà duplicata proportionione, che il lato AB al lato CD, e la proportionione di AB à CD è come E ad F; hauerà il quadrato di AB al quadrato di CD duplicata proportionione di quella; che hà il numero E al numero F: ma il numero quadrato G al numero quadrato H ^c hà la medesima duplicata proportionione del numero E al numero F; sarà il quadrato di AB al quadrato di CD, come il numero quadrato G al numero quadrato H, il che era da dimostrarsi nel primo luogo.

Di nouo, sia il quadrato di AB al quadrato di CD, come il numero quadrato G al numero quadrato H. Dico che le rette AB, CD sono commenfurabili in lunghezza. Siano i numeri E, ed F i lati de i numeri quadrati G, ed H. Perche il quadrato della retta AB al quadrato della retta CD ^b hà duplicata proportionione, che il lato AB al lato CD, ed il quadrato della retta AB al quadrato della retta CD, per ipotesi, è come il numero quadrato G al numero quadrato H; hauerà il numero quadrato G al numero quadrato H duplicata proportionione, che la retta AB alla retta CD: ma il numero quadrato G al numero quadrato H ^c hà duplicata proportionione di quella, che hà il numero E al numero F; sarà il lato AB al lato CD, come il numero E al numero F; per la qual cola le rette linee AB, CD sono commenfurabili in lunghezza, ch'era da dimostrarsi nel secondo luogo.

In oltre, siano le rette A, & B, incommenfurabili in lunghezza. Dico che il quadrato di A al quadrato di B non è come il numero quadrato al numero quadrato.

Habbia, s'è possibile, il quadrato della retta linea A al quadrato della retta linea B quella proportionione, che hà il numero quadrato al numero quadrato; per quel, che si è dimostrato nella seconda parte, le

rettc

a 5. del 10.

b 20. del 6.

c 11. del 8.

d 20. del 6.

e 11. del 8.

rette A, & B faranno commensurabili in lunghezza; il che è contro all'ipotesi. Non dunque il quadrato di A al quadrato di B è come il numero quadrato al numero quadrato, che era da dimostrarsi nel terzo luogo.

Finalmente, non habbia il quadrato della retta linea A al quadrato della retta linea B quella proportion, che hà il numero quadrato al numero quadrato. Dico che le rette A, & B sono incommensurabili in



lunghezza. Se le rette A, & B non sono incommensurabili in lunghezza, per necessaria conseguenza, sono commensurabili in lunghezza; e, per quel, che si è dimostrato nella prima parte, il quadrato di A al quadrato di B sarà come il numero quadrato al numero quadrato, ch'è contro all'ipotesi. Non dunque le rette A, & B sono commensurabili in lunghezza; ma hanno le lunghezze incommensurabili, come fù proposto dimostrare.

COROLLARIO.

Da quel, che si è detto, è manifesto, che le rette linee, le quali sono commensurabili in lunghezza, sono ancora commensurabili in potenza, e quelle, che sono commensurabili in potenza, non sempre sono commensurabili in lunghezza. Di più, quelle rette, che sono incommensurabili in lunghezza, non sempre sono incommensurabili in potenza. Quelle rette linee poi, che hanno le potenze incommensurabili, sempre sono incommensurabili in lunghezza.

Cioè, essendosi dimostrato nella prima parte, che i quadrati delle rette linee, che sono commensurabili in lunghezza, sono frà loro come numero quadrato à numero quadrato, ed i numeri quadrati, come gli altri numeri, sono tutti commensurabili; ancora i quadrati di quelle rette linee sono commensurabili; e perciò, quando le rette linee sono commensurabili in lunghezza, sono ancora commensurabili in potenza.

Similmente, perche nella sesta proposizione di questo, si è dimostrato in genere, che le grandezze, le quali sono frà loro come numero à numero, sono commensurabili; se i quadrati di due rette non saranno come numero quadrato à numero quadrato, mà saranno come numero non quadrato, à numero non quadrato, quei due quadrati saranno commensurabili; mà perche non sono frà loro come numero quadrato à numero quadrato, per l'ultima parte dell'antecedente proposizione, i latidi quei quadrati saranno incommensurabili in lunghezza. E queste sono quelle rette linee, che sono incommensurabili in lunghezza, e sono commensurabili in potenza; cioè sono quelle, che si dicono commensurabili solamente in potenza. E da qui ne se-

gue,

gue, che le rette, le quali sono incommensurabili in lunghezza, non sempre sono incommensurabili in potenza.

Finalmente, nella settima proposizione di questo si è dimostrato in genere, che quando le grandezze non sono fra di loro come numero a numero, quelle sono incommensurabili. Hor quando i quadrati di due rette linee non hanno la proporzione, che ha il numero al numero, quelli sono incommensurabili: ma si è dimostrato nella prima parte, che quando i quadrati delle rette non sono fra loro, come numero quadrato a numero quadrato, quelle rette linee sono incommensurabili in lunghezza; quando dunque i quadrati delle rette linee non sono come numero a numero, ne meno saranno come numero quadrato a numero quadrato; e perciò saranno incommensurabili in potenza, ed in lunghezza. Donde è manifesto, che quando i quadrati di due rette linee sono incommensurabili, necessariamente ancora quelle rette linee saranno incommensurabili in lunghezza.


THEOREMA VIII. PROPOSITIONE X.

Se quattro grandezze sono proporzionali, e la prima è commensurabile alla seconda, ancora la terza sarà commensurabile alla quarta; e se la prima è incommensurabile alla seconda, ancora la terza sarà incommensurabile alla quarta.

Siano le quattro grandezze proporzionali A, B, C, D, o che tutte quattro siano del medesimo genere, o che le due A, & B siano d'un genere, e le altre due d'un altro genere, e la prima A sia commensurabile alla seconda B.

Dico che la terza C sarà ancora commensurabile alla quarta D. Perche A, & B si suppongono commensurabili, la proporzione di A a B sarà come quella d'un numero ad un altro numero. Sia dunque come il numero E al numero F. Perche A a B, per ipotesi, è come C a D, hauerà C a D l'istessa proporzione, quale ha il numero E al numero F; per la qual cosa le due C, & D sono commensurabili, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

Di nouo, supposto che la prima A sia incommensurabile alla seconda B. Dico che la terza C sarà incommensurabile alla quarta D. Perche le due A, & B si suppongono incommensurabili, la proporzione di A a B non sarà come quella del numero al numero: ma la proporzione di A a B, per ipotesi, è come quella di C a D; la proporzione dunque di C a D non è come quella del numero al numero: Per la qual cosa C, & D sono incommensurabili, che era da dimostrarsi.



a 5. del 10.

b 6. del 10.

c 7. del 10.

d 8. del 10.

S C O L I O I.

L'antecedente proposizione, ch' Euclide pone in genere, non solo si applica alle rette linee, che sono commensurabili, ò incommensurabili in lunghezza, ma si applica ancora à quelle, che sono commensurabili, o incommensurabili in potenza, nel seguente modo.

Se quattro linee rette sono proporzionali, e la prima è commensurabile solamente in potenza alla seconda, ancora la terza sarà commensurabile solamente in potenza alla quarta; e se la prima è incommensurabile in potenza alla seconda, ancora la terza sarà incommensurabile alla quarta.

Habbia A à B l'istessa proportion, che B à C à D . Dico prima, che se A è commensurabile solamente in potenza alla seconda B , ancora C sarà commensurabile solamente in potenza alla quarta D . Perché A à B è come C à D , sarà il quadrato di A al quadrato di B come il quadrato di C al quadrato di D : e perché le due A , & B si suppongono commensurabili in potenza, i loro quadrati ^f saranno ancora commensurabili; per la qual cosa il quadrato di A al quadrato di B sarà come numero à numero: ma il quadrato di A al quadrato di B è come il quadrato di C al quadrato di D ; sarà il quadrato di C al quadrato di D come è il numero al numero; e perciò i quadrati delle due C , & D , ^h sono commensurabili: dal che le due C , & D ^k sono commensurabili in potenza, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.



e 22. del 6.

f 3. defin.

del 10.

g 3. del 10.

h 6. del 10.

k 3. defin.

del 10.

Di nuovo, supposto che A sia incommensurabile in potenza alla retta B . Dico che C sarà incommensurabile in potenza alla retta D . Perché le due A , & B sono incommensurabili in potenza, i loro quadrati saranno incommensurabili, e perciò ^l non sono fra loro come numero à numero: ma la proportion del quadrato di A al quadrato di B è come il quadrato di C al quadrato di D ; non sarà il quadrato di C al quadrato di D come numero à numero; per la qual cosa ^m non saranno commensurabili, e le due C , & D non sono commensurabili in potenza, che era da dimostrarsi.

l 7. del 10.

m 8. del 10.

PROBLEMA III. PROPOSITIONE XI.

Ad vna proposta retta linea ritrouare due rette linee incommensurabili, cioè vna incommensurabile solamente in lunghezza, e l'altra incommensurabile in lunghezza, ed in potenza.

Sia

Sia propoſta la retta linea A, alla quale ſi voglia prima trouare vna retta linea incommenſurabile ſolamente in lunghezza.

Per il Lemma antecedente ſi trouino due numeri, come B, & C, i quali non habbiano la proportionē, come numero quadrato à numero quadrato; poi, per il Corollario alla propoſitione ſeſta di queſto, ſi troui la retta D, in modo, che il quadrato della retta A al quadrato della retta D, ſia come il numero B al numero C. Dico che la retta D è incommenſurabile ſolamente in lunghezza alla retta A. Perche il quadrato di A al quadrato della retta D, per coſtruzione, è come il numero B al numero C; e ſimilmete per coſtruzione, il numero B al numero C non è come numero quadrato à numero quadrato; perciò il quadrato di A al quadrato di D



non farà come numero quadrato à numero quadrato; ed inconſeſſenza le rette A, & D ſono incommenſurabili in lunghezza. Che poi le rette A, & D ſiano incommenſurabili ſolamente in lunghezza, è chiaro; poiche, eſſendo il quadrato di A al quadrato di D, come il numero B al numero C, i quadrati delle due A, & D, faranno commenſurabili; e le rette A, & D, faranno commenſurabili in potenza, per la qual coſa le rette A & D ſono ſolamente incommenſurabili in lunghezza.

Di nouo, alla propoſta retta linea A ſ' habbia à ritrouare vna retta incommenſurabile in lunghezza, e potenza. Si troui, come prima, la retta D, che ſia incommenſurabile ſolamente in lunghezza alla retta A; poi ſi troui vna media proportionale frà le rette A, & D, che ſia la notata E. Dico che la retta E è incommenſurabile alla retta A, in lunghezza, e potenza. Perche E, per coſtruzione, è media proportionale frà le due A, & D, la prima A alla terza D, per il Lemma ſettimo dopo la 18. del ſeſto, hà duplicata proportionē di quella, che hà la prima A alla ſeconda E: mà il quadrato di A al quadrato di E hà la medefima duplicata proportionē di A ad E: farà il quadrato di A al quadrato di E, come A à D: mà le due A, & D, per quel che ſi è dimoſtrato, ſono frà loro incommenſurabili in lunghezza, farà il quadrato di A incommenſurabile al quadrato di E; e perciò i quadrati di A, ed E ſono incommenſurabili, ed i lati A, & E faranno incommenſurabili in lunghezza. Per la qual coſa le rette A, ed E, ſono incommenſurabili in lunghezza, ed in potenza, eh'era da farſi, e dimoſtrarſi.

COROLLARIO.

Da quel, che ſi è detto, è manifeſto, che, ſe la propoſta retta A farà quella retta linea, che, nella quinta definitione, fù chiamata Rationale, eſſendo D, per quel, che ſi è dimoſtrato, ſolamente commenſurabile in potenza alla Rationale A, ouero ſolamente incommenſurabile in lunghezza, ch'è l'ſteſſa coſa, farà, per la 6. defin. di queſto,

* quello Lemma manca per errore, però ſi cauà dallo Scolio primo nel fine del 9. lib.

a 9. del 10.

b 6. del 10.

c 13. del 6.

d 10. del 10.

la retta D Rationale. Ed all'incontro, se stabiliremo la retta D come Rationale, essendo A commensurabile solamente in potenza à D, farà ancora A Rationale. In ostia perche E, ch'è media proportionale frà le due A, & D, è incommensurabile alla retta A, tanto in lunghezza, come in

A  B 7

E 

D  C 3

potenza, farà ancora incommensurabile in lunghezza, e potenza alla retta D. Poiche, essendo E media proportionale frà le due D, ed A, farà il quadrato di D al quadrato di E, come D ad A: mà D è incommensurabile in lunghezza ad A, farà il quadrato di D incommensurabile al quadrato di E; per la qual cosa D, ed E saranno ancora incommensurabili in lunghezza, come si disse. Donde appare, che, se frà due rette linee, come A, & D, incommensurabili solamente in lunghezza, cioè commensurabili solamente in potenza, si troua vna media proportionale, come E, farà E incommensurabile in lunghezza, e potenza, tanto alla retta A, quanto alla retta D: sì che, determinata A, ouero D, come Rationale, sempre la media E sarà irrationale.

THEOREMA IX. PROPOSITIONE XII.

Quelle grandezze, che sono commensurabili ad vna terza, saranno commensurabili frà di loro.

Sia la grandezza A, commensurabile alla grandezza C, e la grandezza B sia commensurabile alla medesima grandezza C. Dico che le grandezze A, & B, sono frà loro commensurabili.

A  D 10, E 8

C  F 2, G 3

B  H 5, K 4, L 6

Perche A, & C si suppongono commensurabili, la proportionione di A à C sarà come quella, che hà il numero al numero; habbia dunque A à C la proportionione, che hà il numero D al numero E. Similmente, perche le due C, & B sono commensurabili, hauerà C à B la proportionione, che hà il numero al numero: sia, per esempio, come il numero F al numero G. Si prendano tre numeri, come H, K, L, che siano i minimi nelle proportioni di D ad E, e di F à G; cioè che H à K sia come D ad E, ouero A à C, e la proportionione di K ad L

sia

a 10. del 10.

a 5. del 10.

b 5. del 10.

c 4. del 8.

sia come quella di F à G, cioè, come quella di C à B. Perche H à K è come A à C, e la proportion di K ad L è come quella di C à B, per il primo Corollario alla quinta propositione di questo, sarà per l'egualità, A à B come il numero H al numero L. Per la qual cosa le grandezze A, & B sono commensurabili, ch'era da dimostrarsi.

f6. del 19.

S C O L I O.

Se le grandezze A, & B sono rette linee, e le due A, & B sono commensurabili solamente in potenza alla retta C. Dico che le due A, & B sono commensurabili in potenza frà loro. Perche, l'antecedente propositione si è dimostrata in genere, se in luogo delle rette A, C, B si pongono i loro quadrati, sarà manifesto, da quel, che si è dimostrato, che i quadrati di A, & B, sono commensurabili; e perciò le rette A, & B sono commensurabili in potenza.

Se due grandezze sono commensurabili frà loro, ed vna di quelle sia commensurabile ad vna terza, l'altra farà ancora commensurabile alla medesima terza.

Siano le due A, & B, commensurabili frà loro, ed A sia commensurabile à C. Dico che B sarà commensurabile alla medesima C. Perche tanto B, quanto C, è commensurabile ad A, per l'antecedente propositione, le due B, & C, sono frà loro commensurabili.



THEOREMA X. PROPOSITIONE XIII.

Se vna di due grandezze è commensurabile ad vna terza, e l'altra è incommensurabile alla medesima terza, quelle due sono incommensurabili.

Sia la grandezza A commensurabile à C, e la grandezza B incommensurabile alla medesima C. Dico che le due A, & B sono incommensurabili. Se B, ed A non sono incommensurabili, sarà B commensurabile ad A; mà C è supposta commensurabile alla medesima A, le due B, & C saranno commensurabili, ch'è contro all'ipotesi. Non dunque le due A, & B sono commensurabili; per la qual cosa B sarà incommensurabile ad A, ch'era da dimostrarsi.


a 1a. del 20.

THEOREMA XI. PROPOSITIONE XIV.

Se due grandezze sono commensurabili, ed vna di quelle sia incommensurabile ad vna terza, ancora l'altra sarà incommensurabile alla medesima terza.

a 12. del 10.

Siano le grandezze A , & B comensurabili frà loro, e sia A incommensurabile à C . Dico che B sarà incommensurabile alla medesima C . Se B non è incommensurabile à C , sarà C comensurabile à B ; ma, per ipotesi, A è comensurabile à B , le due A , & C saranno comensurabili, ch'è contro all'ipotesi. Non dunque B è comensurabile à C , ma le due C , & B sono incommensurabili, come fù proposto dimostrare.




S C O L I O.

Da quel, che s'è detto, facilmente si dimostra il seguente Theorema.

Quelle grandezze, che sono comensurabili alle incommensurabili, sono frà di loro incommensurabili.

Siano le due grandezze A , & B incommensurabili; e sia C comensurabile ad A , e la grandezza D sia comensurabile à B . Dico che le due C , & D sono incommensurabili. Perche le due C , ed A , per ipotesi, sono comensurabili, ed A è incommensurabile à B , per l'antecedente proposizione, sarà C incommensurabile à B . Similmente



perche D , & B , per ipotesi, sono frà loro comensurabili, e si è dimostrata B incommensurabile à C , per l'antecedente proposizione, sarà D incommensurabile à C : ch'era da dimostrarsi.


L E M M A.

Date due rette linee ineguali, ritrouare di quanto la potenza della maggiore supera la potenza della minore.

a 10. del 1.

b 1. del 4.

Delle rette date sia la maggiore AB , e la minore C , e si voglia ritrouare quanto la potenza, o quadrato, di AB è maggiore della potenza, o quadrato di C . Si diuidi AB in due parti uguali in D , fatto centro in D , coll'intervallo DA , ouero DB , si descriva il mezzo circolo AEB , nel quale si addatti^b la retta BE uguale alla retta C . Si tiri la retta AE . Dico che la potenza di AB supera la potenza di C per quanto è la potenza, o quadrato di AE . Perche l'angolo AEB




nel

nel mezzo circolo ^c è retto, farà il quadrato di AB^d uguale à i quadrati dei lati BE, EA , e perciò il quadrato di AB supera il quadrato di BE , cioè di C , per il quadrato di AE , ch'era da dimostrarsi.

è 3. del 3.
d 47. del 1.

Date due rette linee, ritrouare la retta, la di cui potenza sia uguale alle potenze delle date.

Siano le rette date AB, BC , e si voglia ritrouare la retta, il di cui quadrato, ò potenza, sia uguale à i quadrati, ò potenze, delle due AB, BC . Si adattino le rette AB, BC , ^e che facciano angolo retto ne gli estremi B ; si tiri la retta AC . Essendo l'angolo B retto, il quadrato di AC^f è uguale à i quadrati delle due AB, BC ; cioè la potenza di AC è uguale alle potenze delle due AB, BC , ch'era da dimostrarsi.




è 11. del 1.

f 47. del 1.

THEOREMA XII. PROPOSITIONE XV.


Se quattro linee rette sono proporzionali, e la potenza della prima supera la potenza della seconda, per quanto è il quadrato d'vna retta linea, commensurabile in lunghezza alla prima; la potenza della terza supererà la potenza della quarta, per quanto è il quadrato della retta, commensurabile in lunghezza alla terza. E se la potenza della prima supera la potenza della seconda, per il quadrato di vna retta, incommensurabile alla prima; la potenza ancora della terza supererà la potenza della quarta, per quanto è il quadrato della retta, incommensurabile alla terza.

Siano le quattro rette linee proporzionali A, B, C, D , e la potenza della prima A superi la potenza della seconda B , per il quadrato della retta E ; e la potenza della terza C superi la potenza della quarta D , per il quadrato della retta F . Dico che, se la retta E è commensurabile in lunghezza alla prima A , farà ancora la retta F commensurabile in lunghezza alla terza C ; e se la retta E



è 11.

è incommensurabile in lunghezza alla prima A, ancora la retta F sarà incommensurabile in lunghezza alla terza C. Perche il quadrato di A, per ipotesi, supera il quadrato di B per il quadrato di E, sarà la differenza frà il quadrato di A, ed il quadrato di B; e per simile ragione, il quadrato di F sarà la differenza di quanto il quadrato di C supera il quadrato di D. In oltre, perche A à B è come C à D, sarà il quadrato di A ^a al quadrato di B, come il quadrato di C al quadrato di D; e, dividendo, la differenza frà i quadrati di A, & B, cioè, il quadrato di E, al quadrato di B, ^b sarà come la differenza frà i quadrati di C, & D, cioè, il quadrato di F al quadrato di D: ed innertendo, il quadrato di B al quadrato di E ^c sarà come il quadrato di D al quadrato di F. Hor perche il quadrato di A al quadrato di B è come il quadrato di C al quadrato di D; ed il quadrato di B al quadrato di E è come il quadrato di D al quadrato di F, per l'egualità, il quadrato di A al quadrato di E ^d sarà come il quadrato di C al quadrato di F; e la proportionione della retta A alla retta E ^e sarà come quella della retta C alla retta F. Se dunque la retta A è commensurabile in lunghezza alla retta E, sarà ancora la retta C commensurabile in lunghezza alla retta F; e se la retta A è incommensurabile in lunghezza alla retta E, ^f sarà ancora la retta C incommensurabile in lunghezza alla retta F, come fu proposto dimostrare.



il quadrato
di.

a 23. del 6.

b 27. del 5.

c Corol. alla
4. del 5.

d 22. del 5.

e 22. del 6.

f 10. del 10.

g 10. del 11.


S C O L I O.

Nell'istesso modo si dimostrerà, che se A è commensurabile ad E, solamente in potenza, ancora C sarà commensurabile solamente in potenza alla retta F.

THEOREMA XIII. PROPOSITIONE XVI.

La composta di due grandezze commensurabili è commensurabile all'vna, ed all'altra di quelle, che la compongono: e se la composta è commensurabile ad vna di quelle, che la compongono, quelle due saranno commensurabili frà loro.

Siano le due grandezze AB, BC commensurabili, le quali, giunte insieme, compongano la grandezza AC. Dico che la composta AC è commensurabile ad AB, ed è ancora commensurabile alla grandezza BC. Perche le due AB, BC sono cōmensurabili, per la 1. defin.



di

di questo, haueranno vna commune misura; sia la loro commune misura la notata D. Perche D misura AB, e misura BC, misurerà ancora il tutto AC; hor essendo D commune misura delle due AC, AB, faranno le due AC, AB commensurabili. Similmente perche D misura AC, e misura ancora BC, le due AC, BC faranno commensurabili.

Di nuouo sia tutta AC commensurabile ad AB, ouero BC; per essemplio, sia commensurabile ad AB: Dico che le due AB, BC sono commensurabili. Sia D la commune misura delle due AB, AC; perche D misura il tutto AC, e misura la parte AB, misurerà ancora il rimanente BC; dal che D farà commune misura delle due AB, BC; e perciò le due AB, BC sono commensurabili, ch'era da dimostrarli.


COROLLARIO.

Da quel, che si è detto, è manifesto, che quando la composta di due grandezze è commensurabile ad vna di quelle, farà ancora commensurabile al rimanente; cioè se AC è commensurabile ad AB, la medesima farà commensurabile al rimanente BC, stante che se D misura AC, e misura AB, per il 9. assioma, misura ancora il rimanente BC, e perciò le due AC, BC sono commensurabili.

THEOREMA XIV. PROPOSITIONE XVII.

La composta di due grandezze incommensurabili è incommensurabile all'vna, ed all'altra di quelle, che la compongono; e se la composta di due grandezze è incommensurabile ad vna di quelle, che la compongono, quelle due, che la compongono, faranno incommensurabili.

Siano prima le due grandezze AB, BC incommensurabili, le quali, giunte insieme, compongano la grandezza AC. Dico che AC sarà incommensurabile ad AB, ed ancora farà incommensurabile à BC. Se AC non

è incommensurabile ad AB, ouero BC,  sarà AC commensurabile ad vna delle due: sia dunque AC commensurabile ad AB, per l'antecedente Corollario, sarà AC commensurabile al rimanente BC; dal che le due AB, BC, faranno commensurabili, ch'è contro all'ipotesi. Non dunque AC è commensurabile ad AB. Nell'istesso modo si dimostrerà, che AC è incommensurabile à BC.

Di nuouo sia AC incommensurabile ad vna delle componenti AB, BC, per essemplio sia incommensurabile ad AB. Dico che le due AB, BC sono incommensurabili. Se le due AB, BC non sono incommensurabili,

sa-

a 3. del 10.
b 1. assioma
del 10.
c 1. assioma
del 10.

d 3. del 10.

e 9. assioma
del 10.

a 16. del 10.

b 10. del 10.

farà AB commensurabile à BC, e tutta AC composta delle due AB, BC^b sarà commensurabile ad AB, ouero BC, ch'è contro all'ipotesi. Non dunque le due AB, BC sono commensurabili, ma AB è incommensurabile à BC.


COROLLARIO.

Quindi è, che se la composta di due grandezze è incommensurabile ad vna delle componenti, sarà ancora incommensurabile all'altra; cioè, se AC è incommensurabile ad AB, sarà ancora incommensurabile al rimanente BC. Perche se AC fosse commensurabile à BC, per il Corollario all'antecedente propositione, sarebbe AC commensurabile ad AB, ch'è contro all'ipotesi; non dunque AC è commensurabile à BC.

L E M M A I.

Date due rette linee ineguali, applicare alla maggiore vn rettangolo, vguale alla quarta parte del quadrato della minore, che manchi à compire la linea per vna figura quadrata.

Sia AB la maggiore, e CD la minore delle rette date, e si voglia alla maggiore AB applicare vn rettangolo, vguale alla quarta parte del quadrato di CD, in modo, che non occupi tutta la retta AB, mà che manchi, à compire la retta AB, per vna figura quadrata. Si diuida CD^a



a 10. del 1.

b Scol. alla

4. del 1.

c 11. del 1.

d 3. del 1.

e 31. del 1.

f 12. del 1.

g 34. del 1.

in due parti vguale in E, sarà il quadrato di CE^b la quarta parte del quadrato di CD; si diuida similmente AB in due parti vguale in F, e, fatto centro in F, coll'intervallo FA, ouero FB, si descriva il mezzo circolo AGB; nel punto F, sopra la retta AB^c si erigga la perpendicolare FG; perche AB è maggiore di CD, sarà AF, ouero FG maggiore di CE. Si faccia FH^d vguale à CE, e dal punto H si tiri la retta HI, e parallela ad AB, la quale concorrerà con la circonferenza AGB in qualche punto I; dal punto I si faccia cadere la retta IK, e perpendicolare ad AB; sarà IK^e vguale ad HF; si continui IK^f

verso

verso L , e si faccia KL^h uguale a KB , e si compisca il rettangolo AL ; sarà il rettangolo AL applicato ad AB , e manca a compire la linea AB per il quadrato LB (stante che LK è uguale a KB). Dico che il rettangolo AL è uguale alla quarta parte del quadrato di CD . Perché IK^1 è media proportionale fra le due AK, KB , sarà il rettangolo, contenuto dalle due AK, KB , ^{m} uguale al quadrato di IK : ma il rettangolo AL è uguale a quello, ch'è contenuto dalle due AK, KB , stante che LK è uguale a KB ; sarà il rettangolo AL uguale al quadrato di IK , ouero di FH , cioè uguale al quadrato di CE ; ma il quadrato di CE ^{n} è la quarta parte del quadrato di CD ; sarà il rettangolo AL uguale alla quarta parte del quadrato di CD , ch'era da farsi, e dimostrarsi.

h z. delt.


113. del 6.

on 17.05.06.

L E M M A I I.

Diuidere vna data retta linea talmente, che il rettangolo contenuto dalle parti sia vguale ad vn dato rettangolo.

Sia data la linea retta AB , ed il rettilineo Z , e si voglia diuider la retta AB in mod^o, che il rettangolo, contenuto dalle parti, sia uguale al rettilineo Z . Si faccia il quadrato X^a uguale al rettilineo Z , si continui il lato CD verso E , e si faccia DE^b uguale al lato CD , sarà il quadrato X^c la quarta parte del quadrato di CE . Se la retta CE non è minore di AB , il problema sarà impos-



214 del 2.

6 g. del r.


c Scol. alla
4-del 2.

fibile, stante che, dovendosi operare come nell' antecedente Lemma, CD non sarà minore di FG. Se poi CE sarà minore di AB, si applichi ad AB, per l' antecedente Lemma, il rettangolo AF, uguale al quadrato X, in modo, che manchi a compire la retta AB per una figura quadrata, come per esempio, per il quadrato FB; sarà divisa la retta AB in H. Dico che il rettangolo contenuto dalle parti AH, HB è uguale al rettilineo Z. Perché la mancanza FB è quadrato, sarà FH uguale ad HB; dal che il rettangolo AF, sarà uguale a quello, ch'è contenuto dalle parti AH, HB; ma il rettangolo AF è uguale, per costruzione, al quadrato X, cioè al rettilineo Z; sarà il rettangolo

contenuto dalle parti AH, HB , vguale al rettilineo Z , ch'era da farfi, e dimostrarfi.

COROLLARIO.


Da quel, che si è detto, è manifesto, che, applicato ad vna retta linea, come AB , vn rettangolo, per essemplio, AF , vguale ad vn dato rettilineo Z , ouero X , in modo, che manchi à compire la linea per vna figura quadrata, come FB , per questa applicatione farà diuifa la linea AB talmente in H , che il rettangolo contenuto dalle parti AH, HB , farà vguale al rettilineo Z , ouero X ; stante che si è dimostrato, che il rettangolo applicato AF è vguale al rettangolo contenuto dalle parti AH, HB .



L E M M A III.

Se alla maggiore di due rette ineguali sia applicato vn rettangolo, vguale a'la quarta parte del quadrato della minore, in modo, che manchi à compire la linea per vna figura quadrata; le parti, fatte nella maggior linea dalla proposta applicatione, faranno frà di loro ineguali.

Siano le rette ineguali, cioè AB maggiore, e la minore CD , la quale sia diuisa in due parti vguali in F ; e sia applicato alla maggiore AB vn rettangolo vguale alla quarta parte del quadrato di CD ; cioè vguale al quadrato di CF , in modo, che manchi à compire la retta AB per vna figura quadrata, come il quadrato di EB ; per questa fatta applicatione sarà diuisa la retta AB in due parti, come AE, EB . Dico che le parti AE, EB sono frà di loro ineguali. Se non sono ineguali, sarà AE vguale ad EB , dal che il quadrato di AB sarà il quadruplo del quadrato di AE , ouero EB . In oltre, perche il rettangolo contenuto dalle parti AE, EB , per quel che si è di-



a. l. c. m. a.

b. Scol. alla
4. del 2.c. Scol. alla
4. del 2.

mostra-

mostrato ne i due antecedenti Lemma, è uguale al quadrato di CF ; essendo il quadrato di CD il quadruplo del quadrato di CF , il medesimo quadrato di CD sarà il quadruplo del rettangolo contenuto dalle due AE, EB : ma il rettangolo contenuto dalle due AE, EB , è uguale al quadrato di EB (stante che EB è supposta uguale ad AE) sarà il quadrato di CD il quadruplo del quadrato di EB ; fù dimostrato il quadrato di AB essere il quadruplo del medesimo quadrato di EB ; il quadrato dunque di CD sarà uguale al quadrato di AB , ed il lato CD sarà uguale al lato AB , ch'è contro all'ipotesi. Non dunque la parte AE è uguale ad EB , ma sono frà di loro ineguali, ch'era da dimostrarsi.

COROLLARIO.


Perche EB è il lato di quel quadrato, che rappresenta la mancanza per compire la linea, sarà manifesto che EB è la minor parte, & AE la maggiore.

THEOREMA XV. PROPOSITIONE XVIII.

Se faranno due rette linee ineguali, ed alla maggiore, sia applicato vn rettangolo, vguale alla quarta parte del quadrato della minore, in modo, che manchi à compire la linea per vna figura quadrata: se le parti della maggior linea sono commensurabili in lunghezza, il quadrato della maggior linea supera il quadrato della minore, per quanto è il quadrato d'vna retta linea commensurabile in lunghezza alla proposta maggiore. E se il quadrato della maggior linea supera il quadrato della minore, per quanto è il quadrato d'vna retta, commensurabile in lunghezza ad essa maggior linea; applicato alla maggior linea vn rettangolo, vguale alla quarta parte del quadrato della minore, in modo, che manchi à compire la linea, per vna figura quadrata; per l'applicazione fatta, sarà diuisa la maggiore in due parti commensurabili in lunghezzaaa.

Siano le due rette linee ineguali AB maggiore, e la minore C , ed alla maggiore AB , per il primo Lemma, sia applicato vn rettangolo vguale alla quarta parte del quadrato della minore C , in modo, che non occupi tutta la linea AB , ma, per compirla, manchi d'vna figura quadrata, e sia per

esempio, la mancanza per quanto è il quadrato di DB; sarà diuisa la retta AB nelle parti AD, DB. Dico prima, che se le parti AD, DB sono commensurabili in lunghezza, il quadrato di AB supererà il quadrato della minore C, per quanto è il quadrato d'una retta commensurabile in lunghezza alla maggiore AB.



Perche la retta AB dalla fatta applicatione è diuisa nelle parti AD, DB, per il Coroll. dopo il Lemma 3. sarà AD maggiore di DB; e per il Lemma 2. e suo Corollario, il rettangolo, contenuto dalle parti AD, DB, sarà vguale alla quarta parte del quadrato della retta C; e perciò il quadruplo rettangolo contenuto dalle parti AD, DB, sarà vguale al quadrato della retta C. In oltre, essendo AD maggiore di DB, si diuisa la retta AB in due parti vguali in E, il punto E caderà fra li punti A, & D; ed il quadrato di AB^b sarà il quadruplo del quadrato di EB; cioè il quadruplo quadrato di EB è vguale al quadrato di AB; si faccia EF^c vguale ad ED, resterà DB vguale ad AF, ed il quadrato di FD^d sarà il quadruplo del quadrato di ED; cioè il quadruplo quadrato di ED è vguale al quadrato di FD. Perche la retta AB è diuisa in due parti vguali in E, e la medesima è diuisa in due parti ineguali in D, sarà il rettangolo contenuto dalle parti ineguali AD, DB, e col quadrato di ED, vguale al quadrato di EB; ed il quadruplo rettangolo contenuto dalle parti AD, DB, col quadruplo quadrato di ED, sarà vguale al quadruplo quadrato di EB; ma il quadruplo quadrato di EB è dimostrato vguale al quadrato di AB; ed il quadruplo quadrato di ED è mostrato vguale al quadrato di FD; sarà il quadruplo rettangolo contenuto dalle parti AD, DB, col quadrato di FD, vguale al quadrato di AB: fu dimostrato, che il quadruplo rettangolo, contenuto dalle parti AD, DB, è vguale al quadrato di C; il quadrato dunque della retta C, col quadrato di FD, è vguale al quadrato di AB; e perciò il quadrato di AB supera il quadrato della retta C, per quanto è il quadrato di FD. Dico che FD è commensurabile in lunghezza ad AB. Perche AF è vguale a DB, la composta delle due AF, DB, sarà il doppio di DB; e perciò la composta delle due AF, DB sarà commensurabile in lunghezza alla retta DB. In oltre perche le due AD, DB, per ipotesi, sono commensurabili in lunghezza, sarà tutta AB^f commensurabile in lunghezza alla parte DB: ma la composta delle due AF, DB, è commensurabile in lunghezza alla medesima DB; sarà tutta AB^g commensurabile in lunghezza alla composta delle due AF, DB. Hor essendo tutta AB commensurabile in lunghezza alla retta composta delle due AF, DB, per il Corollario alla 16. proposizione di questo, sarà tutta AB commensurabile in lunghezza al rimanente FD, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

Di nuouo, supposto che il quadrato di AB superi il quadrato della retta C, per quanto è il quadrato d'una retta, commensurabile in lunghezza alla maggiore AB; applicato alla maggiore AB vn rettangolo, vguale alla quarta parte del quadrato della minore C, in modo, che

manchi

a 10. del 1.

b Scol. alla

4. del 2.

c 3. del 1.

d Scol. alla

4. del 2.

e 5. del 2.

f 16. del 10.

g 11. del 10.

manchi à compire la linea AB per vna figura quadrata, sarà diuisa la retta AB come in D. Dico che le parti AD, DB sono commenfurabili in lunghezza. Si dimostri, come prima si fece, che il quadrato di AB supera il quadrato di C, per quanto è il quadrato di FD. Perche il quadrato di AB, per ipotesi, supera il quadrato di C per il quadrato d'vna retta commenfurabile in lunghezza ad AB, ed il quadrato di AB, per quel, che si è dimostrato, supera il quadrato di C per il quadrato di FD; perciò AB sarà commenfurabile in lunghezza alla retta FD; e, per il Corollario alla 16. proposizione di questo, la retta AB sarà commenfurabile in lunghezza al rimanente AF, DB; cioè alla composta delle due AF, DB: mà la retta DB, come sopra si disse, è commenfurabile in lunghezza alla medesima retta, composta delle due AF, DB; in conseguenza le due AB, BD, sono commenfurabili in lunghezza; e perche tutta AB, (ch'è composta delle due AD, DB) è commenfurabile in lunghezza ad vna di quelle, cioè alla retta AB; le due AD, DB sono commenfurabili in lunghezza, ch'era da dimostrarfi.


h 12. del 10.

K 16. del 10.

THEOREMA XVI. PROPOSITIONE XIX.

Se faranno due rette linee ineguali, ed alla maggiore sia applicato vn rettangolo, vguale alla quarta parte del quadrato della minore, in modo, che manchi à compire la linea per vna figura quadrata; se le parti della maggior linea sono incommenfurabili in lunghezza, il quadrato della maggior linea supererà il quadrato della minore, per quanto è il quadrato d'vna retta linea, incommenfurabile in lunghezza alla proposta maggior linea. E se il quadrato della maggior linea supera il quadrato della minore, per quanto è il quadrato d'vna retta incommenfurabile in lunghezza ad essa maggiore linea; applicato alla maggior linea vn rettangolo, vguale alla quarta parte del quadrato della minore, in modo, che manchi à compire la linea per vna figura quadrata; per l'applicazione fatta sarà diuisa la maggiore in due parti, incommenfurabili in lunghezza.


Siano le due rette linee ineguali AB maggiore, e la minore sia C; ed alla maggiore AB, per il primo Lemma all' antecedente proposizione, sia applicato vn rettangolo, vguale alla quarta parte del quadrato della minore C, in modo, che non occupi tutta la retta AB, mà, per compirla, manchi d'vna figura quadrata, e la mancanza sia, per



esscm-

esempio, il quadrato di DB; sarà diuisa la retta AB nelle parti AD, DB. Dico prima che, se le parti AD, DB, sono incommensurabili in lunghezza, il quadrato di AB supererà il quadrato della retta C, per quanto è il quadrato d'vna retta, incommensurabile in lunghezza alla retta AB.

Si faccia la costruzione della precedente proposizione, e si prouì, come iui si fece, che il quadrato di AB supera il quadrato di C, per quanto è il quadrato di FD: si prouì ancora, che la composta delle due AF, DB, è commensurabile



alla retta DB. Perche le rette AD, DB, per ipotesi, sono incommensurabili in lunghezza, sarà tutta AB ^a incommensurabile in lunghezza alla parte DB: ma DB, per quel, che si è detto, è commensurabile in lunghezza alla composta delle due AF, DB; sarà tutta AB ^b incommensurabile in lunghezza alla composta delle due AF, DB; e per il Corollario alla 17. proposizione, sarà AB incommensurabile in lunghezza al rimanente FD; mà il quadrato di AB supera il quadrato di C, per quanto è il quadrato di FD, essendosi dimostrata FD incommensurabile in lunghezza ad AB, il quadrato di AB supererà il quadrato di C, per quanto è il quadrato d'vna retta, come è FD, incommensurabile in lunghezza alla maggiore AB, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

Di nuouo, sia il quadrato di AB maggiore del quadrato di C, per quanto è vna retta incommensurabile in lunghezza ad AB; e sia applicato ad AB vn rettangolo, vguale alla quarta parte del quadrato di C, in modo, che manchi à compire la linea AB, per quanto è vna figura quadrata, e la mancanza sia, per esempio, il quadrato di DB; sarà diuisa la retta AB nelle parti AD, DB. Dico che le parti AD, DB sono incommensurabili in lunghezza. Supposta la medesima costruzione, dell'antecedente proposizione, si dimostrerà, come iui si fece, che il quadrato di AB supera il quadrato di C, per quanto è il quadrato di FD; si che, per ipotesi, AB sarà incommensurabile in lunghezza alla retta FD, e, per il Corollario alla proposizione 17, sarà AB incommensurabile in lunghezza al rimanente AF, DB; cioè alla composta delle due AF, DB; mà, per quel, che si disse nella dimostrazione dell'antecedente proposizione, la composta delle due AF, DB, è commensurabile in lunghezza alla retta DB; sarà la retta AB ^c incommensurabile in lunghezza alla retta DB. Hor se tutta la retta AB (ch'è composta delle due AD, DB) è incommensurabile ad vna, cioè à DB, saranno le due AD, DB, ^d incommensurabili in lunghezza, ch'era da dimostrarsi.

S C O L I O I.


Sin qui Euclidè hà trattato delle grãdezze commensurabili, ed incommensu-

mensu-

menfurabili frà di loro, e conseguentemente s'inoltra à trattare delle grandezze comparate alla Rationale, spiegata nella definizione quinta di questo, che sono quelle grandezze, che si dicono Rationali, o Irrazionali, secondo che sono commensurabili, ò incommensurabili alla detta Rationale. E per maggior chiarezza, deuesi auuertire, che in due modi Euclide considera la commensurabilità, ed incommensurabilità delle grandezze; cioè, ò considera la commensurabilità, ed incommensurabilità delle grandezze, comparate frà di loro; ouero le considera comparate alla Rationale, della quale pienamente fu parlato dopo la settima definizione di questo. La commensurabilità, ed incommensurabilità delle grandezze frà di loro (del che hà trattato sino à questo luogo) la nomina con le medesime voci di commensurabile, ed incommensurabile; quella poi, che riguarda la comparatione alla Rationale (della quale si parlerà nelle cose seguenti) l'esprime con le voci denominate dalla medesima Rationale; cioè, quelle rette, che sono commensurabili in lunghezza alla Rationale, che per la nona propositione, sono ancora commensurabili in potenza, le chiama Rationali in lunghezza, e potenza; e quelle rette, che alla Rationale sono commensurabili solamente in potenza, si dicono Rationali in potenza solamente; e quelle rette, che alla Rationale sono incommensurabili in potenza, le quali, per la nona propositione di questo, sono ancora alla medesima Rationale incommensurabili in lunghezza, le chiama Irrazionali. Donde è manifesto, che due riguardi ca: sono nelle comparationi, cioè, uno è quello della comparatione frà di loro, e l'altro della comparatione rispetto alla Rationale. Quanto à quello, che si fa nella comparatione frà di loro, si esprime con le voci di Commensurabili in lunghezza, e potenza; di Commensurabili in potenza solamente; ouero d'Incommensurabili in lunghezza, e potenza, secondo che saranno, ò non saranno commensurabili frà di loro. Quello poi, che si farà nella comparatione, rispetto alla Rationale, si esprimerà con le voci di Rationali in lunghezza, e potenza; ò di Rationali solamente in potenza; ouero d'Irrazionali in lunghezza, e potenza, secondo che saranno commensurabili, ò incommensurabili alla Rationale. Nota, che, quando le rette linee sono alla Rationale commensurabili solamente in potenza, cioè, quando le rette linee, comparate alla Rationale, non sono commensurabili in lunghezza, mà sono ad essa Rationale solamente commensurabili in potenza, all' hora questi due riguardi s'uniscono insieme, in modo, che, se le rette linee, commensurabili solamente in potenza alla Rationale, saranno commensurabili frà di loro in lunghezza, quelle si chiameranno Rationali in potenza, e commensurabili frà di loro in lunghezza: se poi saranno commensurabili solamente in potenza alla Rationale, ed ancora saranno commensurabili solamente in potenza frà di loro; si chiameranno Rationali in potenza, ed ancora commensurabili frà di loro in potenza.

Quindi è, che i numeri sordi, cioè quelli, da i quali non si può estrarre la radice, ò lato, senza che soprauanzi cosa alcuna, comparati frà di loro, possono essere commensurabili in lunghezza, e per la nona di questo, commensurabili ancora in potenza; e, comparati alla Rationale, possono ancora essere incommensurabili in lunghezza, e commensurabili in potenza; e, secondo questo caso, quei numeri sordi si dicono Rationali in potenza, e commensurabili frà di loro in lunghezza, e potenza; come per essempio. Sia esposta la

Razionale AB, espressa col numero 4; cioè, che consisti di quattro unità determinate, il di cui quadrato ABCD consista di 16. unità quadrate; e sarà il quadrato AC, per la 5. definizione, Razionale, al quale devono essere comparati gli altri piani; ciò fatto, si moltiplichi una delle uguali parti, o unità, che sono in AB, quanto si vuole, e produca per esempio, la retta, o numero FG. Perché l'unità AE, per costruzione, è comune misura delle due AB,



FG; sarà FG commensurabile in lunghezza alla razionale AB; e per la definizione 6. di questo, FG sarà Razionale. Nel punto G si erigga la retta GH perpendicolare ad FG; si faccia GH moltiplice di AE in modo, che sia maggiore, o minore di FG; sarà GH commensurabile ad AB, e perciò sarà Razionale; e' i lati FG, GH sia fatto il piano rettangolo GI. Perché i lati FG, GH, consistono di parti uguali ad AE, ogn'una delle unità quadrate, che compongono il piano FH, sarà uguale a ciascuna delle unità quadrate, che compongono il Razionale AC; e perciò il quadrato di AE sarà comune misura de i piani FH, AC; ma AC è Razionale, sarà FH ancora Razionale. Si esponga poi il piano rettangolo KM, in modo, che il lato KL sia il doppio di FG; ed LM sia il doppio di GH; sarà FG a GH, come KL ad LM; e dalebe i piani FH, KM saranno fra di loro simili. In oltre, perché AE misura FG, e per costruzione, FG misura KL, l'unità AE misurerà KL; e perciò KL è commensurabile alla Razionale AB, e per la 6. definizione, KL sarà Razionale. Nell'istesso modo si prouerà, che LM è Razionale, e sarà il piano KM commensurabile al razionale AC; e per la 9. definizione, il piano KM sarà Razionale. Di più perché FG a GH è come KL ad LM, e per costruzione, FG è ineguale ad HG, sarà KL ineguale ad LM; e per la definizione 18. del 7. Libro, i piani FH, KM non sono numeri quadrati; per la qual cosa i loro lati non sono esprimibili, rispetto alle unità determinate nella Razionale AB, ma si considerano sordamente; come i notati PQ, RT, i di cui quadrati siano i notati PV, RX; sarà PV uguale al piano FH, e sarà RX uguale a KM; ma i due FH, KM, per quel, che si è dimostrato, sono commensurabili al Razionale AC, saranno i due PV, RX, commensurabili al Razionale AC: ma i lati PQ, RT, non essendo esprimibili, rispetto alle unità della Razionale AB, perciò sono incommensurabili ad AB. Hor essendo i lati PQ, RT, incommensurabili in lunghezza ad AB, e le potenze PV, RX sono commensurabili al Razionale AC, i lati PQ, RT saranno quelli, che si dicono Razionali solamente in potenza alla proposta Razionale AB.

Finalmente perché i piani KM, FH sono fra loro simili, sarà il piano KM al piano FH, come il quadrato del lato KL al quadrato del lato FG; ma il quadrato di KL è il quadruplo del quadrato di FG (per essere KL il dop-


pio

pio di FG) sarà il piano KM il doppio del piano FH: ma KM è uguale ad RX, ed il piano FH è uguale a PV; sarà il quadrato RX il quadruplo del quadrato PV; ed il lato RT sarà il doppio del lato PQ: dal che i lati RT, PQ sono commensurabili in lunghezza, e la comune misura sarà PQ; e sono ancora commensurabili in potenza, stante che VP misura quattro volte RX. D'onde è manifesto, che i numeri fordi PQ, RT, comparati frà di loro, senza hauere relatione alla Rationale AB, sono commensurabili in lunghezza, e potenza; ma, comparati alla Rationale AB, si dicono Rationali solamente in potenza, ed irrationali in lunghezza: auuertendo sempre, che questa voce di Rationale, ed Irrationale, hà sempre relatione alla comparatione, rispetto la Rationale proposta; cioè, rispetto alle unità determinate nella Rationale AB; e non hà relatione alla comparatione frà di loro; perche, quando si fà la comparatione frà di loro, e non rispetto alla Rationale, le loro relatiui si esprimono con le voci di Commensurabili, ed Incommensurabili.

S C O L I O I I

Da quel, che si è detto, è manifesto, che le rette commensurabili in lunghezza frà di loro, o sono commensurabili in lunghezza alla proposta Rationale, come sono le notate FG, GH, KL, LM, le quali sono commensurabili in lunghezza frà di loro, e sono ancora commensurabili in lunghezza alla Rationale AB; ouero sono alla Rationale commensurabili solamente in potenza, come sono i lati PQ, RT, i quali sono commensurabili in lunghezza frà di loro, e sono solamente commensurabili in potenza alla Rationale AB; e queste sempre si chiamano Rationali; cioè, se sono commensurabili in lunghezza alla Rationale, si dicono Rationali in lunghezza, e se sono commensurabili solamente in potenza alla Rationale, si dicono Rationali in potenza. E perche due rette, Rationali in lunghezza, possono essere ambedue ineguali alla espōta Rationale; e può essere, che una di quelle due sia uguale alla Rationale; perciò le dette Rationali si possono diuidere in tre generi. Il primo de' quali è, quando una di due rette, commensurabili in lunghezza frà di loro, e commensurabili in lunghezza alla Rationale, è uguale alla medesima Rationale. Il secondo genere è quando di due rette, commensurabili in lunghezza frà di loro, e commensurabili in lunghezza alla Rationale, nessuna è uguale alla detta Rationale. Ed il terzo genere è, quando due rette sono commensurabili in lunghezza frà di loro, e sono alla Rationale solamente commensurabili in potenza. E questi tre generi di Rationali si possono trouare, come fà il P. Clauio nel seguente modo.


Siano presi due qualunque numeri ineguali B, & C, e sia espōta la Rationale A; diuisa in tante uguali parti, per quante unità sono nel numero B. Si espōga poi la retta D, uguale ad una delle parti, che sono nella Rationale A; e si prenda E, multiplice di D,




M m m

come

come la Rationale A è moltiplice della medesima D ; e si prenda la retta F , in modo, che sia misurata da D tante volte, per quante unità sono nel numero C . Perchè A , ed E sono uguali moltiplici di D , saranno in E tante parti uguali à D , per quante ne sono in A ; e perciò le due A , ed E sono frà di loro uguali; ma la retta D , per costruzione, è comune misura delle tre A, E, F ; le tre rette dunque A, E, F sono commensurabili in lunghezza, e perciò le due E , ed F sono commensurabili in lunghezza frà di loro, e sono commensurabili in lunghezza alla Rationale A ; e per la 6. definizione, sono Rationali. Si è dimostrata la Rationale E , uguale alla espōsa Rationale A ; si faranno dunque ritrovate le due Rationali E , ed F , commensurabili in lunghezza frà di loro, e commensurabili in lunghezza alla Rationale A ; & una di esse, come E , sarà uguale alla Rationale A . E queste sono quelle Rationali, che habbiamo chiamate del primo genere.




Siano di nuovo espōsti tre numeri uguali, come B, C, G ; e sia la Rationale A divisa in tante parti uguali, per quante unità sono in B ; e sia D una di quelle parti. Si prendano poi le rette E, F , in modo, che E sia misurata da D tante volte, per quante unità sono nel numero C ; e la retta



F sia misurata da D tante volte, per quante unità sono nel numero G ; saranno le rette E, F inguali alla Rationale A . E perchè D è comune misura delle rette A, E, F , saranno le rette A, E, F , commensurabili in lunghezza; e perciò le rette E, F sono commensurabili in lunghezza alla Rationale A , e per la 6. definizione, le rette E, F sono Rationali. Si faranno dunque ritrovate le Rationali E, F , commensurabili in lunghezza frà di loro, e commensurabili in lunghezza alla Rationale A ; e nessuna delle due E, F , è uguale alla espōsa Rationale A . E queste sono le Rationali del secondo genere.

Finalmente sia espōsa la Rationale A , alla quale, per l'undecima di questo, si trovi la retta B , commensurabile solamente in potenza; si divida la retta B in quante parti uguali si vuole, ed una di quelle parti sia D ; si prenda C , moltiplice di D , secondo qualunque moltiplicatione, sarà D comune




misura delle due B, C ; e perciò le due B, C sono frà loro commensurabili in lunghezza; e per la 9. proposizione di questo, sono ancora frà loro commensurabili in potenza; cioè i loro quadrati sono frà loro commensurabili. Dico che le due B, C sono alla Rationale A commensurabili solamente in

poten-

potenza. Perche il quadrato di B , per costruzione, è commensurabile al quadrato di A ; sarà il quadrato di C^a commensurabile al quadrato di A ; dal che C sarà Rationale in potenza ad A . In oltre perche le rette C , & B sono commensurabili in lunghezza, e la retta B , per costruzione, è incommensurabile in lunghezza alla Rationale A ; sarà ancora la retta C incommensurabile in lunghezza alla Rationale A ; ed haueremo ritrouate le due Rationali C , & B , fra di loro commensurabili in lunghezza, e commensurabili solamente in potenza alla Rationale A . E queste sono le Rationali del terzo genere, come fu proposto fare, e dimostrare.


Volendosi ritrouare quante si voglia linee Rationali commensurabili fra loro in lunghezza, si operi in questo modo. Si espongano tanti numeri B, C, D , per quante sono le Rationali da trouarsi, e si prendano altrettante rette E, F, G , multipli di A , in modo, che la retta E contenga tante volte A , per quante unità son nel numero B , si faccia similmente che la retta F contenga tante volte A , per quante unità sono nel numero C , e che la retta G contenga tante volte A , per quante unità sono nel numero D ; essendo A comune misura delle rette E, F, G , saranno le rette E, F, G , commensurabili fra loro in lunghezza, e saranno Rationali, stante che sono commensurabili alla Rationale A .



L E M M A.

Quello spatio, ch'è commensurabile allo spatio Rationale, è ancora Rationale.

Sia lo spatio A Rationale, al quale sia commensurabile lo spatio B . Dico che lo spatio B è Rationale. Si intenda CD la Rationale, alla quale deuono essere comparate le altre grandezze, il di cui quadrato sia E ; per l'ottaua definizione di questo, sarà il quadrato E quello, che chiamiamo Rationale, al quale deuono essere comparati gli altri piani. Perche lo spatio B è supposto Rationale, sarà dunque B^a Rationale rispetto al Rationale E , e perciò i due B , & E , sono commensurabili. In oltre, perche gli spatij E , ed A sono commensurabili al medesimo spatio B , sarà A^b commensurabile al Rationale E ; e, per la 6. definizione di questo, lo spatio A sarà Rationale, ch'era da dimostrarsi.



a 12. del 10.

b 14. del 10.


a 9. defin. del 10.

b 12. del 10.

THEOREMA XVII. PROPOSITIONE XX.

Il rettangolo, contenuto da linee rette Rationali in lunghezza, e commensurabili secondo qualch'vno de i modi sopradetti, sarà Rationale.

Sia esposta la Rationale A, e lo spatio rettangolo BD, il quale sia contenuto dalle rette Rationali in lunghezza BC, CD, e commensurabili secondo vno de i tre predetti modi, spiegati nel secondo de gli antecedenti Scolij; cioè, che l'vno, ò l'altro de i lati, BC, CD, sia vguale all'esposta Rationale A; ò che nissuno di essi sia vguale alla Rationale A; mà che ambidue ò siano commensurabili in lunghezza, ò commensurabili solamente in potenza alla Rationale A. Dico che il rettangolo BD sarà Rationale. Sopra vno de i lati BC, CD, per esemplo, sopra al lato BC, si descriua il quadrato EB. Perche la retta BC, per ipotesi, è Rationale, sarà BC commensurabile, ò in lunghezza, ò solamente in potenza all'esposta Rationale A: per la qual cosa il quadrato di BC, cioè il quadrato EB, sarà commensurabile al quadrato della Rationale A: mà il quadrato della Rationale A è quel Rationale, rispetto al quale, tutti gli altri spatij, che gli sono commensurabili, sono Rationali; essendo il piano EB, commensurabile al quadrato della Rationale A, sarà il quadrato EB Rationale. In oltre, perche BC, come lato del quadrato BE, è vguale ad EC, e la retta BC, per ipotesi, è commensurabile in lunghezza al lato CD, sarà EC commensurabile in lunghezza al medesimo lato CD. Si considerino i rettangoli EB, BD, i quali hanno la medesima altezza BC; sarà il rettangolo EB al rettangolo BD, come la base EC alla base CD, mà EC è dimostrata commensurabile in lunghezza al lato CD, sarà il piano EB commensurabile al piano BD. E perche il quadrato EB è dimostrato Rationale, il rettangolo BD, ch'è commensurabile allo spatio Rationale EB, per l'antecedente Lemma, sarà Rationale, il che era da dimostrarsi.




THEOREMA XVIII. PROPOSITIONE XXI.

Se vn rettangolo Rationale sarà applicato ad vna retta Rationale; l'altro lato sarà Rationale, e sarà ancora commensurabile in lunghezza à quel lato, al quale è fatta l'applicatione.

Sia esposta la Rationale A, alla quale tutte le altre si comparano; e sia data la retta BC Rationale, secondo vno de i tre detti modi, spie-

gati

gari nello Scolio secôdo alla 19. proposizione di questo; cioè che ò BC sia vguale, ò non vguale alla Rationale A, sia però ò commensurabile in lunghezza, ouero commensurabile solamente in potenza, alla esposta Rationale A; e si applichi alla rationale BC il rettangolo Rationale BD, e ne risulti il lato CD. Dico che il lato CD è Rationale, ed è commensurabile in lunghezza al lato BC. Sopra al lato BC ^a si descriva il quadrato EB. Essendo BC, per ipotesi, Rationale, dimostreremo, come nell'antecedente proposizione si fece, che il quadrato EB è Rationale. Hor essendo BD, per ipotesi, Rationale, ed il quadrato EB, per quel che si è dimostrato, è Rationale; faranno gli spatij BE, BD ^b commensurabili al quadrato della Rationale A; e perciò i rettangoli EB, BD, ^c sono commensurabili fra loro. In oltre perche i rettangoli EB, BD, hanno la medesima altezza BC, sarà il quadrato EB al rettangolo BD, come la base EC, ouero BC, alla base CD: mà il quadrato EB è dimostrato commensurabile al rettangolo BD; sarà BC ^d commensurabile alla retta CD; dal che le rette BC, CD sono fra loro commensurabili in lunghezza. E perche le Razionali CB, ed A, sono commensurabili ò in lunghezza, ouero commensurabili solamente in potenza; essendo CB commensurabile à CD, sarà ancora A ^e commensurabile à CD ò in lunghezza, ouero commensurabile solamente in potenza. Hor essendo CD commensurabile alla rationale A ò in lunghezza, ouero commensurabile solamente in potenza, per la sesta definizione di questo, sarà CD Rationale. Per la qual cosa, applicato il piano Rationale BD al lato Rationale BC, ne risulta il lato CD Rationale, e commensurabile in lunghezza al lato BC, ch'era da dimostrare.



a 46. del 1.

b 9. defin. del 10.

c 12. del 10.

d 10. del 10.

e 18. del 10.

L E M M A I.

Il lato di qualunque quadrato, vguale à qualche spatio Irrationale, è Irrationale.

Sia il quadrato di qualche retta linea B vguale à qualche spatio Irrationale, cioè, che sia Irrationale. Dico che la retta linea B è ancora Irrationale. Si esponga la Rationale A. Se la retta linea B non è Irrationale, quella necessariamente sarà Rationale, e per la sesta definizione, sarà commensurabile ad A ò in lunghezza, ouero solamente in potenza, e perciò il quadrato della retta B sarà commensurabile al quadrato della Rationale A; e per la



nona definizione, il quadrato di *B* sarà Rationale, ch'è contro all'ipotesi. Non dunque la retta linea *B* è Rationale, mà sarà Irrationale, ch'era da dimostrarsi.

Il medesimo si caua dalla definizione Undecima di questo, doue si disse, che le rette linee, i di cui quadrati sono Irrationali, si chiamano Irrationali.

COROLLARIO.

Da quel, che si è detto nell'antecedente Lemma, e da quel, che si disse nella dimostrazione alla 20. proposizione, si caua, che il quadrato d'vna retta Rationale è Rationale.


LEMMA II.

Ritrouare due, ò più rette; Rationali, commensurabili solamente in potenza.

Le rette Rationali, che sono commensurabili frà di loro solamente in potenza, sono di due generi; cioè, ò vna di quelle è uguale all'esposta Rationale, ò ambedue sono ineguali alla detta Rationale. Habbiansi prima da trouare quelle del primo genere; cioè quelle, delle quali vna è uguale all'esposta Rationale. Sia dunque l'esposta Rationale *A*, e sia la retta *B* uguale ad *A*. Poi si troui la retta *C*,^a commensurabile solamente in potenza alla retta *B*; sarà ancora *C* commensurabile, solamente in potenza alla Rationale *A*; e per la sesta definizione di questo, sarà la retta *C* Rationale: mà *B*, per essere uguale ad *A*, è ancora Rationale; le due dunque *B*, *C*, sono Rationali, e sono commensurabili solamente in potenza, delle quali *B* è uguale alla Rationale *A*, ch'era da farsi nel primo luogo.

Per trouare quelle del secondo genere; cioè, che niuna delle due sia uguale all'esposta Rationale. Sia di nuovo esposta la Rationale *A*, e si troui la retta *B*,^b commensurabile solamente in potenza alla Rationale *A*, per la sesta definizione di questo, *B* sarà Rationale. Similmente si troui la retta *C*,^c commensurabile solamente in potenza alla retta *B*. Perche *A*, & *B*,

sono




a 11. del 10.

b 11. del 10.

c 11. del 10.

sono commensurabili frà di loro solamente in potenza, e la retta B, per costruzione, è commensurabile à C solamente in potenza; sarà A^d commensurabile à C solamente in potenza. Hor essendo C commensurabile ad A, solamente in potenza, per la sesta definizione, C sarà Rationale. Per la qual cosa le due B, & C sono Razionali, e sono commensurabili frà di loro solamente in potenza, delle quali nissuna è uguale alla Rationale A, come sù proposto ritrouare.



d Scol. alla
12. propo.
del 7.

Bisognando poi ritrouare quante rette Razionali si vogliono, commensurabili solamente in potenza, si operi nel seguente modo.

Si esponano tanti numeri primi, per quante rette Razionali si vogliono, come sono i numeri A, B, C, D, E; poi si prenda la Rationale F, e si faccia come il numero A al numero B, così il

A 5	F	
B 7	G	
C 3	H	
D 2	I	
E 11	K	

quadrato di F al quadrato di un'altra retta, che sia G, come si disse nel Corollario alla sesta proposizione di questo. Di nuovo si faccia come il numero B al numero C, così il quadrato di G al quadrato d'un'altra retta, che sia H. E similmente, si faccia come il numero C al numero D, così il quadrato di H al quadrato di I, e come il numero D al numero E, così il quadrato di I al quadrato di K; e con quest'ordine in infinito. Dico che le rette F, G, H, I, K sono Razionali, commensurabili solamente in potenza. Perche il quadrato di F al quadrato di G è come A à B; ed il quadrato di G al quadrato di H è come B à C; ed ancora il quadrato di H al quadrato di I è come C à D; ed il quadrato di I al quadrato di K è come D ad E; sarà per l'eguaglianza, il quadrato di F al quadrato di K come A ad E; e similmente, il quadrato di F al quadrato di I sarà come A à D, il quadrato di F al quadrato di H, come A à C; il quadrato di G al quadrato di K, come B ad E; il quadrato di G al quadrato di I, come B à D; ed il quadrato di H al quadrato di K, come C ad E. Per la qual cosa i quadrati delle rette F, G, H, I, K sono come i numeri A, B, C, D, E, e per la sesta proposizione di questo, i quadrati delle rette F, G, H, I, K sono frà di loro commensurabili; dal che le rette F, G, H, I, K sono commensurabili in potenza. Dico che le rette F, G, H, I, K sono incommensurabili in lunghezza. Perche i quadrati delle rette F, G, H, I, K, sono come i numeri primi A, B, C, D, E; ed i nu-

meri

meri primi, per il Corollario all'ultimo Scolio dell'ottavo Libro non sono come i numeri quadrati; in conseguenza i quadrati delle rette F, G, H, I, K , non sono come i numeri quadrati; e per la nona proposizione di questo, le rette F, G, H, I, K sono incommensurabili in lunghezza; furono dimostrate commensurabili in potenza; faranno dunque le rette F, G, H, I, K , commensurabili solamente in potenza. Finalmente, perchè F , per ipotesi, è Rationale, ed i quadrati delle rette G, H, I, K sono comparati al quadrato della Ra-

A 5

F

B 7

G

C 3

H

D 2

I

E 11

K

tionale F ; perciò le rette F, G, H, I, K sono Razionali. E così sarà manifesto il modo da trovare quante si voglia rette Razionali, commensurabili fra di loro solamente in potenza, il che era da farsi, e dimostrarsi.

Se faranno proposte quante si voglia rette Razionali commensurabili solamente in potenza, e se ne vogliano ritrovare delle altre, che con le proposte siano commensurabili solamente in potenza, si operi in questo modo. Siano proposte le due Razionali A, B , commensurabili solamente in potenza, ed il quadrato di A al quadrato di B sia come il numero C al numero D , si prenda qualunque altro numero E , non quadrato, che sia primo a ciascuno de numeri $C, \& D$, poi si faccia per il Corollario alla sesta proposizione di questo, come il numero D al numero E così il quadrato della retta B al

A C 10

B D 6

F E 7

quadrato d'un'altra retta come F . Dico che la retta F è Rationale commensurabile solamente in potenza alle due $A, \& B$, perchè il quadrato della retta B al quadrato della retta F è come il numero D al numero E ; perciò i quadrati delle rette $B, \& F$ sono commensurabili, e le rette $B, \& F$ sono commensurabili almeno in potenza; ma la retta B è supposta Rationale, la retta dunque F , che gl'è commensurabile, sarà Rationale. In oltre perchè D ed E sono numeri primi, per quel, che si disse nel fine dell'ottavo Elemento non sono fra loro come numero quadrato a numero quadrato, ma per costruzione il numero D al numero E è come il quadrato della retta B al quadrato della retta F , il quadrato dunque della retta B al quadrato della retta F non è come numero quadrato a numero quadrato, e per la nona proposizione di questo, le rette $B, \& F$ sono incommensurabili in lunghezza, e perciò sono commensurabili solamente in potenza. Finalmente essendo il quadrato di A al quadrato di B come il numero C al numero D , ed il quadrato di B al quadrato di F è come il numero D al numero E ; per l'egualità il quadrato di A al quadrato di F sarà come il numero C al numero E ; ma li numeri C ed E per essere numeri primi non sono come numero quadrato a numero quadrato, in conseguenza il quadrato di A al quadrato di F non sarà come numero quadrato a numero quadrato,


e per

e per la 9. proposizione di questo, le rette A, ed F, sono incommensurabili in lunghezza, ma sono commensurabili in potenza, siante che li loro quadrati sono come i numeri C & E; saranno dunque le rette A, & F, Rationali, commensurabili solamente in potenza, come fu proposto fare, e dimostrare. Nell'istesso modo se ne possono trouare quante si voglia altre.

THEOREMA XIX. PROPOSITIONE XXII.

Il rettangolo, contenuto da due rette linee Rationali, e commensurabili frà di loro solamente in potenza, è Irrazionale: e la retta linea, il di cui quadrato è vguale al detto rettangolo, è parimente Irrazionale; e questa retta linea si chiamerà Media.

Sia esposta la Rationale A, ed il proposto rettangolo sia BD, il quale sia contenuto dai lati BC, CD, Rationali, e frà di loro commensurabili solamente in potenza, secondo vno de gli antedetti modi, spiegati nel secondo de gli antecedenti Lemma; cioè è che vno de i lati BC, CD sia vguale alla rationale A, ouero ambidue siano ineguali alla Rationale A. Dico che il rettangolo BD è Irrazionale, e la retta, il di cui quadrato è vguale al rettangolo BD, sarà ancora Irrazionale, e si chiamerà Media. Sopra ad vno de i lati BC, CD, per esempio, sopra al lato BC, si descriva il quadrato BE. Perche BC, per ipotesi, è Rationale, per il Corollario dopo la vigesima propositione, sarà il quadrato EB Rationale, e perciò b sarà commensurabile al quadrato della Rationale A. In oltre, perche i due rettangoli EB, BD, hanno la medesima altezza BC, sarà il quadrato EB al rettangolo BD, come la base EC, ouero BC, alla base CD: ma BC (per essere commensurabile solamente in potenza à CD) è incommensurabile in lunghezza alla medesima CD; sarà il quadrato EB d incommensurabile al rettangolo BD. Finalmente perche il quadrato EB è commensurabile al quadrato della Rationale A, e si è dimostrato il quadrato EB essere incommensurabile al rettangolo BD, sarà il quadrato di A e incommensurabile al rettangolo BD. Hor essendo il rettangolo BD incommensurabile al quadrato della Rationale A, per la definizione decima, il rettangolo BD sarà Irrazionale. Frà li due lati BC, CD, si troui vna media proportionale, che sia F; il quadrato della retta F g sarà vguale al rettangolo BD: ma il rettangolo BD è irrationale, sarà il quadrato della retta F irrationale, e per il primo de gli antecedenti Lem-



a 46. del 1.

b 9. defin. del 10.

c 2. del 6.


d Scol. alla prop. 10. del 10.

e 14. del 10.

f 33. del 6.

g 17. del 6.

ma, sarà la retta F irrationale; la quale, essendo media proportionale fra i due lati BC, CD, commensurabili solamente in potenza, si chiamerà Media. Per la qual cosa il rettangolo, contenuto da i lati BC, CD, commensurabili solamente in potenza, è irrationale; e la retta F, il di cui quadrato è vguale allo irrationale BD, è parimente irrationale; la quale si chiamerà Media, come fù proposto dimostrare.



S C O L I O.

Deuesi però auuertire, che non tutte le rette, che sono medie proportionali fra due lati, che contengono vn rettangolo, si deouono chiamare Medie, ma quando si dira Media, s'intenderà quella retta, ch'è media proportionale fra le due rette Rationali, e fra di loro commensurabili solamente in potenza.

Fù dimostrato dopo la prima propositione del sesto Libro, che, se saranno due qualunque rette linee, come BC, CD, il quadrato dell'vna al rettangolo, contenuto dalle due, è come il medesimo rettangolo al quadrato dell'altra; cioè, il quadrato di BC al rettangolo BD, è come il medesimo rettangolo BD al quadrato di CD; dal che il rettangolo BD è medio proportionale fra il quadrato del lato BC, ed il quadrato del lato CD; e perciò vuole il Campano, che non solo la retta F debba chiamarsi media, ma il rettangolo ancora BD, ed il quadrato della retta F, che gli è vguale, si debba chiamare Medio. E qui ancora si deue auuertire, che, quando vn rettangolo si chiamerà con questa voce, Medio, dobbiamo intendere quello, ch'è contenuto da i lati commensurabili solamente in potenza, ed il quadrato della sudetta media F, ch'è vguale al medio BD, sarà quello, che si chiamerà ancora Medio.

THEOREMA XX. PROPOSITIONE XXIII.

Se à qualche retta Rationale è applicato vn rettangolo, vguale al quadrato della media; l'altro lato del rettangolo sarà Rationale, e sarà incommensurabile in lunghezza à quella Rationale, alla quale fù fatta l'applicazione.


345. del 1.

Sia la media A, e qualunque retta Rationale BC, alla quale sia applicato il rettangolo BD, * vguale al quadrato della media A. Dico che, il lato CD è Rationale, ed è incommensurabile in lunghezza al lato BC. Perche la retta A, per ipotesi, è media, il suo quadrato sarà vguale à quel rettangolo, ch'è contenuto da due rette Rationali, e frà di loro commensurabili solamente in potenza; altrimenti, per lo Scolio ante-

ceden-

cedente, la retta A non farebbe quella, che chiamiamo Media. Sia quel rettangolo il notato EG, contenuto da i due lati Rationali EF, FG, commensurabili frà di loro solamente in potenza. Essendo il rettangolo BD, per costruzione, vguale al quadrato della Media A, ed il rettangolo EG vguale al medesimo quadrato di A; sarà il rettangolo BD vguale al rettangolo EG: per la qual cosa i rettangoli BD, EG^b hanno i lati reciprochi intorno à gli angoli vguali; e sarà come BC ad EF, eosi FG al lato CD; ed il quadrato di BC al quadrato di EF^c sarà come il quadrato di FG al quadrato di CD: ma il quadrato di BC è commensurabile al quadrato di EF (stante che le rette BC, EF, sono supposte Rationali) in conseguenza il quadrato di FG^d sarà commensurabile al quadrato di CD; e perciò le rette FG, CD sono commensurabili almeno in potenza. E perche BC è supposta Rationale, se BC sarà quella Rationale, alla quale si comparano tutte le altre, essendo DC commensurabile almeno in potenza alla Rationale BC; sarà DC^e Rationale; e se BC non è quella Rationale, alla quale si comparano tutte le altre, sia quella la retta H. Perche BC è supposta Rationale, sarà BC^f commensurabile, almeno in potenza, alla esposta Rationale H: ma CD è commensurabile, almeno in potenza, alla retta BC; sarà ancora DC^g commensurabile, almeno in potenza, all'

esposta Rationale H: per la qual cosa la retta CD^h sarà Rationale. Dico finalmente, che CD è incommensurabile in lunghezza alla retta BC. Si prendano i due lati EF, FG come basi di due rettangoli, e l'altezza comune sia EF; sarà il quadrato di EF al rettangolo, contenuto dalle due EF, FG,



le due EF, FG, ^k come la base EF alla base FG. Nell'istesso modo, prese DC, & CB, come basi di due rettangoli, e sia DC l'altezza comune, sarà il quadrato di DC al rettangolo DCB, come DC à CB. In oltre, perche i lati EF, FG sono commensurabili solamente in potenza, saranno dunque incommensurabili frà di loro in lunghezza; e perche il quadrato di EF al rettangolo EFG, per quel, che si è dimostrato, è come EF ad FG; essendo EF incommensurabile in lunghezza ad FG, sarà il quadrato di EFⁱ incommensurabile al rettangolo EFG: fu mostrato il rettangolo EFG vguale al rettangolo BCD; sarà il quadrato di EF^j incommensurabile al rettangolo BCD. Di più, perche le rette EF, CD sono Rationali, saranno almeno commensurabili frà di loro in potenza; e perciò il quadrato di EF sarà commensurabile al quadrato di CD: ma il quadrato di EF è dimostrato incommensurabile al rettangolo DCB; sarà il quadrato di DC^m incommensurabile al rettangolo DCB: ma il quadrato di DC al rettangolo DCB, per quel, che si è dimostrato, è come DC à CB; essendo il quadrato di DC incommensura-

b 14. del 6.

c 22. del 6.

d 10. del 10.

e 6. defn. del 10.

f 6. defn. del 10.

g 12. del 10.

h 6. defn. del 10.

K 1. del 6.

i 10. del 6.


m 13. del 10.

a 19. del 10.

bile al rettangolo DCB, sarà il lato DC^a incommensurabile al lato BC. Per la qual cosa il lato DC è incommensurabile in lunghezza al lato BC, ch'era da dimostrarsi.

S C O L I O.


Perche il quadrato della media A è uguale al rettangolo BD, applicato alla Rationale BC; sarà A media proportionale frà i lati BC, CD; e perciò applicando à qualche Rationale BC il quadrato della media A, ne risulterà la terza proportionale CD. Si che, nelle cose à venire, douendosi applicare à qualche Rationale BC il quadrato della media A, per facilità, si faccia, come la Rationale BC alla media A, così A ad un'altra, che ne risulterà il terzo lato CD; ed in questo modo saremo liberi dalla lunga operatione, che bisognerebbe fare, operandosi come nella 45. propof. del primo lib.



THEOREMA XXI. PROPOSITIONE XXIV.

La retta linea, commensurabile alla Media, è Media.

Sia la retta linea B, commensurabile alla media A, ò che sia commensurabile in lunghezza, e potenza, ò sia commensurabile in potenza solamente. Dico che la retta B sarà Media. Sia esposta la Rationale DC, alla quale sia applicato il rettangolo DE, ^a uguale al quadrato della media A, per lo Scolio alla propof. 22, sarà il rettangolo ED medio, il quale,



a Scolio antecedente.

b 13. del 10.

c Scolio antecedente. d 9. del 10.

e 1. del 6.

f 10. del 10.

g 14. del 10.

applicato alla Rationale DC, fa il lato EC^b Rationale, ed incommensurabile al lato DC in lunghezza. Di nuovo si applichi alla Rationale DC^c il rettangolo DF, uguale al quadrato della retta B; e perche le rette A, & B, per ipotesi, sono commensurabili, i loro quadrati^d faranno frà loro commensurabili, ed i rettangoli DF, DE, che sono uguali à i loro quadrati, faranno frà di loro commensurabili: ma il rettangolo DE al rettangolo DF^e è come la base EC alla base CF; essendo il rettangolo ED commensurabile al rettangolo DF, sarà EC^f commensurabile alla retta CF: ma EC è dimostrata incommensurabile alla Rationale CD, sarà CF^g incommensurabile alla Rationale CD. In oltre perche EC è

dimo-

dimostrata Rationale, non essendo commensurabile alla Rationale CD in lunghezza, sarà necessariamente ^h alla Rationale CD commensurabile in potenza; perchè, se fusse altrimenti, CD non farebbe Rationale. Hor essendo le due EC, CF, commensurabili in lunghezza, faranno ancora K commensurabili frà loro in potenza: ma EC è commensurabile in potenza alla Rationale CD, farà ancora CF commensurabile in potenza alla Rationale CD; e perciò CF ⁱ farà Rationale: per la qual cosa le due DC, CF sono Razionali; e commensurabili frà di loro solamente in potenza; e per lo Scolio alla propof. 22, il rettangolo DF è medio. Finalmente, perchè il quadrato della retta B è vguale al rettangolo DF, contenuto da i lati DC, CF, Razionali, e commensurabili frà di loro solamente in potenza, perciò la retta B ^m farà Media. Per la qual cosa la retta, ch'è commensurabile alla Media, è Media, ch'era da dimostrarsi.

^h 6. defin. del 10.

^K 9. del 10.

ⁱ 6. defin. del 10.

^m 22. del 10.

COROLLARIO I.

Da quel, che si è detto, appare, che il rettangolo, il quale è commensurabile al Medio, è ancora Medio; mentre, si è dimostrato, che il rettangolo DF, commensurabile al medio DE, è Medio.


COROLLARIO II.

Le rette linee frà di loro commensurabili, per la nona proposizione, ò sono commensurabili in lunghezza, e potenza, ouero sono commensurabili solamente in potenza. E perchè la retta, ch'è commensurabile alla Media, per l'antecedente proposizione, è Media; sarà manifesto, che due Medie, frà di loro commensurabili, ò faranno commensurabili in lunghezza, e potenza, ouero faranno commensurabili solamente in potenza; se faranno commensurabili in lunghezza, e potenza; si chiameranno Medie commensurabili in lunghezza; ed in questa voce vi si comprende ancora commensurabili in potenza: e se faranno commensurabili solamente in potenza, si chiameranno Medie commensurabili solamente in potenza.

L E M M A.

Ritrouare quattro Medie, cioè due commensurabili in lunghezza, e due altre commensurabili solamente in potenza.

Sia esposta qualunque Media A , e si trovi la retta B , commensurabile in lunghezza alla media A ; che si fa col dividerla in quante parti uguali si vogliano, ed una di quelle parti sia D ; poi si prenda la retta B , moltiplice di D , secondo qualunque moltiplicatione; sarà D commune misura delle due A , e B , e perciò le due A , e B , sono commensurabili in lunghezza. In oltre, per l'undecima di questo, si trovi la retta C , commensurabile solamente in potenza alla retta A , cioè che sia solamente incommensurabile in lunghezza, e per l'antecedente proposizione, essendo le due B , e C , commensurabili ad A , cioè una commensurabile in lunghezza, e l'altra solamente in potenza, quelle saranno Medie; ed in questo modo saranno ritrovate le due Medie A , e B , commensurabili in lunghezza, e saranno ritrovate ancora le due Medie A , e C , commensurabili solamente in potenza, ch'era da farsi, e dimostrarsi.



THEOREMA XXII. PROPOSITIONE XXV.

Il rettangolo, contenuto da due rette Medie, commensurabili in lunghezza, è Medio.


Sia il rettangolo AB , contenuto dalle due rette AC , BC , le quali siano Medie, commensurabili fra di loro in lunghezza. Dico che il rettangolo AB è Medio.

a 46. del 1.

Sopra la media BC si descriva il quadrato BD ; per lo Scolio alla proposizione 22. il quadrato BD sarà Medio. Si considerino i rettangoli AB , BD , che hanno la medesima altezza B ; sarà il rettangolo AB alla base AC , come la base AC alla base CD , ouero CB : ma AC , per ipotesi, è commensurabile in lunghezza a CB , ouero CD ; sarà il rettangolo AB , e commensurabile al Medio BD , e per il Corollario 1. all'antecedente proposizione, sarà il rettangolo AB Medio. Per la qual cosa il rettangolo, contenuto dalle medie, commensurabili in lunghezza, è Medio, ch'era da dimostrarsi.

b 1. del 6.

c 10. del 10.




THEOREMA XXIII. PROPOSITIONE XXVI.

Il rettangolo contenuto dalle rette, che sono Medie,

com-

commensurabili solamente in potenza, o è Rationale, ouero è Medio.

Sia il rettangolo AC, contenuto dalle rette AB, BC, che siano medie, commensurabili solamente in potenza. Dico che il rettangolo AC, o è Rationale, ouero è Medio. Sopra i lati AB, BC si descrivano i quadrati AD, CE. Perche le due AB, BC, per ipotesi, sono Medie, per lo Scolio alla 22. proposizione, i loro quadrati AD, CE, sono Medij. Si esponga la Rationale FG, alla quale si applichi il rettangolo FH, vguale al quadrato AD; al lato IH si applichi il rettangolo IK, vguale al rettangolo AC; ed al lato KL si applichi il rettangolo LM, vguale al quadrato CE. Perche gli angoli in H, K, L sono retti, le rette GH, HK, KM ^a costituiscono vna sola retta linea; e le rette FI, IL, LN costituiscono similmente vna sola retta linea; dal che tutto il quadrilatero FGMN farà vn solo parallelogrammo. E perche le rette FG, IH, LK, NM ^e sono frà di loro vguali, essendo FG Rationale, farà ancora IH, ouero LK, Rationale. E perche i quadrati AD, CE sono Medij, i rettangoli ancora FH, LM, che sono vguali a quei quadrati, faranno Medij; i quali, applicati alle Razionali FG, LK, ne risultano i lati GH, KM ^a Razionali, ed incommensurabili alle Razionali FG, LK; ed essendo le rette AB, BC, commensurabili in potenza, i loro quadrati AD, CE faranno commensurabili, ed i rettangoli FH, LM, che sono vguali a i medesimi quadrati, faranno frà di loro commensurabili. In oltre, essendo i rettangoli FH, LM, sotto vguali altezze, farà il rettangolo FH al rettangolo LM, ^e come la base GH alla base KM: ma il rettangolo FH è dimostrato commensurabile al rettangolo LM, farà GH ^f commensurabile ad MK; e perciò le rette GH, KM sono commensurabili in lunghezza. E perche le rette GH, KM sono state dimostrate Razionali, in conseguenza ^g faranno commensurabili alle Razionali FG, LK: ma si disse, che le rette GH, KM sono incommensurabili in lunghezza alle Razionali FG, LK; faranno dunque le rette GH, KM, commensurabili solamente in potenza alle Razionali FG, LK, e commensurabili frà di loro in lunghezza; e per la 20. proposizione di questo, il rettangolo contenuto dalle due GH, KM, farà Rationale. Di più, essendo AB vguale à DB, ed il lato BC vguale ad EB, farà AB à BE, ^h come DB à BC, cioè ^k come DA ad AC: ma AB à BE è come AC à CE, farà DA ad AC, ^l come AC à CE; dal che i tre AD, AC, CE sono continui proporzionali; ma i tre DA, AC, CE sono vguali à i tre FH, IK, LM; faranno i tre FH, IK, LM continui proporzionali. E perche i tre



a 45. del 2.

b 14. del 1.

c 34. del 1.

d 32. del 10.

e 1. del 6.

f 10. del 10.

g 6. defin. del 10.

h Corol. alla 7. del 5.
k 1. del 6.
l 11. del 5.

rettan-

m 1. del 6.


n 17. del 6.

o 6. defin.
del 6.

p 30. del 12.

q 12. del 10.

rettangoli FH, IK, LM ^m sono come le basi GH, HK, KM, faranno le rette GH, HK, KM, continue proporzionali, ed il rettangolo delle estreme GH, KM, ⁿ sarà vguale al quadrato della media HK: ma il rettangolo contenuto dalle due GH, KM, fu dimostrato Rationale; il quadrato dunque di HK sarà Rationale; e per la 9. definizione di questo, il quadrato di HK sarà commensurabile al quadrato della Rationale IH, ouero FG; dal che HK ^o sarà Rationale, e sarà commensurabile alla Rationale HI, ouero FG, ò in lunghezza, ouero solamente in potenza. Se la Rationale HK ò commensurabile in lunghezza alla Rationale HI, sarà il rettangolo IK, contenuto dalle rationali IH, HK commensurabili in lunghezza, ^p Rationale: ma il rettangolo IK è fatto vguale al rettangolo AC, sarà, in tal caso, AC Rationale. Se poi la Rationale HK sarà commensurabile alla Rationale IH solamente in potenza, il rettangolo IK, contenuto dalle Rationali IH, HK, commensurabili solamente in potenza, ^q sarà Medio; ma il rettangolo IK è vguale al rettangolo AC; il rettangolo dunque AC, in questo caso, sarà Medio, come fu proposto dimostrare.



CONSETTARIO.

a 30. del 10.

b 32. del 10.

c 25. del 10.


d 36. del 10.

Dalle cose dette si conclude, che ^a il rettangolo, contenuto da due rette Rationali, e commensurabili in lunghezza, è Rationale; che ^b il rettangolo, contenuto da due rette Rationali, commensurabili solamente in potenza, è Irrationale, e si chiama Medio; ed il quadrato, che gli è vguale, si chiama Medio; il di cui lato si dice parimente Media; che ^c il rettangolo, contenuto da due rette Medic, commensurabili in lunghezza, è Medio; e che ^d il rettangolo, contenuto da due rette Medic, commensurabili solamente in potenza, ò è Rationale, ouero è Medio.

S C O L I O.

Perche due rette Rationali non possono in altri modi essere commensurabili, se non che ò in lunghezza, ò solamente in potenza, è manifesto dall'antecedente Confettario, ch' Euclide s'è qui b' spiegato la natura de i rettangoli contenuti da quelle Rationali secondo i due predetti modi; poiche, nella 20. proposizione b' ha dimostrato, che il rettangolo, contenuto da due Rationali, commensurabili in lunghezza, è Rationale; e quello, contenuto da due rationali, commensurabili solamente in potenza, è Medio; e quella retta, il di cui quadrato è uguale all'antedetto Medio, la chiama Media. E perche le medie ancora, ò sono commensurabili in lunghezza, ouero solamente in potenza, b' ha dimostrato, che il rettangolo, contenuto da due medie, commensurabili in lunghezza, è ancora Medio; e che il rettangolo, contenuto da due medie, commensurabili solamente in potenza, ò è Rationale, ouero è medio. Resta solo d'investigare, qual rettangolo sia quello, ch'è contenuto da due Medie, incommensurabili in lunghezza, e potenza; al che supplisce il P. Clauio, col dimostrare, che quello non è Rationale, ne Medio; mà che costituisce un terzo genere; stante che è uguale al rettangolo, contenuto dalla Rationale, e da quella retta, che si chiama Media; e la dimostrazione è la seguente.

Sia il rettangolo AC, contenuto dalle due Medie AB, BC, incommensurabili in lunghezza, e potenza. Dico che il rettangolo AC non è Rationale, ne meno è Medio, &c. s'intenda fatta la costruzione del antecedente Theorema, e si dimostri, come iui si fece, che le rette GH, KM sono Rationali; e che sono alla Rationale FG, ouero LK, incommensurabili in lunghezza. E perche le medie AB, BC, per ipotesi, sono incommensurabili in lunghezza, e potenza, perciò i loro quadrati AD, CE, e i rettangoli FH, LM, che sono uguali a quei quadrati, saranno incommensurabili: mà FH ad LM b' è come GH à KM; saranno le rette GH, KM, c' incommensurabili in lunghezza. E perche le rette GH, KM, sono state dimostrate Rationali, perciò sono fra di loro commensurabili solamente in potenza; ed il rettangolo, contenuto da esse rette GH, KM, d' sarà Irrazionale, e sarà quello, che si chiama Medio. Ed essendo il rettangolo, contenuto dalle due GH, KM, e per le cose dimostrate nell'antecedente proposizione, uguale al quadrato di HK, sarà il quadrato di HK Medio, ed il lato HK sarà irrationale; ed è quella retta, che si chiama Media. Per la qual cosa il rettangolo IK, ouero AC, non è Rationale; perche se fosse rationale, applicato alla Rationale IH, l'altro lato HK f' sarebbe rationale, ch'è contro à quel, che si è dimostrato. Dico che ne meno IK è medio, perche, se fosse



a 9. del 10.

b 11. del 6.

c 10. del 10.


d 12. del 10.

e 17. del 6.

f 11. del 10.

g. 23. del 10

se Medio, applicato alla Rationale HI , ne risultarebbe il lato HK Rationale, ed incommensurabile in lunghezza alla Rationale HI : ma HK fu dimostrata irrationale, sarebbe Rationale, ed irrationale, ch'è impossibile. Non dunque il rettangolo IK , ouero AC , che gli è uguale, è Medio; ne meno, per quel, che si è dimostrato, è Rationale; in conseguenza il rettangolo AC è d'un altro genere, uguale a quello, che è contenuto dalla Rationale, come IH , e dalla Media, per esempio HK . Onde ne segue, che la retta, il di cui quadrato è uguale al rettangolo, contenuto da due Medie incommensurabili in lunghezza, e potenza, come (per l'ultima supposizione) sono le due AB , BC , non è Media, ma è di quel genere di linee, il di cui quadrato è uguale al rettangolo, contenuto dalla Rationale, e dalla media, come sono le rette IH , HK , ch'è il nostro proposito.



THEOREMA XXIV. PROPOSITIONE XXVII.


Il Medio non supera il Medio per vno spatio Rationale.

a. 45. del 10

Siano i due Medij AB , AC , ed il Medio AB superi il medio AC , per quanto è il rettangolo DB . Dico che DB non è Rationale. Sia DB , se è possibile, Rationale. Si esponga la Rationale EF , alla quale si applichi il rettangolo EG , uguale al Medio AB ; ad alla medesima Rationale EF sia applicato il rettangolo EH , uguale al medio AC , il rimanente KG sarà uguale al Rationale DB , e perciò KG sarà Rationale. Perché i Medij AB , AC , cioè i rettangoli EG , EH , sono applicati alla Rationale EF , i lati FG , FH saranno Rationali, ed ogn'vno incommensurabile in lunghezza alla Rationale EF . Di nuovo perché il Rationale KG è applicato alla Rationale KH , ouero EF , l'altro lato HG sarà Rationale, commensurabile in lunghezza alla Rationale EF . Hor perché le due EF , HG sono commensurabili in

b. 23. del 10

c. 21. del 10



lunghez-


lunghezza, e la retta EF è dimostrata incommensurabile in lunghezza ad FH, sarà HG^d incommensurabile in lunghezza alla medesima FH. Prese FH, ed HG come basi di due rettangoli, ed FH sia altezza comune, farà il quadrato di FH al rettangolo delle due FH, HG, e come FH ad HG: mà FH è dimostrata incommensurabile in lunghezza ad HG, farà il quadrato di FHⁱ incommensurabile al rettangolo delle due FH, HG. In oltre perche le rette FH, HG, per quel, che si è dimostrato, sono Rationali, perciò i loro quadrati sono commensurabili, e l'aggregato de i quadrati di FH, HG, sarà commensurabile al quadrato di FH; mà il quadrato di FH è Rationale; perciò l'aggregato de i quadrati di FH, HG, che gl'è commensurabile per il Lemma, che antecede alla 20. propof. di questo è Rationale. Similmente il doppio rettangolo, contenuto dalle due FH, HG, è commensurabile al semplice rettangolo delle medesime FH, HG. (Sante che il doppio rettangolo contiene il semplice due volte.) Hor perche i quadrati di FH, HG, giunti insieme, sono commensurabili al quadrato di FH, ed il quadrato di FH è incommensurabile al rettangolo delle due FH, HG; l'aggregato de i due quadrati di FH, HG, sarà incommensurabile al rettangolo delle due FH, HG: mà il doppio rettangolo delle due FH, HG, è commensurabile al semplice rettangolo delle due FH, HG; farà l'aggregato de i due quadrati di FH, HG, incommensurabile al doppio rettangolo delle due FH, HG; e per la 17. di questo, il Composto de i quadrati delle due FH, HG, col doppio rettangolo delle due FH, HG, farà incommensurabile all'aggregato de i quadrati di FH, HG: mà il Composto de i due quadrati FH, HG, col doppio rettangolo delle due FH, HG, è uguale al quadrato di FG; farà il quadrato di FG incommensurabile all'aggregato de i quadrati di FH, HG: Mà l'aggregato de i quadrati di FH, HG, per essere commensurabile al quadrato di FH, è Rationale, essendo il quadrato di FG incommensurabile all'aggregato de i quadrati di FH, HG, ch'è Rationale, per la decima definizione di questo, il quadrato di FG sarà irrationale; ed il lato FG^m sarà irrationale, ch'è impossibile, mentre fu dimostrato, che la retta FG è Rationale, incommensurabile in lunghezza alla Rationale EF. Non dunque il rettangolo DB, ch'è la differenza di quanto il medio AB supera il medio AC, è Rationale, che era da dimostrarsi.

S C O L I O.

Il Rationale supera il Rationale per vno spatio Rationale.

Sia il Rationale AB, il quale superi il Rationale AC, per il rettangolo DB. Dico che il rettangolo DB è Rationale. Si esponga la Rationale E, rispetto alla quale si comparano tutte le altre. Perché i rettangoli AB,

AC sono Rationali, ogn'vno^a sarà commensurabile al quadrato



d 14. del 10.

e 2. del 6.

f 10. del 10.

g 16. del 10.

h 14. del 10.


K 14. del 10.

l 4. del 1.

m 11. defin. del 10.

n 9. defin. del 10.


b 12. del 10. della Rationale E; e perciò^b saranno frà di loro commensurabili. Hor essendo tutto il rettangolo AB, ch'è composto de i due AC, DB, commensurabile ad AC, sarà, per il Corollario alla 16. propof., il medesimo rettangolo AB commensurabile al rettangolo DB: ma AB, per ipotesi, è Rationale; sarà DB, per il Lemma, che antecede la 20. propof. Rationale, il che era da dimostrarsi.



PROBLEMA IV. PROPOSITIONE XXVIII.

Ritrouare due Medie, commensurabili frà di loro solamente in potenza, le quali contengano vn rettangolo Rationale.

Si trouino, per il 2. Lem. dopo la 21. propof., due rette Razionali, e commensurabili solamente in potenza, che siano le notate A, & B; si troui frà le due A, & B, vna media proportionale, che sia C; e si faccia sì come A à B, così C^b ad vn'altra, che sia D. Dico che le due C, & D sono le Medie, commensurabili solamente in potenza, e contengono vn rettangolo Rationale. Perche le due A, & B sono Razionali, e commensurabili solamente in potenza, sarà il rettangolo, contenuto da esse, e Irrationale, che si chiama Medio: ma il rettangolo, contenuto dalle due A, & B, è vguale al quadrato di C (stante che C è media proportionale frà le due A, & B) sarà il quadrato di C = Medio, e la retta C sarà quella, che si chiama Media. E perche la proportion di A à B è come quella di C à D, e le due A, & B sono commensurabili solamente in potenza, saranno le due C, & D, commensurabili solamente in potenza: ma la retta C è dimostrata Media, sarà la retta D, che gli è commensurabile, Media, e saranno ritrouate le due Medie C, & D, commensurabili solamente in potenza. Dico finalmente, che il rettangolo, contenuto dalle Medie C, & D, è Rationale. Per costruzione A à B è come C à D, permutando A à C^b sarà come B à D; ma A à C è come C à B (stante che C è media proportionale frà le due A, & B) sarà C à B^k come B à D; per la qual cosa B è media proportionale frà le due C, & D; e perciò il rettangolo contenuto dalle due C, & D, è vguale al quadrato della retta B: ma il quadrato di B è Rationale, (mentre per costruzione B è Rationale) sarà il rettangolo, contenuto dalle Medie C, & D, Rationale, ch'era da farsi, e dimostrarsi.




PROBLEMA V. PROPOSITIONE XXIX.

Ritrouare due Medie commenfurabili folamente in potenza, le quali contengano quel Rettangolo, che fi chiama Medio.

Per lo Scolio alla propof. 21. di queſto, ſi trouino tre rette Rationa-
li, commenfurabili folamente in po-
tenza, che ſiano le notate A, B, C; frà
le due A, & B, ſi troui la media pro-
portionale D; farà il rettangolo con-
tenuto dalle due A, & B, ^b vguale al
quadrato di D. Poi ſi faccia ſi come
B à C, ^c così D ad vn'altra, che ſia E.

Dico che le due D, ed E ſono le medie, commenfurabili folamente in
potenza, le quali contengono quel rettangolo, che ſi chiama Medio.
Perche le due A, & B ſono Rationali, e commenfurabili folamente in po-
tenza, farà il rettangolo, contenuto dalle due A, & B, Irrationale, cioè d
quello, che ſi chiama Medio: ma il rettangolo delle due A, & B è vgua-
le al quadrato di D; farà il quadrato di D Medio, e la retta D ^e farà
Media. In oltre, perche B à C è come D ad E, e le due B, & C, per
coſtruzione, ſono Rationali, e commenfurabili folamente in potenza;
faranno le due D, ed E, ^f commenfurabili folamente in potenza: ma D
è dimoſtrata Media, farà E, ^g che gli è commenfurabile folamente in
potenza, Media; e perciò le due D, ed E ſono Medie, commenfurabili
folamente in potenza. Dico che le Medie D, ed E, contengono quel
rettangolo, che ſi dice Medio. Perche B à C è come D ad E, per-
mutando, B à D ^h farà come C ad E; ma B à D è come D ad A
(ſtante che le tre B, D, A ſono continue proportionali) farà D ad A ^k
come C ad E; ed il rettangolo, contenuto dalle eſtreme D, ed E, ^l farà
vguale al rettangolo contenuto dalle Medie A, & C: ma il rettangolo
contenuto dalle due Rationali A, & C, commenfurabili folamente in
potenza, ^m è Medio; il rettangolo dunque, contenuto dalle Medie D,
ed E, farà Medio, ch'era da farſi, e dimoſtrarſi.



a 13. del 6.

b 17. del 6.

c 12. del 6.

d 17. del 10.

e Scol. alla

22. del 10.

f Scol. alla

10. del 10.

g 24. del 10.

h 16. del 5.

K 11. del 5.

l 16. del 6.

m 22. del 10.

L. E. M. M. A. I.

Ritrouare due numeri piani ſimili.

Si eſpongano quattro numeri proporzionali
A, B, C, D, talmente, che A à B ſia come C à
D; ed A, multiplicando B, produca il nume-
ro E; come ancora C, multiplicando D, pro-
duca F; i numeri E, ed F, che hanno i lati proporzionali, per la 21.
defin. del 7, ſono numeri piani ſimili, che era da farſi.

A	3	6	C
B	5	10	D
E	15	60	F

Nel

a 28. e 29.
prop. del 9.

Nel 9. lib. si è dimostrato, che² se il numero disparo, ouero il numero paro, moltiplica vn numero paro, produce numero paro; ed il numero disparo moltiplica il numero disparo, produce numero disparo; sarà manifesto di quali numeri dobbiamo valerci, per trouare due numeri piani simili, che ambidue siano numeri pari, ò ambidue numeri dispari. E perche per trouare due numeri piani simili, si deuono prendere quattro numeri proportionali, come antedentemente si è fatto, pigliandoli ò tutti quattro numeri pari, ouero il primo, e terzo sia numero paro, ed il secondo, e quarto numero disparo, sempre i piani simili, che ne verranno, faranno numeri pari; e se tutti quattro saranno numeri dispari, i piani simili, che ne verranno, saranno ambidue numeri dispari; e se il primo, e secondo, sarà disparo, ed il terzo, e quarto sarà numero paro, vno de piani simili sarà numero paro, e l'altro disparo.

L E M M A II.

Ritrouare due numeri quadrati, in modo, che il loro aggregato sia numero quadrato.

Per l'antecedente Lemma si trouino due numeri piani, simili, come $A'B$, e C , i quali siano ambidue ò numeri pari, ouero ambidue numeri dispari; e dal numero AB se ne detragga il numero DB , uguale al numero C : perche da vn numero paro, detratto vn numero

$A \dots E \dots D \dots B$
 $C \dots$

paro, resta numero paro; e similmente dal numero disparo, detratto il numero disparo, resta numero paro, ò che i due $A'B$, BD siano pari, ò pure siano ambidue dispari, il rimanente AD sarà numero paro. Si diuidi il numero paro AD in due parti uguali, che siano AE , ED . Dico che il prodotto, fatto dalla moltiplicatione di AB in BD , sarà vno de i numeri quadrati; e l'altro sarà al quadrato di ED i quali giunti insieme comporranno vn numero quadrato. Perche i numeri AB , BD sono piani simili, per la prima propositione del nono Libro, il prodotto, fatto dalla moltiplicatione del numero AB nel numero BD , sarà numero quadrato. In oltre, perche il numero AD è diuiso in due parti uguali in E , ed à quello se gli è aggiunto il numero DB , per il sesto Theorema dopo la 14. propositione del Libro nono, il prodotto, fatto dalla moltiplicatione del numero AB nel numero BD , col quadrato del numero ED , è uguale al quadrato del numero EB . Per la qual cosa i numeri quadrati so-

no, vno il prodotto di AB in BD , e l'altro il quadrato di ED , i quali, giunti insieme, fanno il numero quadrato EB , ch'era da farsi, e dimostrarsi.

COROLLARIO.

Perche il prodotto, fatto da AB in BD , col quadrato di DE , è vguale al quadrato di EB , la differenza frà il quadrato di EB , ed il quadrato di DE , sarà il prodotto, fatto da i due AB , BD : Si che, se i due AB , BD , sono numeri piani, simili, sarà noto il modo di trouare due numeri quadrati, che la loro differenza sia numero quadrato; poiche, detratto da AB il numero DB , vguale al numero C , e l'auanzo AD , sia diuiso in due parti vguali, vno di quelli numeri quadrati, sarà il quadrato di EB , e l'altro il quadrato di ED .

Se poi i numeri presi AB , & C , ouero AB , & BD , non sono piani simili, ma ambidue siano numeri pari, ò ambidue dispari, nell'istesso modo si troueranno i due numeri quadrati EB , ED , la di cui differenza sarà il prodotto de i due AB , BD , il quale non sarà numero quadrato; perche, se il prodotto, fatto da i due AB , BD , fusse numero quadrato, i due AB , BD , sarebbero piani simili, ch'è contro all'ipotesi.

L E M M A II.

Ritrouare due numeri quadrati, che il loro aggregato non sia numero quadrato.

Siano esposti i due numeri piani simili AB , e C , ambidue pari, ouero ambidue dispari; e, detratto dal numero AB il numero DB , vguale al numero C , saranno i numeri AB , BD piani $A \dots E \cdot F \dots D \dots B$ simili; e perche sono ambidue pari, ouero ambidue di-

spari, il rimanente AD sarà numero paro; il quale, diuiso ne i due numeri vguali AE , ED , per l'antecedente Lemma, il prodotto, fatto da i due AB , BD , è numero quadrato; al quale si aggiunga il quadrato di ED , l'aggregato sarà numero quadrato; cioè sarà il quadrato del

numero EB ; da ED se ne leui l'unità EF , sarà il quadrato di DF minore del quadrato di DE . Dico che il prodotto, fatto da AB in BD , ch'è numero quadrato, col quadrato del numero FD , non fa numero quadrato. Se l'aggregato del prodotto di AB in BD , col quadrato di DF , è numero quadrato, quel numero quadrato, o sarà maggiore, o uguale, o minore del quadrato di FB . Sia prima, se è possibile, il prodotto di AB in BD , col quadrato di FD , maggiore del quadrato di FB ; sarà il suo lato, o radice, maggiore di FB . Hor se quel lato è maggiore di FB , o sarà uguale ad EB , o sarà maggiore di EB , non potendo

A.....E.F....D.....B
C.....

essere minore di EB , stante che EB supera FB per una sola unità; sì che, essendo quel lato maggiore di FB , e minore di EB , bisognerebbe diuider l'unità EF , ch'è impossibile, nella quantità discreta. Non dunque quel lato è minore di EB , ma sarà o uguale ad EB , ouero maggiore. Sia prima uguale ad EB , in tal caso, il prodotto di AB in BD , col quadrato di FD , sarà uguale al quadrato di EB ; ma, per il Lemma antecedente, il prodotto di AB , in BD , col quadrato di ED , è uguale al medesimo quadrato di EB : sarà il prodotto di AB in BD , col quadrato di FD , uguale al prodotto di AB in BD , col quadrato di ED : se ne leui ugualmente il prodotto di AB in BD , resta il quadrato di FD uguale al quadrato di ED , ed il lato FD uguale al lato ED , la parte uguale al tutto, ch'è impossibile. Non dunque il lato del quadrato composto del prodotto di AB , in BD , col quadrato di DF , è uguale ad EB . Sia di nouo quel lato maggiore di EB , sarà il suo quadrato maggiore del quadrato di EB ; cioè il prodotto di AB in BD , col quadrato di FD , sarà maggiore del quadrato di EB : s'è dimostrato, nel Lemma antecedente, il quadrato di EB uguale al prodotto di AB in BD , col quadrato di ED ; sarà il prodotto di AB in BD , col quadrato di DF , maggiore del prodotto di AB in BD , col quadrato di ED ; se ne leui ugualmente il prodotto di AB in BD , resta il quadrato di FD maggiore del quadrato di ED ; ed il numero FD sarà maggiore del numero ED ; la parte maggiore del tutto, ch'è impossibile. Non dunque il lato del quadrato, composto del prodotto di AB in BD , col quadrato di DF , è maggiore di EB , ne meno, per quel che si è dimostrato, è uguale, ne minore di EB . Per la qual cosa il prodotto di AB in BD , col quadrato di FD , non è maggiore del quadrato di FB .

Di nuovo sia, se è possibile, il prodotto di AB in BD , col quadrato di DF , uguale al quadrato di FB . Dal numero AE se ne detragano le due unità AH , sarà $A...H...E.F....D.....B$ AH il doppio dell'unità EF . $C.....$

Perche il tutto AD , per costruzione, è il doppio di ED , e la parte AH è il doppio di EF , per la 7. proposizione del 7, il rimanente HD sarà il doppio del rimanente FD ; e perciò HD è diviso ne i due numeri uguali HF , FD , à i quali aggiunto il numero DB , per il 6. Theorema dopo la proposizione 14. del 9, il prodotto di HB in BD , col quadrato di FD , è uguale al quadrato di FB : ma, per la supposizione fatta, il medesimo quadrato di FB è uguale al prodotto di AB in BD , col quadrato di FD ; sarà il prodotto di AB in BD col quadrato di DF , uguale al prodotto di HD in DB , col quadrato di FD : se ne leui il commune quadrato di FD , resta il prodotto di AB in BD uguale al prodotto di HB in BD : dal che DB , moltiplicando HB , e moltiplicando AB , produce numeri uguali, e, per la 17. del 7, il prodotto al prodotto è come il numero moltiplicato BH al numero moltiplicato AB : ma i prodotti sono stati dimostrati uguali; perciò i numeri AB , HB sono frà di loro uguali; la parte uguale al tutto, ch'è impossibile. Non dunque il prodotto di AB in BD , col quadrato di FD , è uguale al quadrato di FB .

Sia finalmente, s'è possibile, il prodotto di AB in BD , col quadrato di FD , minore del quadrato di FB . Perche il prodotto di HB in BD , col quadrato di DF , per quel, che si è dimostrato, è uguale al quadrato di FB ; ed il prodotto di AB in BD , col quadrato FD , per la fatta supposizione, è minore del quadrato di FB ; sarà il prodotto di AB in BD , col quadrato di FD , minore del prodotto di HB in BD , col quadrato di FD : se ne leui il commune quadrato di FD , resta il prodotto di AB in BD , minore del prodotto di HB in BD . Hor perche i numeri AB , HB , moltiplicano il medesimo numero DB , il prodotto di AB in BD al prodotto di HB in BD , per la 18. del 7, sarà come il moltiplicante AB al moltiplicante HB : ma il prodotto di HB in BD è dimostrato minore del prodotto di HB in BD ; sarà il numero AB minore del numero HB ; il tutto minore della parte, ch'è impossibile. Non dunque il prodotto di AB in BD , col quadrato di FD , è minore del quadrato di FB ; non è maggiore, ne uguale, per quel, che si è dimostrato, in conseguenza il prodotto di AB in BD , col quadrato di DF , non è numero quadrato, come si è proposto dimostrare.

S C O L I O.


Dall'antecedente Lemma si caua il modo da trouare due numeri, il di cui aggregato non habbia à ciascuno di quelli la proportionione, che hà il numero quadrato al numero quadrato: poiche, se per l'antecedente Lemma si trouano due numeri quadrati, che il loro composto non sia numero quadrato, quel composto, che non è quadrato, à ciascuno de i due quadrati trouati, non farà come numero quadrato à numero quadrato. Ouero, se si diuiderà vn numero quadrato in due numeri non quadrati, quel quadrato à ciascuno de i non quadrati, non farà come numero quadrato à numero quadrato.

PROBLEMA VI. PROPOSITIONE XXX.

Ritrouare due rette Rationali, commensurabili solamente in potenza, in modo, che il quadrato della maggiore superi il quadrato della minore, per il quadrato d'vna retta, commensurabile in lunghezza alla maggiore.

Sia esposta la Rationale AB, e per la seconda parte all'antecedente, Corollario, si trouino due numeri quadrati, la differenza de'quali non sia quadrato; e siano quelli i numeri quadrati CD, CE, la di cui differenza DE non sia numero quadrato: presa la Rationale AB come diametro d'vn circolo, intorno al quale si descriua il mezzo circolo AFB; poi, per il Corollario alla 6. propof. di questo, si faccia come il numero CD al numero non quadrato ED, così AB ad

vn'altra quantità BF, la quale sia addatata nel mezzo circolo AFB; si tiri la retta AF, sarà l'angolo AFB, nel semicircolo, retto; ed il quadrato di AB^b sarà vguale à i quadrati de i due lati AF, FB; e perciò il quadrato di AB è maggiore del quadrato di AF, per quanto è il quadrato di FB. Dico che le rette AB, BF sono



Razionali, commensurabili solamente in potenza; ed il quadrato della maggiore AB supera il quadrato della minore FB, per il quadrato d'vna retta, come AF, commensurabile in lunghezza alla maggiore AB. Perche il quadrato di AB al quadrato di FB, per costruzione, è come il numero CD al numero ED; saranno i quadrati di AB, FB, commensurabili; ma il quadrato della Rationale AB^d è Rationale, sarà il quadrato di FB^e Rationale, ed il suo lato FB sarà Rationale; per la qual cosa le rette AB, FB sono Rationali. E perche il quadrato di AB al quadrato di FB è come il numero CD al numero DE; ed il numero CD al numero DE non è come numero quadrato à numero quadrato, stante che ED non è numero quadrato, ne meno il quadrato di AB al quadrato di FB

è co-

a 34. del 3.
b 47. del 8.

c 6. del 10.
d 8. defn.
e 10.
e 9. defn.
del 10.


è come numero quadrato à numero quadrato; e perciò le rette AB, FB sono incommensurabili in lunghezza: ma furono dimostrate commensurabili in potenza; saranno le Rationali AB, FB commensurabili solamente in potenza.

Finalmente, perchè il numero CD al numero DE è come il quadrato di AB al quadrato di FB, per la conversione della proportion, l'antecedente CD alla differenza CE s'è come l'antecedente, cioè il quadrato di AB, al quadrato di AF (che è la differenza fra li due quadrati AB, FB) cioè sarà il quadrato di AB al quadrato di AF, come il numero quadrato CD al numero quadrato AF: per la qual cosa le rette AF, AB, sono commensurabili in lunghezza. Saranno dunque ritrovate le due rette AB, FB, Rationali, e commensurabili solamente in potenza; ed il quadrato della maggiore AB supera il quadrato della minore FB, per il quadrato della retta AF, commensurabile in lunghezza alla maggiore AB, ch'era da farsi, e dimostrarfi.

PROBLEMA VII. PROPOSITIONE XXXI.

Ritrouare due rette Rationali, commensurabili solamente in potenza, in modo, che il quadrato della maggiore superi il quadrato della minore, per il quadrato d'vna retta, incommensurabile in lunghezza alla maggiore.

Si cisponga la retta Rationale AB, e per il 2. Lemma dopo la 29. propositione di questo, si trouino due numeri quadrati, come CE, ED, in modo, che il loro aggregato CD non sia numero quadrato. Sopra la Rationale AB si descriua il mezzo circolo AFB; poi, per il Corollario alla 6. propof. di questo, si faccia come il numero CD al numero DE, così il quadrato di AB al quadrato della retta FB, la quale s'è addatti nel mezzo circolo AFB; si tiri la retta AF. Si mostri, come si fece nell'antecedente propositione, che il quadrato di AB supera il quadrato di FB, per quanto è il quadrato di AF; e si mostri ancora, che le due AB, FB sono Rationali, e commensurabili solamente in potenza, stante che questo si dimostra nell'istesso modo, che si fece all'antecedente propositione. In oltre, perchè il quadrato di AB al quadrato di FB è come CD à DE, per la conversione della proportion, sarà il numero DC al numero CE, come il quadrato di AB al quadrato di AF: ma CD à CE non è come numero quadrato à numero quadrato (stante che CD non è numero quadrato) ne meno il quadrato di AB al quadrato di AF è come numero quadrato à numero quadrato; e perciò le rette AF, AB sono incommensurabili in lunghezza. Per la qual cosa saranno ritrovate le due Rationali AB, BF, commensurabili solamente in potenza, ed il quadrato della maggiore AB



f 9. del 10.

b Coroll. alla 19. del 5.

h 9. del 10.

a 1. del 4.

b Coroll. alla 19. del 5. e 14. del 8.


d 9. del 10.

supera il quadrato della minore FB, per il quadrato della retta AF, incommensurabile in lunghezza alla maggiore AB, ch'era da farsi, e dimostrarsi.

PROBLEMA VIII. PROPOSITIONE XXXII.

Ritrouare due Medie, commensurabili solamente in potenza, che contengano vn rettangolo Rationale, ed il quadrato della maggiore superi il quadrato della minore, per il quadrato d'vna retta, commensurabile in lunghezza alla maggiore.

Si trouino, per la 30. propositione di questo, due rette Rationali, commensurabili solamente in potenza, come A, & B, in modo, che il quadrato della maggiore A superi il quadrato della minore B, per il quadrato d'vna retta, commensurabile in lunghezza ad essa maggiore A: frà le due A, & B, si troui vna media, proportionale, che sia C, sarà il rettangolo, contenuto dalle due A, & B, vguale al quadrato della retta C. Poi si faccia sì come A à B, così C ad vn'altra, che sia D. Dico che le due rette C, & D sono le medie, che



si cercano. Perche le due A, B sono Rationali, commensurabili solamente in potenza, il rettangolo contenuto dalle medesime A, & B, sarà irrationale, che si chiama Medio; e la retta C, il di cui quadrato è vguale à quel rettangolo, sarà quella retta, che si chiama Media. E perche A à B è come C à D, e le due A, & B sono commensurabili solamente in potenza; per lo Scolio alla 10. propositione di questo, le due C, & D, saranno commensurabili solamente in potenza. Per la qual cosa D, ch'è commensurabile alla media C, sarà Media; e saranno ritrouate le due medie C, & D, commensurabili solamente in potenza. Dico che contengono vn rettangolo Rationale. Perche A à B è come C à D, permutando, A à C è come B à D; ma A à C è come C à B (stante che C è media proportionale frà le due A, & B) sarà C à B, come B à D; e perciò B è media proportionale frà le due C, & D. Per la qual cosa il rettangolo, contenuto dalle estreme C, & D, è vguale al quadrato della retta B: ma la retta B è posta Rationale, sarà il quadrato di B Rationale; cioè il rettangolo, contenuto dalle medie C, & D, è Rationale. Finalmente perche A à B è come C à D, ed il quadrato di A, per costruzione, supera il quadrato di B, per il quadrato d'vna retta, commensurabile in lunghezza alla maggiore A; il quadrato ancora di C supererà il quadrato di D, per il quadrato d'vna retta, commensurabile in lunghezza alla maggiore C; e saranno ritrouate le due Medie C, & D, commensurabili solamente in potenza, le quali contengono vna

rettan-


rettangolo Rationale, ed il quadrato della maggiore C, supera il quadrato della minore D, per il quadrato d'vna retta, commensurabile in lunghezza alla maggiore C, ch'era da farsi, e dimostrarli.

Se faranno trouate le Rationali A, B, ¹ commensurabili solamente in potenza, in modo, che il quadrato della maggiore A superi il quadrato della minore B, per il quadrato d'vna retta incommensurabile in lunghezza alla maggiore A; ed il rimanente si faccia come prima, hauere-
mo ritrouate le due medie C, & D, commensurabili solamente in potenza, le quali contengono vn rettangolo Rationale, ed il quadrato della maggiore C supererà il quadrato della minore D, per il quadrato d'vna retta, incommensurabile in lunghezza alla maggiore C, il che tutto si dimostra, come sopra si fece.

PROBLEMA IX. PROPOSITIONE XXXIII.

Ritrouare due Medie, commensurabili solamente in potenza, le quali contengano quel rettangolo, che si chiama Medio; ed il quadrato della maggiore superi il quadrato della minore, per il quadrato d'vna retta, commensurabile in lunghezza alla maggiore.

Si trouino due rette Rationali, come A, & C, ² commensurabili solamente in potenza, in modo, che il quadrato della maggiore A superi il quadrato della minore C, per il quadrato d'vna retta, commensurabile in lunghezza alla maggiore A; poi, per lo Scolio alla proposi. 21. di questo, si troui la retta B Rationale, e commensurabile alle due A, & C, solamente in potenza; Ciò fatto, si troui vna media proportionale, ^b frà le due A, & B, che sia D; farà il quadrato della retta D ^c vguale al rettangolo, contenuto dalle due A, & B. Si faccia poi come D à B, ^d così C ad vn'altra, che sia E, farà il rettangolo delle estreme D, ed E, ^e vguale al rettangolo delle medie B, & C. Dico che le due D, ed E sono le Medie, che si cercano. Si prendano le due A, & C, come basi di due rettangoli, e sia B altezza comune; farà il rettangolo, contenuto dalle due A, & B, al rettangolo contenuto dalle due B, & C, ^f come la base A alla base C: ma il rettangolo delle due A, & B, è vguale al quadrato della retta D; ed il rettangolo delle due B, & C, è vguale al rettangolo delle due D, ed E; farà il quadrato di D al rettangolo delle due D, ed E, come A à C. Prese D, ed E, come basi di due rettangoli, e sia D altezza comune; farà il quadrato di D al rettangolo delle due D, ed E, ^g come la base D alla base E: ma il quadrato di D al rettangolo delle due D, ed E, fu mostrato essere come A à C;



farà

37. del 10.

30. del 10.

b 23. del 6.

c 17. del 6.


d 22. del 6.

e 16. del 6.

f 1. del 6.

g 1. del 6.

farà dunque A à C, come D ad E; e perche le due A, & C sono, per costruzione, commensurabili solamente in potenza, faranno le due D, ed E, per lo Scolio alla 10. proposizione di questo, commensurabili solamente in potenza. In oltre, perche il quadrato di D, è vguale al rettangolo contenuto dalle due rationali A, & B, commensurabili solamente in potenza; sarà il quadrato di D ^h irrationale, e la retta D sarà Media; ma si disse, che la retta E è cōmensurabile alla media D, perciò la retta



K 24. del 10. E K sarà Media. Hor essendo le rette B, & C, Rationali, e commensurabili solamente in potenza, il rettangolo contenuto dalle due B, & C, ^l sarà irrationale; cioè quello, che si chiama Medio; ma il rettangolo delle due B, & C, fu dimostrato vguale al rettangolo delle due D, ed E; il rettangolo dunque, contenuto dalle due D, ed E, sarà Medio; E faranno ritrouare le due Medie D, ed E, commensurabili solamente in potenza, le quali contengono quel rettangolo, che si chiama Medio. Dico finalmente, che il quadrato di D supera il quadrato di E, per il quadrato di vna retta, commensurabile in lunghezza alla maggiore D. Perche fu dimostrato, che A à C è come D ad E, e, per costruzione, il quadrato di A supera il quadrato di C, per il quadrato d'vna retta, commensurabile in lunghezza alla maggiore A; il quadrato di D ^m supererà il quadrato di E, per il quadrato d'vna retta, commensurabile in lunghezza alla medesima D, come fu proposto fare, e dimostrare.

n 31. del 10. Se faranno trouate le Rationali A, & C, ⁿ commensurabili solamente in potenza, in modo, che il quadrato della maggiore A superi il quadrato della minore C, per quanto è il quadrato d'vna retta, incommensurabile in lunghezza alla maggiore A; ed il rimanente si faccia come prima, faranno trouate le due Medie D, ed E, commensurabili solamente in potenza, le quali conteranno vno spatio Medio, ed il quadrato della maggiore D supererà il quadrato della minore E, per quanto è il quadrato d'vna retta, incommensurabile alla maggiore D; e la dimostrazione è la medesima, fatta di sopra.


L E M M A.

Se sia il triangolo rettangolo ABC, e l'angolo retto sia BAC, dal quale cada la retta AD, perpendicolare al lato BC. Dico che il rettangolo, contenuto dalle due BC, CD è vguale al quadrato di AC; che il rettangolo, contenuto dalle due CB, BD, è vguale al quadrato di AB; che il rettangolo, contenuto dalle due BD, DC, è vguale al quadrato di AD; e che il rettangolo, contenuto dalle due

AD,

AD, BC, è uguale al rettangolo ; contenuto da i due lati BA, AC.

Perche AD divide il triangolo ABC ne i due triangoli ADE, ADB, simili fra di loro, e simili a tutto il triangolo ABC, considerando i due similtriangoli ABC, ADC, sarà BC a CA, come CA a CD ; ed il rettangolo, contenuto




dalle due BC, CD, sarà uguale al quadrato di AC. Similmente, considerando i simili triangoli ABC, ABD, sarà CB ad AB, come AB a BD ; ed il rettangolo, contenuto dalle due CB, BD, sarà uguale al quadrato di AB. Di nuovo, considerando i simili triangoli ADB, ADC, sarà BD a DA, come DA a DC, ed il rettangolo, contenuto dalle due BD, DC, sarà uguale al quadrato di AD. Finalmente, considerando i simili triangoli ABC, ADB, sarà DC a CA, come BA ad AD ; ed il rettangolo contenuto dalle estreme BC, AD, sarà uguale al rettangolo contenuto dalle medie BA, AC, come sù proposto dimostrare.

PROBLEMA X. PROPOSITIONE XXXIV.

Ritrouare due rette linee , incommensurabili in potenza, in modo , che il composto de i loro quadrati sia Rationale, ed il rettangolo , contenuto da esse, sia Medio .

Si trouino due rette Razionali , come AB, CD , e commensurabili solamente in potenza ; e che il quadrato della maggiore AB superi il quadrato della minore CD , per il quadrato d'vna retta , incommensurabile in lunghezza alla maggiore AB: si diuida CD in due parti uguali in E ; poi



per il secondo Lemma dopo la 17. propositione di questo, si applichi ad AB vn rettangolo , uguale al quadrato di CE, in modo , che manchi a compire la retta AB, per vna figura quadrata ; per il Corollario al citato Lemma, sarà diuisa AB talmente in F, che il rettangolo, contenuto dalle parti AF, FB, sarà uguale al quadrato di CE ; cioè sarà uguale alla quarta parte del quadrato di tutta CD . Intorno alla retta AB si descriva il mezzo circolo AGB ; nel punto F si erigga la retta FG, perpendi-

colare

a 31 del 20.

b 12 del 12.

c 31. del 3.

colare ad AB, la quale, continuata, concorra con la circonferenza in qualche punto G: si tirino le rette AG, GB: l'angolo AGB ϵ sarà retto; e, per l'antecedente Lemma, il rettangolo, contenuto dalle due AF, FB, sarà vguale al quadrato di FG: mà il rettangolo delle due AF, FB, è vguale, per costruzione, al quadrato di CE; farà il quadrato di FG vguale al quadrato di CE; e la retta FG vguale alla retta CE; mà CD è il doppio di CE; farà CD il doppio di FG, Supposto questo.

Perche il quadrato di AB, per costruzione, supera il quadrato di CD, per il quadrato d'vna retta, incommensurabile in lunghezza ad AB; e si è applicato ad AB il rettangolo, contenuto dalle parti AF, FB, vguale alla quarta parte del quadrato della minore CD, che gli manchi à compire la linea, vna figura quadrata; per la decimanona proposizione di questo, le



d 1. del 6.

parti AF, FB sono frà di loro incommensurabili in lunghezza. Preso AF, FB, come basi di due rettangoli, de' quali sia AB altezza comune; farà il rettangolo, contenuto dalle rette BA, AF, al rettangolo, contenuto dalle rette AB, BF, ϵ come le basi AF alla base FB: mà, per il Lemma antecedente, il rettangolo delle due BA, AF, è vguale al quadrato di AG; ed il rettangolo delle due AB, BF, è vguale al quadrato di GB; il quadrato dunque di AG al quadrato di GB ϵ farà, come AF ad FB: fu dimostrata AF incommensurabile in lunghezza ad FB; farà il quadrato di AG ϵ incommensurabile al quadrato di GB; per la qual cosa le rette

f 30. del 10.
g 4. del 10.
h 8. de fin.
del 10.
K 47. del 1.

AG, GB, ϵ sono incommensurabili in potenza. E perche il quadrato della Rationale AB ϵ Rationale, ed è vguale κ à i quadrati delle due AG, GB, haueremo ritrouato due rette, come AG, GB, incommensurabili in potenza, che il loro composto fanno il quadrato di AB Rationale. Dico che il rettangolo contenuto dalle rette AG, GB è Medio. Preso CD DE, come basi di due rettangoli, e sia AB altezza comune; il rettangolo, contenuto dalle due AB, CD, al rettangolo, contenuto dalle due AB, DE, ϵ farà come la base CD alla base DE: mà CD è il doppio di DE, farà il rettangolo, contenuto dalle due AB, CD, il doppio del rettangolo, contenuto dalle due AB, ED, ouero dalle due AB, FG (stante che FG è vguale ad ED) e perciò il rettangolo, contenuto dalle due AB, CD, farà commensurabile al rettangolo, contenuto dalle due AB, GF, (à causa che il doppio è misurato da quello, che è sua metà). Hor essendo le due AB, CD, Rationali, e commensurabili solamente in potenza, il rettangolo, contenuto dalle due AB, CD, ϵ farà irrationale, cioè quello, che si chiama Medio: essendo il rettangolo, contenuto dalle due AB, FG, commensurabile al Medio, cioè al rettangolo, contenuto dalle due AB, CD; il rettangolo ancora, contenuto dalle due AB, FG, ϵ farà Medio: mà, per il Lemma antecedente, il rettangolo, contenuto dalle due AB, FG, è vguale al rettangolo, contenuto dalle due AG, GB; farà il rettangolo, contenuto dalle due AG, GB, Medio. Per la qual

m 12. del 10.
n Caroll alla
14. del 10.

cosa

cosa le rette AG, GB sono incommensurabili in potenza; i loro quadrati compongono il quadrato di AB, ch'è Rationale; e contengono quel rettangolo, che si chiama Medio, come fu proposto fare, e dimostrare.

S C O L I O.

Non sarà inutile dimostrare in questo luogo quel, che si dimostra in uno Scolio Antico, cioè. Se sia possibile, che due spazii irrazionali compongano uno spatio Rationale. Si esponga la retta Rationale AB, e si prendano due numeri ineguali, come C maggiore, ed il minore sia D, che non habbiano la proportion del numero quadrato al numero quadrato: sopra la Rationale AB^a si descriva il quadrato AG; sarà il quadrato AG^b Rationale. Si faccia poi siccome C à D, così il quadrato di AB al quadrato di AE; dal punto E^c sitiri la retta EF, parallela al lato BG. Perche il quadrato di AB al quadrato di AE è come il numero C al numero D; non essendo il numero C al numero D come numero quadrato à numero quadrato, ne meno il quadrato di AB al quadrato di AE sarà come numero quadrato à numero quadrato; per la qual cosa i lati AB, AE^d di quei quadrati sono incommensurabili in lunghezza.


Hor essendo AB, composta delle due AE, EB, incommensurabili in lunghezza ad AE; la medesima AB e sarà incommensurabile in lunghezza al restante EB. In oltre, perche il quadrato di AB, cioè AG, al rettangolo AF, è come AB ad AE, ed AB è incommensurabile in lunghezza ad AE; sarà il quadrato AG^e incommensurabile al rettangolo AF: Ma il quadrato AG è Rationale, perciò il rettangolo AF sarà irrazionale. Nell'istesso modo si dimostrerà, che il rettangolo EG è irrazionale. Per la qual cosa i due irrazionali, AF, EG, compongono lo spatio AG Rationale, ch'era da dimostrarsi.

Se poi i due Rettangoli AF, EG fossero Rationali, si dimostrerà, che tutto il composto AG è Rationale. Perche l'uno, e l'altro de i Rettangoli AF, EG, si suppone Rationale, perciò faranno frà di loro^h commensurabili, per la qual cosa tutto il Composto da loro, cioè AG, k sarà commensurabile ad ogn' uno di essi, ed in conseguenza tutto il Composto AG, essendo commensurabile à i Rationali AF, EG, sarà Rationale; il che era da dimostrarsi.

PROBLEMA XI. PROPOSITIONE XXXV.

Ritrouare due rette linee, incommensurabili in potenza, in modo, che i loro quadrati, giunti insieme, compongano vn' spatio Medio; ed il rettangolo, contenuto da loro, sia Rationale.

Si ritrouino due rette Medie, come AB, CD, ^a commensurabili sola-



C 6 D 4

a 46. del 1.
b 8. defin.
del 10.

c 31. del 1.

d 9. del 10.

e Corol. alla
17. del 10.

f 1. del 6.

g 10. del 10.


h 9. defin.
del 10.

k 16. del 10.

l 9. defin.
del 10.

a 32. del 10.

mente in potenza, le quali contengano vn rettangolo Rationale, in modo, che il quadrato della maggiore AB superi il quadrato della minore CD, per il quadrato d'vna retta, incommensurabile in lunghezza alla maggiore AB. Si facciano le altre cose, come nell'antecedente proposizione, e si mostri, come iui si fece, che le rette AG, GB sono incommensurabili in potenza; e perche



b 47. del 1.

c 9. defin. del 5.

il quadrato della media AB è Medio, essendo vguale ^b à i quadrati delle due AG, GB, i quadrati delle due AG, GB, giunti insieme, comporranno vno spatio Medio. Si dimostri ancora, come si fece nell'antecedente proposizione, che il rettangolo, contenuto dalle due AB, CD, è il doppio del rettangolo, contenuto dalle due AB, GF; e perciò l'vno è commensurabile all'altro. E perche il rettangolo, contenuto dalle due AB, CD, per costruzione, è Rationale, farà ancora il rettangolo, contenuto dalle due AB, FG, che gli è commensurabile, ^c Rationale: ma per il Lemma dopo la 33. proposizione, il rettangolo, contenuto dalle due AB, GF, è vguale al rettangolo contenuto dalle due AG, GB; farà il rettangolo, contenuto dalle due AG, GB, Rationale: mà si è dimostrato, che il composto de i quadrati delle rette AG, GB, è Medio; si faranno dunque ritrouare le due rette AG, GB, incommensurabili in potenza; di cui quadrati, giunti insieme, compongono vn Medio; ed il rettangolo, contenuto da loro, è Rationale, ch'era da farsi, e dimostrarsi.

PROBLEMA XII. PROPOSITIONE XXXVI.

Ritrouare due rette linee, incommensurabili in potenza, in modo, che i loro quadrati, giunti insieme, compongano vn' spatio Medio; ed il rettangolo, contenuto da loro, sia Medio; il quale sia incommensurabile al composto de i loro quadrati.

a 33. del 10.


b 47. del 1.

Si ritrouino due Medie AB, CD, ^a commensurabili solamente in potenza, le quali contengano vn' spatio Medio; ed il quadrato della maggiore superi il quadrato della minore, per il quadrato d'vna retta, incommensurabile in lunghezza alla maggiore AB; e si facciano tutte le altre cose, come fu fatto nella 34. proposizione di questo; e si dimostri, come iui si fece, che le rette AG, GB, sono incommensurabili in potenza. E perche il quadrato della Media AB è Medio, essendo vguale ^b à i quadrati delle due AG, GB, il composto de i quadrati delle rette AG, GB, farà Medio. In oltre si dimostri, come si fece nella 34. proposizione di questo, che il rettangolo, contenuto dalle due AB, CD, è il doppio del rettangolo, contenuto dalle due AB, GF; per il che il rettangolo delle due AB, GF, è commensurabile al rettangolo delle due AB, CD.

E per-

E perche il rettangolo delle due AB, CD, per costruzione, è Medio; il rettangolo delle due AB, GF, e che gli è commensurabile, sarà Medio: ma il rettangolo contenuto dalle due AB, GF, è uguale al rettangolo, contenuto dalle due AG, GB; sarà il rettangolo, contenuto dalle due AG, GB, Medio.

In oltre, perche AB, per costruzione, è incommensurabile in lunghezza alla retta CD, e la retta CD è commensurabile alla sua metà CE; sarà AB e incommensurabile alla retta CE. Prese AB, CE, come basi di due rettangoli, e sia AB altezza comune, sarà il quadrato di AB al rettangolo, contenuto dalle due AB, CE, come le basi AB alla base CE; ma il rettangolo delle due AB, CE, è uguale al rettangolo, contenuto dalle due AB, GF (per essere GF uguale a CE) sarà il quadrato di AB al rettangolo delle due AB, GF, come AB a CE: il rettangolo, contenuto dalle due AB, GF, è uguale al rettangolo, contenuto dalle due AG, GB; sarà il quadrato di AB al rettangolo, contenuto dalle due AG, GB, come AB ad EC: ma AB è dimostrata incommensurabile in lunghezza a CE; sarà il quadrato di AB e incommensurabile al rettangolo, contenuto dalle due AG, GB; cioè incommensurabile al Medio, contenuto dalle due AG, GB. Per la qual cosa haueremo trouate le due rette AG, GB, incommensurabili in potenza, i di cui quadrati, composti insieme, fanno vn' spatio Medio; come ancora il rettangolo contenuto dalle medesime è Medio, il quale è incommensurabile all'aggregato de i loro quadrati, come fù proposto fare, e dimostrare.



S C O L I O.

Da quel, che si è detto se ne caua il seguente problema.

Ritrouare due medie, incommensurabili in lunghezza, e potenza.

Essendosi dimostrato, che il quadrato di AB, cioè il composto de i quadrati delle rette AG, GB, è Medio, ed ancora il rettangolo, contenuto dalle due AG, GB, è Medio; e questo è incommensurabile al composto de i quadrati delle rette AG, GB; sarà il lato dell'aggregato de i quadrati di AG, GB Medio; e sarà ancora Medio il lato del rettangolo, contenuto dalle due AG, GB, le quali saranno incommensurabili in lunghezza; perche, se non sono incommensurabili in lunghezza, i loro quadrati, cioè il rettangolo delle due AG, GB, e l'aggregato de i quadrati delle medesime, saranno commensurabili,

c Corollalla
24. del 10.
d Lem. dopo
la 31. del 10.


e 13. del 10.

f 1. del 6.

g 10. del 10.

39. del 10.

ch'è contro à quello, che si è dimostrato. Non dunque i detti lati sono commensurabili in lunghezza; ma sono in lunghezza incommensurabili, e perciò, se si prenda la retta AB , il di cui quadrato è uguale à i quadrati delle rette AG , GB , e si troua una media proportionale frà le due AG , GB , il di cui quadrato è uguale al rettangolo delle due AG , GB , faranno la retta AB , e quella media proportionale trouata, due Medie incommensurabili in lunghezza, ch'era da farsi, e dimostrarsi.



PRINCIPIO DE' SENARII.

Per compositione.

THEOREMA XXV. PROPOSITIONE XXXVII.

Il Composto di due rette Rationali, commensurabili solamente in potenza, è Irrazionale; e si chiamerà Bino-
mio.

Siano le due Rationali AB , BC , commensurabili solamente in potenza, le quali si aggiungano insieme, in modo, che facciano la sola retta linea AC . Dico che tutta la composta AC è Irrazionale. Perche le Rationali AB , BC , sono commensurabili solamente in potenza, farà la retta AB incommensurabile in lunghezza alla retta BC ;



ed, essendo il quadrato di AB commensurabile al quadrato di BC , l'aggregato de i due quadrati di AB , e BC , ^a farà commensurabile al quadrato di BC : prese AB , BC , come basi di due rettangoli, de' quali BC sia altezza comune; farà il rettangolo, contenuto dalle due AB , BC , al quadrato di BC , ^b come la base AB alla base BC : ma AB è incommensurabile in lunghezza alla retta BC ; farà il rettangolo, contenuto dalle due AB , BC , ^c incommensurabile al quadrato di BC : ma il rettangolo, contenuto dalle due AB , BC , è commensurabile al suo doppio, cioè al doppio rettangolo, contenuto dalle due AB , BC ; farà il doppio rettangolo, contenuto dalle due AB , BC , ^d incommensurabile al quadrato di BC : ma l'aggregato de i quadrati delle due AB , BC , è dimostrato commensurabile al quadrato di BC ; farà l'aggregato de i quadrati delle due AB , BC , ^e incommensurabile al doppio rettangolo, contenuto dalle due AB , BC . E perche i quadrati delle due AB , BC , col doppio rettangolo, contenuto dalle due AB , BC , ^f è uguale al quadrato di AC ; essendo l'aggregato de i quadrati di AB , BC , incommensurabile al dop-

pio

pio rettangolo, contenuto dalle due AB, BC ; sarà il quadrato di AC g. 17. del 10.
 incommensurabile, tanto all'aggregato de i quadrati di AB, BC , quanto
 al doppio rettangolo, contenuto dalle due AB, BC . In oltre, per quel,
 che si è dimostrato, l'aggregato de i quadrati di AB, BC , è commensura-
 bile al quadrato di BC , ed il quadrato di BC ^h è Rationale, per essere BC
 Rationale; sarà l'aggregato de i quadrati di AB, BC , ^k Rationale: Ma
 il quadrato di AC , per quel, che si è dimostrato, è incommensurabile
 all'aggregato de i quadrati di AB, BC ; sarà il quadrato di AC ^l Irratio-
 nale. Per la qual cosa il suo lato AC ^m sarà Irrazionale; e questa retta
 irrazionale AC , composta delle due AB, BC , commensurabili solamen-
 te in potenza, si chiamerà Binomio, ch'era da dimostrarsi.


h 8. defin.
 del 10.
 k 9. defin.
 del 10.
 l 10. defin.
 del 10.
 m 11. defin.
 del 10.

COROLLARIO.

Appare da quel, che si è detto, che da due rette com-
 mensurabili solamente in potenza, se ne generano due
 rette Irrazionali; cioè quella retta, che fra loro è media
 proportionale, è Irrazionale, e si chiama Media; e quella,
 che nasce dal loro composto, è Irrazionale, e si chiama Bi-
 nomio.

THEOREMA XXVI. PROPOSITIONE XXXVIII.

Se due di quelle Medie, commensurabili solamente in
 potenza, che contengono vn rettangolo Rationale, si com-
 pongono insieme; tutta la retta, composta di quelle due,
 è Irrazionale; e si chiamerà Prima Bimediale.

Si compongano le due Medie AB, BC ,
 commensurabili solamente in potenza, 
 che contengano vn rettangolo Rationa-
 le, in modo, che facciano la sola retta
 linea AC . Dico che la composta AC è irrazionale. Perche le Medie
 AB, BC sono commensurabili solamente in potenza, sarà il quadrato
 di AB commensurabile al quadrato di BC ; e l'aggregato de i quadrati
 di AB, BC , ^a sarà commensurabile al quadrato di BC . Prese le due AB, BC ,
 come basi di due rettangoli, e l'altezza commune sia BC ; sarà il ret-
 tangolo delle due AB, BC , al quadrato di BC , ^b come la base AB alla
 base BC : ma AB è incommensurabile in lunghezza alla retta BC ; sarà
 il rettangolo, contenuto dalle due AB, BC , ^c incommensurabile al qua-
 drato di BC : ma il rettangolo delle due AB, BC , è commensurabile al
 doppio rettangolo delle medesime AB, BC ; sarà il doppio rettangolo
 delle due AB, BC , ^d incommensurabile al quadrato di BC . Fù dimo-
 strato l'aggregato de i quadrati delle due AB, BC , essere commensura-
 bile al quadrato di BC ; sarà l'aggregato de i quadrati delle due AB ,

a 16. del 10.
 b 8. del 6.
 c 10. del 10.
 d 14. del 10.

BC,

e 14. del 10.

f 4. del 1.

g 17. del 10.

h 8. defin.
del 10.K 10. defin.
del 10.
l 11. defin.
del 10.


BC, ^e incommensurabile al doppio rettangolo, contenuto dalle due AB, BC. E perche i quadrati delle due AB, BC, col doppio rettangolo, contenuto dalle medesime AB, BC, ^f è vguale al quadrato della retta AC; essendo l'aggregato de i quadrati di AB, BC, incommensurabile al doppio rettangolo delle due AB, BC; farà il quadrato di AC ^g incommensurabile al doppio rettangolo, contenuto dalle due AB, BC; ma il doppio rettangolo delle due è commensurabile al semplice rettangolo delle medesime AB, BC; farà il quadrato di AC ^h incommensurabile al rettangolo, contenuto dalle due AB, BC; fù supposto il rettangolo, contenuto dalle due AB, BC, Rationale; farà il quadrato di AC ^k Irrazionale; ed in conseguenza il suo lato AC ^l sarà irrazionale. La retta AC, composta delle due Medie AB, BC, commensurabili solamente in potenza, che contengono vno spatio Rationale, si chiamerà Prima Bimediale; il che era da dimostrarsi.



L E M M A .

Il Rettangolo, contenuto da vna retta Rationale, e da vn'altra Irrazionale, è Irrazionale.

Sia il rettangolo ABCD, contenuto dalla Rationale AB, e dall'Irrazionale BC. Dico che il rettangolo BD è Irrazionale. Se non è Irrazionale, farà, in conseguenza, Rationale: applicato dunque il Rationale BD alla Rationale AB, ^a produrrà il lato



a 21. del 10.

BC Rationale, ch'è contro all'ipotesi, mentre il lato BC è supposto Irrazionale. Non dunque il rettangolo ABCD è Rationale, ma sarà Irrazionale, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA XXVII. PROPOSITIONE XXXIX.

Se due Medie, commensurabili solamente in potenza, contengono vn' spatio Medio; e quelle si compongano in modo, che costituiscano vna sola retta linea; la composta sarà Irrazionale, e si chiamerà Seconda Bimediale.

a 29. del 10.


b 45. del 1.

Si compongano le due Medie AB, BC, ^a commensurabili solamente in potenza, che contengano quel rettangolo, che si chiama Medio, in modo, che facciano la sola retta linea AC. Dico che la retta AC è Irrazionale. Si cesponga la Rationale DE, alla quale si applichi il rettangolo DF, ^b vguale al quadrato di tutta la retta AC; ed alla medesima Ra-

tio-

tionale DE si applichi il rettangolo DG, vguale all'aggregato de i quadrati di AB, BC. Perche i quadrati delle due AB, BC, col doppio rettangolo, contenuto dalle due AB, BC, e

è vguale al quadrato di AC, cioè vguale al rettangolo DF; detrattone l'aggregato de i quadrati di AB, BC, cioè il rettangolo DG, resta il rettangolo HF vguale al doppio rettangolo, contenuto dalle due AB, BC; e perche il rettangolo, contenuto dalle due AB, BC, per ipotesi, è Medio; ed il rettangolo delle due AB, B



C, è commensurabile al suo doppio, cioè al doppio rettangolo, contenuto dalle medesime AB, BC; farà il doppio rettangolo delle due AB, BC per il Coroll. alla 24. proposizione di questo, Medio: per la qual cosa il rettangolo HF, ch'è vguale, al doppio rettangolo delle due AB, BC, farà Medio. In oltre perche le due rette AB, BC, per ipotesi sono Medie, i loro quadrati, cioè i quadrati di AB, BC, saranno Medij; ed essendo le rette AB, BC, commensurabili in potenza, farà il quadrato di AB commensurabile al quadrato di BC; e l'aggregato de i quadrati di AB, BC, d farà commensurabile a ciascuno di essi quadrati di AB, ouero BC, e, per il Coroll. alla 24. proposizione di questo, l'aggregato de i quadrati di AB, BC, farà Medio: ma il rettangolo DG è vguale all'aggregato de i quadrati di AB, BC, farà il rettangolo DG Medio. Nel parallelogrammo DEGH, il lato DE e è vguale all'oppoſto HG: ma DE, per costruzione, è Rationale, farà HG ancora Rationale; alle quali sono applicati i Medij DG, HF, faranno i lati EG, GF, f Rationali, ed incommensurabili in lunghezza alla Rationale DE. Preſe le rette AB, BC, come baſi di due rettangoli, e l'altezza comune ſia BC; farà il rettangolo delle due AB, BC al quadrato di BC, s come AB à BC: ma AB, per ipotesi, è incommensurabile in lunghezza à BC, farà il rettangolo delle due AB, BC, h incommensurabile al quadrato di BC. E perche il rettangolo delle due AB, BC, è commensurabile al suo doppio, cioè al doppio rettangolo delle due AB, BC; farà il doppio rettangolo delle due AB, BC, cioè il rettangolo HF, k incommensurabile al quadrato di BC. Similmente, effendosi dimostrato l'aggregato de i due quadrati AB, BC, commensurabile al quadrato di BC; ed il quadrato di BC è dimostrato incommensurabile ad HF; farà l'aggregato de i due quadrati di AB, BC, l cioè il rettangolo DG, incommensurabile al rettangolo HF. Finalmente perche i rettangoli DG, HF, hanno vna medesima altezza, il rettangolo DG al rettangolo HF, m farà come la baſe EG alla baſe GF; ma il rettangolo DG è dimostrato incommensurabile al rettangolo HF; farà la retta EG n incommensurabile alla retta GF: dal che le rette EG, GF ſono incommensurabili in lunghezza: ma le medesime rette EG, GF, furono dimoſtrate Rationali; faranno le Rationali EG, GF, commensurabili ſolamente in potenza; e per la 37. proposizione di questo, il loro composto, cioè la retta EF, farà Irrationale; e per l'antecedente Lemma, il rettangolo DF, contenuto

e 4. del 2.

d 16. del 10.

e 34. del 2.

f 33. del 10.

g 1. del 6.

h 10. del 10.

K 14. del 10.

l 14. del 10.

m 1. del 6.

n 10. del 10.

dalla

dalla Rationale DE, e dalla Irrationale EF, è Irrationale. Per la qual cosa il quadrato di AC, ch'è vguale al rettangolo DE, sarà Irrationale; ed il suo lato EF è Irrationale, ch'era da dimostrarsi. Si chiamerà la retta AC, composta delle due AB, BC, seconda Bimediale.

CONSETTARIO.

Dalle due antecedenti proposizioni si caua, che, quando due Medie sono commensurabili solamente in potenza, se quelle contengono vn' spatio Rationale, il loro composto è irrationale, e si chiama prima Bimediale: ma se contengono vn' spatio Medio, il loro composto è irrationale, e si chiama seconda Bimediale.

LEMM A.

Se vna retta linea sarà diuisa in due parti ineguali, sarà l'aggregato de i quadrati delle parti maggiore del doppio rettangolo, contenuto dalle parti, per quanto è il quadrato della differenza delle medesime parti.

Sia la retta AB, diuisa in due parti ineguali, come AC, CB; da AC se ne tagli la parte CD, ^{a 3. del 1.} vguale à CB; sarà



AD la differenza di quanto la maggior parte AC supera la minore CB. Dico che l'aggregato de i quadrati delle parti ineguali AC, CB, supera il doppio rettangolo, contenuto dalle parti AC, CB, per quanto è il quadrato di AD. Perché la retta AC è diuisa in qualunque modo in D, i quadrati delle due AC, CD, ^{b 7. del 1.} sono vguali al doppio rettangolo, contenuto dalle medesime AC, CD, col quadrato del restante AD: ma DC è fatta vguale à CB; perciò i quadrati delle due AC, CB sono vguali al doppio rettangolo, contenuto dalle due AC, CD, ouero dalle due AC, CB, col quadrato di AD. Hor se al doppio rettangolo, contenuto dalle due AC, CB, bisogna aggiungere il quadrato di AD, acciò che sia vguale à i quadrati delle due AC, CB; saranno i quadrati delle due AC, CB, maggiori del doppio rettangolo, contenuto dalle due AC, CB, per quanto è il quadrato della differenza AD, come fù proposto dimostrare.

COROLLARIO.

Appare dunque, che se vna retta linea è diuisa in due parti ineguali, i quadrati delle parti ineguali sono maggiori del doppio rettangolo, contenuto dalle medesime parti ineguali.

THEOREMA XXVIII. PROPOSITIONE XL.

Se due rette linee sono incommensurabili in potenza, ed i loro quadrati, giunti insieme, compongano vno spatio Rationale, ed il rettangolo, contenuto da esse, sia Medio; il composto di queste due rette linee farà Irrazionale, e si chiamerà Maggiore.

Siano le due rette AB, BC , ^a incommensurabili in potenza, che i loro quadrati, giunti insieme, compongano vno spatio Rationale, ed il rettangolo, contenuto da esse, sia Medio, e questi si aggiungano insieme, in modo, che facciano la sola retta AC . Dico che la composta AC è Irrazionale.



Perche il rettangolo, contenuto dalle due AB, BC , è commensurabile al doppio rettangolo, contenuto dalle medesime AB, BC ; ed il rettangolo contenuto dalle due AB, BC , per ipotesi, è Medio; il doppio rettangolo delle due AB, BC , che gli è commensurabile, per il Corollario primo alla 24. proposizione, farà ancora Medio, e perciò farà Irrazionale; ma l'aggregato de i quadrati delle due AB, BC , per ipotesi, è Rationale; farà il doppio rettangolo delle due AB, BC , ^b incommensurabile all'aggregato de i quadrati di AB, BC . E perche i quadrati delle due AB, BC , col doppio rettangolo delle medesime AB, BC , ^c è vguale al quadrato di AC ; farà il quadrato di AC , ^d composto di quelle due grandezze incommensurabili, incommensurabile all'aggregato de i quadrati di AB, BC : ma l'aggregato de i quadrati di AB, BC , per ipotesi, è Rationale; farà il quadrato di AC , ^e che gli è incommensurabile, Irrazionale. Per la qual cosa la retta AC ^f è Irrazionale, ch'era da dimostrarsi. E questa si chiamerà Maggiore, stante che l'aggregato de i quadrati AB, BC , ch'è Rationale, per l'antecedente Lemma, supera il doppio rettangolo delle due AB, BC , ch'è stato dimostrato Medio, per il quadrato della loro differenza; pigliando Euclide la denominazione dalla maggioranza del Rationale sopra il Medio.

a 24. del 10.

b 10. defin. del 10.

c 4. del 2. d 17. del 10.

e 10. de fin. del 10. f 11. defin. del 10.

THEOREMA XXIX. PROPOSITIONE XLI.

Se due rette linee sono incommensurabili in potenza, i di cui quadrati giunti insieme, compongano vno spatio Medio; ed il rettangolo, contenuto da esse, sia Rationale; il composto di queste due rette linee sarà Irrazionale; e si chiamerà linea potente per lo spatio Rationale, e Medio.

a 35. del 10.

Siano le due rette AB, BC, ^a incommensurabili in potenza, che i loro quadrati compongano vno spatio Medio, ed il rettangolo, contenuto dalle medesime AB, BC, sia Rationale, e queste



giunte insieme, compongano la retta AC. Dico che la retta AC è Irrazionale. Perche il rettangolo, contenuto dalle due AB, BC, è commensurabile al suo doppio, cioè al doppio rettangolo delle medesime AB, BC; essendo il rettangolo delle due AB, BC, per ipotesi, Rationale, sarà il doppio rettangolo delle medesime AB, BC, ^b Rationale: ma l'aggregato de i quadrati di AB, BC, per ipotesi, è Medio, e perciò Irrazionale; il doppio rettangolo dunque delle due AB, BC, ^c sarà incommensurabile all'aggregato de i quadrati delle medesime AB, BC. E perche il quadrato di AC si compone de i due incommensurabili; cioè del doppio rettangolo delle due AB, BC, ^d e dell'aggregato de i quadrati delle medesime AB, BC; sarà il quadrato di AC ^e incommensurabile al doppio rettangolo delle due AB, BC: ma, per quel, che si è dimostrato, il doppio rettangolo delle due AB, BC, è Rationale; perciò il quadrato di AC, che gli è incommensurabile, ^f sarà irrationale; ed il suo lato, cioè la retta AC, ^g sarà Irrazionale, che era da dimostrarsi. E questa retta linea AC si chiamerà linea potente, per lo spatio Rationale, e Medio, cioè, che la potenza, o quadrato, della linea AC, si compone del Rationale, ch'è il doppio rettangolo, contenuto dalle due AB, BC; e del Medio, ch'è l'aggregato de i quadrati delle medesime AB, BC.

b 9. defin. del 10.

c 10. defin. del 10.

d 4. del 2.

e 17. del 10.

f 10. defin. del 10.

g 11. defin. del 10.


THEOREMA XXX. PROPOSITIONE XLII.

Se due rette linee sono incommensurabili in potenza, i di cui quadrati, giunti insieme, compongano vno spatio Medio; ed il rettangolo, contenuto da loro sia Medio, incommensurabile al composto de i loro quadrati; quelle rette linee, giunte insieme, costituiscono vna retta linea

Irra-

Irrazionale; E si chiamerà linea potente, per due spazij Medij.

Siano le due rette AB, BC ,^a incommensurabili in potenza, ed i due quadrati di AB, BC , giunti insieme, compongano vno spatio Medio; come anco il rettangolo, contenuto dalle medesime AB, BC , sia Medio, il quale sia incommensurabile all' aggregato de i quadrati di AB, BC . Dico che, composte le rette AB, BC , in modo, che facciano la sola retta linea AC , la retta linea AC sarà Irrazionale. Si esponga la



Razionale DE , alla quale si applichi il rettangolo DF ,^b vguale al quadrato della retta AC ; ed alla medesima Razionale DE s'applichi il rettangolo DG , vguale all' aggregato de i quadrati delle rette AB, BC . Perche il quadrato della retta AC , cioè il rettangolo DF ,^c è vguale à i quadrati delle parti AB, BC , col doppio rettangolo, contenuto dalle medesime parti AB, BC , ed i quadrati delle parti AB, BC , giunti insieme, sono vguali al rettangolo DG ; sarà il rimanente rettangolo HF vguale al doppio rettangolo, contenuto dalle parti AB, BC . In oltre, perche il rettangolo, contenuto dalle due AB, BC , è commensurabile al suo doppio, cioè al doppio rettangolo delle medesime AB, BC ; ed il rettangolo delle due AB, BC , per ipotesi, è Medio; sarà il doppio rettangolo delle due AB, BC , che gli è commensurabile, per il Coroll. alla 24. proposizione di questo Medio: mà il doppio rettangolo delle due AB, BC , è dimostrato vguale al rettangolo HF ; sarà il rettangolo HF Medio. Similmente l' aggregato de i quadrati di AB, BC , per ipotesi, è Medio; il rettangolo DG è fatto vguale all' aggregato de i quadrati di AB, BC ; sarà il rettangolo DG Medio. Nel parallelogrammo $DEGH$ ^d i lati opposti DE, HG sono frà di loro vguali: ma DE , per costruzione, è Razionale, sarà ancora HG Razionale; alle quali, applicati i medij DG, HF , ne risultano le rette EG, GF ,^e Razionali, & incommensurabili in lunghezza alla Razionale DE . Di nuouo, l' aggregato de i quadrati di AB, BC , per ipotesi, è incommensurabile al rettangolo delle medesime AB, BC ; ed il rettangolo delle due AB, BC , è commensurabile al doppio rettangolo delle medesime AB, BC ; sarà l' aggregato de i quadrati delle due AB, BC ,^f cioè il rettangolo DG , incommensurabile al doppio rettangolo delle due AB, BC , cioè al rettangolo HF ; mà il rettangolo DG al rettangolo HF ,^g è come EG à GF ; essendo il rettangolo DG incommensurabile al rettangolo HF , sarà EG ^h incommensurabile à GF ; per il che le due rette EG, GF sono incommensurabili in lunghezza. E perche le rette EG, GF sono state dimostrate Razionali; perciò sono commensurabili solamente in potenza: per la qual cosa tutta la retta EF ,^k composta di quelle due, sarà irrazionale; ed il rettangolo, contenuto dalla irrazionale EF , e dalla Razionale DE , per il Lemma dopo la 38. propo-

e 26. del 10.

b 45. del 1.

c 4. del 2.

d 34. del 1.

e 13. del 10.

f 17. e 14. del 10.


g 1. del 6.

h 10. del 10.

k 37. del 10.

I 11. defin.
del 10.

fitione di questo, sarà irrationale; ma il rettangolo DF, per costruzione, è vguale al quadrato di AC; farà il quadrato di AC irrationale, ed il lato AC¹ sarà irrationale. E perche il quadrato di AC, cioè il rettangolo DF, è composto de i due medij; cioè del medio DG, ch'è vguale à i quadrati delle due AB, BC, e del medio HF, ch'è vguale del doppio rettangolo, contenuto dalle due AB, BC, perciò la retta AC si chiama linea potente per due spatij Medij, il che era da dimostrarfi.



L E M M A I.

Se vna retta linea è diuisa in due parti ineguali, e di nuouo sia diuisa in due altre parti ineguali; i quadrati delle parti più ineguali, sono maggiori de i quadrati delle parti meno ineguali.

ato. del 1.


b 5. del 2.

Sia la retta linea AB diuisa prima in due parti ineguali in C, e di nuouo la medesima AB sia diuisa in due altre parti ineguali, come in D; e siano le due AC, CB più ineguali delle due AD, DB. Dico che i quadrati delle parti più ineguali AC, CB sono maggiori de i quadrati delle parti meno ineguali AD, DB. Si diuida la retta AB² in due parti vguali in E; ò il punto D cade frà i punti E, e C, ouero cade frà i punti A, ed E; cada prima frà i punti E, e C. Perche la retta AB è diuisa in due parti vguali in E, ed in due ineguali in C, farà il rettangolo, contenuto dalle parti ineguali AC, CB, col quadrato di EC, vguale al quadrato di EB; e per l'istessa ragione, il rettangolo, contenuto dalle parti ineguali AD, DB, col quadrato di ED, è vguale al medesimo quadrato di EB; e perciò il rettangolo, contenuto dalle due AC, CB, col quadrato di EC, è vguale al rettangolo, contenuto dalle parti AD, DB, col quadrato di ED: se ne leuino gl'inequali quadrati di EC, e ED, resta il rettangolo, contenuto dalle parti AC, CB, minore del rettangolo, contenuto dalle parti AD, DB; ed il doppio rettangolo, contenuto dalle due AC, CB, sarà minore del doppio rettangolo, contenuto dalle due AD, DB. In oltre, perche la retta AB è diuisa in C, i quadrati delle parti AC, CB,

col

col doppio rettangolo, contenuto dalle medesime parti AC , CB , ^{c 4. del 2.} è uguale al quadrato di AB . Similmente, essendo AB diuisa in D , i quadrati delle parti AD , DB , col doppio rettangolo, contenuto dalle medesime parti, è uguale al medesimo quadrato di AB . Per la qual cosa i quadrati delle parti AC , CB , col doppio rettangolo delle parti AC , CB , sarà uguale a i quadrati delle parti AD , DB , col doppio rettangolo delle medesime parti AD , DB . Da una di queste ugualità se ne leui il doppio rettangolo delle parti AC , CB ; e dall'altra se ne leui il doppio rettangolo delle parti AD , DB ; essendosi dimostrato il doppio rettangolo delle due AC , CB , minore del doppio rettangolo delle due AD , DB , restano i quadrati delle parti più ineguali AC , CB , maggiori de i quadrati delle parti meno ineguali AD , DB , ch'era da dimostrarfi nel primo luogo.

Cada il punto D fra i punti A , ed E . Perche AE è uguale ad EB ,



sarà AD minore di DB ; e, per l'istessa ragione, CB sarà minore di AC . E perche le parti AC , CB , si suppongono più ineguali delle due AD , DB , sarà AD maggiore di CB : ma EB è uguale ad EA , il restante EC sarà maggiore di ED . Hor perche la retta AB è diuisa in due parti uguali in E , ed in due ineguali in C , il rettangolo delle parti ineguali AC , CB , col quadrato di EC , ^{d 5. del 2.} sarà uguale al quadrato di EB . Similmente la retta AB è diuisa in due parti ineguali in D , il rettangolo, contenuto dalle parti ineguali AD , DB , col quadrato di DE , è uguale al quadrato di AE , cioè al quadrato di EB ; per la qual cosa il rettangolo delle parti ineguali AC , CB , col quadrato di EC , sarà uguale al rettangolo, contenuto dalle parti ineguali AD , DB , col quadrato di DE : se ne leuino gl'inequali quadrati di EC , e di DE , resta il rettangolo delle parti AC , CB , minore del rettangolo delle parti AD , DB ; e, procedendosi, come prima si fece, si dimostrerà, che i quadrati delle parti più ineguali AC , CB , sono maggiori de i quadrati delle parti meno ineguali AD , DB , come fù proposto dimostrare.


L E M M A II.

Supposte le medesime cose. Dico che i quadrati delle parti più ineguali AC , CB , superano i quadrati delle parti meno ineguali, AD , DB , per quanto il doppio rettangolo delle parti meno ineguali AD , DB , supera il doppio rettangolo delle parti più ineguali AC , CB .

A qua-

a 45. del 1.

A qualunque retta EF ,^a si applichi il rettangolo EG , uguale al quadrato di AB ; ed alla medesima retta EF si applichi il rettangolo EH , uguale all'aggregato de i quadrati delle parti più ineguali AC , CB ; e similmente ad EF si applichi il rettangolo EI , uguale all'aggregato de i quadrati delle parti meno ineguali AD , DB . Perche i quadrati delle parti più ineguali AC , CB , per l'antecedente Lemma, superano i quadrati delle parti meno ineguali AD , DB , perciò il rettangolo EH sarà maggiore del rettangolo EI , la loro differenza sia, per esempio, il rettangolo KH . Dico che



b 4. del 2.

c 4. del 2.

il rettangolo KH è ancora la differenza di quanto il doppio rettangolo delle parti AD , DB , supera il doppio rettangolo delle parti AC , CB . Perche i quadrati delle parti AC , CB , col doppio rettangolo delle medesime parti AC , CB ,^b è uguale al quadrato di AB , cioè al rettangolo EG ; e l'aggregato de i quadrati delle parti AC , CB , per costruzione, è uguale al rettangolo EH ; sarà il rettangolo LG uguale al doppio rettangolo delle parti AC , CB . Similmente, perche i quadrati delle parti AD , DB , col doppio rettangolo delle medesime parti AD , DB ,^c è uguale al quadrato di AB , cioè al rettangolo EG ; e l'aggregato de i quadrati delle parti AD , DB , per costruzione, è uguale al rettangolo EI ; sarà il rettangolo KG uguale al doppio rettangolo delle parti meno ineguali AD , DB ; per la qual cosa il rettangolo KH sarà la differenza di quanto il rettangolo KG supera il rettangolo LG : ma il rettangolo KG è uguale al doppio rettangolo delle parti meno ineguali AD , DB ; ed il rettangolo LG è uguale al doppio rettangolo, contenuto dalle parti più ineguali AC , CB ; sarà KH la differenza di quanto il doppio rettangolo delle parti meno ineguali supera il doppio rettangolo delle parti più ineguali; ma fu dimostrato, che il medesimo rettangolo KH è la differenza di quanto i quadrati delle parti più ineguali superano i quadrati delle parti meno ineguali; la differenza dunque di quanto i quadrati delle parti più ineguali superano i quadrati delle parti meno ineguali, è uguale alla differenza, di quanto il doppio rettangolo delle parti meno ineguali supera il doppio rettangolo delle parti più ineguali, ch'era da dimostrarsi.

COROL-

COROLLARIO.


Da quel, che si è detto, è manifesto, che il doppio rettangolo delle parti AC, CB, non è vguale al doppio rettangolo delle parti AD, DB.

THEOREMA XXXI. PROPOSITIONE XLIII.

La retta di due nomi, che si dice Binomio, si diuide ne i suoi nomi in vn sol punto.

Sia la retta composta di due nomi AB, diuisa ne i suoi nomi, nel punto C; cioè, che le parti AC, CB, siano Rationali, e commenfurabili solamente in potenza, come appare nella 37. propositione di questo. Dico che la retta AB non si può diuidere in due altre Rationali, commenfurabili solamente in potenza, in altro punto, fuori del punto C. Diuidasi, s'è possibile, in altri nomi ineguali à i due AC, CB, in qualche punto D, in modo, che le parti AD, DB siano Rationali, e commenfurabili solamente in potenza: è manifesto che la retta AB non è diuisa in C in due parti vguali; perche,

se fosse diuisa in due parti vguali in C, le rette AC;




CB farebbero commenfurabili in lunghezza, ch'è con-

tro all'ipotesi, mentre si è supposto, che le rette AC, CB sono commenfurabili solamente in potenza. Per l'istessa ragione la retta AB non è diuisa in D, in due parti vguali. In oltre, per ipotesi, nomi BD, DA non sono i medesimi, che i nomi AC, CB, cioè le parti BD, DA, non sono vguali alle parti AC, CB; cioè la maggior parte BD non è vguale alla maggior parte AC; ne la minore AD è vguale alla minore CB; faranno le parti AC, CB, ò più ineguali, ò meno ineguali delle parti BD, DA; e per il primo de gli antecedenti Lemma, i quadrati delle parti AC, CB, ò sono maggiori, ò minori de i quadrati delle parti AD, DB. Di più, perche le rette AC, CB, per ipotesi, sono Rationali, i loro quadrati, cioè i quadrati delle rette AC, CB sono Rationali, ed il composto de i quadrati delle rette AC, CB, per lo Scolio alla 34. propositione, sarà Rationale. E perche le rette AD, DB, per la fatta supposizione, sono Rationali, l'aggregato de i quadrati di AD, DB, sarà Rationale: ma il Rationale supera il Rationale (per lo Scolio alla vigesimasettima di questo) per vn Rationale; essendo l'aggregato de i quadrati di AC, CB, ch'è Rationale, ineguale all'aggregato de i quadrati di AD, DB, ch'è Rationale, la differenza fra l'aggregato de i quadrati di AC, CB, e l'aggregato de i quadrati di AD, DB, sarà Rationale: ma la differenza fra l'aggregato de i quadrati di AC, CB, e l'aggregato de quadrati di AD, DB (per il secondo de gli antecedenti Lemma) è vguale alla differenza, ch'è fra il doppio rettangolo delle parti AC, CB, ed il doppio rettan-

a 8. defin.
del 10.

b 22. del 10.
c Coroll. alla
24. del 10.

golo delle parti AD, DB; farà la differenza frà il doppio rettangolo delle parti AC, CB, ed il doppio rettangolo delle parti di AD, DB Rationale. Finalmente, perche il rettangolo delle due AC, CB, è commensurabile al suo doppio, cioè al doppio rettangolo delle due AC, CB, ed il rettangolo delle due Razionali AC, CB, commensurabili solamente in potenza, ^b è Medio; il doppio rettangolo delle due AC, CB, che gli è commensurabile, ^c sarà medio.



Nell'istesso modo si dimostrerà, che il doppio rettangolo delle due AD, DB, è Medio. Di più, per l'antecedente Corollario, il doppio rettangolo delle parti AC, CB, che si disse

d 27. del 10.

esser Medio, non è vguale al doppio rettangolo delle parti AD, DB, che similmente è Medio, e perciò l'vno supera l'altro di qualche quantità: e perche il medio non supera il medio per spatio Rationale, ^a mà lo supera per vno spatio Medio; la differenza frà il doppio rettangolo delle parti AC, CB, ed il doppio rettangolo delle parti AD, DB sarà Medio; fù antecedenemente dimostrata Rationale, farebbe medio, e farebbe Rationale, ch'è impossibile. Non dunque la retta AB, composta di due nomi, si diuide ne i suoi nomi in altro punto, che nel solo punto C, come fù proposto dimostrare.

THEOREMA XXXII. PROPOSITIONE XLIV.

La retta, che si chiama prima Bimediale, si diuide ne i suoi nomi in vn sol punto.


Sia AB la prima Bimediale, diuisa in C in due Medie, commensurabili solamente in potenza, le quali contengano vn rettangolo Rationale, come richiede la propositione 38. di questo. Dico che AB non si diuide in due altre Medie, commensurabili solamente in potenza, che contengano vno spatio Rationale, in altro punto, fuori del punto C. Diuidasi, s'è possibile, in due altre medie, ineguali alle due AC, CB, in qualche punto D, in modo, che le Medie AD, DB siano commensurabili solamente in potenza, e contengano vn rettangolo Rationale; si dimostri, come si fece nell'antecedente propositione, che le parti AC, CB, ò sono più ineguali, ò meno ineguali, delle parti AD, DB, e che l'aggregato de i quadrati delle parti AC, CB, è maggiore, ò minore dell'aggregato de i quadrati di AD, DB. In oltre, perche il rettangolo, contenuto dalle due AC, CB, è commensurabile al suo doppio, cioè al doppio rettangolo delle due AC, CB, ed il rettangolo delle medesime parti AC, CB, per ipotesi, è Rationale; il doppio rettangolo, contenuto dalle due AC, CB, che gli è commensurabile, ^a sarà Rationale. Nell'istesso modo si dimostrerà, che il doppio rettangolo delle due AD, DB, è Rationale: mà vn Rationale supera vn Rationale, ^b per vno spatio Rationale, la differenza frà il doppio rettangolo delle parti AC, CB, ed il doppio rettangolo delle parti AD, DB sarà Rationale: mà, per il secondo Lemma dopo la 42. propositione, la differenza frà il doppio

a 9. defn.
del 10.

b Scol. alla
prop. 27. del
10.

rettan-

rettangolo delle due AC, CB , ed il doppio rettangolo delle due AD, DB , è vguale alla differenza frà l'aggregato de i quadrati di AC, CB ; e l'aggregato de i quadrati di AD, DB , per la qual cosa la differenza frà l'aggregato de i quadrati di AC, CB ; e l'aggregato de i quadrati di AD, DB , farà spatio Rationale. Di nuouo, perche le parti AC, CB , per ipotesi, sono Medie commenfurabili solamente in potenza; faranno i quadrati delle rette AC, CB Medij, frà di loro commenfurabili, e l'aggregato de i quadrati di AC, CB farà commenfurabile all'vno, ed all'altro quadrato: mà l'vno, e l'altro quadrato è Medio; farà l'aggregato de i quadrati di AC, CB , per il Corollario alla 24. proposizione di questo, Medio. Nell'istesso modo si dimostrerà, che l'aggregato de i quadrati di AD, DB , è ancora Medio: e perche il Medio non supera il Medio per vno spatio Rationale, non farà la differenza frà l'aggregato de i quadrati di AC, CB , e l'aggregato de i quadrati di AD, DB spatio Rationale: mà fu dimostrato antecedentemente, che questa differenza è spatio Rationale, farebbe, e non farebbe spatio Rationale, ch'è impossibile. Non dunque la Bimediale AB si diuide ne i suoi nomi in altro punto, che nel punto C , come fu proposto dimostrare.




c 16. del 10.

d 17. del 10.

THEOREMA XXXIII. PROPOSITIONE XLV.

La seconda delle due Medie, cioè la Bimediale seconda, si diuide nelle sue Medie in vn sol punto.

Sia AB la seconda Bimediale, diuisa in C , nelle due Medie AC, CB , commenfurabili solamente in potenza, le quali contengano vn rettangolo Medio, come ricerca la 39. proposizione di questo. Dico che AB non si diuide in due altre medie, commenfurabili solamente in potenza, che contengano vno spatio Medio, in altro punto, fuor che nel punto C . Diuidasi, s'è possibile, in due Medie, diuerse dalle due AC, CB , cioè ineguali alle due AC, CB nel punto D , in modo, che le medie AD, DB siano commenfurabili solamente in potenza, e contengano vno spatio Medio. Si dimostri, come si fece nella 43. proposizione, che i quadrati delle rette AC, CD , ò sono maggiori, ouero minori de i quadrati delle rette AD, DB ; si esponga la Rationale EF , alla quale si applichi il rettangolo EG , vguale al quadrato di AB ; ed alla medesima Rationale EF si applichi il rettangolo EH , vguale all'ag-



a 45. del 1.

S ff

gregato

b 4. del 12.

c 45. del 1

d 2. del 6. &
Scol. alla 16
del 5.e 1. del 6. &
Scol. alla 16.
del 5.

f 16. del 10.

g 23. del 10.

h Coroll. al
la 24. del 16.

K 23. del 10.

l 1. del 6.

m 10. del 10

n 16. del 10.

gregato de i quadrati delle rette AC, CB; essendo i quadrati delle parti AC, CB, col doppio rettangolo delle medesime AC, CB, ^avguali al quadrato di AB, cioè vguale al rettangolo EG; ed i quadrati di AC, CB sono vguale al rettangolo EH, farà il doppio rettangolo delle due AC, CB vguale al rettangolo IG. Nell'istesso modo, se si applica alla Rationale EF ^e il rettangolo EK, vguale all'aggregato de i quadrati di AD, DB; farà il rettangolo LG vguale al doppio rettangolo delle due AD, DB. E perche l'aggregato de i quadrati di AC, CB, è ineguale all'aggregato de i quadrati di AD, DB; perciò il rettangolo EK farà ineguale al rettangolo EH; dal che le rette FK, FH ^d sono ineguali. In oltre, perche i quadrati di AC, CB, per il Lemma alla 39. proposizione di questo, sono maggiori del doppio rettangolo delle due AC, CB; farà EH maggiore di IG: per la qual cosa EH ^e farà maggiore della metà di EG; ed il lato FH farà maggiore della metà di FG. Nell'istesso modo si dimostrerà, che FK è maggiore della metà di FG, ed in conseguenza le parti FH, HG sono ò più ineguali, ò mene ineguali, delle parti FK, KG. Di nuouo, perche le parti AC, CB, per ipotesi, sono Medie, commenfurabili in potenza; i quadrati di AC, CB faranno Medij trà di loro commenfurabili, ed il composto de i quadrati di AC, CB ^f farà commenfurabile tanto al quadrato di AC, quanto al quadrato DC: si disse, che i quadrati di AC, & CB, sono Medij; l'aggregato de quadrati di AC, CB, cioè il rettangolo EH, ch'è commenfurabile ad ogn'vno di loro, per il Corollario alla 24. proposizione di questo, farà ancora Medio. Nell'istessa maniera si prouerà, che il rettangolo EK è Medio; e perche i Medij EH, EK sono applicati alla Rationale EF, li lati FH, FK ^g faranno Rationali, incommenfurabili in lunghezza alla Rationale EF. Similmente, perche il rettangolo, contenuto dalle parti AC, CB, per ipotesi, è Medio, il doppio rettangolo delle medesime parti AC, CB, che gli è commenfurabile, cioè il rettangolo IG, ^h farà ancora Medio. E nell'istesso modo si dimostrerà, che LG è medio; applicati dunque i due rettangoli IG, LG alla rationale LK, cioè IH, oue: o EF, gli altri lati HG, KG ^k faranno Rationali, ed incommenfurabili in lunghezza alla Rationale EF. Si prendano le rette AC, CB, come basi di due rettangoli, ed AC sia altezza comune; farà il quadrato di AC ^m incommenfurabile al rettangolo delle due AC, CB. Hor essendo le due AC, CB, per ipotesi, commenfurabili solamente in potenza, farà il quadrato di AC ⁿ commenfurabile al quadrato di CB; e l'aggregato de i due quadrati di AC, CB ^a farà commenfurabile al quadrato di AC: mà il quadrato di AC è incommenfurabile



bile

bile al rettangolo delle due AC, CB, farà l'aggregato de i quadrati AC, CB $\circ$ incommensurabile al rettangolo delle due AC, CB. E perche il rettangolo delle due AC, CB, è commensurabile al suo doppio, cioè al doppio rettangolo delle due AC, CB; farà l'aggregato de i quadrati AC; CB, cioè EH, $\circ$ incommensurabile al doppio rettangolo delle due AC, CB, cioè al rettangolo IG. Et essendo EH ad IG, $\circ$ come la base FH alla base HG; farà FH incommensurabile ad HG; dal che le due FH, HG sono incommensurabili in lunghezza: mà le rette FH, HG furono dimostrate Rationali, in conseguenza farà FH commensurabile solamente in potenza ad HG. Per la qual cosa tutta la retta FG $\circ$ farà irrationale, e farà quella linea, chiamata Binomio, diuisa ne i suoi nomi nel punto H. Tutto quel, che si è fatto, considerando le parti AC, CB, ed i rettangoli EH, IG; si faccia considerando le parti AD, DB, ed i rettangoli EK, LG; e si dimostrerà, che tutta FG è quella retta, che chiamiamo Binomio, diuisa ne i suoi nomi nel punto K. Per la qual cosa il medesimo binomio farà diuiso ne i suoi nomi nel punto H, ed ancora nel punto K, $\circ$ ch'è contro alla 43. proposizione. Non dunque la Bimediale seconda AB si diuide ne i suoi nomi in altro punto, fuori del punto C, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA XXXIV. PROPOSITIONE XLVI.

La Maggiore si diuide ne i suoi nomi in vn solo punto.

Sia la Maggiore AB, diuisa ne i suoi nomi nel punto C, in modo, che le parti AC, CB, siano incommensurabili in potenza; e l'aggregato de i quadrati di AC, CB, sia Rationale; ed il rettangolo delle medesime sia Medio, come richiede la 40. proposizione di questo.

Dico che AB non si diuide in altro punto ne i nomi, che ritengano le medesime condizioni. Si diuida, se è possibile, nel punto D, in modo, che le due AD, DB, siano incommensurabili in potenza; che l'aggregato de i quadrati di AD, DB, sia Rationale; ed il rettangolo, contenuto dalle due AD, DB, sia Medio. Si dimostrerà, come si fece nella 43. che le parti AC, CB, $\circ$ sono più ineguali, $\circ$ menò ineguali, delle parti AD, DB; e per il 2. Lemma, dopo la propos. 42. di questo, la differenza frà l'aggregato de i quadrati di AC, CB; e l'aggregato de i quadrati di AD, DB, è l'istessa, $\circ$ vguale alla differenza frà il doppio rettangolo delle due AC, CB, ed il doppio rettangolo delle due AD, DB. In oltre, essendo, per ipotesi, l'aggregato de i quadrati di AC, CB, Rationale; e l'aggregato de i quadrati AD, DB, similmente Rationale; farà $\circ$ la loro differenza Rationale: ma si disse, che questa differenza è vguale alla differenza, che è frà il doppio rettangolo delle parti AC, CB, ed il doppio rettangolo delle parti AD, DB: la differenza dunque frà il doppio rettan-



o Scol. alla
14. del 10.

p 14. del 10.
q 4. del 6.

t 10. del 10.

t 37. del 10.

u 43. del 10.

a Scol. alla
27. del 10.

golo delle due AC, CB, ed il doppio rettangolo delle due AD, DB, sarà Rationale. Di nouo, perche il rettangolo delle due AC, CB, è Medio, il doppio rettangolo delle medesime AC, CB, che gli è commensurabile, per il Corollario alla 24. propositione, sarà Medio. E nell'istesso modo si



b 27. del 10.

prouerà, che il doppio rettangolo delle due AD, DB, è Medio. E perche il Medio non supera il Medio^b per vno spatio Rationale, la differenza del doppio rettangolo delle due AC, CB, ed il doppio rettangolo delle due AD, DB, non sarà Rationale; ma antecedentemente tal differenza fu mostrata Rationale; sarà, e non sarà Rationale, ch'è impossibile. Non dunque la Maggiore AB si diuide ne i suoi nomi in altro punto, fuori del punto C, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA XXXV. PROPOSITIONE XLVII.

La linea Potente per il Rationale, e Medio, si diuide, ne i suoi nomi in vn sol punto.

Sia AB la linea Potente per il Rationale, e Medio, diuiua ne i suoi nomi nel punto C; cioè, che le rette AC, CB, siano incommensurabili in potenza; che l'aggregato de i quadrati delle medesime AC, CB, sia Medio; ed il Rettangolo, contenuto da esse, sia Rationale, come ricerca la 41. propof. di questo. Dico che AB non si diuide in altri nomi, che habbiano le medesime condizioni, in altro punto. Diuidasi, s'è possibile, nel punto D, in modo, che le rette AD, DB, siano incommensurabili in potenza; che




l'aggregato de i loro quadrati sia Medio; e che il rettangolo, contenuto dalle due AD, DB, sia Rationale. Si dimostri, come si fece nella 43. propof. di questo, che le due AD, DB sono più, o meno ineguali, delle due AC, CB; e per il 2. Lemma dopo la 42. di questo, la differenza frà l'aggregato de i quadrati di AC, CB, e l'aggregato de i quadrati di AD, DB, è l'istessa, o vguale alla differenza frà il doppio rettangolo delle due AC, CB, ed il doppio rettangolo delle due AD, DB; ma la differenza frà il doppio rettangolo delle due AC, CB, ed il doppio rettangolo delle due AD, DB, per lo Scolio alla 27. propof. è Rationale (stante che ogn'vno di quei rettangoli, per ipotesi, è Rationale) sarà la differenza frà l'aggregato de i quadrati AC, CB, e l'aggregato de i quadrati di AD, DB, Rationale. E perche gli aggregati di quei quadrati, per ipotesi, sono Medij, ed il Medio non supera il Medio^a per spatio Rationale; farebbe tal differenza Rationale, e non sarebbe Rationale, ch'è impossibile. Non dunque la retta AB si diuide ne i suoi nomi in altro punto, fuor che nel punto C, ch'era da dimostrarsi.

a 27. del 10.

THEOREMA XXXVI. PROPOSITIONE XLVIII.

La linea potente per due Medij, si diuide ne i suoi nomi in vn sol punto.

Sia la linea potente per due Medij AB , diuisa ne i suoi nomi nel punto C , in modo, che le rette AC , CB , siano incommensurabili in potenza; che l'aggregato de i loro quadrati sia Medio; e che il rettangolo, contenuto dalle medesime, sia Medio, incommensurabile all'aggregato de i loro quadrati, come ricerca la propof. 41. di questo. Dico che AB non si diuide in altri nomi, delle medesime condizioni, in altro punto, fuori del punto C . Si diuida, s'è possibile nel punto D , in altri nomi, in modo, che le parti AD , DB , siano incommensurabili in potenza; che l'aggregato de i quadrati di AD , DB sia Medio; e che il rettangolo, contenuto dalle medesime parti AD , DB , sia Medio, incommensurabile all'aggregato de i loro quadrati. Si faccia la medesima costruzione della 45. propof. e si dimostri, come iui si fece, che le parti FH , HG , ò sono



più ineguali, ò meno ineguali, delle parti FK , KG . Perche il rettangolo delle due AC , CB , per ipotesi, è Medio, il suo doppio, cioè il doppio rettangolo delle due AC , CB , che gli è commensurabile, per il Corollario alla 24. di questo, sarà Medio: ma, per costruzione, il rettangolo IG è vguale al doppio rettangolo delle due AC , CB ; sarà il rettangolo IG Medio. Nell'istesso modo si prouerà, che il rettangolo LG è Medio. In oltre, perche l'aggregato de i quadrati AC , CB , per ipotesi, è Medio, il rettangolo EH , che, per costruzione, è vguale all'aggregato di quei quadrati, sarà Medio. E nell'istesso modo si dimostrerà, che il rettangolo EK è Medio. E perche i medij EH , IG , sono applicati alla Rationale EF ; i lati FH , HG , ^a faranno Rationali, e faranno incommensurabili in lunghezza alla Rationale EF . E per simile ragione le rette FK , KG , sono Rationali, ed incommensurabili in lunghezza alla Rationale EF . Di più, essendo, per ipotesi, l'aggregato de i quadrati di AC , CB , cioè il rettangolo EH , incommensurabile al rettangolo delle due AC , CB , ^b farà ancora incommensurabile al doppio rettangolo delle medesime AC , CB , cioè al rettangolo IG : ma il rettangolo EH al rettangolo IG ^c è come FH ad HG ; ed EH è dimostrato incommensurabile ad IG ; sarà FH ^d incommensurabile ad HG . Dal che le due FH , HG sono incommensurabili in lunghezza: ma furono dimostrate Rationali; faranno le due FH , HG , ^e commensurabili solamente in potenza. Per la

qual

a 23. del 10.

b Corol. alla

24. del 10.


c 1. del 6.

d 10. del 10.

e 10. defin.

del 10.

f 37. del 10. qual cosa tutta la retta FG ^f sarà irrationale, e sarà quella, che fu chiamata Binomio; la quale è diuisa ne i suoi nomi nel punto H. Tutto quello, che si è fatto, e considerando le parti AC, CB, ed i rettangoli EH, IG, si farà ancora, col considerare le parti AD, DB, ed i rettangoli EK, LG; ed in tal modo si dimostrerà, che FG ^g è quella retta, che si chiama Binomio, e che si diuide ne i suoi nomi nel punto K. Per la qual cosa il Binomio FG si diuide ne i suoi nomi nel punto H, e si diuide ancora nel punto K, eh'è contro alla 43. propositione di questo. Non dunque la retta AB si diuide ne i suoi nomi in altro punto, fuor che nel punto D, come fu proposto dimostrare.



DEFINITIONI SECONDE.

Proposte due rette linee, una Rationale, e l'altra sia Binomio, diuisa ne i suoi nomi, in modo, che il quadrato del maggior nome superi il quadrato del minor nome d'una retta linea, commensurabile in lunghezza al maggior nome.

I.

Se il maggior nome è commensurabile in lunghezza alla Rationale, la composta del maggiore, è minor nome, si chiamerà Primo Binomio.

I I.

Se il minor nome è commensurabile in lunghezza alla Rationale, si chiamerà Secondo Binomio.

I I I.

Se nissuno di quei nomi è commensurabile in lunghezza alla Rationale, il composto di quei due nomi si dirà Terzo Binomio.

Di nuouo, se il quadrato del maggior nome è maggiore del quadrato del minor nome, per il quadrato d'una retta, incommensurabile al maggior nome.

Se

I V.

Se il maggior nome è commensurabile in lunghezza alla Rationale, il composto di quei due nomi si chiamerà Quarto Binomio.

V.

Se il minor nome è commensurabile in lunghezza alla Rationale, si dirà Quinto Binomio.

V I.

E se nissuno di quei nomi è commensurabile in lunghezza all'esposta Rationale, si chiamerà Sesto Binomio.

Procedendo Euclide col suo impareggiabil ordine, dalle cose semplici alle composte, e da queste alle più composte; dopo dimostrata la commensurabilità, ed incommensurabilità delle semplici grandezze frà di loro; fatta la comparatione di queste alla Rationale, e spiegato il nascimento, e natura delle Medie; passa alla generatione delle composte, e dimostra, che sono tutte Irrazionali, disponendo sempre le cose con ordine accomodato alla nostra intelligenza; cioè, dal Rationale sà passaggio al Medio, e dal Medio all'Irrazionale. E perche le rette Irrazionali sono innumerabili, ne sciegliè le più elementari, e le distribuisce in tredici classe; cioè, una semplice, sei per compositione, e sei per sottrattione. Quelle per compositione sono le sei seguenti, cioè. Quelle rette, che separatamente sono composte di due Rationali, commensurabili solamente in potenza, costituiscono il primo genere d'irrationali; ed ogn'una si chiama Binomio, come apparisce nella 37. propos. di questo. Quelle, che separatamente sono composte di due Medie, commensurabili solamente in potenza, le quali contengano vno spatio Rationale, costituiscono il secondo genere; ed ogn'una si chiama prima Bimediale, come nella propositione 38. Similmente quelle, che si compongono di due Medie, commensurabili solamente in potenza, le quali contengono vno spatio Medio, formano il terzo genere; ed ogn'una si chiama seconda Bimediale, come nella 39. propositione. Le rette linee poi, che separatamente sono composte da due linee rette, incommensurabili in potenza, i di cui quadrati, insieme giunti, compongano vn Rationale, ed il rettangolo, contenuto da loro, è Medio; costituiscono il quarto genere; ed ogn'una si chiama Maggiore, come nella 40. propositione. Oltre à ciò, quelle rette linee, che separatamente sono composte di due linee rette, incommensurabili in potenza, che i loro quadrati compongano vn Medio, ed il rettangolo, contenuto da esse, è Medio; costituiscono il quinto genere; ed ogn'una si chiama Potente per vn Rationale, ed vn Medio, come nella 41. propositione. E finalmente quelle rette linee, che separatamente sono composte di due rette, incommensurabili in potenza, che i loro quadrati compongano vn Medio, ed il rettangolo, contenuto da esse, è Medio incommensurabile all'aggregato de i loro quadrati, costituiscono il sesto genere, ed ogn'una si chiama

Poten-

Potente di due Medie, come nella 42. proposizione. Spiegata la generatione di queste sei linee, e douendole comparare alla Rationale, diuide prima il genere de' Binomij in sei linee di due nomi, cioè in sei Binomij, con quest' ordine.

Perche ogni Binomio è composto di due rette Rationali, commensurabili solamente in potenza, queste due rette, che compongono il Binomio, non possono essere ambedue commensurabili in lunghezza alla Rationale; perche se ciò fosse, sarebbero frà di loro commensurabili in lunghezza, ed il loro aggregato sarebbe una linea Rationale, ch'è contro à quel, che si dimostrò nella generatione del Binomio alla proposizione 37: perche è una di quelle, ò l'altra, ò nessuna, sarà commensurabile in lunghezza alla Rationale. E di questi due nomi, che compongono il Binomio, uno sarà maggiore dell'altro: perche, se fossero uguali, sarebbero commensurabili frà di loro in lunghezza, ch'è contro all'ipotesi, mentre si suppongono commensurabili solamente in potenza. Hor essendo ineguali i nomi, che compongono il Binomio, il quadrato del maggior nome supererà il quadrato del minor nome, per il quadrato d'una retta, ò commensurabile, ouero incommensurabile in lunghezza ad esso maggior nome; se il quadrato del maggior nome supera il quadrato del minor nome, per il quadrato d'una retta, commensurabile in lunghezza ad esso maggior nome, ne nascono tre Binomij in questa forma. Se il maggior nome è commensurabile in lunghezza alla Rationale, quello si chiama primo Binomio. Se alla Rationale sarà commensurabile in lunghezza il minor nome, si dirà secondo Binomio. E se nessuno de' nomi è commensurabile in lunghezza alla Rationale, si chiamerà terzo Binomio. In oltre quando il quadrato del maggior nome supera il quadrato del minor nome, per il quadrato d'una retta, incommensurabile in lunghezza al maggior nome, ne nascono tre altri Binomij, in questo modo. Se il maggior nome sarà commensurabile in lunghezza alla Rationale, quello si chiamerà quarto Binomio. Se poi alla Rationale sarà commensurabile in lunghezza il minor nome, si chiamerà quinto Binomio. E se nessuno de' i due nomi sarà commensurabile in lunghezza alla Rationale, quello si chiamerà sesto Binomio. E di questi conseguentemente se ne dimostra la loro generatione.

Quanto poi à gli altri cinque generi di linee sopra nominati, come la prima Bimediale, la seconda Bimediale, la Maggiore &c. non si diuidono in altri generi di linee, come si è fatto del Binomio; stante che tutti i nomi, che compongono queste linee, sono incommensurabili in lunghezza alla Rationale.

PROBLEMA XIII. PROPOSITIOE XLIX.


Ritrouare il Primo Binomio.

Per la seconda parte del Corollario alla 29. proposizione di questo, si trouino due numeri quadrati, come AB, BC, la di cui differenza AC non sia numero quadrato: farà la proportion di AB, à BC, come numero quadrato à numero quadrato; e la proportion di BA ad AC non farà come numero quadrato à numero quadrato. Si esponga poi qualche Rationale D, e si prenda EF, commensurabile in lunghezza alla Rationale D, farà EF Rationale. Si faccia poi, per il Corollario alla 6. propo-

fitione

istione di questo, si come il numero AB al numero AC, così il quadrato di EF al quadrato di FG. Dico che la retta EG sarà vna di quelle linee, che chiamiamo Primo Binomio. Perche il quadrato di EF al quadrato di FG è come il numero AB al numero AC, faranno i quadrati delle due EF, FG, ^a frà di loro commensurabili; dalche le rette EF, FG sono almeno commensurabili in potenza; ma la retta EF fù dimostrata Razionale, sarà FG, ^b che gli è commensurabile in potenza, Razionale. E perche il quadrato di EF al quadrato di FG è come il numero AB al numero AC, ed il numero AB al numero AC, per costruzione, non è come numero quadrato à numero quadrato; ne meno il quadrato di EF al quadrato di FG è come numero quadrato à numero quadrato; per la qual cosa le rette EF, FG, ^c sono incommensurabili in lunghezza;

Ma le medesime EF, FG, furono dimostrate Razionali, commensurabili in potenza; il loro composto, cioè tutta la retta EG, ^d sarà irrazionale, e sarà vna di quelle, che habbiamo chiamata Binomio. Dico che EG è primo Binomio. Perche il quadrato di EF al quadrato di FG è come il numero AB al numero AC, e,



per costruzione, AB è maggiore di AC; sarà il quadrato di EF maggiore del quadrato di FG; dal quadrato di EF se ne detragga il quadrato di FG, per il Lemma alla proposizione decima quarta, e quel, che resta, sia il quadrato della retta H; sarà il quadrato di H la differenza di quanto il quadrato di EF supera il quadrato di FG. In oltre, perche il numero AB al numero AC è come il quadrato di EF al quadrato di FG, per la conuertione della proporzione, l'antecedente AB alla differenza frà l'antecedente AB, ed il conseguente AC, cioè à BC, ^e sarà come il quadrato di EF, ch'è antecedente, alla differenza frà il quadrato di EF, ed il quadrato di FG, ch'è conseguente, cioè al quadrato di H. Hor essendo AB à BC, come il quadrato di EF al quadrato di H; e la proporzione di AB à BC, per costruzione, è come numero quadrato à numero quadrato; sarà il quadrato di EF al quadrato di H, come numero quadrato à numero quadrato; e perciò le rette FE, & H, ^f sono commensurabili in lunghezza. Finalmente, perche il quadrato del maggior nome EF supera il quadrato del minor nome FG, per il quadrato della retta H, commensurabile in lunghezza ad esso maggior nome EF; ed il maggior nome EF, per costruzione, è commensurabile in lunghezza alla Razionale D, per la prima delle antecedenti definizioni, sarà EG quella retta, che si chiama primo Binomio, come fu proposto fare, e dimostrare.

PROBLEMA XIV. PROPOSITIONE L.

Ritrouare il secondo Binomio.

a 6. defin.
del 10.

b 6. del 10.


c 6. defin.
del 10.

d 9. del 10.

e 37. del 10.

Si trouino, come si disse nell'antecedente proposizione, due numeri quadrati, come AB, BC, la di cui differenza AC, non sia numero quadrato. Sia esposta la Rationale D, e sia presa la retta FG, commensurabile in lunghezza alla Rationale D; farà la retta GF ^a Rationale. Si faccia per il Corollario alla sesta proposizione, si come il numero AC al numero AB, così il quadrato di FG al

quadrato di EF. Dico che la retta EG farà il secondo Binomio, che si cerca. Perche il quadrato di GF al quadrato di FE è come il numero A C al numero AB, faranno i quadrati delle due GF, FE, ^b commensurabili; dal che le rette GF, FE sono commensurabili, almeno in potenza:



ma la retta GF è dimostrata Rationale, farà la retta FE, ^c che gli è commensurabile in potenza, Rationale. Di nuouo, perche AC ad AB è come il quadrato di GF al quadrato di FE; ed il numero AC al numero AB non è come numero quadrato à numero quadrato; ne meno il quadrato di GF al quadrato di FE è come numero quadrato à numero quadrato; per la qual cosa le rette GF, FE, ^d sono incommensurabili in lunghezza: furono già dimostrate Razionali, in consequenza le rette GF, FE, sono commensurabili solamente in potenza, ed il loro aggregato, cioè tutta la retta EG, ^e farà irrationale, e farà quella retta, che si chiama Binomio. Dico che la retta EG è quella, che chiamiamo secondo Binomio. Perche il numero AC al numero AB è come il quadrato di GF al quadrato di FE, inuertendo, AB ad AC farà come il quadrato di EF al quadrato di FG: ma BA, per costruzione, è maggiore di AC; farà il quadrato di EF maggiore del quadrato di FG. Dal quadrato di EF, per il Lem. alla 14. propos. di questo, se ne sottragga il quadrato di FG, e quel che resta, sia il quadrato di H; farà il quadrato di H la differenza di quanto il quadrato di EF supera il quadrato di FG. E procedendo come nell' antecedente proposizione, si dimostrerà, che la retta H è commensurabile in lunghezza al maggior nome EF. E perche il quadrato del maggior nome EF supera il quadrato del minor nome FG, per il quadrato della retta H, commensurabile in lunghezza al maggior nome EF; e, per costruzione, il minor nome FG è commensurabile in lunghezza alla Rationale D; per la seconda delle antecedenti definizioni, farà EG quella retta, che si chiama secondo Binomio, come fu proposto fare, e dimostrare.

PROBLEMA XV. PROPOSITIONE LI.

Ritrouare il terzo Binomio.


Per la seconda parte del Corollario alla 29. proposizione di questo, si trouino due numeri quadrati, come AB, BC, la di cui differenza AC non sia numero quadrato; poi si prenda vn altro numero D non quadrato,

che

che non habbia ad AC la proportione di numero quadrato à numero quadrato, il che facilmente s'ottiene, se si fa il numero D maggiore di AC per vna vnità, ò due, al più; cioè se, facendosi D maggiore di AC d'vna vnità, fusse numero quadrato, all' hora s'aggiungerà à D vn'altra vnità; mà se con l'aggiunta d'vna sola vnità non fusse numero quadrato, non farà bisogno aggiungerui altra vnità, perche, in quel caso, il numero D non sarà piano, simile ad AC, e perciò non hauerà la proportione ad AC, come numero quadrato à numero quadrato; ed oltre à ciò, non essendo D numero quadrato, ne meno hauerà la proportione ad AB, come numero quadrato à numero quadrato. Si esponga poi qualunque Razionale E, e, per il Corollario alla sesta propositione, si faccia sì come il numero D al numero AB, così il quadrato della Razionale E al quadrato di FG. Essendo i quadrati di E, ed FG, come numero à numero, ^a saranno fra di loro commensurabili, e perciò le rette E, & FG, sono commensurabili, al meno in potenza: mà la

a 6. del 10.

retta E è posta Razionale, sarà FG, ^b che gli è commensurabile in potenza, Razionale. In oltre, perche il numero D al numero AB non è come numero quadrato à numero quadrato, ed il numero D al numero AB è come il quadrato di E al quadrato di F



b 6. defin. del 10.

G; il quadrato di E al quadrato di F

G non sarà come numero quadrato à numero quadrato, e perciò le rette E, & FG sono incommensurabili in lunghezza. Di nouo, per il Corollario alla sesta propositione, si faccia sì come AB ad AC, così il quadrato di FG al quadrato di GH. Hauendo i quadrati di FG, & GH, la proportione del numero AB al numero AC, ^a saranno fra di loro commensurabili, e le rette FG, GH saranno commensurabili al meno in potenza: mà la retta FG è dimostrata Razionale, sarà la retta GH ancora Razionale. E perche AB ad AC non è come numero quadrato à numero quadrato, ed il quadrato di FG al quadrato di GH è come AB ad AC, il quadrato di FG al quadrato di GH non farà come numero quadrato à numero quadrato; per la qual cosa le rette FG, GH sono incommensurabili in lunghezza: mà furono dimostrate Razionali, in conseguenza sono commensurabili solamente in potenza; e per la 37. propositione di questo, tutta la retta FH è irrationale, ed è quella, che si chiama Binomio. Dico che la retta FH è quella linea, che si chiama terzo Binomio. Perche D ad AB, per costruzione, è come il quadrato della retta E al quadrato di FG, e la proportione di AB ad AC è come quella del quadrato di FG al quadrato di GH; per l'vngualità, farà D ad AC, ^a come il quadrato di E al quadrato di GH; mà D ad AC non ha la proportione, che ha il numero quadrato al numero quadrato; ne meno il quadrato di E al quadrato di GH è come numero quadrato à numero quadrato; per la qual cosa le rette E, & GH, ^b sono incommensurabili in lunghezza. Di più essendo AB ad AC come il quadrato di FG al quadrato di GH, ed il numero AB,

c 9. del 10.

d 6. del 10.

e 6. defin. del 10.

f 9. del 10.


g 12. del 9.

h 9. del 10.

K Corol. la 19. del 5.

19. del 10.

per costruzione, è maggiore di AC; farà il quadrato di FG maggiore del quadrato di GH. Sia il quadrato di I la differenza di quanto il quadrato di FG supera il quadrato di GH. Perchè AB ad AC è come il quadrato di FG al quadrato di GH, per la conversione della proporzion, farà AB à BC ^K come il quadrato di FG alla differenza frà il quadrato di FG, ed il quadrato di GH; cioè al quadrato di I: mà AB à BC è come numero quadrato à numero quadrato; farà il quadrato di FG al quadrato di I come numero quadrato à numero quadrato; e perciò le rette FG, ed I ^L sono commensurabili in lunghezza. Hor perchè il quadrato del maggior nome FG, supera il quadrato del minor nome GH, per il quadrato della retta I, commensurabile in lunghezza ad esso maggior nome FG, e niuna delle due FG, GH, è commensurabile in lunghezza alla Rationale E; farà, per la terza delle antecedenti definizioni, la retta FH quella, che si chiama terzo Binomio ch'era da dimostrarsi.




PROBLEMA XVI. PROPOSITIONE LII.

Ritrouare il quarto Binomio.

19. del 10.

Per lo Scolio alla proposizione 19. si trouino due numeri, come AC, CB in modo, che il loro aggregato AB à niuno di loro sia come numero quadrato à numero quadrato. Si esponga qualche Rationale D, e si prenda la retta EF, commensurabile in lunghezza alla Rationale D; farà la retta EF Rationale, e, procedendosi nel rimanente, come si fece alla 49. proposizione di questo, si prouerà, che tutta la retta EG è Binomio. Dico che EG è quella retta, che si chiama quarto Binomio. Sia il quadrato di H la differenza frà il quadrato di EF, ed il quadrato di FG, e si proua, come si fece nella 49. proposizione, che, per la conversione della proporzion, AB à BC è come il quadrato di EF al quadrato di H: mà, per costruzione, AB à BC non è come numero quadrato à numero quadrato; ne meno il quadrato di EF al quadrato di H è come numero quadrato à numero quadrato: dal che le rette EF, ed H, sono incommensurabili in lunghezza. Hor perchè il quadrato del maggior nome EF supera il quadrato del minor nome FG, per il quadrato della retta H, incommensurabile in lunghezza al maggior nome EF; ed il maggior nome EF è commensurabile in lunghezza alla Rationale D; per la



quar-

quarta delle antecedenti definizioni, la retta EG sarà quella, che si chiama quarto Binomio, come fu proposto fare, e dimostrare.

PROBLEMA XVII. PROPOSITIONE LIII.

Ritrouare il quinto Binomio.

Si trouino i numeri AC, CB, come si disse nell'antecedente propositione, e del rimanente si faccia quanto si disse nella 50. propositione, ponendo FG commensurabile in lunghezza alla Rationale D; e come iui si fece, si dimostri la retta EG essere Binomio. Dico che EG è quella linea, che si chiama quinto Binomio. Si dimostri similmente, come si fece nella 50. propositione, che il quadrato di EF è maggiore del quadrato di FG; sia il quadrato di H la differenza di quanto il quadrato di EF supera il quadrato di FG; e procedendosi, come nella 49. propositione, si prouì, per la conuerfione della proportion, AB à BC essere come il quadrato di EF al quadrato di H.

È perche AB à BC non è come numero quadrato à numero quadrato, ne meno il quadrato di EF al quadrato di H è come numero quadrato à numero quadrato; dal che le rette EF, ed H, ² sono incommensurabili in lunghezza: per la qual cosa il quadrato del maggior EF supera il quadrato del minor nome FG, per il quadrato della retta H, incommensurabile in lunghezza al maggior nome EF; ed il minor nome EF è commensurabile il lunghezza alla Rationale D, e per la quinta delle antecedenti definizioni, sarà EG il quinto Binomio, che si cerca, come fu proposto fare, e dimostrare.

A.....C...B

D.....

E-----F-----G

H-----

29. del 10.

PROBLEMA XVIII. PROPOSITIONE LIV.

Ritrouare il festo Binomio.

Si trouino due numeri, come AC, CB, che non siano piani simili, e niuno sia numero quadrato; ed il loro composto, cioè AB, non sia numero quadrato, ne sia à ciascuno di loro, come numero quadrato à numero quadrato, cioè che AB à BC, ne meno AB ad AC, sia come numero quadrato à numero quadrato; il che si farà per il Corollario 2. all'ultima propositione del 9. Si prenda poi qualunque numero quadrato, per essemplio D, il quale non hauerà ad AC, ne meno ad AB, la proportion,

A.....C...B

D.....

E.....


F-----G-----H

I-----

che

a Coroll. alla 6. del 10.

che hà il numero quadrato al numero quadrato : ciò fatto, si esponga qualunque Rationale E, e si faccia si come il numero D al numero AB, ^a così il quadrato di E al quadrato di FG. Il rimanente si faccia come, nella proposizione 51, e si dimostri, come lui si fece, che le rette E, ed FG sono incommensurabili in lunghezza; e che tutta la retta FH è Binomio. Dico che FH è quella, che si chiama sesto Binomio. Si dimostri similmente, come si fece nella 51. proposizione, che le rette E, & GH sono incommensurabili in lunghezza; e che il quadrato di FG è maggiore del quadrato di GH: sia dunque la differenza di quanto il quadrato di FG supera il quadrato di GH, il quadrato di I. Perché AB ad AC è come il quadrato di FG al quadrato di GH, per la conversione della proportion, sarà AB à BC, come il quadrato di FG al quadrato di I: ma AB à BC non è come numero quadrato à numero quadrato, ne meno il quadrato di FG al quadrato di I è come numero quadrato à numero quadrato: per la qual cosa le rette FG, ed I, ^b sono incommensurabili in lunghezza. E perché il maggior nome FG supera il minor nome GH, per il quadrato della retta I, incommensurabile in lunghezza al maggior nome FG; e nessuno de i nomi FG, GH, è commensurabile in lunghezza alla Rationale E, per la 6. definitione, la retta FG sarà quella, che si chiama sesto Binomio, come fu proposto fare, e dimostrare.



b 9. del 10.

THEOREMA XXXVII. PROPOSITIONE LV.

La retta linea, il di cui quadrato è vguale al rettangolo, contenuto dalla Rationale, e dal primo Binomio, è Irrationale; ed è quella, che chiamiamo Binomio.

Sia espotto il rettangolo AC, contenuto dalla Rationale AB, e dal primo Binomio AD. Dico che la retta linea, il di cui quadrato è vguale al rettangolo AC, è Irrationale, ed è quella, che chiamiamo Binomio. S'intenda diuiso il primo Binomio AD ne i suoi nomi, e sia il maggior nome AE; per la prima delle antecedenti definitioni, le rette AE, ED sono Rationali, e commensurabili solamente in potenza; ed il quadrato di AE supera il quadrato di ED, per il quadrato d'vna retta, commensurabile in lunghezza ad AE; ed oltre à ciò la retta AE sarà commensurabile in lunghezza alla Rationale AB. Si diuida ED ^a in due parti vguali in F, sarà il quadrato di EF ^b la quarta parte del quadrato di ED. Perché il quadrato di AE supera il quadrato di ED, per il quadrato d'vna retta, commensurabile in lunghezza ad AE; se alla retta AE, per il primo, ò secondo Lemma, dopo la 17. proposizione di questo, si applichi il rettangolo GX, vguale al quadrato di EF, cioè


a 10. del 1.
b Scil. alla 4. del 2.

v gual-

vguale al quadrato EV, ch'è la quarta parte del quadrato di ED, in modo, che manchi a compire la retta AE d'vna figura quadrata; per la 18. propof. di questo, la retta AE farà diuifa in qualche punto G, e le parti AG, GE, faranno frà di loro commensurabili in lunghezza, e per il Lemma 2. dopo la 17. propof. il rettangolo, contenuto dalle parti AG, GE, farà vguale al quadrato di EF. Per li punti G, E, F, e si tirino le rette GH, EI, FK, parallele ad AB, ouero CD: poi si faccia il quadrato LM d'vguale al rettangolo AH, e si faccia il quadrato MN vguale al rettangolo GI, e si dispongano questi due quadrati in modo, che i lati OM, MP, facciano vna sola retta linea, come OP. Perche gli angoli OMQ, RMP sono retti, vguualmente s'aggiunga l'angolo QMP, i due angoli OMQ, QMP, faranno vguali à i due angoli QMP, PMR: ma gli angoli OMQ, QMP, e sono vguali à due angoli retti; faranno i due angoli QMP, PMR, vguali à due angoli retti; e perciò le rette QM, MR, costituiranno vna sola retta linea. Si prolunghino le rette NP, NR, fino che concorrano con le rette LO, LQ, continuate come in T, ed S. In oltre, perche OM, come lato del quadrato, è vguale ad MQ, ed il lato RM è vguale ad MP; farà tutta OP vguale ad RQ; ma OP è vguale ad SN, e la retta RQ è vguale ad NT; farà SN vguale ad NT, per la qual cosa il rettangolo ST farà quadrato.

Perche il rettangolo, contenuto dalle parti AG, GE, per costruzione, è vguale al quadrato di EF; farà AG ad EF, u come EF ad EG: ma AG ad EF è come il rettangolo AH^h al rettangolo EK; e la proporzione di FE ad EG^k è come il rettangolo EK al rettangolo GI; farà il rettangolo AH al rettangolo EK, come il medesimo rettangolo EK al rettangolo GI; per la qual cosa il rettangolo EK farà Medio proportionale frà i due rettangoli AH, GI, cioè frà i due quadrati LM, MN: ma frà i due quadrati LM, MN, per il Theor. 5. nello Scolio dopo la prima del 6. libro, è Medio proportionale il rettangolo MT; farà il rettangolo MT vguale al rettangolo EK; e perche il rettangolo MT^m è vguale al rettangolo MS, ed il rettangolo EKⁿ è vguale al rettangolo FC, farà il rettangolo MS vguale al rettangolo FC. Hor essendo il rettangolo AH vguale al quadrato ML, il rettangolo GI vguale al quadrato RP, ed i rettangoli EK, FC, vguali à i rettangoli TM, MS, farà tutto il quadrato ST vguale à tutto il rettangolo AC.

Essendosi dimostrato, che le due AG, GE sono commensurabili in lunghezza, farà tutta AE^o commensurabile in lunghezza tanto ad AG, o



e 31. del 1.
d 14. del 2.

e 13. del 12.
f 14. del 1.

g 17. del 6.

h 1. del 6.
k 1. del 6.

l 11. del 5.

m 49. del 1.
n 36. del 1.

o 16. del 10.

quan-

p Scol. alla
12. del 10.
q 6. defin.
del 10.

14. del 10.

14. del 12.

1. del 6.

10. del 10.


1. del 6.
10. del 10.

17. del 10.

quanto ad EG: ma nel primo Binomio AD il maggior nome AE è commensurabile in lunghezza alla Rationale AB; faranno le due AG, GE, p commensurabili in lunghezza alla medesima Rationale AB: per la qual cosa le due AG, GE, q sono Rationali, ed i rettangoli AH, GI, contenuti dalle Rationali GA, AB, & EG,

GH; per la 20. proposizione di questo, sono Rationali; dal che i quadrati LM, MN, che gli sono vguagli, sono ancora Rationali, e perciò i loro lati OM, MP sono Rationali. In oltre, perche le due AE, AG sono commensurabili in lunghezza, e la retta AE è incommensurabile in lunghezza ad ED; farà AG' incommensurabile in lunghezza ad ED: ma la retta ED è commensurabile in lunghezza alla sua metà EF; farà AG' incommensurabile in lunghezza ad EF. Finalmente, perche il rettangolo AH al rettangolo EK, " è come la base AG alla base EF; essendo le due AG, EF, incommensurabili in lunghezza, farà il rettangolo AH x incommensurabile al rettangolo EK: ma AH è

vguale al quadrato LM, ed il rettangolo EK è vguale ad MT, i rettangoli LM, MT, faranno frà di loro incommensurabili. E perche LM ad MT v è come OM ad MP, le due OM, MP, x faranno incommensurabili in lunghezza; furono dimostrate le due OM, MP, Rationali; in conseguenza le due OM, MP, faranno commensurabili solamente in potenza. Per la qual cosa tutta la retta OP, ouero SN, x farà Irrazionale, e farà quella retta, che chiamiamo Binomio. E perche il quadrato di SN, cioè ST; è vguale al rettangolo AC; la retta dunque SN, il di cui quadrato è vguale al rettangolo AC, contenuto dal primo Binomio AD, e dalla Rationale AB, è Irrazionale, ed è quella, che si chiama Binomio, come fu proposto dimostrare.



THEOREMA XXXVIII. PROPOSITIONE LVI.

La retta linea, il di cui quadrato è vguale al rettangolo, contenuto dalla Rationale, e dal secondo Binomio, è Irrazionale; ed è quella, che si chiama prima Bimediale.


Sia il rettangolo AC contenuto dalla Rationale AB, e dal secondo Binomio AD. Dico che la retta, il di cui quadrato è vguale al rettangolo

golo

golo AC, è Irrazionale; ed è quella, che si chiama prima Bimediale. S'intenda diuiso il secondo Binomio AD ne i suoi nomi AE, ED, e sia AE il maggior nome, e per la seconda delle antecedenti definitioni, le rette AE, ED sono Rationali, e commenfurabili solamente in potenza; ed il quadrato di AE supera il quadrato di ED, per il quadrato d'vna retta, commenfurabile in lunghezza al maggior nome AE; ed, oltre à ciò, il maggior nome AE è commenfurabile in lunghezza alla Rationale AB. Si diuida ED in due parti vguali in F, ed il rimanente si costruifca, come nell'antecedente propofitione, e si dimoftri, come iui si fece, che la retta OP, ouero SN, è quella, il di cui quadrato LN è vguale al rettangolo AC. Dico che OP, ouero SN, è irrazionale, ed è quella, che si chiama prima Bimediale.

Perche il maggior nome AE è incommenfurabile in lunghezza ad ED, ed il minor nome ED è commenfurabile in lunghezza alla Rationale AB; farà AE, incommenfurabile in lunghezza alla Rationale AB. Si dimoftri, come si fece, nell'antecedente propofitione, che le due AG, GE sono commenfurabili in lunghezza; dal che tutta AE e farà cōmenfurabile in lunghezza tanto ad AG, quanto à GE. E perche il maggior nome AE è la Rationale del fecondo Binomio AD, le due AG, GE, e che le sono commenfurabili, faranno Rationali. Hor effendo le due AG, GE, commenfurabili in lunghezza ad AE, e la retta AE, per ipoteff, è incommenfurabile in lunghezza alla Rationale AB; le due AG, GE e faranno incommenfurabili in lunghezza alla medefima Rationale AB; per la qual cofa, tanto le due AB, AG, quanto le due AB, GE sono Rationali, e commenfurabili folamente in potenza, e perciò i rettangoli AH, GI e sono Medij: Mà il quadrato LM è vguale al rettangolo AH; ed il quadrato MN è vguale al rettangolo GI; faranno i quadrati LM, MN Medij, ed i loro lati OM, MP e sono Medie.

Di nuouo, perche il rettangolo AH al rettangolo GI hè come la bafe AG alla bafe GE, e le bafi AG, GE sono commenfurabili in lunghezza, faranno i rettangoli AH, GI e frà di loro commenfurabili, ed i quadrati LM, MN, che gli sono vguali, faranno ancora frà di loro commenfurabili; per la qual cofa i loro lati OM, MP sono commenfurabili, al meno in potenza. In oltre, effendo AE commenfurabile in lunghezza ad AG, e la medefima AE è incommenfurabile in lunghezza al minor nome ED, farà AG¹ incommenfurabile in lunghezza ad ED: mà ED è commenfu-



20. del 1.

13. del 10.

16. del 10.

6. steff.
del 10.

14. del 10.

2. del 10.

22. del 10.

11. del 6.

10. del 10

14. del 10.

m 14. del 10.

n 1. del 6.

o 10. del 10.

p 1. del 6.

q 10. del 10.

r 12. del 10.

t 6. defn.

u 20. del 10.

rabile in lunghezza alla sua metà EF, farà AG ^m incommensurabile ad EF. E perchè il rettangolo AH al rettangolo EK ⁿ è come le basi AG alla base EF, essendo AG incommensurabile in lunghezza ad EF, farà il rettangolo AH ^o incommensurabile al rettangolo EK; ma EK, per quel, che si disse nell'antecedente proposizione, è vguale ad MT, & AH è vguale ad LM; farà LM incommensurabile ad MT; e perchè la proportion di LM ad MT è come p o M ad MP, in conseguenza OM q sarà incommensurabile in lunghezza ad MP; furono dimostrate le due OM, MP, Medie, frà di loro commensurabili in potenza; saranno dunque le due OM, MP, Medie commensurabili solamente in potenza. Finalmente, essendo ED il minor nome del secondo Binomio AD, farà ED per la seconda delle antecedenti definitioni, commensurabile in lunghezza alla Rationale AB, ouero EI, che gli è vguale:


ma ED è commensurabile in lunghezza alla sua metà EF, farà EF ^r commensurabile in lunghezza alla retta EI. E perchè la retta EI è Rationale (stante che è vguale alla Rationale AB) perciò EF ^r farà Rationale; ed il rettangolo EK, contenuto da due Rationali, sarà ^t Rationale: fu dimostrato il rettangolo MT vguale al rettangolo EK, in conseguenza il rettangolo MT farà Rationale. Di più, essendo OM vguale ad MQ, il rettangolo contenuto dalle due OM, MP sarà vguale al rettangolo contenuto dalle due OM, MP: ma il rettangolo contenuto dalle due OM, MP, cioè il rettangolo MT, è Rationale; farà il rettangolo, contenuto dalle due OM, MP Rationale. Per la quale cosa le Medie OM, MP, commensurabili solamente in potenza, contengono vn rettangolo Rationale, e per la 38. di questo, tutta la retta OP, ouero SN, è irrationale, ed è quella, che si chiama prima Bimediale; come fu proposto dimostrare.

THEOREMA XXXIX. PROPOSITIONE LVII.


La retta linea, il di cui quadrato è vguale al rettangolo, contenuto dalla Rationale, e dal terzo Binomio, è irrationale; ed è quella, che si chiama seconda Bimediale.

Sia il rettangolo AC, contenuto dalla Rationale AB, e dal terzo Binomio AD. Dico che la retta, il di cui quadrato è vguale al rettangolo AC, è irrationale, ed è quella, che si chiama seconda Bimediale. S'intenda dinffo il terzo Binomio AD ne i suoi nomi AE, ED, e sia AE

il



il maggior nome, per la terza delle antecedenti definizioni, le due AE, ED faranno Rationali, e commensurabili solamente in potenza; ed il quadrato del maggior nome AE sarà maggiore del quadrato di ED, per il quadrato d'vna retta, commensurabili in lunghezza al maggior nome AE; ed, oltre à ciò, niuna delle due AE, ED sarà commensurabile in lunghezza alla Rationale AB. Si diuida ED in due parti vguale in F, e tutto il rimanente della costruzione si faccia come nella 55. proposizione di questo, e si dimostri come lui si fece, che il quadrato di OP, ouero SN, è vguale al rettangolo AC; e, procedendosi come nell'antecedente proposizione, si dimostrerà, che le rette OM, MP sono Medie, commensurabili solamente in potenza. In oltre, perche ED è commensurabile in lunghezza alla sua metà EF, e, per ipotesi, la medesima ED è incommensurabile in lunghezza alla Rationale AB, ouero EI, sarà EF² incommensurabile in lunghezza ad AB, ouero EI: mà EF, per essere commensurabile alla Rationale ED, è Rationale; le due dunque EF, EI faranno Rationali, e perciò sono commensurabili solamente in potenza; ed il rettangolo EK, contenuto dalle medesime EF, EI sarà Medio, e perciò MT, ch'è vguale ad EK, sarà ancora Medio. E perche il rettangolo MT è contenuto dalle Medie OM, MP (per essere OM vguale ad MQ) il rettangolo dunque contenuto dalle medie OM, MP sarà Medio. Hor, essendo le due OM, MP Medie, commensurabili solamente in potenza, le quali contengono vn rettangolo Medio, farà tutta OP, per la 39. di questo, irrationale; e farà quella, che si chiama seconda Bimediale, ch'era da dimostrarsi.



374. del 10.

375. del 10.

THEOREMA XL. PROPOSITIONE LVIII.

La retta linea, il di cui quadrato è vguale al rettangolo contenuto dalla Rationale, e dal quarto Binomio, è Irrationale; ed è quella, che si chiama Maggiore.


Sia il rettangolo AC, contenuto dalla Rationale AB, e dal quarto Binomio AD. Dico che quella retta, il di cui quadrato è vguale al rettangolo AC, è irrationale, ed è quella, che si chiama Maggiore. Sia diuiso il quarto Binomio AD ne i suoi nomi AE, ED, de' quali AE sia il mag-

Vuu 2

giore,

giore, e per la quarta delle antecedenti definitioni, le due AE, ED, faranno Rationali, commensurabili solamente in potenza, ed il quadrato del maggior nome AE sarà maggiore del quadrato del minor nome ED, per il quadrato d'vna retta, incommensurabile in lunghezza ad esso maggior nome AE; ed oltre à ciò, il maggior nome AE sarà commensurabile in lunghezza alla Rationale AB. Si diuida ED in due parti vguali in F, e si faccia tutto il restante della costruzione, come nella 55. propositione di questo, e per la 19. di questo, faranno le due AG, GE, incommensurabili in lunghezza. Si dimostri, come nella citata 55. propositione si fece, che il quadrato di OP, ouero SN, è vguale al rettangolo AC. Dico che la retta OP è irrationale, ed è quella, che si chiama Maggiore. Perche il rettangolo AH al rettangolo GI^a è come AG à GE, essendo AG incommensurabile in lunghezza ad EG, farà AH^b incommensurabile à GI, e perciò i due quadrati LM, MN, che sono vguali à i rettangoli AH, GI, sono ancora incommensurabili; dal che i loro lati OM, MP sono incommensurabili in potenza. E perche il maggior nome AE è commensurabile in lunghezza alla Rationale AB; farà dunque AE^c Rationale, ed il rettangolo AI, contenuto dalle Rationali AE, AB, ^d farà ancora Rationale: ma il rettangolo AI è vguale all'aggregato de i quadrati LM, MN; farà l'aggregato de i quadrati delle rette OM, MP, Rationale.

In oltre, perche AD, per ipotesi, è quarto Binomio, il minor nome ED sarà incommensurabile in lunghezza alla Rationale AB: ma ED è commensurabile in lunghezza alla sua metà EF; farà EF^e incommensurabile in lunghezza alla Rationale AB. E perche EF, per essere commensurabile alla Rationale ED, ^f è Rationale, farà EF commensurabile solamente in potenza alla Rationale AB, ouero EI: per la qual cosa il rettangolo EK ^g è Medio; fu dimostrato, nella 55. propositione, il rettangolo MT vguale ad EK, in conseguenza MT, ch'è contenuto dalle due OM, MP, è medio. Le due dunque OM, MP, sono incommensurabili in potenza; l'aggregato de i loro quadrati è Rationale; ed il rettangolo, contenuto da esse, è Medio; e per la 40. propositione di questo, tutta la retta OP è Irrationale, ed è quella, che si chiama Maggiore, il che era da dimostrarsi.



a 2. del 6.

b 10. del 10.

c 6. defin.

del 10.

d 20. del 10.

e 14. del 10.

f 6. defin.


del 10.

g 11. del 10.

THEOREMA XLI. PROPOSITIONE LIX.

La retta linea, il di cui quadrato è vguale al rettangolo, contenuto dalla Rationale, e dal quinto Binomio, è Irrazionale; ed è quella, che si chiama potente per il Rationale, e Medio.

Sia il rettangolo AC, contenuto dalla Rationale AB, e dal quinto Binomio AD. Dico che la retta, il di cui quadrato è vguale al rettangolo AC, è irrationale, ed è quella, che si chiama potente per il Rationale, e Medio. S'intenda diuiso il quinto Binomio AD ne i suoi nomi AE, ED, de' quali AE sia il maggiore, e per la 5. delle antecedenti definizioni, le rette AE, ED sono Razionali, commensurabili solamente in potenza, ed il quadrato del maggior nome AE supera il quadrato del minor nome ED, per il quadrato d'vna retta, incommensurabile in lunghezza ad AE; ed, oltre a ciò, il minor nome ED è commensurabile in lunghezza alla Rationale AB. Si diuidi ED in due parti vguali in F, ed il restante della costruzione si faccia come nella 55. proposizione di questo; per la 29. di questo, faranno le due AE, GE incommensurabili in lunghezza. Si dimostri, come nella citata 55. proposizione si fece, che il quadrato di OP è vguale al rettangolo AC. Dico che la retta OP è irrationale, ed è quella, che si chiama potente per il Rationale, e Medio. Si dimostri, come si fece nell'antecedente proposizione, che le rette OM, MP sono incommensurabili in potenza; e perche il maggior nome AE è incommensurabile in lunghezza alla Rationale AB, e la medesima AE è Rationale, per essere vno de i nomi del quinto Binomio AD; perciò le due AE, AB sono commensurabili solamente in potenza, ed il rettangolo AI, contenuto dalle due AE, AB, è commensurabile solamente in potenza, è Medio. Ma il rettangolo AI, per costruzione, è vguale all'aggregato de i quadrati LM, MN; farà l'aggregato de i quadrati delle due OM, MP, Medio. In oltre, perche ED è il minor nome del quinto Binomio, perciò è commensurabile alla Rationale AB, ed in conseguenza è Rationale; farà la sua metà EF, che gli è commensurabile, Rationale, e commensurabile in lunghezza alla Rationale AB: per la qual cosa il rettangolo EK, ch'è contenuto dalle



a. d. c. 10.

b. d. c. 10.

Ratio-

c 10. del 10.


Razionali EF, EI, e commensurabili in lunghezza, sarà Razionale. Ma EK è vguale al rettangolo MT, contenuto dalle due OM, MP; sarà il rettangolo contenuto dalle due OM, MP, Razionale. Saranno dunque le rette OM, MP, incommensurabili in potenza; l'aggregato de i loro quadrati LM, NN, è Medio; ed il rettangolo, contenuto da esse, è Razionale; e per la 41. proposizione di questo, tutta la retta OP, ouero SN, è irrazionale, ed è quella, che si chiama Potente per il Razionale, e Medio, ch'era da dimostrarli.

THEOREMA XLII. PROPOSITIONE LX.

La retta linea, il di cui quadrato è vguale al rettangolo, contenuto dalla Razionale, e dal sesto Binomio, è Irrazionale; ed è quella, che si chiama potente di due Medij.

Sia il rettangolo AC, contenuto dalla Razionale AB, e dal sesto Binomio AD. Dico che quella retta, il di cui quadrato è vguale al rettangolo AC, è irrazionale, ed è quella, che si chiama Potente di due Medij. S'intenda diuiso il sesto Binomio AD ne i suoi nomi AE, ED, e sia AE il maggior nome, per la sesta delle antecedenti definizioni, le due AE, ED, sono Razionali, e commensurabili solamente in potenza; ed il quadrato del maggior nome AE supera il quadrato del minor nome ED; per il quadrato d'vna retta, incommensurabile in lunghezza al maggior nome AE; ed, oltre à ciò, niuna delle due AE, ED, è commensurabile in lunghezza alla Razionale AB. Si diuida ED in due parti vguali in F, ed il rimanente della costruzione si faccia come nella 55. proposizione di questo, e per la 19. proposizione di questo, le due AG, GE sono incommensurabili in lunghezza. Si dimostri poi, come nella citata 55. proposizione, che il quadrato di OP è vguale al rettangolo AC. Dico che la retta OP è irrazionale, ed è quella, che si chiama potente per due Medij. Si dimostri, come si fece nella 58. proposizione, che le rette OM, MP sono incommensurabili in potenza; e si dimostri, come nell'antecedente proposizione, che l'aggregato de i quadrati LM, MN, è Medio: similmente si dimostri, come nella 58. proposizione, che il rettangolo MT, contenuto dalle due OM, MP, è Medio. Finalmente perche ED è commensurabile in lunghezza alla sua metà EF,

a 10. del 10.




e la

e la medesima ED è incommensurabile in lunghezza ad AE; sarà EF^b incommensurabile in lunghezza ad AE. E perchè il rettangolo AI al rettangolo EK^c è come AE ad EF, essendo le due AE, EF, incommensurabili in lunghezza, sarà AI^d incommensurabile ad EK; ma il rettangolo AI è uguale all'aggregato de i quadrati LM, MN, ed il rettangolo EK è uguale al rettangolo MT; sarà l'aggregato de i quadrati di OM, MP, incommensurabile al rettangolo MT, ch'è contenuto dalle medesime OM, MP. Le rette dunque OM, MP sono commensurabili solamente in potenza; l'aggregato de i loro quadrati LM, MN, è Medio; ed il rettangolo MT, contenuto dalle medesime rette OM, MP, è Medio, incommensurabile all'aggregato de i loro quadrati LM, MN; e per la 42. proposizione di questo, la retta OP è irrazionale, ed è quella, che si chiama potente per due Medij, come fu proposto dimostrare.

THEOREMA XLIII. PROPOSITIONE LXI.

Applicando il quadrato del Binomio alla Rationale, l'altro lato, che ne risulta, è primo Binomio.

Sia il Binomio AB, diviso ne i suoi nomi AC, CB, e sia AC il maggior nome: sia esposta la rationale DE, alla quale sia applicato il rettangolo DF, uguale al quadrato del Binomio AB, e ne risulti il lato DG. Dico che la retta DG è quella, che si chiama primo Binomio. Si applichi di nuovo alla Rationale DE il rettangolo DH, uguale al quadrato del maggior nome AC; & alla retta HI si applichi il rettangolo IK, uguale al quadrato del minor nome CB: e perchè il quadrato di AB^e è uguale a i quadrati delle due AC, CB, col doppio rettangolo delle medesime AC, CB, essendo



DK uguale a i quadrati delle due AC, CB, sarà il rimanente LF uguale al doppio rettangolo, contenuto dalle due AC, CB. Si divida LG^d in due parti uguali in M dal punto M e si tiri la retta MN, parallela ad ED, ouero GF; i due rettangoli LN, MF, faranno fra di loro uguali, ed ogn'vno sarà uguale al rettangolo, contenuto dalle due AC, CB. Perchè AB, per ipotesi, è binomio, le parti AC, CB, saranno Rationali, e commensurabili solamente in potenza: per il che i quadrati di AC, CB, sono Rationali, e fra loro commensurabili; e l'aggregato de i quadrati di AC, CB, sarà commensurabile, tanto al quadrato di AC, quanto al quadrato di CB: ma i quadrati di AC, & CB, sono Rationali, sarà il loro composto, cioè l'aggregato de i quadrati di AC, CB, Rationale: ma l'aggregato de i detti quadrati è uguale al rettangolo DK; sarà il rettangolo DK Rationale; il quale, applicato alla Rationale DE, produce

l'altro

b 23. del 10.

c 2. del 6.

d 20. del 10.

a 45. del 1.

b 45. del 1.

c 4. del 2.

d 10. del 2.

e 32. del 1.

f 36. del 1.

g 37. del 10.

h 16. del 10.

K 9. definiz. del 10.

l 21. del 10.

m 27. del 10

n Corollalla
24. del 10.

• 23. del 10

p 13. del 10.

q 1. del 6.

r 17. del 6.

t 11. del 6.


u 10. del 10

x 1. del 6.

l'altro lato DL Rationale, e commensurabile in lunghezza alla Rationale DE. In oltre, perche le due AC, CB, sono Razionali, e commensurabili solamente in potenza, farà il rettangolo, contenuto da AC, CB, Medio; ma questo è commensurabile al suo doppio, il doppio rettangolo dunque, contenuto dalle due AC, CB, cioè il rettangolo LF, ⁿ farà Medio; e perciò, applicato il Medio LF alla Rationale DE, ouero LK, fa l'altro lato LG ^o Rationale, ed incommensurabile in lunghezza alla Rationale LK, ouero DE: fu dimostrata DL commensurabile in lunghezza alla Rationale DE, le due DL, LG, ^v saranno incommensurabili in lunghezza; ed haueremo le due DL, LG, Razionali, commensurabili solamente in potenza, e per la 37. di questo, tutta la retta DG farà Binomio. Dico che DG è primo Binomio.

Perche il rettangolo, contenuto dalle parti AC, CB, per l'ultimo Corollalla 1. del sesto, è Medio proportionale fra i quadrati delle due AC, CB; ed i quadrati delle medesime AC, CB, sono vguali, per costruzione, à i rettangoli DH, IK; farà il rettangolo delle due AC, CB, cioè il rettangolo LN, medio proportionale fra i due rettangoli DH, IK; dal che i rettangoli DH, LN, IK sono continui proporzionali: Ma i rettangoli DH, LN, IK ^q sono come le basi DI, LM, IL; faranno le rette DI, LM, IL, continue proporzionali; e la retta LM sarà media proportionale fra le due DI, IL: per la qual cosa il rettangolo, contenuto dalle due DI, IL, ^r è vguale al quadrato della media LM. In oltre, perche le rette

AC, CB, sono commensurabili in potenza, il quadrato di AC farà commensurabile al quadrato di CB; ed i rettangoli DH, IK, che sono vguali à quei quadrati, sono ancora fra di loro commensurabili: ma i rettangoli DH, IK ^t sono fra loro come le basi DI, IL; faranno le rette DI, IL, ^u commensurabili in lunghezza. Di nouo, perche i quadrati delle due AC, CB, per il Lemma dopo la 39. proposizione di questo, sono maggiori del doppio rettangolo, contenuto dalle medesime AC, CB, ed i quadrati delle due AC, CB, sono vguali al rettangolo DK, e similmente il doppio rettangolo delle due AC, CB, è vguale al rettangolo LF; in conseguenza il rettangolo DK farà maggiore del rettangolo LM: Ma i rettangoli DK, LF, ^x sono come le basi DL, LG; farà la base DL maggiore della base LG. Hor essendo DL maggiore di LG, ed il rettangolo contenuto dalle due DI, IL, per quel, che si è dimostrato, è vguale al quadrato di LM, cioè è vguale alla quarta parte del quadrato della minore LG; farà applicato alla maggiore LD il rettangolo contenuto dalle due DI, IL, vguale al quadrato di LM, cioè alla quarta parte del quadrato di LG, e manca à compire la linea DL per vna figura quadrata, e la retta DL da tale applicatione è diuisa in 1, nelle parti DI, IL, le quali, per quel, che si è dimostrato, sono commensura-




bili

bili in lunghezza; per la 18. di questo, il quadrato della maggiore DL supera il quadrato della minore LG, per il quadrato d'una retta, commensurabile in lunghezza alla maggiore DL: e perchè la maggiore DL, per quel, che si è dimostrato nella prima parte, è commensurabile in lunghezza alla Rationale DE, per la prima delle antecedenti definizioni, la retta DG sarà primo Binomio, come fu proposto dimostrare.

THEOREMA XLIV. PROPOSITIONE LXII.

Applicando il quadrato della prima bimediale alla Rationale, il lato, che ne risulta, è secondo Binomio.

Sia la prima Bimediale AB , diuifane i suoi nomi, ed il maggior nome sia AC ; si applichi alla Rationale DE il rettangolo DF , vguale al quadrato di AB , e ne rifulti il lato DG . Dico che DG è secondo binomio. Si profeguia la costruzione dell'antecedente proposizione, in modo, che i due rettangoli DH, IK siano vguali a i quadrati delle rette AC, CB , ed ogn'vno de i rettangoli LN, MF , vguale al rettangolo, contenuto dalle due AC, CB . Perche le due AC ,



245. del i

b 17 del 1o.

c 9.defin.
del 19.

d a l d e t i o .

e'it.del 10.

f 37. del 10.

una retta, commensurabile in lunghezza al maggior nome DL. Hor se il quadrato del maggior nome DL supera il quadrato del minor nome LG, per il quadrato d'una retta, commensurabile in lunghezza al maggior nome DL, e si è dimostrato, che il minor nome LG è commensurabile in lunghezza alla Rationale DE, per la seconda delle antecedenti definizioni, farà la retta DG quella, che si chiama secondo Binomio; il che era da dimostrarsi.


THEOREMA XLV. PROPOSITIONE LXIII.

Applicando il quadrato della seconda Bimediale alla Rationale, il lato, che ne risulta, è terzo Binomio.

Sia la seconda Bimediale AB, il di cui maggior nome AC, ed il minore CB; ed alla Rationale DE^a sia applicato il rettangolo DF, uguale al quadrato di AB, e ne risulti il lato DG. Dico che la retta DG è quella, che si chiama terzo Binomio. Sia fatta tutta la costruzione, come nella 61. propos. Perche i nomi AC, CB, ^b che compongono la seconda Bimediale, sono Medie, commensurabili solamente in potenza, le quali conengono un rettangolo Medio, faranno i quadrati delle rette AC, CB, cioè i rettangoli DH, IK, che gli sono uguali, commensurabili, e Medij; e tutto il rettangolo DK^c

farà commensurabile al medio DH, ed ancora al medio IK: per la qual cosa il rettangolo DK^d sarà Medio, il quale, essendo applicato alla Rationale DE, l'altro lato DL^e sarà Rationale, ed incommensurabile in lunghezza alla Rationale DE. In oltre, perche il rettangolo, contenuto dalle due AC, CB, per ipotesi, è Medio, il doppio rettangolo delle medesime AC, CB, ^f che gli è commensurabile, sarà Medio: ma il

doppio rettangolo delle due AC, CB, è uguale al rettangolo LF; farà il rettangolo LF Medio; il quale, applicato alla Rationale LK, cioè DE, ^g farà il lato LG^h Rationale, ed incommensurabile in lunghezza alla Rationale LK, ouero DE. Prese AC, CB, come basi di due rettangoli, e sia AC altezza comune, farà il quadrato di AC al rettangolo contenuto dalle parti AC, CB, ⁱ come AC a CB: ma AC è incommensurabile in lunghezza a CB, farà il quadrato di AC^k incommensurabile al rettangolo delle due AC, CB. Similmente perche i quadrati delle due AC, CB sono commensurabili, il loro aggregato, sarà commensurabile al quadrato di AC: ma il quadrato di AC è incommensurabile al rettangolo delle due AC, CB, farà l'aggregato de i quadrati di AC, CB, ^m incommensurabile al rettangolo delle due AC, CB. E perche il rettangolo contenuto dalle due AC, CB, è commensurabile al suo doppio, sarà l'aggregato de i



qua-

quadrati delle rette AC, CB, " incommensurabile al doppio rettangolo delle medesime AC, CB; fu fatto, per costruzione, il rettangolo DK uguale all'aggregato de i quadrati di AC, CB, ed il rettangolo LF è uguale al doppio rettangolo delle due AC, CB; sarà il rettangolo DK incommensurabile al rettangolo LF; mà i rettangoli DK, LF^o sono come le basi DL, LG; le rette dunque DL, LG^o faranno incommensurabili in lunghezza; le quali essendo state dimostrate Rationali, saranno Rationali, e commensurabili solamente in potenza, e per la 37. proposizione di questo, tutta la retta DG sarà quella, che si chiama Binomio. Dico che è il terzo Binomio. Si dimostri, come si fece nella proposizione 61. di questo, che DL è il maggior nome, il di cui quadrato è maggiore del quadrato di LG, per il quadrato d'una retta, commensurabile in lunghezza ad esso maggior nome DL. Hor se il quadrato del maggior nome DL supera il quadrato del minore LG, per il quadrato d'una retta, commensurabile in lunghezza al maggior nome DL, e nessuna di loro, per quel, che si è dimostrato, è commensurabile in lunghezza alla Rationale DE; per la terza delle antecedenti definitioni, la retta DG sarà quella, che si chiama terzo Binomio, come fu proposto dimostrare.

15. del 15.


o 1. del 16.
o 10. del 10.

THEOREMA XLVI. PROPOSITIONE LXIV.

Applicando il quadrato della Maggiore alla Rationale, il lato, che ne risulta, è quarto Binomio.

Sia quella retta, che si chiama Maggiore, AB , il di cui maggior nome sia AC , ed alla Razionale DE sia applicato il rettangolo DF , uguale al quadrato di AB , e ne risulti il lato DG . Dico che la retta DG è quella, che si chiama quarto Bino-

245. del 1.



DE due AC, CB, e il rettangolo DK Razionale. E perché il rettangolo LN è uguale al rettangolo delle due AC, CB, farà il rettangolo LN medio, & il doppio LF, ch'è commensurabile ad LN, ^b farà ancora Medio. Hor essendo applicato il Rettangolo DK alla Rationale DE, l'altro lato DL è farà Razionale, e farà commensurabile in lunghezza alla Rationale DE. Similmente, essendo il Medio LF applicato alla Rationale LK, ouero DE, l'altro lato LG ^a farà Razionale, ed incommensurabile in lunghezza alla Rationale LK,

b. Corol. al.
la 24. del 10.
c. 21. del 10.
d. 23. del 10.

e 13. del 10.

f 37. del 10.

g 1. del 6.

h 10. del 10.


oucro DE. Et effendo DL commensurabile in lunghezza alla Rationale DE, e la retta LG è incommensurabile in lunghezza alla medesima DE, le due DL, LG e faranno incommensurabili in lunghezza: ma furono dimostrate Rationali, in conseguenza sono Rationali, e commensurabili solamente in potenza; e perciò tutta la retta DG ^f sarà Binomio. Dico che è il quarto Binomio. Si dimostri, come si fece nella 61. propos. di questo, che DL è maggiore di LG; e che il rettangolo contenuto dalle parti DI, IL, è vguale al quadrato di LM, cioè alla quarta parte del quadrato di LG. Si considerino i nomi AC, CB, i quali sono incommensurabili in potenza, e perciò i loro quadrati sono incommensurabili frà di loro, ed i rettangoli DH, IK, che sono vguali à quei quadrati, faranno frà di loro incommensurabili: ma i rettangoli DH, IK, ^g sono come le basi DI, IL; faranno le rette DI, IL, ^h incommensurabili in lunghezza. Hor effendo il rettangolo delle due DI, IL, vguale al quadrato di LM, sarà applicato ad LD il rettangolo delle due DI, IL, vguale alla quarta parte del quadrato di LG, e manca à compire la retta DL, per vna figura quadrata, risultandone per tale applicatione le parti DI, IL, per quel, che si è dimostrato, incommensurabili in lunghezza, e per la 19. di questo, il quadrato di DL supera il quadrato di LG, per il quadrato d'vna retta, incommensurabile in lunghezza al maggior nome DL. E perche il maggior nome DL è stato dimostrato commensurabile in lunghezza alla Rationale DE, per la 4. delle antecedenti definizioni, tutta la retta DG farà quella, che si chiama quarto Binomio, come fu proposto dimostrare.

THEOREMA XLVII. PROPOSITIONE LXV.

Applicando il quadrato della potente d'vn Rationale, e Medio, alla Rationale, il lato, che ne risulta, è il quinto Binomio.

a 45. del 1.

Sia la retta potente d'vn Rationale, e Medio, la notata AB, ed il maggior nome sia AC, ed alla Rationale DE a sia applicato il rettangolo DF, vguale al quadrato di AB, e ne risulti il lato DG. Dico che la retta DG è quella, che si chiama quinto Binomio. Sia fatta la medesima costruzione della propos. 61. Perche AB è supposta la linea potente per il Rationale, e Medio, per la 41. di questo, le rette AC, CB sono incommensurabili in potenza; e l'aggregato de i quadrati delle rette AC, CB, è Medio; ed il rettangolo, contenuto dalle medesime AC, CB, è Rationale: ma, per costruzione, il rettangolo DK è vguale all'aggregato de i quadrati di AC, CB; farà il



rettan-

rettangolo DK Medio. E perche il rettangolo LN è vguale al rettangolo delle medefime AC, CB; farà il rettangolo LN Rationale, il di cui doppio LF farà Rationale. Hor effendo il medio DK applicato alla Rationale DE, l'altro lato DL^b farà Rationale, e farà incommensurabile in lunghezza alla Rationale DE. Similmente, effendo il Rationale LF applicato alla Rationale LK, cioè DE, l'altro lato LG^c farà Rationale, e commensurabile in lunghezza alla Rationale LK, ouero DE; e perche DL è incommensurabile in lunghezza alla Rationale DE, e la retta LG è commensurabile in lunghezza alla medefima DE; le due DL, LG^d faranno incommensurabili in lunghezza: ma le habbiamo dimoftrate Rationali, faranno dunque le due DL, LG Rationali, e commensurabili folamente in potenza; e per la 37. di queſto, la retta DG è Binomio. Dico che è quinto Binomio. Si dimoftri, come ſi fece nella 61. propoſitione, che il rettangolo, contenuto dalle due DL, LG, è vguale alla quarta parte del quadrato di LG; e ſi moſtri, come ſi fece nell'antecedente propoſitione, che DL è il maggior nome, il di cui quadrato è maggiore del quadrato del minor nome LG, per il quadrato d'vna retta, incommensurabile al maggior nome DL: e perche il minor nome LG è dimoftrato commensurabile in lunghezza alla Rationale DE, per la quinta delle antecedenti definitioni, la retta DG farà quella, che ſi chiama quinto Binomio, come fù propoſto dimoftrare.

b 23. del 10.

c 21. del 10.


d 13. del 10.

THEOREMA XLVIII. PROPOSITIONE LXVI.

Applicando alla Rationale la potente per due Medij, il lato, che ne riſulta, è il ſeſto Binomio.

Sia AB la potente per due Medij, il di cui maggior nome ſia AC; alla Rationale DE^a ſi applichi il rettangolo DF vguale al quadrato di AB, e ne riſulti il lato DG. Dico che la retta DG è quella, che ſi chiama ſeſto Binomio. Sia fatta la coſtruzione della 61. propoſitione di queſto. Perche AB è la potente per due Medij, per la 42. di queſto, le rette AC, CB ſono incommensurabili in potenza, e l'aggregato de i quadrati delle rette AC, CB, è Medio; ed il rettangolo contenuto dalle medefime AC, CB, è Medio, incommensurabile all'aggregato de i detti quadrati: e perche il rettangolo DK è vguale all'aggregato de i quadrati di AC, CB, farà il rettangolo DK Medio. Similmente effendo il rettangolo LN vguale al rettangolo delle due AC, CB, farà il rettangolo LN Medio, ed il ſuo doppio LF^b farà ancora Medio. Hor effendo i Medij DK, LF applicati alla Rationale DE, ouero LK, i lati DL, LG^c faranno Rationali, e faranno in-

a 45. del 10.

b Coroll. at
la 24. del 10
c 23. del 10


com-

d 13. del 10.

c 2. del 6.

f 10. del 10.


commensurabili alla Rationale DE, ouero LK. In oltre, perche l'aggregato de i quadrati di AC, CB, per ipotesi, è incommensurabile al rettangolo delle medesime AC, CB, ed il rettangolo delle due AC, CB, è commensurabile al suo doppio; farà l'aggregato de i quadrati di AC, CB, cioè il rettangolo DK, ^d incommensurabile al doppio rettangolo delle due AC, CB, cioè al rettangolo LF: ma i rettangoli DK, LF: sono come le basi DL, LG; le rette dunque DL, LG ^f faranno incommensurabili in lunghezza: furono le medesime rette DL, LG mostrate Rationali, in conseguenza le rette DL, LG faranno Rationali, e commensurabili solamente in potenza; e, per la 37. di questo, la retta DG sarà quella, che si chiama Binomio. Si dimostri, come si fece nell'antecedente propositione che il maggior nome è DL, e che il quadrato di DL è maggiore del quadrato del minor nome LG, per il quadrato della retta incommensurabile in lunghezza al maggior nome DLE perche niuna delle rette DL, LG, per quel, che si è dimostrato, è commensurabile in lunghezza alla Rationale DE; per la sesta delle antecedenti definizioni, la retta DG è quella, che si chiama sexto Binomio, il che era da dimostrarsi.



THEOREMA XLIX. PROPOSITIONE LXVII.

La retta linea, ch'è commensurabile in lunghezza al Binomio, ancor essa è Binomio del medesimo ordine.

Sia qualunque Binomio AB, diviso ne i suoi nomi AC, CB, e sia AC il maggior nome, ed il minore CB, e la retta DE sia commensurabile al Binomio AB. Dico che DE è Binomio del medesimo ordine; cioè se AB è primo Binomio, ancora D E sarà primo; se AB è secondo Binomio, sarà ancora DE secondo, &c. Si faccia ^a si come tutta AB à tutta DE, così la parte AC alla parte DF; sarà l'avanzo CB ^b all'avanzo FE come tutta AB à tutta DE. Hor essendo AB à DE come AC à DF, inuertendo, DE ad AB e farà come DF ad AC, ed il restante FE al rimanente CB ^d farà come tutta DE à tutta AB; fù supposta DE commensurabile in lunghezza ad AB, farà DF e commensurabile in lunghezza ad AC, e farà FE commensurabile in lunghezza à CB: e perche i nomi AC, CB del Binomio AB, ^f sono Rationali, le rette ancora DF, FE, ^g che gli sono commensurabili, sono Rationali. Di nuouo perche AC à DF è come AB à DE, ed è AB à DE



a 12. d. 16.

b 10. del 5.

c Corollari

la 4. del 5.

d 15. del 5.

e 10. del 10.

f 37. del 10.

g 6. de 9o.

del 10.

come

come CB ad FE, sarà h AC à DF come CB ad FE; e permutando, AC à CB k farà come DF ad FE: mà le due AC, CB sono commenfurabili folamente in potenza, le due DF, FE l faranno ancora commenfurabili folamente in potenza. Per la qual cofa le due DF, FE m sono Rationali, e commenfurabili folamente in potenza, e per la 37. propofitione di quefto, la retta DE farà Binomio. Dico che DE è Binomio del medefimo ordine del Binomio AB.

Perche AC è il maggior nome del Binomio AB, il quadrato di AC supererà il quadrato di CB, per il quadrato d'vna retta, la quale ò farà commenfurabile, ò incommenfurabile in lunghezza ad AC. Sia nel primo luogo commenfurabile ad AC. Perche AC à CB è come DF ad FE, ed il quadrato di AC supera il quadrato di CB, per il quadrato d'vna retta cōmenfurabile in lunghezza ad AC, per la 15. propofitione di quefto, il quadrato di DF supererà il quadrato di FE, per il quadrato d'vna retta commenfurabile in lunghezza alla retta DF: e perche le rette AC, DF sono commenfurabili in lunghezza, se AC farà commenfurabile in lunghezza à qualche efpofta Rationale, in modo, che AB fia primo Binomio, farà ancora DF o commenfurabile in lunghezza alla medefima Rationale, e per la prima delle feconde definitioni di quefto, la retta DE farà primo Binomio, e perciò del medefimo ordine del Binomio AB. Sia poi CB commenfurabile in lunghezza all'efpofta Rationale, in modo, che AB fia fecondo Binomio. Perche FE è commenfurabile in lunghezza à CB, farà FE o' commenfurabile in lunghezza alla medefima Rationale, e per la definitione del fecondo Binomio, farà la retta DE fecondo Binomio, cioè del medefimo ordine del Binomio AB. Se finalmente ne AC, ne meno CB, è commenfurabile in lunghezza all'efpofta Rationale, in modo, che AB fia terzo Binomio, effendo le due DF, FE commenfurabili in lunghezza alle due AC, CB, neffuna delle due DF, FE p farà commenfurabile in lunghezza all'efpofta Rationale, e per la terza delle antecedenti definitioni, la retta DE farà terzo Binomio, cioè farà del medefimo ordine del Binomio AB.

In oltre se il quadrato di AC supera il quadrato di CB, per il quadrato d'vna retta, incommenfurabile in lunghezza alla retta AC, il quadrato di DF supererà il quadrato di FE, q per il quadrato d'vna retta incommenfurabile in lunghezza alla retta DF; e, procedendofi nel medefimo modo di prima, fi prouerà, che DE è Binomio quarto, ò quinto, ò fefto, fecondo che AB farà quarto, ò quinto, ò fefto Binomio. Per la qual cofa la retta, commenfurabile in lunghezza al Binomio, è Binomio del medefimo ordine, come fu propofto dimoftrare.

THEOREMA L. PROPOSITIONE LXVIII.

Quella retta, ch'è commenfurabile in lunghezza alla bimediale, è ancor effa Bimediale, & è del medefimo ordine.

Sia AB qualunque delle Bimediali, diuifa ne i fuoi nomi AC, CB, ed

h 11. del 5.
K 16. del 5.
l 10. del 10.
m 6. defin.
del 10.


n 12. del 10.

o 12. del 10.

p 12. del 10.

q 15. del 10.

- a 12. del 6. il maggior nome sia AC; e sia DE commensurabile in lunghezza ad AB. Dico che la retta DE è ancora Bimediale, ed è del medesimo ordine della Bimediale AB. Si faccia sì come tutta AB à tutta DE, ^a così la parte AC alla parte DF, ed inuertendo, sarà tutta DE à tutta
- b Coroll. alla 4. del 5. AB ^b come la parte DF alla parte AC; dal che il restante FE al rimanente CB ^c sarà come tutta DE à tutta.
- c 19. del 5. AB, cioè come DF ad AC: ma DE è posta commensurabile in lunghezza ad AB; sarà FE ^d commensurabile in in lunghezza à CB: ed ancora DF sarà commensurabile in lunghezza ad AC; ma le due AC, CB, sono medie, faranno le due DF, FE, ^e che gli sono commensurabili, ancora Medie. In oltre perchè AC à DF è come CB ad FE, permutando, AC à CB ^f sarà come DF ad FE: ma le due AC, CB ^g sono commensurabili solamente in potenza, faranno ancora le due DF, FE, ^h commensurabili solamente in potenza. Per la qual cosa le rette DF, FE, sono Medie, commensurabili solamente in potenza, e per la 38. proposizione di questo, la retta DE è quella, che si chiama Bimediale. Dico che la Bimediale DE è del medesimo ordine della Bimediale AB. Presc le due AC, CB, come basi di due rettangoli, de' quali AC sia altezza comune, sarà il quadrato di AC al rettangolo contenuto dalle due AC, CB, ^k come la base AC alla base CB. E nell'istesso modo si proverà, che il quadrato di DF al rettangolo delle due DF, FE, ^l è come DF ad FE; ma AC à CB è come DF ad FE, sarà il quadrato di AC al rettangolo delle due AC, CB, ^m come il quadrato di DF al rettangolo delle due DF, FE; e, permutando, il quadrato di AC al quadrato di DF ⁿ è come il rettangolo delle due AC, CB, al rettangolo delle due DF, FE; ma il quadrato di AC ^o è commensurabile al quadrato di DF (stante che le rette AC, DF sono commensurabili in lunghezza) sarà il rettangolo delle due AC, CB, ^p commensurabile al rettangolo delle due DF, FE. Se dunque il rettangolo, contenuto dalle due AC, CB, è Rationale, in modo, che AB sia prima Bimediale; sarà il rettangolo delle due DF, FE, ^q Rationale, e la retta DE ^r sarà prima Bimediale, cioè del medesimo ordine della Bimediale AB. Se poi il rettangolo delle due AC, CB, sarà Medio, in modo, che la retta AB sia seconda Bimediale, sarà il rettangolo delle due DF, FE, ^s Medio, e la retta DE ^t sarà seconda Bimediale, cioè del medesimo ordine della Bimediale AB, ch'ora da dimostrarsi.
- x 1. del 6.
- 1 1. del 6.
- m 11. del 5.
n 16. del 10.
- o 9. del 10.
- p 10. del 10.
- q Lem. dopo la 19. del 10.
- r 18. del 10.
- s 24. del 10.
t 39. del 10.




THEOREMA LL PROPOSITIONE LXIX.

La retta, commensurabile alla Maggiore, è Maggiore.

Sia quella retta, che chiamiamo Maggiore, AB, diuisa ne i suoi nomi AC, CB; e sia la retta DE commensurabile ab AB, ò in lunghezza, e

poten-

potenza, ouero in potenza solamente. Dico che DE ancor essa è Maggiore. Si faccia la medesima costruzione dell' antecedente proposizione, e si dimostri, come iui si fece, che AC à DF, e che CB ad FE, è come AB à DE. Per-



che DE è commensurabile ò in lunghezza, e potenza, ò in potenza solamente, ad AB, ^a sarà DF commensurabile nell'istesso modo ad AC, come ancora la retta FE à CB. In oltre perche AC à DF è come CB ad FE, il quadrato di AC ^b al quadrato di DF sarà come il quadrato di CB al quadrato di FE, e per la 12. del 5. l'aggregato de i quadrati di AC, CB, all'aggregato de i quadrati di DF, FE, è come il quadrato di CB al quadrato di FE: ma il quadrato di CB è commensurabile al quadrato di FE; sarà l'aggregato de i quadrati di AC, CB, ^c commensurabile all'aggregato de i quadrati di DF, FE; ma l'aggregato de i quadrati di AC, CB, è Rationale (stante che le rette AC, CB sono i nomi, che compongono la maggiore AB) in conseguenza l'aggregato de i quadrati di DF, FE è sarà Rationale.


Prese AC, CB come basi di due rettangoli, de'quali AC sia l'altezza commune, sarà il quadrato di AC al rettangolo delle due AC, CB, ^f come la base AC alla base CB. Nell'istesso modo si dimostrerà, che il quadrato di DF al rettangolo delle due DF, FE, è come DF ad FE: ma DF ad FE è come AC à CB, sarà il quadrato di AC al rettangolo delle due AC, CB, ^g come il quadrato di DF al rettangolo delle due DF, FE: e permutando, il quadrato di AC al quadrato di DF ^h sarà come il rettangolo delle due AC, CB, al rettangolo delle due DF, FE: ma il quadrato di AC è commensurabile al quadrato di DF ^k (stante che AC, & DF sono state dimostrate commensurabili in lunghezza, e potenza, ò al meno in potenza) sarà il rettangolo, contenuto dalle due AC, CB, ⁱ commensurabile al rettangolo delle due DF, FE. E perche il rettangolo delle due AC, CB, ^m per la natura della maggiore AB, è Medio; sarà il rettangolo delle due DF, FE, ⁿ che gli è commensurabile, Medio. Di nuouo, perche AC à CB è come DF ad FE, e le due AC, CB sono incommensurabili in potenza ^o (stante che compongono la maggiore AB) faranno le due DF, FE, ^p incommensurabili in potenza. Hor essendo le due DF, FE, incommensurabili in potenza, e l'aggregato de i loro quadrati, per quel che si è dimostrato, è Rationale, il rettangolo ancora, contenuto dalle medesime DF, FE, è Medio; per la 40. di questo, tutta la retta DE sarà quella, che si chiama Maggiore, come fù proposto dimostrare.

THEOREMA LII. PROPOSITIONE LXX.

La retta, commensurabile alla potente per il Rationale, e Medio, è ancor essa potente per il Rationale, e Medio.

Sia AB la retta potente, per il Rationale, e Medio, la quale sia diuisa ne i suoi nomi AC, CB, e sia DE commensurabile ò in lunghezza, e potenza, ouero in potenza solamente, ad AB. Dico che DE sarà quella, che si chiama potente per il Rationale, e Medio.

Si faccia la medesima costruzione dell'altre antecedenti, e si dimostri, come si fece nell'antecedente propositione, che l'aggregato de i quadrati delle due AC, CB, è commensurabile all'aggregato de i quadrati di DF, FE: ma l'aggregato




de i quadrati di AC, CB, ^a per la natura della proposta AB, è Medio; sarà l'aggregato de i quadrati di DF, FE, ^b che gli è commensurabile, Medio. Similmente si dimostri, come nell'antecedente propositione, che il rettangolo delle due AC, CB, è commensurabile al rettangolo contenuto dalle due DF, FE: ma il rettangolo, contenuto dalle due AC, CB, è Rationale, sarà il rettangolo delle due DF, FE, ^c che gli è commensurabile, Rationale. Finalmente si dimostri, come nell'antecedente, che le rette DF, FE sono incommensurabili in potenza; ed hauereмо le due DF, FE, incommensurabili in potenza; l'aggregato de i loro quadrati è Medio; e contengono vn rettangolo Rationale, e per la 41. proposi. di questo, sarà la retta DE potente per il Rationale, e Medio, il che era da dimostrarsi.

THEOREMA LIII. PROPOSITIONE LXXI.

La retta, commensurabile alla potente per due Medij, è ancor essa potente per due Medij.

Sia la potente per due Medij AB, diuisa ne i suoi nomi AC, CB, e sia DE commensurabile ò in lunghezza, e potenza, ò in potenza solamente ad AB. Dico che DE è potente per due Medij. Si dimostri come nella 69. propositione, che l'aggregato de i quadrati di AC, CB, è commensurabile all'aggregato de i quadrati di DF, FE, e che il rettangolo, contenuto dalle medesime AC, CB, è commensurabile al rettangolo delle due DF, FE. E perche



tanto l'aggregato de i quadrati di AC, CB, quanto il rettangolo delle rette AC, CB, ^a (per la natura della linea AB) è Medio; sarà tanto l'aggregato de i quadrati di DF, FE, quanto il rettangolo, contenuto dalle medesime DF, FE, ^b Medio; e farà, come nell'antecedente propositione fu dimostrato, DF incommensurabile in potenza. Finalmente, essendo AB, per ipotesi, la retta potente per due Medij, l'aggregato de i quadrati di AC, CB, sarà ^c incommensurabile al rettangolo, contenuto dalle rette AC, CB; ma l'aggregato de i quadrati di AC, CB, è dimostrato

com-

a 41. del 10.
b 24. del 10.

c lem. dopo
la 19. del 10.

a 41. del 10.

b 24. del 10.

c 42. del 10.

commensurabile all'aggregato de i quadrati di DF, FE, farà l'aggregato de i quadrati di DF, FE, ^d incommensurabile al rettangolo delle due AC, CB. E perche il rettangolo di AC, CB, è dimostrato commensurabile al rettangolo delle due DF, FE; farà l'aggregato de i quadrati delle due DF, FE, ^e incommensurabile al rettangolo delle medesime DF, FE. Per la qual cosa le rette DF, FE sono incommensurabili in potenza; l'aggregato de i quadrati di DF, FE, per quel che si è dimostrato, è Medio; come ancora il rettangolo, contenuto dalle medesime DF, FE, è Medio, ed è incommensurabile all'aggregato de i quadrati DF, FE; e, per la 42. proposizione di questo, la retta DE farà quella, che si chiama potente per due Medij, ch'era da dimostrarsi.


d 13. del 10.

e 13. del 10.

THEOREMA LIV. PROPOSITIONE LXXII.

La retta, il di cui quadrato è vguale all'aggregato dello spatio Rationale, col Medio; ò è Binomio, ò è prima Bimediale, ò è Maggiore, ouero è la potente per il Rationale, e Medio.

Sia il rettangolo Rationale AB, al quale sia aggiunto il Medio CD. Dico che la retta, il di cui quadrato è vguale allo spatio AD, ò è Binomio, ò prima Bimediale, ò



Maggiore, ouero è la potente per il Rationale, e Medio. Perche AB è Rationale, e lo spatio CD è Medio, farà AB, ò maggiore, ò minore di CD; perche se fossero vguali farebbero commensurabili, ed in tal caso ò ambidue farebbero Rationali, ò pure ambidue Medij, ch'è contro all'ipotesi; non dunque AB è vguale à CD. Supposto prima che AB sia maggiore di CD. Si esponga qualunque Rationale EF, alla quale ^a si applichi il rettangolo EG, vguale al Rationale AB; farà HG vguale ad EF, e perciò HG farà Rationale. Si applichi ad HG ^b il rettangolo HI, vguale al Medio CD; farà HI Medio, ed il rettangolo EG, ch'è vguale al Rationale AB, farà Rationale: per la qual cosa i due EG, HI, faranno incommensurabili; perche se fossero commensurabili, farebbero ò tutti due Rationali, ò tutti due Medij. In oltre, essendo alla Rationale EF applicato il Rationale EG, l'altro lato EH ^c farà Rationale, e farà commensurabile in lunghezza alla Rationale EF. Similmente essendo alla Rationale HG applicato il Medio HI, l'altro lato HK farà Rationale, ^d ed incommensurabile in lunghezza alla Rationale HG, ouero EF; fu dimostrata EH commensurabile in lunghezza alla medesima EF, faranno le due EH, HK, ^e incommensurabili in lunghezza: ma, per quel che si è dimostrato, sono Rationali, in conseguenza le rette EH, HK sono Rationali, è commensurabili solamente in potenza; per la qual cosa tutta la

a 45. del 10.

b 45. del 10.

c 45. del 10.

d 45. del 10.

e 13. del 10.

f 39. del 1.
S 1. del 6.

retta EK ^f farà Binomio. E perche lo spatio AB è supposto maggiore di CD, cioè EG maggiore di GK, & EG à GK :: è come EH ad HK, farà EH maggiore di HK, e perciò il quadrato del maggior nome EH supererà il quadrato di HK, per il quadrato d'vna retta, ò comensurabile, ò incommensurabile in lunghezza al maggior nome EH. Se il quadrato di EH supera il quadrato di HK, per il quadrato d'vna retta comensurabile in lunghezza ad EH, per la prima delle prossime antecedenti definitioni, sarà EK primo Binomio; e per la 55. propositione, la retta, il di cui quadrato è vguale al rettangolo EI, contenuto dalla Rationale EF, e dal primo Binomio EK, è irrationale, ed è quella, che si chiama Binomio; ma il rettangolo EI, per costruzione, è vguale ad AD, perciò la retta, il di cui quadrato è vguale al rettangolo AD, è irrationale, ed è quella, che si chiama Binomio. Ma se il quadrato di EH supera il quadrato di HK, per il quadrato d'vna retta, incommensurabile in lunghezza ad EH; essendo EH, per quel che si è dimostrato, comensurabile in lunghezza ad EF, farà EK quarto Binomio; e la retta, il di cui quadrato è vguale al rettangolo EI, contenuto dalla Rationale EF, e dal quarto Binomio EK, cioè al rettangolo AD, ^h farà irrationale. e farà quella, che si chiama Maggiore.

h 28. del 10.

Di nuouo, supposto che AB sia minore di CD, si faccia la costruzione di prima, e si dimostri nell'istesso modo, che EK è Binomio, e che EH è comensurabile in lunghezza ad EF.

E perche AB è minore di CD, cioè EG minore di HI; farà EH minore di HK: per la qual cosa il quadrato di HK farà maggiore del quadrato di EH, per il quadrato d'vna retta ò comensurabile, ouero incommensurabile in lunghezza ad HK. Se il quadrato del maggior nome HK supera il quadrato di EH, per il quadrato d'vna retta, comensurabile in lunghezza ad HK, farà EK, per la seconda delle precedenti definitioni, secondo Binomio; e la retta, il di cui quadrato è vguale al rettangolo EI, contenuto dalla Rationale EF, e dal secondo Binomio EK, ouero vguale ad AD, sarà ^k irrationale, e farà quella, che si chiama prima Bimediale.

K 56. del 10.

Finalmente se il quadrato di HK supera il quadrato di EH, per il quadrato d'vna retta incommensurabile in lunghezza al maggior nome HK, essendo il minor nome EH comensurabile in lunghezza alla Rationale EF, farà EK quinto Binomio, e la retta, il di cui quadrato è vguale al rettangolo EI, contenuto dalla Rationale EF, e dal quinto Binomio EK, cioè vguale ad AD, sarà irrationale; e sarà ^l quella, che si chiama potente per il Rationale, e Medio. Per la qual cosa la retta, il di cui quadrato è vguale al composto dello spatio Rationale, e Medio, ò è Binomio, ò è prima Bimediale, ò è maggiore, ouero la potente per il Rationale, e Medio, ch'era da dimostrarsi.

l 59. del 10.



THEOREMA LV. PROPOSITIONE LXXIII.

La retta, il di cui quadrato è vguale all'aggregato di due Medij incommensurabili; ò è seconda Bimediale, ouero è la potente di due Medij.

Siano composti li due Medij incommensurabili AB, CD in modo, che facciano il solo piano A D. Dico che la retta, il di cui quadrato è vguale ad AD, ò è seconda Bi-



mediale, ouero è la potente per due Medij. Sia esposta la Rationale EF. O il medio AB è maggiore, ouero è minore del Medio CD, non potendo essere vguale, stante che sarebbero commensurabili, ch'è contro all'ipotesi. Sia nel primoluo AB maggiore di CD. Si faccia la costruzione dell'antecedente propositione, farà EG maggiore di HI, e la retta EH maggiore di HK: e perche i Medij AB, CD, per ipotesi, sono incommensurabili, farà EG incommensurabile ad HI; ma EG ad HI è come EH ad HK; farà EH incommensurabile in lunghezza ad HK. In oltre, perche i due AB, CD sono Medij, faranno i due EG, HI, che gli sono vguali, ancora Medij. Hor essendo i Medij EG, HI applicati alle Razionali EF, HG, gli altri lati EH, HK sono e Razionali, ed incommensurabili in lunghezza alla Rationale EF. Essendo dunque le due EH, HK Razionali, ed incommensurabili in lunghezza, faranno Razionali, e commensurabili solamente in potenza, e per la 37. propositione di questo, la retta EK farà Binomio. Di più essendosi dimostrata EH maggiore di HK, il quadrato di EH farà maggiore del quadrato di HK, per il quadrato d'una retta ò commensurabile, ouero incommensurabile in lunghezza alla maggiore EH. Se il quadrato di EH è maggiore del quadrato di HK, per il quadrato d'una retta, commensurabile in lunghezza ad EH, essendo per quel che si è dimostrato, ambidue i nomi EH, HK incommensurabili in lunghezza alla Rationale EF; farà EK, per la terza delle precedenti definitioni, terzo Binomio; e la retta, il di cui quadrato è vguale al rettangolo EI, contenuto dalla Rationale EF; e dal terzo Binomio EK, cioè vguale al rettangolo AD, ò sarà irrationale, e farà quella, che si chiama seconda Bimediale. Se poi il quadrato di EH supera il quadrato di HK, per il quadrato d'una retta, incommensurabile al maggior nome EH; per che i due EH, HK sono incommensurabili in lunghezza alla Rationale EF, per la sesta delle precedenti definitioni, sarà EK sesto Binomio; e la retta, il di cui quadrato è vguale al rettangolo EI, contenuto dalla Rationale EF, e dal sesto Binomio EK, cioè vguale ad AD, sarà e irrationale, e farà quella che si chiama potente per due Medij.

Finalmente se il Medio AB farà minore del Medio CD, procedendosi nell'istesso modo, si prouerà similmente, che la retta EK ò è secon-

da

a. del 6.
b. ro. del 10.

ca. 3. del 10.

d. 57. del 10.

e. 60. del 10.

da Bimediale, ouero è la potente per due Medij, il che era da dimostrarli.

S C O L I O.

Sette sono i Senarij, de' quali ha trattato fin qui Euclide.

Nel primo dimostra la generatione di sei linee Irrazionali, che sono. Il Binomio; la Prima Bimediale; la Seconda Bimediale; la Maggiore; la Potente per il Rationale, e Medio; e la Potente per due Medij.

Nel secondo tratta della diuisione de i loro nomi, dimostrando che ciascuna si diuide ne i loro nomi in un sol punto.

Nel terzo spiega il modo da ritrouare il primo, secondo, terzo, quarto, quinto, e sesto Binomio.

Nel quarto dimostra qual differenza sia frà le linee irrationali del primo Senario frà di loro.

Nel quinto, applicando i quadrati delle irrationali del primo Senario alla Rationale, dimostra l'altro lato, che nasce da tale applicatione, quale linea irrationale sia.

Nel sesto dimostra, che ogni retta, commensurabile à ciascuna delle irrationali del primo Senario, è irrationale della medesima specie di quella, alla quale è commensurabile.

E nel settimo, in due sole proposizioni, spiega manifestamente la differenza delle sopradette irrationali.

Essendosi dimostrato nel sesto Senario, che ogni retta, commensurabile in lunghezza à qualunque delle irrationali del primo Senario, è irrationale della medesima specie di quella, alla quale è commensurabile; e perche ogni retta è commensurabile alla sua parte Aliquota, sarà manifesto, che non solo la metà, mà qualunque parte aliquota dell'irrationale, essendo commensurabile al tutto, sarà irrationale, e della medesima specie del suo tutto.

Dopo ch' Euclide hà dimostrato le passioni delle sudette sei linee irrationali generate per compositione, spiega susseguentemente le medesime cose in sei altre linee irrationali, che si generano per sottrattione; il che dimostra in sette altri Senarij, come successiuamente si può vedere.

PRINCIPIO DE' SENARII

PER DETRACTIONE.

THEOREMA LVI. PROPOSITIONE LXXIV.

Se da vna linea Rationale se ne detragga vna Rationale, commenfurabile solamente in potenza à tutta, la rimanente sarà Irrazionale, e chiamasi Apotome.

Dalla Rationale AB se ne detragga la Rationale AC, che sia commenfurabile solamente in potenza ad AB. Dico che il restante CB è irrazionale. Prese le rette AB, AC, come basi di due rettangoli, de' quali AB sia altezza comune; sarà il quadrato di AB al rettangolo contenuto dalle due AB, AC, come AB ad AC: ma AB è incommenfurabile in lunghezza



ad AC (stante che sono commenfurabili solamente in potenza) sarà il quadrato di AB incommenfurabile al rettangolo contenuto dalle due BA, AC. In oltre perche AB è commenfurabile solamente in potenza ad AC, sarà il quadrato di AB commenfurabile al quadrato di AC, e l'aggregato de i quadrati di AB, AC, sarà commenfurabile al quadrato di AB: ma il quadrato di AB è dimostrato incommenfurabile al rettangolo delle due BA, AC; sarà l'aggregato de i quadrati di AB, AC, incommenfurabile al rettangolo contenuto dalle due BA, AC. E perche il rettangolo delle due BA, AC, è commenfurabile al suo doppio, cioè al doppio rettangolo delle due BA, AC; sarà l'aggregato de i quadrati di AB, AC, incommenfurabile al doppio rettangolo delle due BA, AC. Di più, perche i quadrati delle due BA, AC, sono vguagli al doppio rettangolo delle due BA, AC, eol quadrato di BC; e si è dimostrato, che i due quadrati di AB, AC, sono incommenfurabili al doppio rettangolo delle due BA, AC; i quadrati delle medesime BA, AC, per il Corollario alla 17. propositione di questo, saranno incommenfurabili al quadrato di CB: ma l'aggregato de i quadrati di AB, AC, è Rationale (stante che è commenfurabile al quadrato della Rationale AB) essendo incommenfurabile al quadrato di CB, sarà il quadrato di CB irrazionale, ed il suo lato BC sarà irrazionale. Si chiami la retta BC Apotome. Se dunque dalla Rationale se ne detrae vna lunghezza Rationale, commenfurabile in potenza à tutta, quel che resta è Irrazionale, il che era da dimostrarsi.

THEOREMA LVII. PROPOSITIONE LXXV.

Se da vna linea Media si detragga vna Media, commenfurabile solamente in potenza à tutta, ed il rettangolo

conte-

a 10. del 10.

b 16. del 10.

c 12. del 10.

d 13. del 10.

e 7. del 1.

f 10. defn.

del 10.

g 11. defn.

del 10.

contenuto da tutta, e dalla detratta sia Rationale; la rimanente sarà Irrationale, e si chiama prima Apotome della Media.

Dalla Media AB ne sia detratta la Media AC, commensurabile solamente in potenza à tutta la Media AB; ed il rettangolo contenuto da tutta AB, e dalla Media detratta AC, sia Rationale. Dico che il rimanente CB è Irrazionale. Perche le rette AB, AC sono commensurabili solamente in potenza, il quadrato di AB sarà commensurabile al quadrato di AC, e l'aggregato de i quadrati di AB, AC, sarà commensurabile al quadrato di AC. In oltre, perche le rette AB, AC sono Medie, i loro quadrati^b faranno ancora Medij, e perciò irrazionali: ma l'aggregato de i quadrati di AB, AC, è dimostrato commensurabile al quadrato di AC, ch'è Medio, l'aggregato de i quadrati delle due AB, AC, sarà Medio: ed in cōseguenza irrazionale: fù supposto il rettangolo delle due BA, AC, Rationale; l'aggregato de i quadrati di AB, AC, ch'è Medio, sarà incommensurabile al rettangolo delle due BA, AC, ch'è Rationale. E

perche il doppio rettangolo delle due BA, AC, è Rationale per essere commensurabile alla sua metà, ch'è Rationale; sarà l'aggregato de i quadrati delle due AB, AC, incommensurabile al doppio rettangolo delle due BA, AC: ma l'aggregato de i quadrati di AB, AC, è vguale al doppio rettangolo delle due BA, AC, col quadrato di BC; sarà il doppio rettangolo delle due BA, AC, col quadrato di BC, incommensurabile al doppio rettangolo delle due BA, AC. Hor se l'aggregato del doppio rettangolo delle due BA, AC, col quadrato di BC, è incommensurabile alla parte, cioè al doppio rettangolo delle due BA, AC; sarà il quadrato di BC incommensurabile al doppio rettangolo delle due BA, AC: ma il doppio rettangolo delle due BA, AC, è dimostrato Rationale; in cōseguenza il quadrato di BC sarà irrazionale, ed il suo lato BC sarà irrazionale, ch'era da dimostrarsi. Si chiami la retta BC prima Apotome della Media.



THEOREMA LVIII. PROPOSITIONE LXXVI.

Se da vna linea Media se ne detragga vna Media, commensurabile solamente in potenza à tutta, ed il rettangolo, contenuto da tutta, e dalla media detratta, sia Medio; la rimanente sarà irrazionale, e si chiama seconda Apotome della media.

Dalla Media AB ne sia detratta la media AC, commensurabile solamente in potenza à tutta AB, ed il rettangolo contenuto da tutta AB, e dalla Media detratta AC, sia Medio. Dico che la rimanente CB sarà ir-

razionale.

rationale. Perche le rette AB, AC sono commenfurabili in potenza, farà il quadrato di AB commenfurabile al quadrato di AC; e l'aggregato de i quadrati di AB, AC, sarà commensurabile al quadrato di AC, ed ancora al quadrato di AB: mà i quadrati di AB, AC sono Medij (stante che le rette AB, AC sono supposte Medie) farà l'aggregato de i quadrati di AB, AC, ch'è commenfurabile ad ogn'vno di loro, Medio. In oltre perche il rettangolo delle due BA, AC, per ipotesi, è Medio; sarà il suo doppio, cioè il doppio rettangolo di BA, AC, che gli è commenfurabile, Medio. E perche l'aggregato de i quadrati di AB, AC, è uguale al doppio rettangolo delle due BA, AC, eol quadrato di BC; l'aggregato de i quadrati di AB, AC, ch'è Medio, supererà il doppio rettangolo delle due BA, AC, ch'è dimostrato Medio, per il quadrato di BC, ma il Medio non supera il Medio e per spatio Rationale; non farà dunque il quadrato di BC Rationale. Per la qual cosa il quadrato di BC è irrationale, ed il lato BC è similmente irrationale, come fu proposto dimostrare. Si chiami la retta BC seconda Apotome della Media.

THEOREMA LIX. PROPOSITIONE LXXVII.

Se da vna retta linea se ne detragga vna retta linea, incommensurabile in potenza à tutta, in modo, che l'aggregato de i quadrati di tutta, e della detratta, sia Rationale; ed il doppio rettangolo, contenuto dalle medesime sia Medio; la rimanente sarà irrationale, e si chiamerà Minore.

Dalla retta AB sia detratta la retta AC, incommensurabile in potenza ad AB, in modo, che l'aggregato de i quadrati delle due AB, AC sia Rationale; & il doppio rettangolo, contenuto dalle medesime BA, AC sia Medio.




Dico che la rimanente CB sarà irrationale. Perche il doppio rettangolo delle due BA, AC, è irrationale, stante che, per ipotesi, è Medio; e l'aggregato de i quadrati di AB, AC, per ipotesi, è Rationale; l'aggregato dunque de i quadrati di AB, AC farà incommensurabile al doppio rettangolo delle due BA, AC. Di nuouo perche l'aggregato de i quadrati di AB, AC, è uguale al doppio rettangolo delle due BA, AC eol quadrato di BC; essendo l'aggregato de i quadrati delle due AB, AC incommensurabile alla parte, cioè al doppio rettangolo delle due BA, AC; il medesimo aggregato de i quadrati di AB, AC, per il Corollario alla 17. propositione di questo, sarà incommensurabile al rimanente, cioè al quadrato di BC: mà l'aggregato de i quadrati di AB, AC, per ipotesi, è Rationale; sarà il quadrato di BC irrationale, e la retta BC sarà ancora irrationale, ch'era da dimostrarsi. La retta BC sarà quella, che si chiamerà Minore.

THEOREMA LX. PROPOSITIONE LXXVIII.

Se dalla retta linea se ne detrae vna retta linea , incom-
mensurabile in potenza à tutta, in modo , che l'aggregato
de i quadrati di tutta, e della detratta, sia Medio; ed il dop-
pio rettangolo , contenuto dalle medesime, sia Rationale ;
la rimanente sarà irrationale , e si dirà esser quella , che col
Rationale fa il tutto Medio .

Dalla retta AB se ne
detragga la retta AC, in-
com-
mensurabile in po-
tenza à tutta AB , in mo-
do , che l'aggregato de i
quadrati di AB, AC sia



Medio ; ed il doppio rettangolo contenuto dalle medesime BA , AC sia,
Razionale . Dico che la rimanente BC sarà irrationale . Perche il dop-
pio rettangolo , contenuto dalle due BA , AC , è rationale , e l'aggregato
de i quadrati di AB, AC , per ipotesi , è Medio , e pereio irrationale , fa-
rà l'aggregato de i quadrati di AB , AC ^a incommensurabile al doppio
rettangolo delle due BA, AC: mà l'aggregato de i quadrati di AB, AC, ^b
è vguale al doppio rettangolo delle due BA , AC col quadrato di BC; fa-
rà il doppio rettangolo delle due BA, AC, col quadrato di BC , incom-
mensurabile al rettangolo delle due BA , AC . Per la qual cosa il dop-
pio rettangolo delle due BA , AC ^c sarà incommensurabile al quadrato
di BC. E perehe il doppio rettangolo delle due BA , AC , è dimostrato
Razionale ; il quadrato dunque di BC ^d sarà irrationale , ed il lato BC
sarà parimente irrationale . E questa retta BC si dirà esser quella , che col
Rationale fa il tutto Medio , come fu proposto dimostrare .

THEOREMA LXI. PROPOSITIONE LXXIX.

Se dalla retta linea se ne detragga vna retta linea incom-
mensurabile in potenza à tutta , in modo , che l'aggregato
de i quadrati di tutta , e della detratta sia Medio ; ed il dop-
pio rettangolo , contenuto dalle medesime, sia ancora Me-
dio , incommensurabile all'aggregato de i loro quadrati; la
rimanente sarà irrationale , e si dirà esser quella , che col
Medio fa il tutto Medio .

Dalla retta AB se ne detragga la retta AC , incommensurabile in po-
tenza à tutta AB, in modo , che il composto de i quadrati di AB, AC sia
Medio , ed il doppio rettangolo contenuto dalle medesime BA , AC sia

Medio ,

a 10. de fin.
del 10.
b 7. del 2.

c 17. del 10.

d 10. de fin.
del 10.

Medio, incommensurabile all'aggregato de i quadrati di AB, AC. Dico che la rimanente CB sarà irrazionale.

Perche l'aggregato de i quadrati di AB, AC, è vguale al doppio rettangolo contenuto dalle due BA, AC, col quadrato di BC; il medesimo aggregato de i quadrati di AB, AC, ch'è Medio, supererà il doppio rettangolo delle due BA, AC, che similmente è Medio, per la quantità del quadrato di BC: mà il Medio non supera il Medio per lo spatio Rationale, in conseguenza il quadrato di BC non è Rationale; mà ben si irrazionale, ed il suo lato sarà parimente irrazionale, come fu proposto dimostrare. La retta linea BC si chiamerà quella, che col Medio fa il tutto Medio.


27. del 3.

27. del 10

L E M M A.

Se saranno quattro quantità, e la differenza frà la prima, e seconda, è vguale alla differenza frà la terza, e quarta; sarà ancora la differenza frà la prima, e terza, vguale alla differenza frà la seconda, e quarta;

Siano le quattro grandezze A B, C D, E F, G H; e sia I B la differenza frà A B, e C D, e la differenza frà E F, e G H sia K F. Dico che se I B è vguale à K F, la differenza ancora frà A B, e E F, sarà vguale alla differenza frà C D, e G H. Si



prenda la differenza frà E K, e A I, che sia L K, sarà E L vguale ad A I; alle vguale E L, A I, s'aggiungano le vguale K F, I B; sarà tutta A B vguale ad E L, insieme con K F; dal che la differenza frà E F, e A B sarà L K: mà, per costruzione, L K è la differenza frà E K, e A I; la differenza dunque frà E F, e A B, è vguale alla differenza frà E K, e A I. Inoltre perche I B è la differenza di quanto A B supera C D, sarà A I vguale à C D. Similmente perche K F è la differenza di quanto E F supera G H, sarà E K vguale à G H. Hor essendo A I vguale à C D, ed è ancora E K vguale à G H; la differenza frà E K, e A I sarà vguale alla differenza frà G H, e C D; mà, per quel che si è dimostrato, la differenza frà E K, e A I, è vguale alla differenza frà E F, e A B; sarà la differenza frà E F, e A B, vguale alla differenza frà G H, e C D, come fu proposto dimostrare.

THEOREMA LXII. PROPOSITIONE LXXX.

All'Apotome si può aggiungere vna sola linea Rationale, che sia commensurabile solamente in potenza à tutta la composta.

Sia l'Apotome AB, alla quale sia aggiunta la Rationale BC, commensurabile solamente in potenza à tutta la composta AC.



Dico che non si può aggiungere

ad AB altra retta Rationale, come, per esempio BD, che sia commensurabile solamente in potenza ad AD. Sia aggiunta, s'è possibile, la Rationale BD, commensurabile solamente in potenza ad AD. Perche le due AC, CB, per ipotesi, sono commensurabili solamente in potenza, il quadrato di AC sarà commensurabile al quadrato di BC; dal che l'aggregato de i quadrati di AC, BC, * sarà commensurabile al quadrato di AC, ed ancora al quadrato di BC: ma il quadrato di BC è Rationale, stante che BC, per ipotesi, è Rationale; l'aggregato ancora de i quadrati di AC, BC, che gli è commensurabile, * sarà Rationale. Nell'istesso modo si prouerà, che l'aggregato de i quadrati di AD, DB, è Rationale, e per lo Scolio alla 27. propos. di questo, la differenza frà l'aggregato de i quadrati di AC, CB, e l'aggregato de i quadrati di AD, DB, sarà spatio Rationale. Oltre à ciò, perche AC è commensurabile in potenza à BC, essendo BC Rationale, * sarà ancora AC Rationale, e commensurabile solamente in potenza à BC. Nell'istessa maniera si prouerà, che AD è Rationale, e commensurabile solamente in potenza à BD.

Di nuouo, perche AC è diuisa in B, i quadrati delle due AC, CB, d sono vguali al doppio rettangolo delle due AC, CB, col quadrato di AB; dal che l'aggregato de i quadrati di AC, CB, supera il doppio rettangolo delle due AC, CB, per il quadrato di AB. Similmente la retta AD è diuisa in B, e i quadrati delle due AD, DB sono vguali al doppio rettangolo delle due AD, DB, col quadrato di AB, e perciò l'aggregato de i quadrati delle due AD, DB, supera il doppio rettangolo delle medesime AD, DB, per il quadrato di AB; per la qual cosa la differenza frà l'aggregato de i quadrati di AC, CB, & il doppio rettangolo delle due AC, CB, è vguale alla differenza frà l'aggregato de i quadrati delle due AD, DB, ed il doppio rettangolo delle medesime AD, DB. Si considerino quattro quantità, la prima sia l'aggregato de i quadrati delle due AC, CB; la seconda sia il doppio rettangolo delle medesime AC, CB; la terza sia l'aggregato de i quadrati di AD, DB; e la quarta il doppio rettangolo delle due AD, DB. E perche si è dimostrato, che la differenza frà la prima, e seconda, cioè frà l'aggregato de i quadrati di AC, CB, ed il doppio rettangolo delle medesime AC, CB, è vguale alla differenza frà la terza, e quarta, cioè frà l'aggregato de i quadrati delle due AD, DB, ed il doppio rettangolo delle medesime AD, DB; per il Lemma antecedente, la diffe-

renza

a 16. del 10.

b 9. defin. del 10.

c 6. defin. del 10.

d 7. del 2.

e 7. del 2.

renza frà la prima, e terza, cioè frà l'aggregato de i quadrati delle due AC, CB , e l'aggregato de i quadrati delle due AD, DB , sarà vguale alla differenza frà la seconda, e quarta, cioè frà il doppio rettangolo delle due AC, CB , ed il doppio rettangolo delle due AD, DB : ma la differenza frà l'aggregato de i quadrati delle due AC, CB , e l'aggregato de i quadrati di $AD, \& DB$, per quel che si è dimostrato, è Rationale; la differenza dunque frà il doppio rettangolo delle due AC, CB , ed il doppio rettangolo delle due AD, DB , sarà Rationale.

Finalmente, perche le due AC, CB , sono Rationali, e commensurabili solamente in potenza, il rettangolo contenuto dalle medesime AC, CB ,^a sarà Medio, & il doppio rettangolo delle due AC, CB , che gli è commensurabile, sarà aneora Medio. Nell'istesso modo si dimostrerà, che il doppio rettangolo, contenuto dalle due AD, DB , è Medio. E perche il Medio non supera il Medio ^g per spatio Rationale, la differenza frà il doppio rettangolo delle due AC, CB , ch'è Medio, ed il doppio rettangolo delle due AD, DB , che parimente è Medio, non sarà Rationale: ma questa differenza fù dimostrata Rationale, farebbe, e non sarebbe Rationale, ch'è impossibile. Non dunque all'Apotome AB si può aggiungere altra Rationale BD , commensurabile solamente in potenza alla composta AD , fuor che la sola Rationale BC , ch'era da dimostrarsi.

fas. del 20.

g 27. del 20.

THEOREMA LXIII. PROPOSITIONE LXXXI.

Alla prima Apotome della Media vna sola linea Media si può aggiungere, che sia commensurabile solamente in potenza alla composta, e che contenga con la composta vn rettangolo Rationale.

Sia AB la prima Apotome della Media, alla quale sia aggiunta la Media BC , commensurabile solamente in potenza à tutta la composta AC , e che il rettangolo contenuto da tutta AC , e dall'aggiunta BC , sia Rationale. Dico che non è possibile aggiungerui altra Media, come BD , commensurabile solamente in potenza à tutta AD ; e che il rettangolo contenuto da tutta AD , e dall'aggiunta DB , sia Rationale. Sia aggiunta, s'è possibile, qualche Media BD , commensurabile solamente in potenza ad AD , e che il rettangolo delle due AD, DB , sia Rationale. Perche il rettangolo contenuto dalle due AC, CB , per ipotesi, è Rationale, il doppio rettangolo delle medesime AC, CB , che gli è commensurabile, ^a sarà Rationale. Nell'istesso modo si dimostrerà, che il doppio rettangolo delle due AD, DB , è Rationale: per la qual cosa la differenza frà il doppio rettangolo, contenuto dalle due AC, CB , & il doppio rettangolo delle due AD, DB ,^b sarà Rationale. Si dimostri, come si fece nell'antecedente propositione, che la differenza frà l'aggregato de i quadrati di AC ,



a 9. defia. del 10.

b Scol. alla 27. del 10.

di AC ,

di AC, CB, e l'aggregato de i quadrati di AD, DB, è vguale alla differenza frà il doppio rettangolo contenuto dalle due AC, CB, ed il doppio rettangolo, contenuto dalle due AD, DB; e perche la differenza di questi due doppij rettangoli è stata dimostrata Rationale, sarà la differenza frà l'aggregato de i quadrati di AC, CB, e l'aggregato de i quadrati di AD, DB, Rationale.

e Corollalla
24. del 10.

Di nuouo, perche BC, per ipotesi, è Media; sarà AC, che gli è commensurabile in potenza, Media; e perciò le due AC, BC sono Medie commensurabili



solamente in potenza: per la qual cosa i loro quadrati sono Medij frà di loro commensurabili. Hor essendo il quadrato di AC commensurabile al quadrato di BC, l'aggregato de i quadrati di AC, CB, ^d sarà commensurabile al quadrato di AC, ed ancora al quadrato di BC: ma il quadrato di BC è Medio, sarà l'aggregato de i quadrati di AC, BC, e Medio. Nell'istesso modo si dimostrerà, che l'aggregato de i quadrati di AD, DB, è Medio; e perche il Medio non supera il Medio ^f per spatio Rationale, la differenza frà l'aggregato de i quadrati di AC, CB, e l'aggregato de i quadrati di AD, DB, non sarà Rationale: ma l'istessa differenza fu dimostrata Rationale, farebbe, e non farebbe Rationale, ch'è impossibile. Non dunque alla Media AB si può aggiungere altra Media, fuor che la Media BC, che sia commensurabile solamente in potenza al tutto, e che il rettangolo contenuto da tutta, e dall'aggiunta sia Rationale, come fu proposto dimostrare.

d 10. del 10.

e 14. del 10.

f 17. del 10.

THEOREMA LXIV. PROPOSITIONE LXXXII.

Alla seconda Apotome della Media vna sola linea Media si può aggiungere, che sia commensurabile solamente in potenza à tutta la composta, e che contenga con la composta vn rettangolo Medio.

Sia AB la seconda Apotome della Media, alla quale sia aggiunta la Media BC, commensurabile solamente in potenza à tutta la composta AC, ed il rettangolo contenuto da tutta AC, e dall'aggiunta CB, sia Medio. Dico che non è possibile aggiungere altra Media ad AB, commensurabile solamente in potenza à tutta la composta, e che il rettangolo contenuto da tutta, e dall'aggiunta, sia Medio. S'aggiunga, s'è possibile, ad AB qualche altra Media BD, commensurabile solamente in potenza ad AD, e che il rettangolo contenuto da tutta AD, e dall'aggiunta DB, sia Medio.


a 45. del 1.

b 45. del 1.

Si esponga la Rationale EF, alla quale si applichi il rettangolo EG, ^a vguale all'aggregato de' quadrati di AC, CB; ed alla medesima EF si applichi il rettangolo EL, vguale al quadrato di AB, e si applichi ancora il rettangolo EL ^b vguale all'aggregato de i quadrati delle due AD,

DB.

DB. Perche i quadrati delle due AC, BC sono vguali al doppio rettangolo delle medefime AC, BC, e col quadrato di AB, e l'aggregato de i quadrati di AC, CB, per costruzione, è vguale al rettangolo EG; farà il rettangolo EG vguale al doppio rettangolo delle due AC, CB, col quadrato di AB; se ne leuino gli vguali, cioè il rettangolo EI, ed il quadrato di AB, resta il rettangolo KG vguale al doppio rettangolo delle due AC, CB. Nell'istefo modo si dimostrerà, che il rettangolo KL è vguale al doppio rettangolo delle due AD, DB. In oltre perche BC, per ipotesi, è Media,



farà AC, ^a che gli è commensurabile in potenza, Media; e perciò le due AC, BC sono medie commensurabili solamente in potenza, per la qual cosa i loro quadrati faranno ancora Medij frà di loro commensurabili. Hor essendo i quadrati di AC, CB, commensurabili, il loro aggregato e farà commensurabile al quadrato di AC, ed ancora al quadrato di BC: ma i quadrati di AC, BC sono Medij, l'aggregato de i quadrati di AC, CB, che à loro è commensurabile, ¹ farà ancora Medio; ed il rettangolo EG, ch'è vguale al detto aggregato, farà parimente Medio, il quale applicato alla Rationale EF farà l'altro lato EH s Rationale, & incommensurabile in lunghezza alla Rationale EF. Similmente essendo il rettangolo contenuto dalle due AC, CB, per ipotesi, Medio, il doppio rettangolo delle medefime AC, CB, che gli è commensurabile, ^h farà ancora Medio: ma il doppio rettangolo delle due AC, CB, è dimostrato vguale al rettangolo KG; il rettangolo dunque KG farà Medio, che applicato alla Rationale KI, ouero EF farà il lato KH ^k Rationale, ed incommensurabile in lunghezza alla Rationale KI; ouero EF. In oltre, perche il quadrato di AC, per ipotesi, è commensurabile al quadrato di CB, farà l'aggregato de i quadrati di AC, CB, ^l commensurabile al quadrato di AC, ed ancora al quadrato di CB. Si prendano le rette AC, CB, come basi di due rettangoli, e sia AC altezza commune, farà il quadrato di AC al rettangolo contenuto dalle due AC, CB, ^m come la base AC alla base CB: ma AC, per ipotesi, è incommensurabile in lunghezza à CB, farà il quadrato di AC ⁿ incommensurabile al rettangolo delle due AC, CB: ma il quadrato di AC è dimostrato commensurabile all'aggregato de i quadrati di AC, CB, l'aggregato dunque de i quadrati di AC, CB, cioè il rettangolo EG, ^o farà incommensurabile al rettangolo delle due AC, CB. E perche il doppio rettangolo delle due AC, CB, è commensurabile al rettangolo delle medefime AC, CB; farà il rettangolo EG ^p incommensurabile al doppio rettangolo delle due AC, CB: fu dimostrato il doppio rettangolo delle due AC, CB vguale al rettangolo KG; farà il rettangolo EG incommensurabile al rettangolo KG. Finalmente perche i rettangoli ^q EG, KG sono come le basi EH, KH; ed i rettangoli EG, KG sono incommensurabili; farà EH ^r incommen-

c 7. del 8.

d 24. del 10.

e 16. del 10.

f Coroll. alla 24. del 10.

g 13. del 10.

h Coroll. alla 24. del 10.

i 23. del 10.

l 16. del 10.

m 1. del 6.

n 10. del 10.

o 13. del 10.


p 13. del 10.

q 1. del 5.

r 1. del 10.

incom-

menfurabile in lunghezza à KH: mà furono mostrate Rationali, in conseguenza le rette EH, KH sono Rationali, e commensurabili solamente in potenza. Se dunque dalla Rationale EH se ne detrae la Rationale KH, commensurabile solamente in potenza alla medesima EH, per la 74. proposizione di questo, la rimanente EK farà Apotome, alla quale è aggiunta la Rationale KH, commensurabile solamente in potenza à tutta EH, ne all'Apotome EK, per l'80. proposizione di questo, si può aggiungere altra Rationale, che sia commensurabile solamente in potenza à tutta la composta, fuor che KH. Nell'istesso modo si prouerà, che EK è Apotome, e che KM è Rationale, e commensurabile in potenza à tutta EM; che è contro à quel che si è dimostrato, mentre nessun' altra Rationale si può aggiungere ad EK, che sia commensurabile solamente in potenza à tutta la composta, fuor che la Rationale KH. Non dunque alla seconda Apotome della media, notata AB, si può aggiungere altra media, commensurabile solamente in potenza à tutta, e che il rettangolo di tutta e dell'aggiunta sia Rationale, fuor che la media BC, ch'era da dimostrarsi.



THEOREMA LXV. PROPOSITIONE LXXXIII.

Alla minore vna sola retta linea si può aggiungere incommensurabile in potenza à tutta la composta, in modo, che l'aggregato de i quadrati di tutta la composta, e dell'aggiunta, sia Rationale; e che il doppio rettangolo, contenuto dalle medesime, sia Medio.

Sia la minore AB, alla quale sia aggiunta la retta BC, incommensurabile in potenza à tutta AC, in modo, che l'aggregato de i quadrati delle due AC, CB sia Rationale, ed il doppio rettangolo, contenuto dalle medesime AC, CB sia Medio. Dico che nessun' altra retta si può aggiungere ad AB, secondo le proposte condizioni. Sia, se è possibile, aggiunta ad AB qualche altra retta BD, che sia incommensurabile in potenza ad AD, che l'aggregato de i quadrati di AD, DB sia Rationale, e che il doppio rettangolo contenuto dalle medesime AD, DB sia Medio. Si dimostri, come si fece nella proposizione 80. di questo, che la differenza fra l'aggregato de i quadrati di AC, CB, e l'aggregato de i quadrati di AD, DB, è vguale alla differenza fra il doppio rettangolo contenuto dalle due AC, CB ed il doppio rettangolo



golo

golo delle due AD, DB: mà la differenza frà l'aggregato de i quadrati di AC, CB, e l'aggregato de i quadrati di AD, DB, è Rationale (stante che l'vno, e l'altro aggregato è Rationale) farà la differenza frà il doppio rettangolo delle due AC, CB, & il doppio rettangolo delle due AD, DB, Rationale. In oltre perche tanto il doppio rettangolo delle due AC, CB, quanto il doppio rettangolo delle due AD, DB, è Medio, non potendo il Medio ^a superare il Medio per spatio Rationale; ne meno la differenza frà il doppio rettangolo delle due AC, CB, ed il doppio rettangolo delle due AD, DB, è Rationale: fu dimostrata la medesima differenza essere Rationale, farebbe, e non farebbe Rationale, ch'è impossibile. Non dunque alla minore AB si può aggiungere altra retta BD, incommensurabile in potenza à tutta AD, in modo, che l'aggregato de i loro quadrati sia Rationale, e che contengano vn rettangolo Medio, fuor che la retta BC, ch'era da dimostrarsi.

a 27. del 10.

THEOREMA LXVI. PROPOSITIONE LXXXIV.

A quella linea, che col Rationale fa il tutto Medio, vna sola retta linea si può aggiungere, commensurabile solamente in potenza à tutta la composta, in modo, che l'aggregato de i quadrati di tutta, e dell'aggiunta, sia Medio, & il doppio rettangolo contenuto da tutta, e dall'aggiunta sia Rationale.

Sia AB la retta linea, che col Rationale fa il tutto Medio, alla quale sia aggiunta la retta BC, incommensurabile in potenza à tutta la composta AC, in modo, che l'aggregato de i quadrati di AC, CB sia Medio, & il doppio rettangolo, contenuto dalle medesime AC, CB sia Rationale. Dico che non si può aggiungere ad AB altra



retta, secondo le proposte condizioni. S'aggiunga, s'è possibile, ad AB vn'altra retta, come DB, incommensurabile in potenza ad AD, che l'aggregato de i quadrati di AD, DB sia Medio, & il doppio rettangolo contenuto dalle medesime AD, DB sia Rationale. Si dimostri, come si fece nell'80. propositione di questo, che la differenza frà l'aggregato de i quadrati di AC, CB, e l'aggregato de i quadrati di AD, DB, è vguale alla differenza frà il doppio rettangolo delle due AC, CB, & il doppio rettangolo delle due AD, DB. Perche la differenza del doppio rettangolo delle due AC, CB, & il doppio rettangolo delle due AD, DB, è Rationale (stante che l'vno, e l'altro doppio rettangolo è supposto Rationale) farà la differenza frà l'aggregato de i quadrati di AC, CB, e l'aggregato de i quadrati di AD, DB, Rationale. In oltre perche tanto l'aggregato de i quadrati di AC, CB, quanto l'aggregato de i quadrati di AD, DB, per ipotesi è Medio, ed il Medio non supera il Medio ^a

a 27. del 10.


per spatio Rationale, ne meno la differenza frà l'aggregato de i quadrati di AC, CB, e l'aggregato de i quadrati di AD, DB farà Rationale: mà la medesima differenza fu dimostrata Rationale, farebbe, e non farebbe Rationale, ch'è impossibile. Non dunque alla retta AB si può aggiungere altra retta, secondo le sopra poste conditioni, fuor che la retta BC, ch'era da dimostrarsi.



THEOREMA LXVII. PROPOSITIONE LXXXV.

A quella retta, che col Medio fà il tutto Medio, vna sola retta linea si può aggiungere incommensurabile in potenza à tutta la composta, in modo, che l'aggregato de i quadrati di tutta, e dell'aggiunta, sia Medio, & il doppio rettangolo, contenuto dalle medesime, sia Medio, incommensurabile all'aggregato de i detti quadrati.

Sia AB quella retta, che col Medio fà il tutto Medio, alla quale sia aggiunta la retta BC, incommensurabile in potenza à tutta la composta AC, in modo, che l'aggregato de i quadrati di AC, CB, sia Medio, & il doppio rettangolo, contenuto dalle medesime AC, CB, sia Medio, incommensurabile all'aggregato de i quadrati di AC, CB. Dico che non si può aggiungere ad AB altra retta, secondo le medesime conditioni. Si aggiunga, s'è possibile, qualche altra retta BD, incommensurabile in potenza ad AD, che l'aggregato de i quadrati di AD, DB, sia Medio, & il doppio rettangolo, contenuto dalle medesime AD, DB, sia Medio, incommensurabile all'aggregato de i quadrati di AD, DB. Sia fatta la medesima costruzione dell'82. propositione. Perche l'aggregato de i quadrati delle due AC, CB, è Medio, il rettangolo EG, che gli è vguale, sarà ancora Medio, il quale, applicato alla Rationale EF, fà l'altro lato EH Rationale, ed incommensurabile in lunghezza alla Rationale EF. Similmente perche il doppio rettangolo contenuto dalle due AC, BC, per ipotesi, è Medio, ed è vguale, per quel che fu dimostrato nel 82. propositione, al rettangolo KG; sarà il rettangolo KG Medio, il quale applicato alla Rationale KI, ouero EF, fà l'altro lato KH Rationale, ed incommensurabile in lunghezza alla Rationale KI, ouero EF. E perche il doppio rettangolo del-



a 23. del 10.

b 23. del 10.

le

le due AC, CB, è supposto incommensurabile all'aggregato de i quadrati di AC, CB; sarà il rettangolo KG incommensurabile al rettangolo EG: ma il rettangolo KG al rettangolo EG ^c è come KH ad EH; essendo i rettangoli KG, EG, incommensurabili, sarà la retta KH ^d incommensurabile in lunghezza alla retta EH: furono mostrate le rette KH, EH, Razionali, in conseguenza saranno commensurabili solamente in potenza. Se dunque dalla Rationale EH se ne sottrae la Rationale KH, commensurabile solamente in potenza à tutta EH, l'auanzo EK ^e sarà Apotome, e la retta HK sarà quella Rationale, che, aggiunta all'Apotome EK, è commensurabile in potenza à tutta EH, ne altra Rationale si può aggiungere ad EK, che sia commensurabile in potenza à tutta la composta. Nell'istesso modo si dimostrerà, che EK è Apotome, e che MK è Rationale, commensurabile solamente in potenza à tutta la composta EM: dal che altra Rationale si può aggiungere ad EK, commensurabile solamente in potenza à tutta la composta, che è contro à quello che si è dimostrato. Non dunque alla retta AB si può aggiungere altra retta, secondo le condizioni della retta BC, ch'era da dimostrarsi.

ca. del 6.
d 10. del 10.

e 74. del 10.

ANNO TATIONE.

Nelle cose seguenti la retta BC, aggiunta all'Apotome AB, secondo le condizioni esposte nelle scì antecedenti proposizioni, la chiameremo linea congruente, in modo, che quando si dirà l'Apotome con la congruente, si douerà intendere tutta la retta AC.

DEFINITIONI TERZE.

Esposta la Rationale, e l'Apotome, se il quadrato dell'Apotome, con la congruente, supera il quadrato della congruente, per il quadrato d'una retta linea commensurabile in lunghezza à tutta la composta dell'Apotome, e congruente.

I.

Se la composta dell'Apotome, e congruente sarà commensurabile in lunghezza alla Rationale; quell'Apotome si chiamerà prima Apotome.

I I.

Se la sola congruente sarà commensurabile in lunghezza alla Rationale; quell'Apotome si dirà seconda Apotome.

A B C
D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aaaa 2

E se

I I I.

E se ne tutta la composta, ne la sola congruente, è commensurabile in lunghezza alla Rationale; si dirà terza Apotome.

Di nuouo se il quadrato di tutta la composta è maggiore del quadrato della congruente, per il quadrato d'una retta incommensurabile in lunghezza à tutta la composta dell'Apotome, e congruente.

I V.

Se la composta dell'Apotome, e congruente, sarà commensurabile in lunghezza alla Rationale; quell'Apotome si chiamerà quarta Apotome.

V.

Se la sola congruente è commensurabile in lunghezza alla Rationale; quell'Apotome si chiamerà quinta Apotome.

V I.

E se ne tutta la composta, ne la sola congruente è commensurabile in lunghezza alla Rationale; si dirà sesta Apotome.

S C O L I O.

Queste sei linee, che si chiamano Apotome, prima, seconda, terza &c. sono sei linee irrationali, che restano dalle detractioni fatte de i minori nomi da quelle sei linee, che furono chiamate Binomij; cioè il maggior nome d'ogni Binomio, leuato il minor nome, si chiama Apotome.

PROBLEMA XIX. PROPOSITIONE LXXXVI.

Ritrouare la prima Apotome.

Per la seconda parte al Corollario della 29. propositione di questo; si trouino due numeri quadrati, come AB, BC, la di cui differenza AC non sia numero quadrato; sarà la proportionione di AB à BC come numero qua-

drato

drato a numero quadrato; e la proportionne di AB ad AC non sarà come numero quadrato a numero quadrato. Si esponga qualunque Rationale D, e si prenda la retta EF, commensurabile in lunghezza alla Rationale D; sarà la retta EF = Rationale, e per il Corollario alla 6. proposizione, di questo, si faccia sì come il numero AB al numero AC, così il quadrato di EF al quadrato di FG. Dico che

la retta EG è quella, che chiamiamo prima Apotome. Perche la proportionne del quadrato di EF al quadrato di FG, per costruzione, è come il numero AB al numero AC, i quadrati delle due EF, FG ^b saranno commensurabili, e le rette EF, FG, saranno commensurabili, almeno in potenza: ma la retta

EF è dimostrata Rationale; sarà la retta FG, che gli è commensurabile, in potenza, e parimente Rationale. E perche AB ad AC non è come numero quadrato a numero quadrato, ne meno il quadrato di EF al quadrato di FG è come numero quadrato a numero quadrato, e perciò i loro lati EF, FG, ^d sono incommensurabili in lunghezza: furono dimostrate Razionali, e commensurabili in potenza; saranno dunque le rette EF, FG Razionali, e commensurabili solamente in potenza; e per la 74. proposizione di questo, il rimanente EG sarà quella, che si chiama Apotome, & FG sarà la sua congruente. Dico che EG è prima Apotome.


Dal quadrato di EF s'intenda detratto il quadrato di FG, ed il rimanente sia il quadrato della retta H; sarà il quadrato di H la differenza frà il quadrato di EF, ed il quadrato di FG. Perche AB ad AC è come il quadrato di EF al quadrato di FG; per la conversione della proportionne, sarà AB a BC, cioè l'antecedente alla differenza frà l'antecedente, e conseguente, come il quadrato di EF al quadrato di H, cioè come l'antecedente, ch'è il quadrato di EF, alla differenza, ch'è frà il quadrato di EF, ed il quadrato di FG. Hor essendo il quadrato di EF al quadrato di H come il numero quadrato AB al numero quadrato CB; le due EF, & H ^e sono commensurabili in lunghezza; sì che il quadrato di EF, ch'è composta dell'Apotome, e della congruente, supera il quadrato della congruente FG, per il quadrato della retta H, commensurabile in lunghezza alla composta EF; ed è la composta EF commensurabile in lunghezza alla Rationale D; per la prima delle terze definizioni, la retta EG è quella, che si chiama prima Apotome, ch'era da farsi, e dimostrarsi.

PROBLEMA XX. PROPOSITIONE LXXXVII.

Ritrouare la seconda Apotome.

Si ritrouino due numeri quadrati AB, AC, come si disse nell'antecedente proposizione, cioè che la loro differenza AC non sia numero quadrato. Si esponga la Rationale D, e si prenda la retta GF, commensurabile in lunghezza alla Rationale D; sarà la retta GF = Rationale: per il

Corol-



a 6. defin.
del 10.

b 6. del 10.

c 6. defin.
del 10.

d 9. del 10.

e 9. del 10.


a 6. defin.
del 10.

Corollario alla 6. proposizione, si faccia si come AC ad AB, così il quadrato di FG al quadrato di EF. Dico che la retta EG è quella, che si chiama seconda Apotome. Perché il quadrato di FG al quadrato di EF è come il numero AC al numero AB, i quadrati delle rette ^b GF, EF, saranno commensurabili, e le rette GF, EF saranno commensurabili, almeno in potenza; e perché GF è stata dimostrata Rationale, la retta ancora EF, ^c che gli è commensurabile in potenza, sarà Rationale. Similmente perché il quadrato di GF al quadrato di EF è come il numero AC al numero AB, ed i numeri AC, AB, per costruzione, non sono come i numeri quadrati; né meno il quadrato di FG al quadrato di EF sarà come numero quadrato a numero quadrato; per la qual cosa le rette GF, EF ^d sono incommensurabili in lunghezza; ma furono dimostrate Rationali, in conseguenza le rette GF, EF, sono Rationali, e commensurabili solamente in potenza; e per la 74. proposizione di questo, sarà la rimanente EG Apotome, la di cui congruente sarà FG. Dico che EG è quella, che si chiama seconda Apotome. Dal quadrato di EF s'intenda detratto il quadrato di GF, ed il restante sia il quadrato di H. Perché AC ad AB è come il quadrato di GF al quadrato di EF, inuertendo, AB ad AC ^e sarà come il quadrato di EF al quadrato di FG; e per la conversione della proporzione, sarà il numero quadrato AB al numero quadrato BC, ^f come il quadrato di EF al quadrato di H: per la qual cosa le due EF, & H ^g sono commensurabili in lunghezza; e perciò il quadrato della composta EF supera il quadrato della congruente FG, per il quadrato della retta H, commensurabile in lunghezza alla composta EF, ed è, per costruzione, la congruente GF, commensurabile in lunghezza alla Rationale D; e per la seconda delle terze definizioni, la retta EG è quella, che si chiama seconda Apotome, ch'era da farsi, e dimostrarsi.

PROBLEMA XXI. PROPOSITIONE LXXXVIII.

Ritrouare la terza Apotome.

Si trouino i due numeri AB, BC, come si disse nella propof. 86; poi si troui vn altro numero, per esempio I, il quale non sia al numero AB, né meno al numero AC, come numero quadrato a numero quadrato; il che si farà col prendere il numero I vna, ò due vnità maggiore del numero AC, come si disse nella 51. propof. di questo. Oltre à ciò si esponga qualunque Rationale D, e si faccia, per il Corollario alla 6. proposizione, si come il numero I al numero AB, così il quadrato della Rationale D al



qua-

quadrato di EF; saranno i quadrati di D, & EP, ^a commensurabili, e le rette D, & EF saranno commensurabili, almeno in potenza: ma la retta D è posta Rationale, farà EF, ^b che gli è commensurabile in potenza, Rationale. E perche il quadrato di D al quadrato di EF è come il numero I al numero AB; e, per costruzione il numero I al numero AB non è come numero quadrato a numero quadrato, ne meno il quadrato di D al quadrato di EF è come numero quadrato a numero quadrato: per la qual cosa le rette D, & EF, ^c sono incommensurabili in lunghezza. Di nuovo si faccia si come AB ad AC, così il quadrato di EF al quadrato di FG. Dico che EG è la terza Apotome. Perche il quadrato di EF al quadrato di FG è come il numero AB al numero AC, farà il quadrato di EF commensurabile al quadrato di GF; ^d e perciò le rette EF, FG, sono commensurabili almeno in potenza: e perche EF fu dimostrata Rationale, ancora FG, che gli è commensurabile in potenza, ^e farà Rationale. In oltre, essendo il quadrato di EF al quadrato di FG, come AB ad AC; ed i numeri AB, AC, per costruzione, non hanno la proportion de i numeri quadrati; ne meno i quadrati delle due EF, FG, hanno la proportion de i numeri quadrati; e perciò le rette EF, FG, ^f sono incommensurabili in lunghezza: ma furono dimostrate Razionali, faranno dunque le due EF, FG Razionali, e commensurabili solamente in potenza; e per la 74. propos. di questo, EG farà Apotome, e la sua congruente farà GF. Dico che EG è quella, che si chiama terza Apotome.

Perche il numero I al numero AB è come il quadrato di D al quadrato di EF; ed il numero AB al numero AC è come il quadrato di EF al quadrato di FG; per l'egualità, farà il numero I al numero AC, ^g come il quadrato di D al quadrato di GF: ma il numero I al numero AC, per costruzione, non è come numero quadrato a numero quadrato; ne meno il quadrato di D al quadrato di GF è come numero quadrato a numero quadrato: per la qual cosa i lati D, & GF, ^h sono incommensurabili in lunghezza. Fu dimostrata EF incommensurabile in lunghezza alla medesima D, in conseguenza nessuna delle due EF, FG è commensurabile in lunghezza alla Rationale D. Dal quadrato di EF se ne tragga il quadrato di GF, ed il rimanente sia il quadrato di H. Si dimostri, come si fece nell'86. proposizione di questo, che la retta H è commensurabile in lunghezza ad EF; e farà il quadrato della composta EF maggiore del quadrato della congruente GF, per il quadrato della retta H, commensurabile in lunghezza alla composta EF. E perche niuna delle due EF, GF, è commensurabile in lunghezza alla Rationale D; per la terza delle terze definizioni, la retta EG farà quella, che si chiama terza Apotome, ch'era da farsi, e dimostrarfi.

PROBLEMA XXII. PROPOSITIONE LXXXIX.

Ritrouare la quarta Apotome.

Per lo Scolio alla proposizione 29. si trouino i due numeri, come AC, CB, in modo, che il loro aggregato AB non sia ad AC, ne meno a CB,

come

^a 6. del 10.^b 6. defn. del 10.^c 9. del 10.^d 14. del 10.^e 6. de fin. del 10.^f 9. del 10.^g 22. del 5.^h 9. del 10.

come numero quadrato à numero quadrato. Poi si csponga la Rationa-
le D, e si prenda EF, commenfurabile
in lunghezza alla Rationale D; per il
che EF farà Rationale; e procedendo-
si, come si fece nell'86. propositione,
si prouerà, che EG è Apotome, la di
cui congruente farà GF. Dico che EG
è la quarta Apotome. Dal quadrato di
EF^a si detragga il quadrato di GF, ed il
rimanente sia il quadrato di H. Essen-
do AB ad AC come il quadrato di EF

A.....C...B

D-----

E-----G-----F

H-----

a Lem. dopo
la prop. 14.

b Corol. alla
19. del 5.

c 9. del 10.

al quadrato di FG; per la conuerfione della proportionè, farà AB à BC^b
come il quadrato di EF al quadrato di H: mà AB à BC non è come nume-
ro quadrato à numero quadrato, ne meno il quadrato di EF al qua-
drato di H è come numero quadrato à numero quadrato: per la qual
cofa le rette EF, ed H^c sono incommenfurabili in lunghezza. Il quadra-
to dunque della composta EF supera il quadrato della congruente GF, per
il quadrato della retta H, incommenfurabile in lunghezza alla composta
EF; e la composta EF, per costruzione, è commenfurabile in lunghez-
za alla Rationale D; per la quarta delle terze definizioni, la retta EG
sarà quella, che si dice quarta Apotome, ch'era da farfi, e dimostrarfi.

PROBLEMA XXIII. PROPOSITIONE XC.

Ritrouare la quinta Apotome.

Si trouino i due numeri AC, CB, come si fece nell'antecedente propo-
sitione; si csponga la Rationale D, e si prenda FG, commenfurabile in
lunghezza alla Rationale D. Nel refto si profeguisca, come nell'87. pro-
positione, e si dimoftri, che EG è A-
potome, la di cui congruente è GF. A.....C...B
Dico che EG è quella, che si dice
quinta Apotome. Dal quadrato di EF
se ne detragga il quadrato di FG, ed
il rimanente sia il quadrato di H. Ef-
fendo AB ad AC come il quadrato di
EF al quadrato di FG, per la conuer-
fione della proportionè, farà AB à B

A.....C...B

D-----

E-----G-----F

H-----

a Corol. alla
19. del 5.

b 9. del 10.


C^a come il quadrato di EF al quadrato di H: mà i numeri AB, BC non
hanno la proportionè de i numeri quadrati; ne meno i quadrati di EF, ed
H, sono come i numeri quadrati; e perciò le rette EF, ed H^b sono in-
commenfurabili in lunghezza. Per la qual cofa il quadrato della compo-
sta EF supera il quadrato della congruente GF, per il quadrato della
retta H, incommenfurabile in lunghezza alla composta EF; e la con-
gruente GF, per costruzione, è commenfurabile in lunghezza alla Ra-
tionale D; e per la quinta delle terze definizioni, la retta EG è quella,
che si chiama quinta Apotome, ch'era da farfi, e dimostrarfi.

PRO-

PROBLEMA XXIV. PROPOSITIONE XCI.

Ritrouare la sesta Apotome.

Per il Corollario secondo all'ultima propositione del nono Libro, si trouino due numeri come AC, CB, che non siano piani simili, e niuno sia numero quadrato; ed il loro composto, cioè AB, non sia numero quadrato, ne à ciascuno di loro habbia la proportione di numero quadrato à numero quadrato, cioè che AB non sia ad AC, ne meno à BC, come numero quadrato à numero quadrato. Si prenda poi qualunque numero quadrato, per esempio I, il quale non hauerà ad AC, ne meno ad AB, la proportione, che hà il numero quadrato al numero quadrato. Si esponga poi qualunque Rationale D, ed il rimanente si faccia come nell'88. propositione di questo; e si dimostri, come iui si fece, che le rette D, & EF, sono incommensurabili in lunghezza; e che EG è Apotome, la di cui congruente è GF. Dico che EG è quella, che si chiama sesta Apotome. Si dimostri, come si fece nella citata 88. propositione, che D è incommensurabile in lunghezza alla retta GF; per la qual cosa nessuna delle due EF, GF, è commensurabile in lunghezza alla Rationale D: dal quadrato di EF se ne detragga il quadrato di GF, ed il rimanente sia il quadrato di H; e si dimostri, come si fece nell'89. propositione, che H è incommensurabile in lunghezza alla retta EF. Hor essendo il quadrato della composta EF maggiore del quadrato della congruente GF, per il quadrato della retta H, incommensurabile in lunghezza alla composta EF; e niuna delle due EF, GF, è commensurabile in lunghezza alla Rationale D; per la sesta delle terze definitioni, la retta EG è sexto Binomio, come fu proposto fare, e dimostrare.



THEOREMA LXVIII. PROPOSITIONE XCII.

La retta linea, il di cui quadrato è vguale al rettangolo, contenuto dalla Rationale, e dalla prima Apotome, è Apotome.

Sia il rettangolo AC, contenuto dalla Rationale AB, e dalla prima Apotome AD. Dico che la retta linea, il di cui quadrato è vguale al rettangolo AC, è Apotome. Sia DE la congruente dell'Apotome AD, per la definitione della prima Apotome, le due AE, DE, faranno Razionali, e commensurabili solamente in potenza; e tutta la composta AE farà commensurabile in lunghezza alla Rationale AB, ed il quadrato della composta AE supera il quadrato della congruente DE, per il quadrato d'vna retta, commensurabile in lunghezza alla medesima AE. Si diuida DE in due parti vguali in F; farà il quadrato di DF, ouero di


a ro. del 1.

B b b

FE,

b Scolalla
4. del 2.

FE, ^b la quarta parte del quadrato di DE; sia poi per il primo Lemma dopo la propositione 17. di questo, applicato ad AE vn rettangolo vguale al quadrato di EF, che manchi à compire la linea per vna figura quadrata, e quel rettangolo sia quello, ch'è contenuto dalle due AG, GE, cioè sia diuisa AE, per il Lemma secondo dopo la citata 17. propositione, talmente in G, che il rettangolo contenuto dalle parti AG, GE sia vguale al quadrato di FE, cioè alla quarta parte del quadrato di DE. Perche il quadrato di AE supera il quadrato di DE, per il quadrato d'vna retta, commensurabile in lunghezza ad AE, per la 18. propositione di questo, le sette AG, GE, sono commensurabili in lunghezza; dal che tutto l'aggregato AE farà tanto ad AG, come à GE, ^c commensurabile in lunghezza: mà AE è commensurabile in lunghezza alla Rationale



e 16. del 2.

d 12. del 10.

e 6. defn.
del 10.
f 31. del 1.

g 30. del 10.

h 13. del 10.

K 17. del 10.

I 22. del 10.

m 14. del 2.

n 26. del 6.

o 17. del 6.

p 1. del 6.

q 11. del 5.

AB; faranno le due AG, GE ^d commensurabili in lunghezza alla medesima Rationale AB; e perciò le due AG, GE, ^e sono Rationali. Da i punti F, G, E si tirino le rette FK, GH, EI ^f parallele ad AB, le quali correranno con la retta BC, continuata, come in K, H ed I; faranno le rette FK, GH, EI rationali; stante che ogn'vna è vguale alla Rationale AB: per la qual cosa i rettangoli AH, GI, che sono contenuti dalle rationali AG, AB, & EG, GH, commensurabili in lunghezza, sono Rationali. In oltre perche DE è commensurabile solamente in potenza ad AE, le due DE, AE faranno incommensurabili in lunghezza: mà AE è commensurabile in lunghezza ad AB; farà DE ^h incommensurabile in lunghezza alla medesima AB. E perche DE è commensurabile alla sua metà FE, ouero DF; farà FE, ouero DF ^k incommensurabile in lunghezza ad AB: mà le due DF, FE sono rationali, stante che sono commensurabili alla Rationale DE; faranno le due DF, FE Rationali, ed ogn'vna sarà commensurabile solamente in potenza ad AB, ouero FK. Per la qual cosa i due rettangoli DK, FI, che sono contenuti da lati rationali, e commensurabili solamente in potenza, sono ⁱ Medij.

Si faccia il quadrato LM ^m vguale al rettangolo AH; e si faccia il quadrato NO vguale al rettangolo GI; i quadrati NO, LM, haucranno vn angolo commune, e perciò ⁿ sono intorno al medesimo diametro PQ. Si continui OS in T, ed il lato NS in R. Perche il rettangolo contenuto dalle due AG, GE, per costruzione, è vguale al quadrato di FE; farà FE ^o media proportionale fra le due AG, GE; e farà AG ad EF come EF ad EG: mà i rettangoli AH, IF, IG sono ^p come le basi AG, FE, EG; essendo le basi AG, FE, GE continue proportionali, faranno i rettangoli AH, FI, GI ^q continui proportionali, ed il rettangolo FI farà Medio proportionale fra li due rettangoli AH, GI: farono fatti i quadrati LM,

NO

NO vguale à i rettangoli AH, GI; farà il rettangolo FI Medio proporzionale fra i quadrati LM, NO. E perche il rettangolo LO è Medio proporzionale fra i medefimi quadrati LM, NO; in conseguenza il rettangolo LO farà vguale al rettangolo FI: mà il rettangolo FI è vguale al rettangolo DK, ed il rettangolo LO è vguale al rettangolo NM; farà tutto il rettangolo DI vguale allo gnomone VXY, col quadrato di NO: leuato ne vgualemente gli vguale, cioè il quadrato di NO, ed il rettangolo GI reſta il rettangolo DH vguale allo gnomone VXY; fu fatto, per coſtruzione, il rettangolo AH vguale al quadrato LM; farà il rimanente rettangolo AC vguale al quadrato TR; e perciò il quadrato del lato TS farà vguale al rettangolo AC. Dico che TS è quella retta, che chiamiamo Apotome.

Perche i rettangoli AH, GI ſono dimoſtrati Rationali, i quadrati LM, NO, che gli ſono vguale, faranno Rationali, & i loro lati LP, NP, cioè TO, SO ſono Rationali: In oltre perche il rettangolo FI è dimoſtrato Medio, il rettangolo LO, che gli è vguale, farà ancora Medio, e perciò irrationale: mà il quadrato NO è Rationale; i rettangoli LO, NO faranno incommenſurabili; e le rette TO, SO, che ſono come i rettangoli LO, NO, faranno incommenſurabili in lunghezza. Hor eſſendoci dimoſtrate le due TO, OS, Rationali, e incommenſurabili in lunghezza, faranno le rette TO, SO, Rationali, e commenſurabili ſolamente in potenza. Si che, detratta dalla Rationale TO la Rationale OS, commenſurabile ſolamente in potenza à tutta OT, la rimanente TS, per la 74. di queſto, farà Apotome, ch'era da dimoſtrarſi.


r. del 6.

f. 10. del 10.

THEOREMA LXIX. PROPOSITIONE XCIII.

La retta, il di cui quadrato è vguale al rettangolo, contenuto dalla Rationale, e dalla ſeconda Apotome, è la prima Apotome della Media.

Sia il rettangolo AC contenuto dalla Rationale AB, e dalla ſeconda Apotome AD. Dico che la retta, il di cui quadrato è vguale al rettangolo AC, è quella, che ſi chiama prima Apotome della Media. Sia DE la congruente della ſeconda Apotome AD; per la definizione della ſeconda Apotome, le rette AE, DE, faranno Rationali, commenſurabili ſolamente in potenza; e la congruente DE farà commenſurabile in lunghezza alla Rationale AB, ed il quadrato di AE ſupera il quadrato di E D, per il quadrato d'vna retta, commenſurabile in lunghezza alla compoſta AE. Si diuidi DE in due parti vguale in F, ed il rimanente della co-




ato. del 1.

struzione si faccia, come nell'antecedente proposizione, e si dimostri, come iui si fece, che le parti AG, GE sono commensurabili in lunghezza; e che tutta AE è commensurabile in lunghezza tanto ad AG, quanto à GE. Perche la congruente ED, per la natura dell'Aporome, è commensurabile solamente in potenza alla composta AE, faranno le due AE, DE, incommensurabili in lunghezza; ma DE è commensurabile in lunghezza ad AB; sarà AE $\propto$ incommensurabile in lunghezza alla medesima AB; ma AE è dimostrata commensurabile in lunghezza alle due AG, GE; faranno le due AG, GE, $\propto$ incommensurabili in lunghezza alla Rationale AB. E perche le due AG, GE sono commensurabili ad AE, ch'è Rationale; faranno le due AG, GE $\propto$ Rationali; ed in conseguenza le due AG, GE sono Rationali, e commensurabili solamente in potenza ad AB. Per la qual cosa i rettangoli AH, GI, contenuti dalle Rationali solamente in potenza, $\propto$ sono Medij. In oltre, perche DE è commensurabile in lunghezza alla sua metà D F, ouero FE, e la medesima DE è commensurabile in lunghezza alla Rationale AB; le due DF, FE, $\propto$ faranno commensurabili in lunghezza alla Rationale AB, ouero FK, che gli è uguale; e perciò le due DF, FE, $\propto$ sono Rationali; ed i rettangoli DK, FI, che sono contenuti da linee Rationali, e commensurabili in lunghezza, sono $\propto$ Rationali. Si dimostri, come si fece nell'antecedente proposizione, che il quadrato di TS è uguale al rettangolo AC. Dico che TS è la prima Apotome della Media.

Perche le rette AG, GE, sono commensurabili in lunghezza, i rettangoli AH, GI, $\propto$ che hanno la proportionione di AG à GE, faranno $\propto$ commensurabili; ma i rettangoli AH, GI, sono vguali à i quadrati LM, NO; i medesimi quadrati LM, NO, faranno commensurabili, ed i loro lati LP, NP, ouero TO, OS, sono commensurabili almeno in potenza. Di più perche i rettangoli AH, GI, sono stati dimostrati Medij, i quadrati LM, NO, che gli sono vguali, saranno Medij, ed i loro lati LP, PN, ouero TO, OS, sono Medie, commensurabili almeno in potenza. Oltre à ciò, essendosi dimostrato il rettangolo FI Rationale, e, per quel che si disse nell'antecedente proposizione, è uguale al rettangolo LO; sarà il rettangolo LO Rationale; ma il quadrato NO è dimostrato Medio, sarà il Rationale LO incommensurabile all'irrationale NO; ed i lati TO, OS, $\propto$ che sono come i rettangoli LO, NO, saranno $\propto$ incommensurabili in lunghezza: furono dimostrati i lati TO, OS Medie, e commensurabili in potenza; faranno dunque le rette TO, OS Medie, commensurabili solamente in potenza, le quali contengono il Rationale LO (stante che PO è uguale ad OS) e per la 75. proposizione, detratta dalla Media OT la

Media



Media OS, commensurabile solamente in potenza ad OT, la rimanente TS farà la prima Apotome della Media, il che era da dimostrarsi.


THEOREMA LXX. PROPOSITIONE XCIV.

La retta linea, il di cui quadrato è vguale al rettangolo contenuto dalla Rationale, e dalla terza Apotome, farà la seconda Apotome della Media.

Sia il rettangolo AC, contenuto dalla Rationale AB, e dalla terza Apotome AD. Dico che la retta, il di cui quadrato è vguale al rettangolo AC, farà quella, che si chiama seconda Apotome della Media. Sia DE la congruente della terza Apotome AD, per la definizione della terza Apotome, le rette AE, DE sono Razionali, e commensurabili solamente in potenza, e niuna delle due AE, DE, è commensurabile in lunghezza alla Rationale AB; ed il quadrato della composta AE supera il quadrato della congruente DE, per il quadrato d'una retta, commensurabile in lunghezza ad essa composta AE. Si divide DE in due parti vguali in F, e si faccia il restante della costruzione, come nella 92. proposizione di questo; e, come lui si fece, si dimostri, che le rette AG, GE, sono commensurabili fra loro in lunghezza; dal che l'aggregato AE farà commensurabile in lunghezza tanto ad AG, quanto ad EG: ma la retta AE, per ipotesi, è incommensurabile in lunghezza alla Rationale AB: le due dunque AG, GE, sono incommensurabili in lunghezza ad AB. E perche le medesime AG, GE, sono commensurabili ad AE, ch'è Rationale; faranno ancora loro Razionali.

Per la qual cosa tanto le due BA, AG, quanto le due BA, GE, sono Razionali, e commensurabili solamente in potenza; e perciò i rettangoli AH, GI, contenuti da esse, faranno Medij. In oltre perche la Rationale DE è commensurabile in lunghezza alla sua metà DF, ouero FE; e la medesima DE, per ipotesi, è incommensurabile in lunghezza ad AB; le due DF, FE, faranno Razionali, ed incommensurabili in lunghezza alla Rationale AB: dal che tanto le due BA, DF, quanto le due BA, FE, sono Razionali, e commensurabili solamente in potenza. Per la qual cosa i rettangoli DK, FI, contenuti da esse, sono Medij. Si dimostri poi, come si fece nella proposizione 92. che il quadrato di TS è vguale al rettangolo AC. Dico che TS è la seconda Apotome della Media.

Perche i rettangoli AH, GI, per quel che si è dimostrato, sono Medij, perciò i quadrati LM, NO, che gli sono vguali, faranno Medij, ed i lo-



a 10. del 1.

b 16. del 10.

c 14. del 10.

d 6. defin. del 10.

e 22. del 10.

f 14. del 10.


g 22. del 10.

ro lati LP, NP, ouero TO, OS, sono Medie. Di nuouo, effendosi dimostrate le rette AG, GE, commensurabili in lunghezza, i rettangoli AH, GI, ^h che sono come AG, a GE, saranno ^k commensurabili, ed i quadrati LM, NO, che gli sono vguali, sono commensurabili; dal che i lati LP, PN, ouero TO, OS, sono commensurabili, almeno in potenza. Oltre, a ciò, effendo, per ipotesi, ED commensurabile solamente in potenza ad AE, le due AE, ED, saranno incommensurabili in lunghezza: ma la retta AE è dimostrata commensurabile in lunghezza ad EG, farà DE ^l incommensurabile in lunghezza ad EG: ma DE è commensurabile in lunghezza alla sua metà FE; le due FE, EG, ^m saranno incommensurabili in lunghezza, ed i rettangoli FI, GI, ⁿ che sono come le rette FE, GE, saranno ^o incommensurabili. E perche i rettangoli FI, GI, sono vguali à i rettangoli LO, NO; i rettangoli dunque LO, NO, sono incommensurabili, e le rette TO, OS, ^p che sono come i rettangoli LO, NO, saranno ^q incommensurabili in lunghezza: furono dimostrate Medie, e commensurabili in potenza; saranno dunque le rette TO, OS, Medie, commensurabili solamente in potenza. Finalmente, effendosi dimostrato il rettangolo FI esser Medio, farà il rettangolo LO, che gli è vguale, Medio. Hor effendo le due TO, OS, Medie, commensurabili solamente in potenza, le quali contengono il rettangolo RO Medio, per la 76. propos. di questo, detratta dalla Media OT la Media OS, la rimanente TS farà la seconda Apotome della Media, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA LXXI. PROPOSITIONE XCV.

La retta, il di cui quadrato è vguale al rettangolo contenuto dalla Rationale, e dall'Apotome quarta, è quella, che si chiama Minore.

Sia il rettangolo AC, contenuto dalla Rationale AB, e dalla quarta Apotome AD. Dico che la retta, il di cui quadrato è vguale al rettangolo AC, è quella, che si chiama Minore. Sia DE la congruente della quarta Apotome AD, per la definizione della quarta Apotome, le rette AE, DE, sono Razionali, commensurabili solamente in potenza; e la retta AE è commensurabile in lunghezza alla Rationale AB; ed il quadrato di AE supera il quadrato della congruente DE, per il quadrato d'vna retta, commensurabile in lunghezza all'istessa AE. Si diuidi DE ^a in due parti vguali in F, si applichi ad AE il rettangolo contenuto dalle due AG, GE, vguale al quadrato di FE, cioè vguale alla quarta parte del quadrato di DE, che manchi à compire la linea, per vna figura quadrata; e da tale applicatione sia diuisa



la retta AE in G; perche il quadrato di AE supera il quadrato di DE, per il quadrato d'vna retta, commensurabile in lunghezza alla medesima AE, per la 19. proposizione di questo, le parti AG, GE, sono incommensurabili in lunghezza. Il restante della costruzione si faccia come nella 92. proposizione di questo. Perche AE, per la natura della quarta Apotome, è Rationale, ed è commensurabile in lunghezza alla Rationale AB, il rettangolo AI, contenuto da esse, ^b farà Rationale. Similmente, essendo DE, per l'istessa ragione, Rationale, ed è incommensurabile in lunghezza ad AB; faranno le due AB, DE, Razionali, e commensurabili solamente in potenza; e perciò il rettangolo DI, contenuto dalle due AB, DE, ^c farà Medio. In oltre, essendo le due AG, GE, incommensurabili in lunghezza, ed il rettangolo AH al rettangolo GI ^d è come AG, à GE; i rettangoli AH, GI, ^e faranno incommensurabili. Si dimostri poi, come si fece nella 92. di questo, che il quadrato di TS è vguale al rettangolo AC. Dico che TS è la Minore.

b 20. del 10.

c 22. del 10.

d 1. del 6.

e 10. del 10.

Per costruzione il rettangolo AI è vguale à i quadrati LM, NO, cioè vguale all'aggregato de i quadrati di LP, PN, ouero di TO, OS: ma il rettangolo AI è dimostrato Rationale; l'aggregato d'due de i quadrati di TO, OS, farà Rationale. Di nuouo, perche il rettangolo DI è dimostrato Medio, il doppio rettangolo LO, cioè il doppio rettangolo contenuto dalle due TO, OS, che gli è vguale, farà ancora Medio. Finalmente perche i rettangoli AH, GI sono dimostrati incommensurabili, i quadrati LM, NO, che gli sono vguali, faranno incommensurabili, ed i loro lati LP, PN, ouero TO, OS sono incommensurabili in potenza. E perche l'aggregato de i loro quadrati è dimostrato Rationale, & il doppio rettangolo, contenuto dalle medesime TO, OS, è Medio, per la 77. proposizione di questo, la retta TS è quella, che si chiama Minore, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA LXXII. PROPOSITIONE XCVI.

La retta, il di cui quadrato è vguale al rettangolo contenuto dalla Rationale, e dalla quinta Apotome, è quella, che col Rationale fa il tutto Medio.

Sia il rettangolo AC, contenuto dalla Rationale AB, e dalla quinta Apotome AD. Dico che la retta, il di cui quadrato è vguale al rettangolo AC, è quella, che si dice col Rationale fa il tutto Medio. Sia DE la congruente della quinta Apotome AD; per la defin. della quinta Apotome, le rette AE, DE sono Razionali, commensurabili solamente in potenza; e la congruente DE è commensurabile in lunghezza alla Rationale AB, ed il quadrato di AE supera il quadrato di DE, per il quadrato d'vna retta, incommensurabile alla medesima AE. Si diuidi DE ^a in due parti vguali in F, ed il rimanente si costruiscia, come nell'altre; ^c per quel che si è dimostrato nell'antecedente proposizione, le due AG, GE sono incommensurabili in lunghezza. E perche AE è Rationale,


a 10. del 6.

ed

b 10. del 10.

ed incommensurabile in lunghezza alla Rationale AB, farà, come fu dimostrato alla 93. proposizione, il rettangolo AI Medio. In oltre, perchè DE è Rationale, ed è commensurabile in lunghezza alla Rationale AB; farà il rettangolo DI b Rationale. Si prouì, come si fece nell'antecedente proposizione, che i due rettangoli AH, GI, sono incommensurabili; e si dimostri, come nella 92. proposizione, che il quadrato di TS è vguale al rettangolo AC. Dico che TS è quella, che col Rationale fa il tutto Medio.

Essendosi dimostrato, che il rettangolo AI è Medio, l'aggregato de i quadrati LM, NO, che gli è vguale, farà Medio; cioè l'aggregato de i quadrati de i lati LP, PN, ouero TO, OS, è Medio. Parimente, essendosi dimostrato il rettangolo DI Rationale, farà il doppio rettangolo LO, che gli è vguale, Rationale: ma il rettangolo LO è contenuto dalle due rette TO, OS, (stante che OS è vguale ad OP) farà il doppio rettangolo contenuto dalle due TO, OS, Rationale. Si mostri, come si fece nell'antecedente proposizione, che le due TO, OS sono incommensurabili in potenza; ed haueremo le due rette TO, OS, incommensurabili in potenza, l'aggregato de i loro quadrati è Medio, & il doppio rettangolo, da loro contenuto, è Rationale, per la 78. proposizione di questo, farà la rimanente TS quella, che col Rationale fa il tutto Medio, come fu proposto dimostrare.



THEOREMA LXXIII. PROPOSITIONE XCVII.

La retta, il di cui quadrato è vguale al rettangolo, contenuto dalla Rationale, e della sesta Apotome, è quella, che col Medio fa il tutto Medio.

a 10. del 2.

Sia il rettangolo AC, contenuto dalla Rationale AB, e dalla sesta Apotome AD. Dico che la retta, il di cui quadrato è vguale al rettangolo AC, è quella, che col Medio fa il tutto Medio. Sia DE la congruente della sesta Apotome AD, per la definizione di detta Apotome, le rette AE, DE, saranno Razionali, e commensurabili tolamente in potenza; e niuna delle due AE, DE, farà commensurabile in lunghezza alla Rationale AB; ed il quadrato di AE farà maggiore del quadrato di DE, per il quadrato d'vna retta, incommensurabile in lunghezza alla composta AE. Si diuida DE in due parti vguale in F, ed il rimanente si costruisca, come si fece nell'antecedenti proposizioni; faranno le due AG, GE, come fu dimostrato nella 95. proposizione fra di loro incommensurabili:

rabili:


rabili: per la qual cosa i rettangoli AH, GI, che sono come le basi AG, GE, faranno incommensurabili. Di nuovo, perche le due AE, ED sono Rationali, ed ogn'vna è incommensurabile in lunghezza alla Rationale AB; tanto le due AB, AE, quanto le due AB, DE sono Rationali, e commensurabili solamente in potenza. Per la qual cosa i rettangoli AI, DI, sono Medij. Di più, essendo, per ipotesi, le due AE, DE, commensurabili solamente in potenza, cioè incommensurabili in lunghezza, i rettangoli AI, DI, che sono come le basi AE, DE, faranno ^d fra loro incommensurabili. Si dimostri, come si fece nella 92. proposizione, che il quadrato di TS è uguale al rettangolo AC. Dico che la retta TS è quella, che col Medio fa il tutto Medio.

Essendo AI per quel che si è dimostrato, Medio, ed il rettangolo AI, è uguale all'aggregato de i quadrati LM, NO, cioè all'aggregato de i quadrati de i lati LP, PN, ouero TO, OS; l'aggregato de i quadrati delle rette TO, OS, sarà ancora Medio. In oltre, perche DI è uguale al doppio rettangolo LO, cioè al doppio rettangolo, contenuto dalle due TO, OS, ed il rettangolo DI è dimostrato Medio; sarà il doppio rettangolo, contenuto dalle rette TO, OS, Medio. Di più, essendosi dimostrato DI incommensurabile al rettangolo AI, sarà il doppio rettangolo, contenuto dalle due TO, OS, incommensurabile all'aggregato de i quadrati di TO, OS. Finalmente si dimostri, come si fece nella proposizione 95. che le rette TO, SO, sono incommensurabili in potenza; ed haueremo le rette TO, SO, incommensurabili in potenza; l'aggregato de loro quadrati è Medio, & il doppio rettangolo, contenuto dalle medesime, è ancora Medio, ed è incommensurabile all'aggregato de i loro quadrati, e per la 79. proposizione, la rimanente TS è quella, che col Medio fa il tutto Medio, ch'era da dimostrarfi.

THEOREMA LXXIV. PROPOSITIONE XCVIII.

Applicando il quadrato dell'Apotome alla Rationale, l'altro lato, che ne risulta, è prima Apotome.

Sia l'Apotome AB, e la sua congruente BC, in modo, che le due AC, BC, siano Rationali, e commensurabili solamente in potenza, e sia esposta qualunque Rationale DE, alla quale si applichi il rettangolo DF, uguale al quadrato di AB, e ne risulti il lato DG. Dico che DG è pri-



b 12. del 10.

c 1. del 6.


d 80. del 10.

a 45. del 1.

C c c c

ma

b 45. del 1.^o ma Apotome. Si applichi di nuovo alla Rationale DE ^b il rettangolo DH, vguale al quadrato di AC, ed al lato IH si applichi il rettangolo IK vguale al quadrato di BC, in modo, che tutto il rettangolo DK sia vguale all'aggregato de i quadrati delle due AC, CB. E perche l'aggregato de i quadrati delle rette AC, CB, cioè il rettangolo DK, è vguale ^c al doppio rettangolo contenuto dalle medesime AC, CB, col quadrato di AB; leuarene il quadrato di AB, cioè il rettangolo DF, resta il rettangolo GK vguale al doppio rettangolo delle due AC, CB. Si che diuisa GL, ^d in due parti vguali in M, e tirata dal punto M ^e la retta MN, parallela ad ED, ogn'vno de i rettangoli GN, MK, ^f sarà vguale al rettangolo contenuto dalle due AC, CB. Di nuovo, perche le due AC, BC, sono Rationali, i loro quadrati saranno ancora ^g Rationali, e perciò commensurabili frà di loro; ed il loro aggregato; cioè l'aggregato de i quadrati di AC, CB, ^h sarà commensurabile tanto al quadrato di AB, quanto al quadrato di BC: ma i quadrati di AC, CB, sono, per quel che si è detto, Rationali; sarà l'aggregato de i quadrati di AC, CB, cioè il rettangolo DK, Rationale; il quale, applicato alla Rationale DE, fa il lato DL ^k Rationale, e commensurabile in lunghezza alla Rationale DE. E perche le due AC, CB, per ipotesi, sono Rationali, e commensurabili solamente in potenza; il rettangolo contenuto dalle medesime AC, CB, sarà Medio, & il doppio rettangolo delle due AC, CB, che gli è commensurabile, sarà ancora Medio; ma il doppio rettangolo delle due AC, CB, è vguale al rettangolo GK; il rettangolo dunque GK sarà Medio, il quale, applicato alla Rationale GF, ouero DE, ⁱ fa il lato GL Rationale, ed incommensurabile in lunghezza alla Rationale GF, ouero DE. E perche GK è irrationale, cioè è Medio, ed il rettangolo DK è dimostrato Rationale; sarà il rettangolo DK incommensurabile al rettangolo GK; e le rette DL, LG, ^m che sono come i rettangoli DK, GK, sono ⁿ incommensurabili in lunghezza; le quali, essendo state dimostrate Rationali, saranno Rationali, e commensurabili solamente in potenza; e, per la 74. propositione di questo, la rimanente DG sarà Apotome. Dico che è prima Apotome.



Per l'ultimo Coroll. alla 1. propos. del 6. Libro, il rettangolo contenuto dalle due AC, BC, cioè il rettangolo MK, è Medio proportionale frà i quadrati delle due AC, BC, ed i quadrati delle due AC, BC sono vguali a i rettangoli DH, IK; sarà il rettangolo MK Medio proportionale frà i due rettangoli DH, IK; e sarà il rettangolo DH al rettangolo MK, come il medesimo rettangolo MK al rettangolo IK; ma questi rettangoli sono ^o come le rette DI, LM, LI; saranno le rette DI, LM, LI, continue proportionali; ed il rettangolo contenuto dalle estreme DI, LI, ^p sarà

vqua-

vguale al quadrato di ML. Si è dunque ad LD applicato il rettangolo contenuto dalle due DI, IL, vguale al quadrato di ML, cioè vguale alla quarta parte del quadrato di GL, e manca à compire la linea per il quadrato di IL. In oltre, perche i quadrati delle due AC, BC, sono commensurabili, faranno i rettangoli DH, IK, che gli sono vguali, frà di loro commensurabili, ed i lati DI, IL, che sono ^a come i rettangoli DH, IK, saranno ^r commensurabili in lunghezza. Hor essendo le rette DL, GL, ineguali, ed alla maggiore DL si è applicato il rettangolo contenuto dalle rette DI, IL, vguale alla quarta parte del quadrato della minore GL, e gli manca à compire la linea per il quadrato di IL; essendo le parti DI, IL, commensurabili in lunghezza; per la 18. propositione di questo, il quadrato di DL supererà il quadrato della congruente GL, per il quadrato d'vna retta, commensurabile in lunghezza alla composta DL; ed è la composta DL commensurabile in lunghezza alla Rationale DE; per la prima delle terze definitioni, farà DG prima Apotome, ch'era da dimostrarsi.

g 1. del 6.
r 10. del 10.


THEOREMA LXXV. PROPOSITIONE XCIX.

Applicando alla Rationale il quadrato della prima Apotome della Media; l'altro lato, che ne risulta, farà la seconda Apotome.

Sia AB la prima Apotome della Media, e la sua congruente sia BC, in modo, che le due AC, BC, siano Medie, commensurabili solamente in potenza, le quali contengano vn rettangolo Rationale. Si esponga qualunque Rationale DE, alla quale s'applichi ^a il rettangolo DF, vguale al

a 45. del 1.

quadrato di AB, e ne risulti il lato DG. Dico che DG è seconda Apotome. Si faccia la medesima costruzione dell' antecedente propositione, in modo, che i rettangoli DH, IK, siano vguali à i quadrati di AC, CB, ed il rettangolo GK vguale al doppio rettangolo, contenuto dalle medesime AC, BC, e la metà, cioè il rettangolo MK, vguale al semplice rettangolo delle due AC, CB. Perche le due AC, CB, sono Medie, commensurabili solamente in potenza, i loro quadrati, cioè i rettangoli DH, IK, che gli sono vguali, faranno Medij, frà di loro commensurabili; dal che il loro aggregato DK ^b farà commensurabile all'vno, ed all'altro; e perciò DK ^c farà Medio, il quale, applicato alla Rationale DE, fa l'altro lato DL ^d Rationale, ed incommensurabile in lunghezza alla Rationale DE. Di nuouo, perche il rettangolo contenuto dalle due AC, CB, è Rationale, il doppio rettangolo delle medesime AC, CB, cioè



b 16. del 10.

c Corollalla
14. del 10.
d 23. del 10.

c. 17. del 10.

f. 1. del 6.
g. 10. del 10.

il rettangolo GK, sarà Rationale, il quale applicato alla Rationale GF, ouero DE, e fa il lato GL Rationale, e commensurabile in lunghezza alla Rationale DE. E perche DK è irrationale, cioè Medio, ed il rettangolo GK è Rationale; i rettangoli DK, GK, saranno incommensurabili: ma i rettangoli DK, GK, sono come le basi DL, GL; saranno le rette DL, GL, incommensurabili in lunghezza: furono dimostrate Razionali, perciò le rette DL, GL, saranno Razionali, commensurabili solamente in potenza; e per la 74. proposizione di questo, la rimanente DG sarà Apotome; la di cui congruente sarà GL. Dico che DG è seconda Apotome. Si dimostri, come si fece nell'antecedente proposizione, che il quadrato di DL supera il quadrato di GL, per il quadrato d'vna retta, commensurabile in lunghezza alla medesima DL. E perche si è dimostrato, che la congruente GL è commensurabile in lunghezza alla Rationale DE, per la seconda delle terze defin. DG, sarà seconda Apotome, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA LXXVI. PROPOSITIONE C.

Applicando alla Rationale il quadrato della seconda Apotome della Media, l'altro lato, che ne risulta, è terza Apotome.

a. 45. del 1.


b. 13. del 10.

c. 13. del 10.

d. 1. del 6.

e. 19. del 10.

Sia AB la seconda Apotome della Media, la di cui congruente sia BC, in modo, che le due AC, CB, siano Medie, commensurabili solamente in potenza, e che contengano vn rettangolo Medio. Si esponga qualunque Rationale DE, alla quale sia applicato ^a il rettangolo DF, vguale al quadrato di AB, e ne risulti il lato DG. Dico che DG è terza Apotome. Si faccia la medesima costruzione, che si è fatta nelle antecedenti, e si dimostri, come nella precedente proposizione, che il rettangolo DK è Medio, il quale, applicato alla Rationale DE, ^b fa il lato DL Rationale, ed incommensurabile in lunghezza ad ED. E perche il rettangolo contenuto dalle due AC, CB, per ipotesi, è Medio, il doppio rettangolo delle medesime AC, CB, cioè il rettangolo GK, sarà Medio; il quale, applicato alla Rationale GF, ouero DE, fa il lato GL ^c Rationale, ed incommensurabile in lunghezza alla Rationale DE. Prese AC, BC, come basi di due rettangoli, e l'altezza comune sia AC; farà il quadrato di AC al rettangolo delle due AC, CB, ^d come AC à CB: ma, per ipotesi, le due AC, CB, sono incommensurabili in lunghezza; farà il quadrato di AC e incommensurabile al rettangolo conte-




nuto

nuto dalle due AC, CB. In oltre, perche le rette AC, CB, sono, per ipotesi, commensurabili in potenza, i loro quadrati faranno fra loro commensurabili; e l'aggregato de i quadrati di AC, CB, ^f farà commensurabile al quadrato di AC: ma il quadrato di AC è dimostrato incommensurabile al rettangolo delle due AC, CB; ^g farà l'aggregato de i quadrati di AC, CB, ^z incommensurabile al rettangolo delle medesime AC, CB. E perche il rettangolo delle due AC, CB, è commensurabile al suo doppio, cioè al doppio rettangolo delle medesime AC, CB; ^h farà l'aggregato de i quadrati di AC, CB, cioè il rettangolo DK, ⁱ incommensurabile al doppio rettangolo delle due AC, CB, cioè al rettangolo GK: sono i rettangoli DK, GK, ^k come le basi DL, LG; faranno le rette DL, LG, ^l incommensurabili in lunghezza; e perche furono dimostrate Rationali, le due dunque DL, GL, sono Rationali, e commensurabili solamente in potenza, e per la 74. proposizione, la rimanente DG farà Apotome, la di cui congruente farà GL. Dico che DG è terza Apotome. Si dimostri, come si fece nella proposizione 98, che il quadrato di DL supera il quadrato di GL, per il quadrato d'una retta, commensurabile in lunghezza alla composta DL. Perche nessuna delle due DL, GL, per quel che si è dimostrato, è commensurabile in lunghezza alla Rationale DE; per la terza delle terze definitioni, farà DG quella, che si chiama terza Apotome, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA LXXVII. PROPOSITIONE CI.

Applicando alla Rationale il quadrato della Minore; il lato, che ne risulta, farà quarta Apotome.

Sia la minore AB, e la sua congruente BC, in modo, che le due AC, CB, siano incommensurabili in potenza, l'aggregato de i loro quadrati sia Rationale, & il doppio rettangolo contenuto dalle medesime AC, CB, sia Medio; e sia esposta qualunque Rationale DE, alla quale sia applicato il rettangolo DF, ^a uguale al quadrato della minore AB, e ne risultati il lato DG. Dico che DG è la quarta Apotome. Si faccia la medesima costruzione, come nell'altre del medesimo Senario. Perche l'aggregato de i quadrati di AC, CB, cioè il rettangolo DK, per ipotesi, è Rationale, applicato alla Rationale DE, ^b fa l'altro lato DL Rationale, e commensurabile in lunghezza alla Rationale DE. Di nuovo, perche il doppio rettangolo contenuto dalle due AC, CB, cioè GK, è Medio, applicato alla Rationale GF, ouero DE, fa l'altro lato GL



Ratio-

f 16. del 10.

g 14. del 10.

h 14. del 10.

k 1. del 6.

l 10. del 10.

a 45. del 5.

b 22. del 10.

c 23. del 20.

d 1. del 6.
e 10. del 10.

f 11. del 6.
g 10. del 10.

Razionale, ed incommensurabile in lunghezza alla Razionale DE. In oltre, perche DK è Razionale, ed il rettangolo GK è irrazionale, cioè Medio, i rettangoli DK, GK, saranno fra loro incommensurabili: ma i rettangoli DK, GK, ^d sono come le basi DL, GL; saranno le rette DL, GL, ^e incommensurabili in lunghezza; e perche le medefime DL, GL, furono dimostrate Razionali, le due dunque DL, GL, sono Razionali, e commensurabili solamente in potenza, e per la 74. proposizione, la rimanente DG sarà Apotome, la di cui congruente sarà GL. Dico che DG è quarta Apotome. Perche le due AC, BC, per ipotesi, sono incommensurabili in potenza, saranno i loro quadrati, cioè i rettangoli DH, IK, ^f incommensurabili: ma i rettangoli DH, IK, ^g sono come le basi DI, IL, le rette DI, IL ^g saranno incommensurabili in lunghezza. E perche il rettangolo contenuto dalle medefime DI, IL, è vguale al quadrato di ML, come fu dimostrato nella 98. propof., sarà applicato alla retta DL il rettangolo contenuto dalle due DI, IL, vguale al quadrato di ML, cioè vguale alla quarta parte del quadrato di GL, e manca à compire la linea per il quadrato di LI. E perche le rette DI, IL, sono state dimostrate incommensurabili in lunghezza, per la 19. propof. di questo, il quadrato della composta DL supera il quadrato della congruente GL, per il quadrato d'vna retta incommensurabile in lunghezza alla composta DL: e fu dimostrata la composta DL commensurabile in lunghezza alla Razionale DE; per la quarta delle terze defin. sarà DG la quarta Apotome, ch'era da dimostrarsi.


THEOREMA LXXVIII. PROPOSITIONE CII.

Applicando alla Razionale il quadrato di quella, che col Razionale fa il tutto Medio, l'altro lato, che ne risulta, sarà la quinta Apotome.

Sia AB quella retta, che col Razionale fa il tutto Medio, la di cui congruente sia BC, in modo, che le due AC, CB siano incommensurabili in potenza, l'aggregato de i loro quadrati sia Medio, & il doppio rettangolo contenuto dalle medefime AC, CB, sia Razionale: si epongua qualunque Razionale DE, alla quale sia applicato il rettangolo DF, ^a vguale al quadrato di AB, che ne risulti il lato DG. Dico che DG è la quinta Apotome. Sia fatta la medefima costruzione, che si è fatta nell'altre del medesimo Senatio. Perche l'aggregato de i quadrati di AC, CB, cioè il rettangolo DK, è Medio, applicato alla Razionale DE, l'altro lato DL ^b sarà Razionale, ed incommensurabile

a 45. del 1.

b 37. del 10.



bile


bile in lunghezza alla Rationale DE. Di più perche il doppio rettangolo contenuto dalle medesime AC, CB, cioè il rettangolo GK, è Rationale, applicato alla Rationale DE, l'altro lato GL^a sarà Rationale, e c 23. del 10.
 commensurabile in lunghezza, alla Rationale DE. Hor essendo DK irrationale, cioè Medio, ed il rettangolo GK è Rationale, i rettangoli DK, GK, saranno incommensurabili: ma i rettangoli DK, GK, sono come le basi DL, GL; saranno le rette DL, GL, incommensurabili in lunghezza, le quali essendo state dimostrate Razionali, faranno Razionali, e commensurabili solamente in potenza; e per la 74. propositione, la retta DG sarà Apotome, la di cui congruente sarà GL. Dico che DG è quinta Apotome. Si dimostri, come si fece nell'antecedente propositione, che il quadrato di DL è maggiore del quadrato di GL, per il quadrato d'una retta incommensurabile in lunghezza alla composta DL. Essendosi dimostrato, che la congruente GL è commensurabile in lunghezza alla Rationale DE, per la quinta delle terze definizioni, la retta DG sarà quella, che si dice quinta Apotome, come fu proposto dimostrare.

THEOREMA LXXIX. PROPOSITIONE CIII.

Applicando alla Rationale il quadrato di quella retta, che col Medio fa il tutto Medio; l'altro lato, che ne risulta, sarà la sesta Apotome.

Sia AB quella retta, che col Medio fa il tutto Medio, la di cui congruente sia BC, in modo, che le due AC, CB, siano incommensurabili in potenza, l'aggregato de i quadrati di AC, CB, sia Medio, & il doppio rettangolo contenuto dalle medesime AC, CB, sia Medio, incommensurabile all'aggregato de i quadrati di AC, CB.


Sia esposta qualunque Rationale DE, alla quale sia applicato il rettangolo DF^a uguale al quadrato di AB, e ne risulti il lato DG. Dico che DG è la sesta Apotome. Si faccia la medesima costruzione delle altre del medesimo Scenario. Perche l'aggregato de i quadrati di AC, CB, cioè il rettangolo DK, è Medio, applicato alla Rationale DE, fa l'altro lato DL^b Rationale, ed incommensurabile in lunghezza alla Rationale DE. Similmente, perche il doppio rettangolo contenuto dalle due AC, CB, cioè il rettangolo GK, è Medio, applicato alla Rationale DE, fa il lato DL^c Rationale, ed incommensurabile in lunghezza alla Rationale DE. E perche l'aggregato de i quadrati di AC, CB, cioè il rettangolo DK, è incommensurabile, per ipotesi, al doppio rettangolo delle due AC, CB, cioè al rettangolo



GK.

d 1. del 6.
e 10. del 10.


GK, ed i rettangoli DK, GK^d sono come le basi DL, LG; faranno le rette DL, LG, e incommensurabili in lunghezza: ma le medesime DL, LG sono state dimostrate Rationali, faranno le due DL, LG Rationali, e commensurabili solamente in potenza; e per la 74. proposizione, la rimanente DG sarà Apotome. Dico che è sesta Apotome. Si dimostri, come si fece nella 101. proposizione, che il quadrato di DL supererà il quadrato della congruente GL, per il quadrato d'una retta incommensurabile alla composta DL. E perchè le due DL, GL, sono state dimostrate incommensurabili in lunghezza alla Rationale DE; per la sesta delle terze definizioni, la retta DG sarà la sesta Apotome, ch'era da dimostrarsi.



THEOREMA LXXX. PROPOSITIONE CIV.

La retta linea, ch'è commensurabile in lunghezza all' Apotome, è Apotome del medesimo ordine.

Sia l'Apotome AB, la di cui congruente BC, in modo, che le due AC, BC, siano Rationali, e commensurabili solamente in potenza; e sia la retta DE commensurabile in lunghezza ad AB. Dico che DE è Apotome del medesimo ordine dell'Apotome AB. Si faccia sì come AB à DE, e così BC ad EF, farà tutta AC à tutta DF, b come AB à DE, ouero come BC ad EF. E perchè le due



a 12. del 6.
b 11. del 5.

c 10. del 10.

d 6. defin.
del 10.

AB, DE sono, per ipotesi, commensurabili in lunghezza, farà AC e commensurabile in lunghezza à DF, e farà BC commensurabile in lunghezza ad EF: ma le due AC, BC, per ipotesi, sono Rationali; faranno le due DF, FE, che gli sono commensurabili, d ancora Rationali; e perchè le due AC, CB, sono commensurabili solamente in potenza, le due ancora DF, FE, per lo Scolio alla 10. proposizione, saranno commensurabili in potenza: per la qual cosa le due DF, FE, sono Rationali, e commensurabili solamente in potenza, e per la 74. proposizione, la rimanente DE sarà Apotome. Dico che è del medesimo ordine dell'Apotome AB. E prima sia il quadrato di AC maggiore del quadrato di BC, per il quadrato d'una retta linea, commensurabile in lunghezza ad AC. Perchè AC à CB è come DF ad FE, per la 15. proposizione, ancora il quadrato di DF supererà il quadrato di FE, per il quadrato d'una retta commensurabile in lunghezza alla retta DF. Se dunque AC è commensurabile in lunghezza à qualche Rationale, in modo, che AB sia prima Apotome; e

sendo

sendo DF, commensurabile in lunghezza ad AC, sarà ancora DF ϵ commensurabile in lunghezza alla medesima Rationale, e per la prima delle terze definizioni, la retta DE sarà prima Apotome, cioè del medesimo ordine dell'Apotome AB. Se poi BC sarà commensurabile in lunghezza alla Rationale, sarà nell'istesso modo EF commensurabile in lunghezza alla medesima Rationale; ed ambedue AB, DE, faranno seconde Apotome. E se nessuna delle due AC, CB, sarà commensurabile in lunghezza alla Rationale, ne meno alcuna delle due DF, FE, sarà commensurabile in lunghezza alla medesima Rationale: per la qual cosa le due AB, DE, faranno terze Apotome.

Finalmente sia il quadrato di AC maggiore del quadrato di CB, per il quadrato d'vna retta, incommensurabile in lunghezza ad AC, per la 15. proposizione, il quadrato di DF sarà maggiore del quadrato di EF, per il quadrato d'vna retta, incommensurabile in lunghezza alla medesima DF; e perciò, come prima, se AB è quarta, o quinta, o sesta Apotome, ancora DE sarà quarta, quinta, o sesta Apotome, ch'è da dimostrarsi.

THEOREMA LXXXI. PROPOSITIONE CV.

La retta linea, ch'è commensurabile all'Apotome della Media, è ancor essa Apotome della Media, e del medesimo ordine.

Sia qualunque Apotome della Media AB, la di cui congruente sia BC, in modo, che le due AC, BC, siano Medie, commensurabili solamente in potenza; e sia DE commensurabile ad AB, o in lunghezza, e potenza, o uero solamente in potenza. Dico che la retta DE è Apotome della Media, e del medesimo ordine. Si faccia, come prima, si come AB à DE, a così BC ad EF; sarà tutta AC à DF, ^b come AB à DE, è come BC ad EF. Perche le due AB, DE, per ipotesi, sono commensurabili o in lunghezza, e potenza, o in potenza solamente; faranno le due AC, DF, ^c e le due ancora BC, EF, nell'istesso modo commensurabili o in lunghezza, e potenza, o uero in potenza solamente. E perche le due AC, BC, sono Medie, le due ancora DF, FE, che gli sono commensurabili; ^d faranno Medie. In oltre, perche AC à DF è come BC ad EF, permutando, AC à CB ϵ sarà come DF ad FE: ma le due AC, CB sono commensurabili solamente in potenza, per lo Scolio alla 10. proposizione, le due DF, FE, faranno commensurabili solamente in potenza: sono le due DF, FE, per quel che si è dimostrato, Medie, e, per la 75. proposizione, la rimanente DE sarà prima Apotome della Media. Dico che è del medesimo ordine della Media AB. Prese AC, CB come basi di due rettangoli, de' quali AC sia altezza comune, sarà il quadrato di AC ^e al rettangolo contenuto delle due AC, CB, come AC a CB. E nell'istesso modo



D d d

fi di-

e 10. del 10.

a 11. del 6.

b 11. del 5.

c 10. del 10.

d Corol. alla

24. del 10.

e 16. del 5.


f 1. del 6.

si dimostrerà, che DF ad FE è come il quadrato di DF al rettangolo delle due DF, FE: ma DF ad FE è dimostrata come AC à CB; farà il quadrato di AC al rettangolo contenuto dalle due AC, CB, s come il quadrato di DF al rettangolo delle due DF, FE; e permutando, il quadrato di AC al quadrato di DF^h sarà come il rettangolo contenuto dalle due AC, CB, al rettangolo delle due DF, FE: ma il quadrato di AC è commensurabile al quadrato di DF (stante che le rette AC, DF, sono dimostrate commensurabili) farà il rettangolo delle due AC, CB,^k commensurabile al rettangolo delle due DF, FE. Se dunque il rettangolo contenuto dalle due AC, CB è Razionale, in modo, che AB sia prima Apotome della Media, farà ancora il rettangolo contenuto dalle due DF, FE,^l che gli è commensurabile, Razionale: Dal che la retta DE farà quella, che si chiama prima Apotome della Media, cioè del medesimo ordine dell'Apotome AB. Se poi il rettangolo delle due AC, CB, è Medio, in modo, che AB sia seconda Apotome della Media; farà il rettangolo delle due DF, FE, che gli è commensurabile, Medio. Per la qual cosa la retta DE sarà ^m seconda Apotome della Media, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA LXXXII. PROPOSITIONE CVI.

La retta linea, ch'è commensurabile alla minore, è ancor essa Minore.

Sia la Minore AB, la di cui congruente BC, in modo, che le due AC, BC, siano incommensurabili in potenza; che l'aggregato de i quadrati di AC, CB, sia Razionale, & il doppio rettangolo, contenuto dalle medesime AC, CB sia Medio: e sia DE commensurabile ad AB, ò in lunghezza, e potenza, ouero in potenza solamente. Dico che la retta DE è quella, che si chiama Minore. Si faccia la medesima costruzione dell' antecedente proposizione, e si prouì, come in i si fece, che le due DF, AC, come ancora le due EF, BC, sono commensurabili ò in lunghezza, e potenza, ouero in potenza solamente. E perche AC à DF è come BC ad EF, permutando, AC à BC^a sarà come DF ad EF, ed il quadrato di AC al quadrato di BC^b sarà come il quadrato di DF al quadrato di FE; e componendo, l'aggregato de i quadrati di AC, CB, al quadrato di CB,^c farà come l'aggregato de i quadrati di DF, FE, al quadrato di FE; e permutando, l'aggregato de i quadrati di AC, CB all'aggregato de i quadrati di DF, FE, ^d sarà come il quadrato di CB al quadrato di EF: Ma il quadrato di CB è commensurabile al quadrato di FE (stante che le rette CB, FE, sono state dimostrate commensurabili) farà l'aggregato de i quadrati di AC, CB, ^e commensurabile all'aggregato de i quadrati di DF, FE. E perche l'aggregato de i quadrati di AC, CB, per ipotesi, è Razionale; l'aggregato ancora de i quadrati di DF, FE, che gli è commensurabile, ^f sarà Razionale. Si dimostri, come si fece nell' antecedente



a 16. del 5.

b 22. del 6.

c 18. del 5.

d 16. del 5.

e 10. del 10.

f 9. defin. del 10.

dente

dente proposizione , che il rettangolo , contenuto dalle due AC , CB , è commensurabile al rettangolo , contenuto dalle due DF , FE ; dal che il doppio rettangolo delle due AC , CB , sarà commensurabile al doppio rettangolo delle due DF , FE : ma il doppio rettangolo delle due AC , CB , per ipotesi , è Medio ; sarà il doppio rettangolo delle due DF , FE , ^a che gli è commensurabile , Medio . E perchè AC à BC è come DF ad FE , e le due AC , CB , sono , per ipotesi , incommensurabili in potenza ; saranno le due ancora DF , FE , ^b incommensurabili in potenza . Hor essendo le due DF , FE , incommensurabili in potenza , l'aggregato de i loro quadrati è Rationale , & il doppio rettangolo , contenuto dalle medesime DF , FE , è Medio : per la 77. proposizione di questo , la retta DE sarà quella , che si chiama Minore , come fu proposto dimostrare .

^a Corollalla
24. del 10.


^b 10. del 10.

THEOREMA LXXXIII. PROPOSITIONE CVII.

La retta linea , ch'è commensurabile à quella , che col Rationale fa il tutto Medio , è ancor essa quella , che col Rationale fa il tutto Medio .

Sia AB quella retta , che col Rationale fa il tutto Medio , la di cui congruente sia BC , in modo , che le due AC , CB , siano incommensurabili in potenza : l'aggregato de i loro quadrati , cioè di AC , CB , sia Medio , & il doppio rettangolo , contenuto dalle medesime AC , CB , sia Rationale ; e sia DE commensurabile ad AB in qualunque modo . Dico che ED è quella , che col Rationale fa il tutto Medio .

Si faccia la medesima costruzione dell'altre antecedenti , e si dimostri , come si fece nell'antecedente proposizione , che l'aggregato de i quadrati delle due AC , CB , è commensurabile all'aggregato de i quadrati delle due DF , FE : ma l'aggregato de i quadrati di AC , CB , per ipotesi , è Medio ; sarà l'aggregato de i quadrati di DF , FE , ^a Medio . Similmente si dimostri , come si fece nella 105. proposizione , che il rettangolo delle due AC , CB , è commensurabile al rettangolo delle due DF , FE ; dal che i loro doppij saranno ancora commensurabili : ma il doppio rettangolo delle due AC , CB , per ipotesi , è Rationale ; sarà il doppio rettangolo delle due DF , FE , che gli è commensurabile , ^b Rationale . Finalmente perchè AC à CB è come DF ad FE , e le due AC , CB , per ipotesi , sono incommensurabili in potenza ; saranno ancora le due DF , FE , ^c incommensurabili in potenza . Hor essendo le due DF , FE , incommensurabili in potenza , l'aggregato de i quadrati di DF , FE , è Medio ; & il doppio rettangolo , contenuto dalle medesime , è Rationale ; per la 78. proposizione di questo , sarà la retta DE quella , che col Rationale fa il tutto Medio , ch'era da dimostrarsi .



^a Corollalla
24. del 10.

^b 9. defin.
del 10.


^c 10. del 10.

THEOREMA LXXXIV. PROPOSITIONE CVIII.

La retta linea, ch'è commensurabile à quella, che col Medio fa il tutto Medio, è ancor essa quella, che col Medio fa il tutto Medio.

Sia AB quella retta, che col Medio fa il tutto Medio, la di cui congruente sia BC, in modo, che le due AC, BC siano incommensurabili in potenza, l'aggregato de i loro quadrati sia Medio, & il doppio rettangolo contenuto dalle medesime AC, CB sia Medio, incommensurabile all'aggregato de i loro quadrati; e sia DE commensurabile ad AB in qualunque modo. Dico che DE è quella, che col Medio fa il tutto Medio.

Si faccia la medesima costruzione, dell'altre di questo Senario, e si dimostri, come nella 106. che l'aggre-



a 14. del 10.

b 14. del 10.

c 10. del 10.

d 14. del 10.

gato de i quadrati di AC, CB è commensurabile all'aggregato de i quadrati di DF, FE. Essendo, per ipotesi, l'aggregato de i quadrati di AC, CB Medio, sarà ancora l'aggregato de i quadrati di DF, FE Medio. In oltre si dimostri, come si fece nella 105. proposizione, che il rettangolo delle due AC, BC è commensurabile al rettangolo delle due DF, FE, i loro doppij saranno ancora commensurabili: ma il doppio rettangolo delle due AC, CB, per ipotesi, è Medio; sarà il doppio rettangolo delle due DF, FE, che gli è commensurabile, Medio. Di nuovo perche AC à CB è come DF ad FE; sono le due AC, CB, per ipotesi, incommensurabili in potenza; le due ancora DF, FE saranno incommensurabili in potenza. Finalmente perche l'aggregato de i quadrati di AC, CB, come si disse, è commensurabile all'aggregato de i quadrati di DF, FE; & il doppio rettangolo delle due AC, CB è commensurabile al doppio rettangolo delle due DF, FE; essendo, per ipotesi, l'aggregato de i quadrati di AC, CB incommensurabile al doppio rettangolo delle medesime AC, CB; sarà l'aggregato de i quadrati delle due DF, FE incommensurabile al doppio rettangolo delle medesime DF, FE. Hor perche le due DF, FE sono incommensurabili in potenza, l'aggregato de i loro quadrati è Medio, & il doppio rettangolo delle medesime DF, FE, è Medio incommensurabile all'aggregato de i loro quadrati; per la 79. proposizione, la retta DE sarà quella, che col Medio fa il tutto Medio, come fu proposto dimostrare.

THEOREMA LXXXV. PROPOSITIONE CIX.

La retta, il di cui quadrato è vguale alla differenza di quanto il Rationale supera il Medio, è vna delle due irrazionali, cioè, ò Apotome, ouero la Minore.


Dal

Dal Rationale AD ne sia detratto il Medio CD. Dico che la retta, il di cui quadrato è vguale allo spatio AB, ò è Apotome, ouero è la Minore. Sia sposta qualunque Rationale EF, alla quale sia applicato il rettangolo EG, vguale allo spatio AB; essendo HG vguale ad EF, farà HG Rationale. Si applichi ad HG il rettangolo HI, vguale al Medio CD, in modo, che tutto il rettangolo EI sia vguale al Rationale AD; dal che EI farà Rationale, ed il lato EK, farà Rationale, è commensurabile in lunghezza alla Rationale EF. Di nuouo essendo HI Medio (per essere vguale al Medio CD) applicato alla Rationale HG, l'altro lato HK, farà Rationale, ed incommensurabile in lunghezza alla Rationale EF; ma EF, per quel che si è dimostrato, è commensurabile in lunghezza ad EK: le due EK, HK, faranno incommensurabili in lunghezza. E perche le medesime sono state dimostrate Razionali; perciò le rette EK, HK, saranno commensurabili solamente in potenza; e per la 74. proposizione di questo, la rimanente EH farà Apotome, la di cui congruente farà HK. Inoltre il quadrato della composta EK supera il quadrato della congruente HK, per il quadrato d'vna retta, la quale ò sarà commensurabile in lunghezza ad EK, ouero farà alla medesima incommensurabile. Se è commensurabile ad EK, essendosi dimostrata EK commensurabile in lunghezza alla Rationale EF, per la prima delle terze definizioni, farà EH prima Apotome; e per la 92. proposizione di questo, la retta, il di cui quadrato è vguale al rettangolo EG, contenuto dalla Rationale EF, e dalla prima Apotome EH, cioè vguale allo spatio AB, farà Apotome. Se poi il quadrato di EK supera il quadrato di HK, per il quadrato d'vna retta incommensurabile ad EK, essendosi dimostrata la retta EK commensurabile in lunghezza alla Rationale EF; per la quarta delle terze definizioni, la retta EH farà la quarta Apotome, la di cui congruente farà HK; e per la 95. proposizione di questo, la retta, il di cui quadrato è vguale al rettangolo EG, contenuto dalla Rationale EF, e dalla quarta Apotome EH, cioè vguale allo spatio AB, è quella, che si chiama Minore, come fu proposto dimostrare.

THEOREMA LXXXVI. PROPOSITIONE CX.

La retta, il di cui quadrato è vguale alla differenza di quanto il Medio supera il Rationale, ò farà prima Apotome della Media, ouero farà quella, che col Rationale fa il tutto Medio.

Dal Medio AD se ne detragga il Rationale CD . Dico che la retta ,
 il di cui quadrato è vguale allo spatio AB, d'è prima Apotome , ouero è
 quella , che col Rationale fa il tutto Medio . Si faccia la medesima co-
 struzione dell'antecedente proposizione . Essendo il rettangolo EI vgua-
 le al Medio AD, sarà EI Medio, il quale, applicato alla Rationale EF,
 213. del 10. farà il lato EK ^a Rationale, ed incommensurabile in lunghezza alla Ra-
 tionale EF . Di nuouo perche HI è vguale al Rationale CD , farà HI
 Rationale , che , applicato alla Ratio-
 nale HG, ^b fa il lato HK Rationale , e
 221. del 10. c'ommesurabile in lunghezza alla Ra-
 tionale HG, ouero EF: ma EF è dimo-
 strata incommensurabile in lunghez-
 217. del 10. za ad EK; le due EK, HK ^c saranno in-
 commensurabili in lunghezza ; E per-
 che sono Rationali, perciò sono le due
 HK, EH Rationali , e commensurabili
 solamente in potenza; e per la 74-pro-
 posizione , la rimanente EH è Apoto-
 me , la di cui congruente farà HK . In



oltre il quadrato di EK supera il quadrato di HK per il quadrato d'vna
 retta, la quale d'è sarà commensurabile in lunghezza ad EK, ouero incommen-
 surabile: Se sarà commensurabile in lunghezza ad EK , essendosi dimo-
 strata la congruente HK commensurabile in lunghezza alla Rationale
 EF , per la seconda delle terze definizioni , EH farà seconda Apotome; e
 per la 93. proposizione di questo , la retta , il di cui quadrato è vguale al
 rettangolo EG , conrenuto dalla Rationale EF , e dalla seconda Apotome
 EH , cioè vguale allo spatio AB , farà la prima Apotome della Media .
 Se poi il quadrato di EK supera il quadrato HK , per il quadrato
 d'vna retta incommensurabile in lunghezza alla medesima EK ; essendosi
 dimostrata la congruente HK commensurabile in lunghezza alla Ratio-
 nale EF , per la quinta delle terze definizioni , la retta EH farà la quin-
 ta Apotome ; e per la 96. proposizione di questo , la retta , il di cui qua-
 drato è vguale al rettangolo contenutó dalla Rationale EF, e dalla quin-
 ta Apotome EH , cioè vguale allo spatio AB, farà quella , che col Ratio-
 nale fa il tutto Medio, ch'era da dimostrarsi.


THEOREMA LXXXVII. PROPOSITIONE CXI.

La retta, il di cui quadrato è vguale alla differenza ,
 ch'è frà due Medij, trà loro incommensurabili ; d'è la se-
 conda Apotome della Media, ouero è quella , che col Me-
 dio fa il tutto Medio .

Dal Medio AD ne sia detratto il Medio CD , il quale sia incommen-
 surabile al tutto AD . Dico che la retta , il di cui quadrato è vguale al

rima-

rimanente AB, ò è la seconda Apotome della Media, ouero è quella, che col Medio fa il tutto Medio. Sia fatta la medesima costruzione della 109. proposizione. Perche i due rettangoli EI, HI, per costruzione, sono vguali à i due Medij AD, CD, i due EI, HI, faranno Medij, i quali, applicati alla Rationale EF, ouero HG, fanno i lati EK, HK = Rationali, ed incommensurabili in lunghezza alla Rationale EF. E perche i due AD, CD, cioè EI, HI, per ipotesi, sono incommensurabili, ed i rettangoli EI, HI sono come le basi EK, HK, le rette EK, HK faranno incommensurabili in lunghezza: ma sono state dimostrate Rationali; faranno in conseguenza le due EK, HK Rationali, commenfurabili solamente in potenza; e per la 74. proposizione di questo, la rimanente EH farà Apotome, la di cui congruente farà HK. Di nuouo il quadrato di EK supera il quadrato di HK, per il quadrato d'vna retta, la quale ò farà commenfurabile in lunghezza alla composta EK, ouero farà incommensurabile: Se è commenfurabile in lunghezza ad EK. Perche nessuna delle due EK, HK è commenfurabile in lunghezza alla Rationale EF, per la terza delle terze definizioni, il rimanente EH farà la terza Apotome; e per la 94. proposizione, la retta, il di cui quadrato è vguale al rettangolo EG, contenuto dalla Rationale EF, e dalla terza Apotome EH, cioè vguale allo spatio AB, farà la seconda Apotome della Media. Se poi il quadrato di EK supera il quadrato di HK, per il quadrato d'vna retta incommensurabile in lunghezza ad EK; essendosi dimostrato, che nessuna delle due EK, HK, è commenfurabile in lunghezza alla Rationale EF; per la sesta delle terze definizioni, la retta EH farà la sesta Apotome, la di cui congruente farà HK; e per la 97. propof. di questo, la retta, il di cui quadrato è vguale al rettangolo EG, contenuto dalla Rationale EF, e dalla sesta Apotome EH, cioè vguale allo spatio AB, è quella, che col Medio fa il tutto Medio, come fu proposto dimostrare.



a 23. del 10.

b 1. del 6.

c 10. del 10.

THEOREMA LXXXVIII. PROPOSITIONE CXII.


L'Apotome è diuerfa dal Binomio.

Sia qualunque Apotome A. Dico che A non è Binomio. Sia A, se è possibile, qualcuno de i binomij. Sia espofa qualunque Rationale BC, alla quale si applichi il rettangolo CD = vguale al quadrato della retta A. Perche A, per ipotesi, è Apotome, l'altro lato BD farà quella, che si chiama prima Apotome; alla quale s'intenda aggiunta la sua congruente DE, e per la definizione della prima Apotome, le due BE, DE, faranno Rationali, commenfurabili solamente in potenza; ed il quadrato di BE supererà il quadrato di DE, per il quadrato d'vna retta, commen-

a 45. del 1.

furabile

furabile in lunghezza alla medesima BE; e la retta BE sarà commenfurabile in lunghezza alla Rationale BC. Di nuouo perche A è supposta ancora essere vno de i binomij, farà il lato BD, per la 61. di questo, primo binomio; il quale si concepisca diuisione i suoi nomi, e sia BE il maggior nome; e per la definizione del primo Binomio, le due BF, FD sono Rationali, commenfurabili solamente in potenza; ed il quadrato di BF supererà il quadrato di FD, per il quadrato d'vna retta, commenfurabile in lunghezza al maggior nome BF; ed il maggior nome BF sarà commenfurabile in lunghezza alla Rationale BC. E perche tanto BE, come BF, è commenfurabile in lunghezza alla medesima BC; le due BE, BF faranno frà loro commenfurabili in lunghezza. Hor essendo tutta BE commenfurabile in lunghezza alla



b 12. del 10.

c 16. del 10.
d 6. defin.
del 10.

c 14. del 10.

sua parte BF, farà la medesima BE^c commenfurabile in lunghezza al rimanente FE: ma BE è Rationale; farà FE, ^d che gli è commenfurabile, Rationale. In oltre perche le due BE, DE, sono state dimostrate Rationali, e commenfurabili solamente in potenza, faranno le medesime BE, ED incommenfurabili in lunghezza: ma BE è dimostrata commenfurabile in lunghezza ad FE, farà ED^e incommenfurabile in lunghezza ad FE; furono dimostrate ambedue Rationali, in conseguenza le medesime FE, DE sono Rationali, e commenfurabili solamente in potenza; e per la 74. proposizione, la rimanente FD sarà Apotome; e perciò irrationale. Fu dimostrata la retta FD Rationale; farà Rationale, ed Irrationale, ch'è impossibile. Non dunque A, essendo Apotome, è la medesima che vno de i Binomij: ma è diuersa dal Binomio, come fu proposto dimostrare.

S C O L I O.

Le linee Irrazionali diuerse frà di loro, delle quali si è parlato sin hora, sono le seguenti tredici linee.

- 1 Media.
- 2 Binomio, che si diuide in sei specie.
- 3 Prima Bimediale.
- 4 Seconda Bimediale.
- 5 Maggiore.
- 6 Potente per il Rationale, e Medio.
- 7 Potente per due Medij.
- 8 Apotome, che si diuide in sei specie.
- 9 Prima Apotome della Media.

10 Seconda Apotome della Media.

11 Minore.


12 Col Rationale fa il tutto Medio.

13 Col Medio fa il tutto Medio.

THEOREMA LXXXIX. PROPOSITIONE CXIII.

Applicando il quadrato della Rationale al Binomio, il lato, che ne risulta, sarà Apotome, i di cui nomi sono commensurabili à i nomi del Binomio, e sono nella medesima proportionione; ed, oltre à ciò, l'Apotome, che da questa applicatione si genera, tiene il medesimo ordine del Binomio.

Sia qualunque Rationale A, ed il Binomio BC, il di cui maggior nome sia BD; ed al Binomio BC sia applicato il rettangolo BE, uguale al quadrato della Rationale A; l'altro lato, che ne risulta, sia BF. Dico che BF è Apotome, i di cui nomi, cioè la composta dell'Apotome, e sua,



congruente per vn nome, e la detta congruente per l'altro nome, sono commensurabili à i nomi BD, DC, del Binomio BC; e che sono nella medesima proportionione; ed oltre à ciò, l'Apotome BF è del medesimo ordine del Binomio BC. Di nuouo al minor nome DC del Binomio, si applichi il rettangolo CG vguale al quadrato della Rationale A; sarà CG Rationale, il quale, applicato alla Rationale DC, fa l'altro lato DG, e Rationale, e commensurabile in lunghezza alla Rationale DC. Si faccia BH vguale alla retta DG, sarà BH Rationale, e commensurabile in lunghezza à DC. E perche i rettangoli BE, CG, sono fra di loro vguali; sarà BC à CD, come DG, ouero HB, à BF; e diuidendo, BD à DC, come HF ad FB: ma BD, per ipotesi, è maggiore di DC, sarà HF maggiore di FB. Si faccia FI vguale ad FB, e si faccia, si come HI ad IF, così FB à BK; componendo, sarà HF ad FI, ouero HF ad FB, come FK à BK: ma HF ad FB, per quel che si è dimostrato, è come BD à DC; sarà BD à DC, come FK à BK: e perche i due BD, DC, (come nomi del Binomio) sono Razionali, e commensurabili solamente in

a 47. del 1.

b 45. del 1.

c 21. del 10.

d 14. del 6.

e 17. del 5.

f 10. del 6.

g 18. del 5.

h 11. del 5.

E e e

poten-


potenza: i due dunque FK, BK faranno ancora Rationali, e commensurabili solamente in potenza.

Di nuovo, perche l'antecedente HF al conseguente FB è come l'antecedente FK al conseguente KB; gli antecedenti insieme HF, FK, cioè HK, à i conseguenti insieme FB, BK, cioè FK, ^K faranno come vn antecedente ad vn conseguente; cioè come FK à KB. Hor essendo HK ad FK come FK à KB, sarà FK Media proportionale fra le due HK, BK; dal che la prima HK alla terza KB, per il Lemma 8. dopo la 18. del 6. Libro, hà duplicata proportionē di quella, che hà la prima HK alla seconda KF; ma il quadrato di HK al quadrato di KF ^I hà la medesima duplicata proportionē di HK à KF: sarà il quadrato di HK al quadrato di KF, come la prima HK alla terza KB.

In oltre, perche BD à DC, per quel che si è dimostrato, è come FK à KB, & è FK à KB come HK à KP; sarà BD à DC, ^m come HK à KF; ed il quadrato di BD al quadrato di DC ⁿ sarà come il quadrato di HK al quadrato di KF: ma il quadrato di BD è commensurabile al quadrato di DC (stā-

te che BD, DC, sono nomi del Binomio) sarà ancora il quadrato di HK ^o commensurabile al quadrato di KF. Fù dimostrato il quadrato di HK al quadrato di KF essere come HK à KB; essendo il quadrato di HK commensurabile al quadrato di KF, sarà la retta HK ^p commensurabile in lunghezza alla retta KB; e la medesima HK, per il Corollario alla 16. proposizione di questo, sarà commensurabile in lunghezza al restante BH. Fù dimostrata BH Rationale, in conseguenza HK, ^q che gli è commensurabile, sarà Rationale: e similmente KB, che è commensurabile à KH, sarà ancora Rationale. E perche le due FK, KB, furono dimostrate commensurabili solamente in potenza, essendo KB Rationale, sarà ancora FK, ^r che gli è commensurabile, Rationale. Per la qual cosa, le due FK, KB sono Rationali, e commensurabili solamente in potenza, e per la 74. proposizione di questo, la rimanente BF sarà Aporome, la di cui congruente sarà BK, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

Essendosi dimostrata tutta HK commensurabile in lunghezza alla parte KB, faranno le parti KB, BH ^s commensurabili in lunghezza: ma BH fù dimostrata commensurabile in lunghezza alla retta DC, sarà KB ^t commensurabile in lunghezza alla medesima DC. In oltre perche si è dimostrato, che BD à DC è come FK à KB, permutando, ^x sarà BD ad FK come DC à KB: fù dimostrata la retta DC commensurabile in lunghez-



K 18. del 5.

I 20. del 6.

m 11. del 5.

n 17. del 6.

p 10. del 10.

p 10. del 10.

q 6. defn. del 10.

r 6. defn. del 19.

s 16. del 10.

t 12. del 10.

x 16. del 5.

za alla retta BK; sarà BD γ ancora commensurabile in lunghezza ad FK. y 10. del 10.
 Hor essendo FK commensurabile in lunghezza à BD, e la retta BK commensurabile in lunghezza à DC; le rette dunque FK, KB, che sono nomi dell'Apotome BF, faranno commensurabili in lunghezza à i nomi BD, DC, del Binomio BC, ch'era da dimostrarsi nel secondo luogo.

Similmente essendosi dimostrato, che BD à DC è come FK à BK, i nomi dunque FK, KB, dell'Apotome BF, sono nella medesima proportion de i nomi BD, DC, del Binomio BC, ch'era da dimostrarsi nel terzo luogo.

Finalmente il quadrato del maggior nome BD supera il quadrato del minor nome DC, per il quadrato d'vna retta, la quale ò sarà commensurabile in lunghezza al maggior nome BD; ouero sarà incommensurabile in qualunque modo. Perche BD, à DC, è come FK à KB, se il quadrato di BD supera il quadrato di DC, per il quadrato d'vna retta commensurabile in lunghezza à BD, il quadrato ancora di FK supererà il quadrato di KB; x 25. del 10.
 per il quadrato d'vna retta commensurabile in lunghezza ad FK; e se il quadrato di BD supera il quadrato di DC, per il quadrato d'vna retta incommensurabile in lunghezza al maggior nome BD; il quadrato ancora di FK supererà il quadrato di KB, per il quadrato d'vna retta incommensurabile in lunghezza ad FK. Di più, se BD è commensurabile in lunghezza alla Rationale A, sarà ancora FK (ch'è commensurabile in lunghezza à BD) commensurabile in lunghezza alla Rationale A; e se il minor nome DC è commensurabile in lunghezza alla Rationale A, sarà ancora KB, (ch'è commensurabile à DC in lunghezza) commensurabile in lunghezza alla Rationale A. Ed in ultimo, se nessuna delle due BD, DC è commensurabile in lunghezza alla Rationale A, ne meno alcuna delle due FK, KB & sarà commensurabile in lunghezza alla Rationale A; x 14. del 10.
 e per quel che si disse nelle seconde, e terze definitioni, l'Apotome BF sarà del medesimo ordine del Binomio BC; cioè, se il Binomio BC sarà primo, ò secondo, ò terzo Binomio &c. sarà ancora l'Apotome BF prima, ò seconda, ò terza Apotome &c. come fu proposto dimostrare.

THEOREMA XC. PROPOSITIONE CXIV.

Applicando il quadrato della Rationale all'Apotome, l'altro lato, che ne risulta, è Binomio; i di cui nomi sono commensurabili à i nomi dell'Apotome, e sono nella medesima proportion; ed oltre à ciò il Binomio è del medesimo ordine dell'Apotome.

Sia la Rationale A, e l'Apotome BC, la di cui congruente sia CD; sarà BD il maggior nome dell'Apotome, e perciò Rationale. Sia applicato all'Apotome BC il rettangolo CE, γ uguale al quadrato della Rationale A, dal quale risulti il lato BE. Dico che BE è Binomio, i di cui nomi sono commensurabili à i nomi BD, DC, dell'Apotome BC, e sono x 45. del 1.

E e e e 2

nella

b 45. del 2.

c 21. del 10.

d 14. del 6.

x Corol. alla 19. del 5.
c 20. del 6.

f 19. del 5.

g 21. del 5.

h 20. del 6.

K 10. del 10.

l 10. del 10.
m Corol. alla 16. del 10.


n 6. defin. del 10.

n 16. del 5.
p 10. del 10.

nella medesima proportione; ed oltre à ciò, il Binomio BE è del medesimo ordine dell'Apotome BC. Alla composta BD si applichi il rettangolo BF^b vguale al quadrato della Rationale A; farà il rettangolo BF Rationale, ed vguale al rettangolo CE. E perche il Rationale BF è applicato alla Rationale BD, il lato BG, che ne risulta, farà c Rationale, e commensurabile in lunghezza alla composta BD. Perche i due rettangoli BF, CE, per costruzione, sono frà di loro vguali, perciò hanno i lati reciprochi, e farà BE à BG^d come BD à BC; e per la conuersione della proportion, BE ad EG^e farà come BD, à DC. Si diuida EG in H, in modo, che EH ad HG^e sia come BE ad EG; e farà tutta BE à tutta GE come la parte EH, detratta da BE, alla parte HG, detratta da GE; dal che il rimanente BH al rimanente HE^f farà come tutta BE à tutta GE: ma BE ad EG, per costruzione, è come EH ad HG; farà BH ad HE^g come la medesima HE ad HG: per la qual cosa EH è Media proportionale frà le due BH, HG. E perche la prima BH alla terza HG, per il Lemma 8. dopo la 18. del 6, hà duplicata proportion, che la prima BH alla seconda HE; ed il quadrato di BH al quadrato di HE^h hà la medesima duplicata proportion, che hà BH ad HE; farà il quadrato di BH al quadrato di HE come la prima BH alla terza HG. E perche sù dimostrato, che BD à DC è come BE ad EG, cioè come BH ad HE; e le due BD, DC, sono Rationali, e commensurabili solamente in potenza (stante che sono nomi dell'Apotome BC) faranno le due BH, HE^k commensurabili solamente in potenza; per la qual cosa i quadrati delle due BH, HE, sono commensurabili; e le rette BH, GH, che furono dimostrate come i quadrati di BH, HE, sono commensurabili in lunghezza. Hor essendo BH commensurabile in lunghezza alla parte GH, m farà ancora commensurabile in lunghezza al rimanente BG; e le due BG, GH, faranno commensurabili in lunghezza frà loro. E perche BG sù dimostrata Rationale, e commensurabile in lunghezza alla retta BD; farà ancora BH Rationale, e commensurabile in lunghezza alla medesima BD. In oltre, perche le due BH, HE sono state dimostrate commensurabili solamente in potenza, e la retta BH è dimostrata Rationale; farà ancora HE, la quale gli è commensurabile in potenza, n Rationale; e perciò le due BH, HE sono Rationali, e commensurabili solamente in potenza; e per la 37. propositione di questo, la retta BE farà Binomio, il che era da dimostrarsi nel primo luogo.

Di nouo, essendosi dimostrato che BH ad HE è come BD à CD; permutando, BH à BD^o farà come HE à CD: sù dimostrata BH commensurabile in lunghezza à BD; farà ancora HE^p commensurabile in lunghezza à CD: per la qual cosa le due BH, HE, che sono i nomi del Binomio BE, sono commensurabili in lunghezza alle due BD, CD, che

sono




sono i nomi dell'Apotome BC, ch'era da dimostrarsi nel secondo luogo. Fu aneora dimostrata BH ad HE come BD à DC, perciò hanno la medesima proportionione, ch'era da dimostrarsi nel terzo luogo.

Finalmente perche BD à DC è come BH ad HE, se il quadrato di BD supera il quadrato di DC, per il quadrato d'vna retta commensurabile in lunghezza alla medesima BD, aneora il quadrato di BH supererà il quadrato di HE, e se il quadrato di BD supera il quadrato di DC, per il quadrato d'vna retta incommensurabile in lunghezza à BD, ancora il quadrato di BH supererà il quadrato di HE, e per il quadrato d'vna retta incommensurabile in lunghezza à BH. Si ehe, se BD è commensurabile in lunghezza alla Rationale A, ancora BH (ch'è commensurabile in lunghezza à BD) sarà commensurabile in lunghezza alla Rationale A: e se CD è commensurabile in lunghezza alla Rationale A, ancora HE (ch'è commensurabile in lunghezza à CD) sarà commensurabile in lunghezza alla Rationale A: E finalmente, se nessuna delle due BD, DC è commensurabile in lunghezza ad A, ne meno alcuna delle due BH, HE sarà commensurabile in lunghezza alla Rationale A; e per quel che si disse nelle seconde, e terze definitioni, BE sarà Binomio del medesimo ordine dell'Apotome BC; eioè, se l'Apotome BC sarà prima, ò seconda, ò terza Apotome &c, farà ancora BE primo, ò secondo, ò terzo Binomio &c, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA XCI. PROPOSITIONE CXV.

Se vn rettangolo è contenuto dall'Apotome, e dal Binomio, ed i nomi del Binomio sono commensurabili à i nomi dell'Apotome, e sono nella medesima proportionione; la retta linea, il di cui quadrato è vguale al detto rettangolo, è Rationale.

Sia il rettangolo AB, contenuto dall'Apotome AC, e dal Binomio CB, i di cui nomi CD, DB, siano commensurabili à i nomi CE, AE, dell'Apotome AC; e sia CD à DB, come CE ad EA; s'intenda la retta F, il di cui quadrato sia vguale al rettangolo AB. Dico che la retta F è Rationale. Sia esposta la Rationale G; si applichi al Binomio CB il rettangolo CH, vguale al quadrato della Rationale G; farà CH Rationale, ed il lato BH sarà Apotome, della quale IB sia la congruente; dal che i nomi saranno HI, IB, commensurabili in lunghezza à i nomi CD, DB, e nella medesima proportionione, cioè HI ad IB sarà come CD à DB: ma



CD à

q 15. del 10.

r 15. del 10.

r 1a. del 19.

u 14. del 10.

a 45. del 1.

b 13. del 10.

e 11. del 5.

d 16. del 5.

e 19. del 5.

f 11. del 10.

g 10. del 10.

h 1. del 6.

K 10. del 10.


l 9. de fin.

del 10.

m 2. de fin.

del 10.

CD à DB, per ipotefi, è come CE ad EA; farà HI ad IB ^e come CE ad EA; e permutando, tutta HI à tutta CE ^d farà come la parte IB alla parte EA; dal che l'auanzo HB all'auanzo CA ^e farà come tutta HI à tutta CE. In oltre perche tanto IH, come CE, è commensurabile in lunghezza à CD; le due HI, CE ^f faranno commensurabili in lunghezza: ma HI à CE è dimostrata essere come HB à CA; farà HB ^g commensurabile in lunghezza à CA. Hor perche i rettangoli HC, BA, hanno vna medesima altezza, farà HC ad AB, ^h come HB à CA; e perche HB è commensurabile in lunghezza ad AC; farà HC ^k commensurabile ad AB: ma HC è Razionale, farà il rettangolo AB, che gli è commensurabile, ^l Razionale; e la retta F, il di cui quadrato è vguale ad AB, ^m farà Razionale, come fù proposto dimostrare.




COROLLARIO.

Da quel che si è detto, è manifesto, che vno spatio Razionale può essere contenuto da due rette Irrazionali; mentre il rettangolo AB è Razionale, ed è contenuto dall'Apotome AC, e dal Binomio CB, che sono linee Irrazionali.

THEOREMA XCII. PROPOSITIONE CXVI.

Dalla Media ne nascono infinite linee Irrazionali; e nessuna è la medesima delle tredici spiegate antecedentemente.

Sia la Media AB. Dico che dalla Media AB ne nascono infinite linee Irrazionali; e nessuna di quelle è la medesima di quelle tredici spiegate in questo libro. Sia esposta la Razionale AC, e si cõcepisca il rettangolo AD, il quale sia contenuto dalla Media AB, e dall'esposta Razionale AC; per il Lemma dopo la 38. propos. di questo, il rettangolo AD, contenuto dalla Razionale AC, e dalla Irrazionale AB, farà Irrazionale. Sia BE la retta, il di cui quadrato è vguale al rettangolo AD, farà BE Irrazionale.



Dico


Dico, che BE non è alcuna di quelle tredici notate dopo la 112. propos. di questo. Perche, applicando alla Rationale AC il quadrato della media, il lato, che ne risulta, per la 23. propos. di questo, è Rationale, ed incommensurabile in lunghezza alla Rationale AC; applicando dunque ad AC il quadrato della media AB, il lato, che non risulta, sarà Rationale, e perciò non sarà il medesimo, che l'irrazionale BE. In oltre applicando ad AC ciascun quadrato dell' altre dodici irrazionali, delle quali si è parlato di sopra, ciascun lato, che ne risulta, ò è vno de' Binomij, ouero vna delle Apotome, come apparisce nelle proposizioni 61. 62. 63. 64. 65. 66. 98. 99. 100. 101. 102. & 103. di questo. E perche il quadrato dell'irrazionale BE, applicato alla Rationale AC, fa il lato AB Media; sarà manifesto, che l'irrazionale BE è differente da tutte le tredici sopra notate, mentre applicato il suo quadrato alla Rationale AC, fa il lato differente da quei lati fatti da' quadrati di quelle tredici, applicati alla medesima Rationale AC.

Si compisca il rettangolo DE, il quale sarà contenuto dalla Rationale BD, e dall'irrazionale BE; e per il lemma dopo la 38. propos. il rettangolo DE sarà irrazionale. S'intenda la retta EF, il di cui quadrato sia vguale all'irrazionale DE, sarà EF irrazionale. Dico, che l'irrazionale EF non è alcuna di quelle tredici sopra nominate, ne meno è la medesima, che BE. Perche il quadrato di EF, cioè il rettangolo DE, applicato alla Rationale BD, fa il lato BE; ed i quadrati di quelle tredici, come ancora il quadrato di BE, applicati alla Rationale BD, fanno, per quel che si è dimostrato, i lati diuersi da BE, sarà manifesto, che EF non è alcuna di quelle tredici, ne meno è la medesima, che BE. Nell'istesso modo, che si sono trouate le irrazionali BE, EF, se ne possono ritrouare infinite altre, diuersi da quelle tredici, e diuersi fra di loro, come trà proposto dimostrare.

THEOREMA XCIII. PROPOSITIONE CXVII.

Il Diametro, ò Diagonale del quadrato, è incommensurabile in lunghezza al lato del medesimo quadrato.

Sia il quadrato ABCD, il di cui diametro AC. Dico, che il diametro AC è incommensurabile in lunghezza al lato AB. Se il diametro AC non è incommensurabile in lunghezza ad AB, sarà dunque al lato AB commensurabile in lunghezza, e perciò il diametro AC al lato AB ^a hauerà la proportionc, che hà il numero al numero. Sia dunque AC ad AB, come il numero EF al numero G, ed i numeri EF, & G, siano i minimi di quelli, che hanno la proportionc di EF à G. Perche il quadrato del lato AC ^b è vguale à i quadrati de i due lati AB, BC, ed i quadrati de i lati AB, BC sono fra di loro vguali, sarà il qua-



E...H...F

G-----

drato

a 5 del 10.

b 47. de. 1.

c 20. del 6.


d 13. del 8.

c 29. del 9.

f 14. del 9.

g 4. Theor.
sinpo la 14.
del 9.

drato di AC il doppio del quadrato del lato AB. In oltre perche il quadrato di AC al quadrato di AB ϵ hà duplicata propotione di quella, che hà il lato AC al lato AB, e per ipotesi, AC ad AB ϵ come il numero EF al numero G; il quadrato di AC al quadrato di AB hauerà duplicata propotione di quella, che hà il numero EF al numero G: ma il quadrato del numero EF al quadrato del numero G ϵ hà la medesima duplicata propotione, che hà il numero EF al numero G; hauerà il quadrato di AC al quadrato di AB l'istessa propotione, quale hà il quadrato del numero EF al quadrato del numero G: ma il quadrato di AC ϵ il doppio del quadrato di AB; sarà il quadrato del numero EF il doppio del quadrato del numero G; e perciò dal quadrato del numero EF se ne può prendere la metà, cioè il quadrato del numero F sarà numero paro. Dico che il numero EF ϵ ancora numero paro: Perche se EF non ϵ numero paro, ma ϵ numero disparo, multiplicato in se medesimo, quel che produce ϵ sarà numero disparo, e in conseguenza il quadrato del numero EF sarebbe numero disparo, ch'è contro à quello, che si è dimostrato; mentre si è dimostrato, che il quadrato del numero EF ϵ numero paro. Non dunque il numero EF ϵ disparo, ma ϵ numero paro. E perche i numeri EF, & G, sono i minimi nella loro propotione, faranno ϵ in conseguenza frà di loro primi; ed essendosi dimostrato EF essere numero paro, sarà G numero disparo; perche se fosse numero paro, i numeri pari EF, & G, hauerrebbero per commune misura il numero due, ed in tal caso non sarebbero frà di loro primi, che ϵ contro à quel che si è dimostrato. Non dunque G ϵ numero paro, ma ϵ numero disparo. Si diuida il numero paro EF in due parti vguali, che siano i due FH, HF. Perche EH ϵ vguale ad HF, il prodotto di EH in se medesimo sarà vguale al prodotto di EH in HF; e sarà ancora vguale al prodotto di HF in se medesimo; e così i quattro prodotti, cioè il prodotto di EH in se medesimo, quello, che si fa da HF in se medesimo, e due volte il prodotto di EH in HF, sono frà di loro vguali; e perciò tutti insieme sono il quadruplo di vno, cioè il quadruplo del quadrato di EH. Ma gli antecedetti quattro prodotti sono vguali ϵ al quadrato di EF; sarà il quadrato del numero EF il quadruplo del quadrato del numero EH. Hor essendosi dimostrato, che il quadrato del numero EF ϵ il doppio del quadrato del numero G, ed ϵ il quadruplo del quadrato del numero EH; di quelle parti, che il quadrato di EF ϵ quattro, il quadrato di G sarà due, ed il quadrato di EH sarà vno: per la qual cosa il quadrato del numero G sarà il doppio del quadrato del numero EH. Hor se il quadrato del numero G ϵ il doppio del quadrato del numero EH, si può dunque il quadrato del numero G diuidere in due parti vguali, e perciò sarà numero paro. E procedendosi, come prima si fece, si dimostrerà, che G ϵ numero paro: ma fu dimostrato essere numero disparo, sarà dunque G numero paro, e numero disparo, ch'è impossibile. Non dunque il



E...H...F
G.....

diametro AC è commensurabile in lunghezza al lato AB, ma sono incommensurabili in lunghezza, ch'era da dimostrarsi.

In altro modo si dimostrerà il medesimo. Sia, se è possibile, il diametro AC commensurabile in lunghezza al lato AB, sarà la proportion di AC ad AB, ^h come quella del numero al numero. Sia dunque AC ad AB, come il numero EF al numero G, ed i numeri EF, & G, siano i minimi nella loro proportion; in conseguenza saranno frà di loro primi. Dico prima, che G non è l'vnità. Perche AC ad AB è come EF à G, sarà il quadrato di AC al quadrato di AB, per quel che sopra si è dimostrato, come il quadrato di EF al quadrato di G: ma il quadrato di AC fu sopra dimostrato il doppio del quadrato di AB; sarà il quadrato del numero EF il doppio del quadrato del numero G. Se dunque G sarà l'vnità, il suo quadrato sarà ancora l'vnità: ma il quadrato di EF è il doppio del quadrato di G; sarà il quadrato di EF il numero due, il che non può essere, stante che EF, per ipotesi, non è l'vnità; e perciò al minimo sarà il numero due; nel qual caso il numero EF farebbe due, ed il suo quadrato farebbe ancora due, ch'è impossibile. Non dunque G è l'vnità, ma sarà qualche numero. E perche si è dimostrato, che il quadrato del numero EF è il doppio del quadrato del numero G; in conseguenza il quadrato del numero G misura il quadrato del numero EF, e per la 14. propos. del 8. lib. il lato dell'vno misura il lato dell'altro, cioè il numero G misurerà il numero EF: ma il numero G misura se medesimo, perciò i numeri G, & EF, che hanno vna commune misura, sono frà di loro composti: sono, per quel che si disse, numeri frà di loro primi; farebbero frà di loro primi, e farebbero frà di loro composti, ch'è impossibile. Non dunque il diametro AC è commensurabile al lato AB, ma sono incommensurabili, ch'era da dimostrarsi.

h. s. del 10.

S C O L I O.

Sogliono i Commentatori aggiungere quì vn'appendice, cauata da alcuni esemplari Greci, in ordine à ritrouare altre grandezze incommensurabili, tanto ne' piani, come ne' solidi: ma perche ancora non si è parlato de' solidi, m'è parso bene porre quest'appendice nel fine del duodecimo Elemento.

Fine del Decimo Elemento.

EVCLIDE RESTITVTO

D A

VITALE GIORDANI

ELEMENTO VNDECIMO.



DEFINITIONI.

I.

Il Solido, ò corpo, è quello, che hà lunghezza, larghezza, e grossezza.

I I.


L'estremo del solido è la superficie.

I I I.

La linea retta si dice essere perpendicolare, ouero eretta al piano, quando concorrendo con vn solo estremo in quel piano, fa angoli retti con tutte le rette linee, che passano per il concorso, e giacciono in quel medesimo piano.




I concepisca la retta linea AB eleuata, in modo, che concorra nel piano CDEF col solo estremo B, e dal punto B s'intendano distese nel piano CDEF quante rette linee si vogliono, come BC, EG, BD, BE, BH, BF, &c. se la retta AB farà angoli retti con tutte le nominate rette, e con tutte l'infinitè altre, che dal punto B si distenderanno nel piano CDEF, la retta AB si dirà essere eretta, cioè perpendicolare, al piano CDEF.




I V.

Il piano si dice essere eretto, ouero perpendicolare, al piano, quando tutte le rette, che giacciono in vn piano, facendo angoli retti con la commune sectione, sono perpendicolari all'altro piano.

I piani si dicono essere diuersi frà loro, quando continuati non possono costituire vn sol piano. Per esempio le figure piane Z, ed X, benchè si segano scambievolmente à causa, che parte dell'una cade dentro dell'altra, con tutto ciò, hauendo una parte commune, come la notata a b d e f, non sono in diuersi piani, ma costituiscono il solo piano Z X, in modo, che se i due piani Z, ed X saranno continuati da tutte le parti indeterminatamente, non saranno due piani distinti, ma costituiranno vn solo piano: e questi non si dicono piani diuersi, ma si dicono essere in vn medesimo piano. Quei piani poi, che, segandosi scambievolmente, e continuati non costituiscono vn medesimo piano, si dicono essere piani diuersi; come sono i piani AC, EF, i quali si segano scambievolmente, non hanno alcuna parte commune, e continuati non possono costituire vn sol piano. E perchè ogni piano hà lunghezza, e larghezza, se due piani diuersi concorreranno scambievolmente, à concorreranno secondo la loro lunghezza, ouero secondo la loro larghezza, sì che in qualunque modo il loro commune concorso necessariamente, sarà una linea, come apparisce ne i piani diuersi AC, EF, che concorrono scambievolmente, ed il loro commune concorso è la linea BC. Hor se i piani AC, EF si concepiranno continuati, non potendo costituire vn sol piano, stante, che gli supponiamo piani diuersi, la continuazione dell'uno sarà diuersa dalla continuazione dell'altro; cioè la continuazione CF, del piano EF caderà totalmente fuori del piano AK; e la continuazione BK, del piano AC, caderà totalmente fuori del piano EF, perchè altrimenti costituirebbero vn sol piano, ch'è contro all'ipotesi, mentre si suppongono essere piani diuersi; e perciò continuati si segaranno nella linea BC del concorso. E per l'auuenire la linea BC, ch'è commune segmento, si chiamerà commune sectione de i piani, che scambievolmente si segano; e si dice commune sectione, stante che la linea BC




giace nel piano AC, e giace ancora nel piano EF. Supposto questo, si considerino i piani diuersi ABCD, & EF, i quali si seghino scambievolmente, e la loro comune sectione sia la linea BC; si concepiscano presi nel piano ABCD quanti si voglia punti Q, R, da i quali si concepiscano tirate le rette QG, RH, giacenti nel piano ABCD, e che facciano angoli retti con la comune sectione EC; se le rette QG, RH, &c. saranno perpendicolari al piano EF, cioè se faranno angoli retti con tutte le infimite rette GI, GK, GL; HM, HN, HO, &c. che sono distese nel piano EF, il piano ABCD si dirà esser'retto, cioè essere perpendicolare al piano EF.



V.

Quando vna retta linea, inclinata ad vn piano, concorre in quel piano solamente con vno de' suoi estremi, e da qualche punto di essa cade vn'altra retta, perpendicolare al medesimo piano, e frà i punti, doue queste due rette concorrono col detto piano, è tirata vna retta; l'angolo acuto, che si contiene da questa, e dall' inclinata, si dice essere l'inclinazione, che hà la retta inclinata al piano.

La retta linea, che con vno de i suoi estremi concorre in vn piano, e non è perpendicolare al medesimo piano, si dice essere inclinata à quel piano. Hor s'intenda la retta linea AB, inclinata al piano CDEF, la quale concorra col detto piano coll'estremo A; e da qualche punto B preso nell'inclinata AB, cada la retta BG perpendicolare al piano CDEF, la quale concorra col piano CDEF in qualche punto G; tirata la retta AG, l'angolo acuto BAG, contenuto dall'inclinata BA, e dalla retta AG, si dice essere l'inclinazione, che hà la retta BA al piano CDEF.




V L.

Quando dalla comune sectione di due piani, che

scam-

scambievolmente si segano non ad angoli retti, sono tirate due rette linee, vna in vn piano, e l'altra nell' altro piano, le quali facciano angoli retti con la commune settione: l'angolo acuto, che si contiene da quelle rette, si dice essere l'inclinazione, che hà vno di quei piani all'altro.

Vn piano si dice essere inclinato ad vn altro piano, quando concorrendo con quel piano, non lo sega perpendicolarmente; come nella figura seguente il piano ABCD sega il piano EFGH, e la commune settione è la linea BC. Se il piano ABCD non è perpendicolare al piano




EFGH, si dirà il piano ABCD essere inclinato al piano EFGH; e preso nella commune settione BC qualunque punto K, dal quale nel piano EG sia distesa la retta KL, che faccia angoli retti con la commune settione BC, e dal medesimo punto K nel piano ABCD sia tirata la retta KI, che similmente faccia angoli retti con la linea BC, l'angolo acuto IKL, che si contiene dalla retta IK, e dalla retta KL, è la quantità dell'inclinazione, che hà il piano ABCD al piano EFGH: e si chiama ancora angolo dell'inclinazione.

V I I.

I piani si dicono essere similmente inclinati quando gli angoli delle loro inclinazioni sono frà di loro vguali.

S'intendano i piani ABCD, EFGH, inclinati à i piani IKLM, NOPQ, e le loro inclinazioni siano gli angoli RST, VXT; Se gli angoli RST, VXT, sono frà di loro vguali, i piani ABCD, EFGH, si diranno essere similmente inclinati à i piani IKLM, NOPQ.



Piani

VIII.

Piani paralleli, ò equidistanti, sono quelli, che continuati da tutte le parti mai s'auvicinano, ne si scostano in luogo alcuno della loro infinita estensione.

Seguendo Euclide il medesimo ordine tenuto nel definire le rette parallele, definisce ancora qui il parallelismo de' piani per la negatiua del loro concorso; ma perche questa definizione patirebbe la medesima eccezione dell'altra, habbiamo noi definita, à similitudine della 34. definizione del primo, per la negatiua del loro scambieuole auuicinamento, e scostamento. Quale poi sia la posizione, che deuono hauere i piani, accioche continuati da tutte le parti mai scambieuolmente s'auvicinino, ne si scostino, si dimostrerà nella 14. proposizione di questo Elemento.

I X.

Le figure solide simili sono quelle, che sono contenute da piani simili, e di numeri vguali.

X.

Le figure solide simili, ed vguali, sono quelle, che sono contenute da piani simili, ed vguali di numero, e grandezza.


Quando i piani, che contengono vn solido, sono vguali di numero à i piani, che contengono vn altro solido, cioè che tante faccie siano in vno, per quante faccie sono nell'altro; se i piani, che contengono vno di quelli, sono simili à i corrispondenti piani, che contengono l'altro solido; quei solidi si dicono essere simili frà di loro, come si è spiegato nella nona definizione: se poi i piani, che contengono vno di quei solidi, sono simili, ed vguali à i corrispondenti piani, che contengono l'altro; quelli si dicono solidi simili, & vguali.

X I.

L'inclinazione di più di due rette linee, che non sono in vn medesimo piano, e concorrono in vn sol punto, si chiama angolo solido: Ouero, l'angolo solido è quello, ch'è contenuto da più di due angoli piani, che s'vniscono in vn sol puoto, e non sono nel medesimo piano.

Nel soggetto piano BAC siano collocate le rette BA, CA, che concorrano scambieuolmente nel punto A, in modo, che costituiscano l'angolo pia-


no BAC ; s'intenda poi inclinata la retta AD in modo, che l'estremo A sia nel soggetto piano, e l'estremo D sia eleuato in alto; la retta AD farà angolo con la retta AC nel piano DAC , e farà ancora angolo con la retta AB nel piano DAB ; e così hauereмо i tre angoli DAC , DAB , BAC , collocati in diuersi piani, i quali s'uniscono nel medesimo punto A . Hor la scambieuole inclinazione delle rette BA , DA , CA , concorrenti nel punto A ; ouero la scambieuole unione, che gli angoli piani BAD , DAC , BAC , fanno nel punto A , si chiama angolo solido. Similmente, nella seconda figura; S'intendano le rette EF , IF , nel soggetto piano, le quali, concorrendo insieme, costituiscano l'angolo piano EFI ; s'intendano poi inclinate le rette HF , GF , in modo, che con uno de i loro estremi concorrano in F , e gli altri estremi H , & G , siano eleuati in alto; la retta HF farà angolo con la retta IF , nel piano HFI ; e farà angolo ancora con la retta FG , nel piano FHG . Finalmente la retta GF farà angolo con la retta EF , nel piano GFE , e farà angolo con FH , nel piano GFH ; e così hauereмо quattro angoli in diuersi piani, che sono gli angoli EFG , GFH , HFI , IFE , la di cui unione nel punto F si chiama angolo solido, come si disse.



X I I.

Quando dagli estremi d'un piano rettilineo si stendono piani rettilinei, in modo, che i contigui scambievolmente si seghino, e le comuni sezioni concorrano in vn solo punto; il solido, contenuto da quei piani rettilinei, si chiama Piramide.

Da gli estremi del piano rettilineo DBC si concepiscano stendersi i piani rettilinei ABD , ADC , ABC , in modo, che i contigui ABD , ADC , scambievolmente si seghino, secondo qualche linea AD : Similmente i contigui ADB , ABC , si seghino, e la comune sezione sia AB ; e si seghino ancora i contigui piani ABC , ACD , secondo la linea AC ; e le comuni sezioni AD , AB , AC , concorrano nel solo punto A ; la



figu-


figura solida, contenuta da i piani ABD , ADC , ABC , BDC , è quella, che si chiamerà Piramide. Similmente da gli estremi del piano $FGHI$, si stendano i piani EGH , EHI , EIF , EFH , in modo, che i contigui si seghino, e le comuni sezioni siano le linee EG , EH , EI , EF , le quali concorrano nel solo punto E , la figura solida $EFGHI$ sarà ancora Piramide: ed il medesimo dobbiamo intendere del solido $KLMNOP$, e di qualunque altro, che habbia le medesime condizioni.

E nota, che se la base BCD è triangolo, il solido $ABDC$ si chiamerà Piramide di base triangolare: se la base sarà quadrilatera, come $FGHI$, il solido $EFGHI$ si chiamerà Piramide di base quadrangolare, e con quest'ordine per le altre.

X I I I.

Il Prisma è la figura solida contenuta da piani, de' quali due, che sono opposti, sono frà loro vguali, simili, e paralleli; e gli altri sono tutti parallelogrammi.

Per esempio nella figura seguente, i piani opposti, cioè i triangoli ABC , DEF , ouero i quadrangoli $HIRG$, $MNOL$; ouero i pentagoni $PQRST$, $VXYZO$, siano simili, vguali, e paralleli, e gli altri siano parallelogrammi, come nella prima figura, i notati $ACFD$, $ABED$, $BCFE$; nella seconda figura i notati $HMLG$, $HINM$, $GROL$, $INOK$; e nella terza figura i notati $PQVO$, $PTZO$, $QRXV$, $RSTX$, $STZY$: ogn'uno di questi solidi si chiama Prisma; cioè quello, le di cui faccie opposte sono triangoli, si chiama Prisma di base triangolare; e gli altri si dicono di basi quadrangolari, o pentagonali, secondo il numero de i lati delle faccie opposte.



X I V.

La Sfera è il solido descritto dalla reuolutione del mez-

zo circolo, fatta intorno al suo diametro posto immobile, fin che ritorna nel luogo, d'onde partì.

Quero, secondo Theodosio, è la figura solida, contenuta da una sola superficie, alla quale tutte le rette, che vi cadono da uno de i punti di dentro, sono frà di loro uguali.

X V.

Asse della sfera è quella retta linea, intorno alla quale, fù circonvoluto quel mezzo circolo, che descrisse la sfera.

X V I.

Il centro della sfera è quel medesimo punto, ch'è centro del detto mezzo circolo.

X V I I.


Il diametro della sfera è la retta linea, che passa per il centro, e termina con ambidue gli estremi nella superficie della sfera.

X V I I I.

Quando per qualche punto fisso in sublime, e per la circonferenza d'un circolo, che non sia nel medesimo piano, passa vna retta linea indeterminata, la quale, stando fermo il punto in sublime, si muoua per la circonferenza di quel circolo, fin che ritorna nel luogo d'onde partì; la figura solida, contenuta dal circolo, e dalla superficie descritta dall'intera reuolutione di quella retta linea, la chiameremo Cono.

Spiega Euclide la generatione del Cono con la reuolutione del triangolo rettangolo intorno ad uno de suoi lati, che contengono l'angolo retto: ma perche la definizione, che ne dà, non è così generale, come quella, che pone Apollonio Pergeo ne' suoi Elementi Conici, mi è parso bene, aderendo a quel che ne definisce il medesimo Apollonio, mutare la definizione d'Euclide, ed in suol luogo porne un'altra più generale; la quale, benché non sia la medesima spiegata dal detto Apollonio, è nondimeno poco da quella differente, non parendomi necessario spiegare in questo luogo, che cosa sia superficie del Cono, e che cosa siano i Coni opposti, essendo materia, che appartiene totalmente alla dottrina

delle sezioni Coniche, e come tale se ne parlerà al proprio luogo. E per spiegazione della sopraposta definizione, si consideri il circolo BDCE, ed il punto A fuori del piano BDCE; e dal punto A s'intenda tirata la retta AF, che passi per la circonferenza del circolo BDC, e poso il punto A immobile, s'intenda muoversi la retta linea AF in modo, che scorra per tutta la circonferenza BDCEB, finche ritorna nel luogo d'onde parti:



il solido ABDCE, contenuto dal circolo BDCE, e dalla superficie descritta, dalla intiera reuolutione della retta AF, per la circonferenza BDCE, è quello, che chiameremo Cono, il di cui vertice, o cima, sarà il punto immobile A.


X I X.

Affe del Cono è la retta linea tirata dal vertice del Cono al centro di quel circolo, intorno al quale si fece la reuolutione; che nella figura antecedente sarà la retta AG.

X X.

Base del Cono è quel medesimo circolo, intorno al quale si riuolge la retta linea, che descrisse il Cono; che nella sopra posta figura è il circolo BDCE.

Notisi, che quando l'asse AG è perpendicolare alla base BDCE, come nell'antecedente figura, il Cono ABDCE si chiama Cono retto; se l'asse AG non è perpendicolare alla base BDCE, si chiama Cono scaleno. Di più ne i coni retti, se l'asse AB della seguente figura è uguale alla retta CB, ch'è semidiametro del circolo CD, sarà l'angolo BAC la metà d'un angolo retto; e tutto l'angolo CAD sarà retto; ed in tal caso il solido ACD si chiama Cono rettangolo come nella prima figura. Se poi l'asse AB è minore del semidiametro BC, come nella seconda figura, sarà l'angolo BAC maggiore della metà d'un angolo retto, e tutto l'angolo CAD sarà ottuso, e perciò il Cono ACD si dice Cono ambigono. E finalmente se l'asse AB è maggiore del semidiametro BC come nella terza figura l'angolo CAB sarà minore della metà d'un angolo retto, e tutto l'angolo CAD sarà acuto, ed in quest'altro caso il Cono ACD si dice Cono ossigono.



Quando

a 5. & 31.
del 1.


b 12. & 32.
del 1.

c 18. & 33.
del 1.

X X I.

Quando due cerchi, sempre equidistanti, si muovono intorno a i loro centri, posti immobili, in modo, che rapiscano quella retta linea indeterminata, che passa per li corrispondenti estremi di due loro diametri paralleli; il solido contenuto da quei due cerchi, e dalla superficie descritta dalla reuolutione di quella retta, che passa per gli estremi de i detti diametri, fin che ritorna al luogo d'onde partì, lo chiameremo Cilindro.

Questa definizione ancora è più generale di quella, che pone Euclide, e l'abbiamo esposta alquanto differente da quella, che pone il Sereni nella sua sezione del Cilindro a causa, che non sà bisogno in questi elementi definire, che cosa sia superficie Cilindrica, non parlandosi in modo alcuno delle sezioni del Cilindro. E per chiarezza di quanto si è detto, si concepiscano i due cerchi ABCD, FGHI, fra di loro equidistanti; i di cui centri siano i punti E, & K, & i diametri AC, FH, siano fra di loro paralleli; per li corrispondenti estremi A, ed F, de i diametri AC, FH, si concepisca passare la retta linea indeterminata LM, e s'intendano immobili i centri E, K, intorno a i quali si muonino i cerchi ABCD, FGHI, in modo, che siano sempre equidistanti, e nella loro reuolutione rapiscano i diametri AC, FH, assieme con la retta LM, fin tanto, che la retta LM ritorni nel luogo donde partì; il solido contenuto da i cerchi ABCD, FGHI, e dalla superficie descritta dall'intera reuolutione della retta LM, sarà quello, che chiameremo Cilindro.



X X I I.

La retta linea, che congiunge i centri de' cerchi circonvoluti, si chiama Asse del Cilindro, che nella figura antecedente è la retta EK.

X X I I I.


Basi del Cilindro si chiamano quei due cerchi, che nella loro reuolutione descrissero il Cilindro, come sono i cerchi ABCD, FGHI.

Quando l'asse EK è perpendicolare alle basi $ABCD$, $FGHI$, il Cilindro $AFHC$ si chiama Cilindro retto; e se l'asse EK non è perpendicolare alle basi $ABCD$, $FGHI$, il solido $AFHC$ si chiama Cilindro scaleno.

X X I V.

I Coni frà di loro, ed i Cilindri frà di loro, si dicono simili, quando ne i Coni, e Cilindri retti, le assi sono proporzionali à i Diametri delle basi; e ne i Coni, e Cilindri scaleni, quando le inclinationi delle Assi alle basi sono frà di loro vguali, e le assi sono proporzionali à i diametri delle basi.

Per esempio se gli angoli co'i quali le Assi AL , EH , sono inclinate alle basi BC , FG , sono frà di loro vguali, e la proportion dell'asse AD al diametro BC della base, è come l'asse EH al diametro FG della base; i Coni scaleni frà di loro, & i Cilindri scaleni frà di loro, si dicono essere simili. E se saranno con retti, e cilindri retti, all'hora saranno simili, quando la proportion dell'asse AD al diametro BC della base, è come l'asse EH al diametro FG della base.



X X V.

Il Cubo, e la figura solida contenuta da sei quadrati vguali.

X X V I.

Il Tetraedro è la figura solida, contenuta da quattro triangoli equilateri, & vguali frà loro.

X X V I I.

L'Ottaedro è la figura solida, contenuta da otto triangoli equilateri, ed vguali.

X X V I I I.

Il Dodecaedro è la figura solida contenuta da dodici pentagoni vguali, equilateri, & equiangoli.


X X I X.

L'Icofaedro è la figura solida, contenuta da vinti triangoli equilateri, ed vguali.

X X X.

Il Parallelepipedo è la figura solida contenuta da sei figure quadrilatere, delle quali le opposte sono frà di loro parallele.

Nella seguente figura il solido FBCE è contenuto da sei quadrilateri, che sono ABCD, ECHG, GH EF, ADEF, ABGF, DCHE, e gli opposti sono paralleli, cioè il quadrilatero ABCD è parallelo al quadrilatero opposto FGHE, come ancora il quadrilatero ABGF è parallelo all' opposto DCHE, ed il quadrilatero ADEF è parallelo al suo opposto BCHG.



X X X I.

La figura solida si dice essere iscritta nella figura solida, quando tutti gli angoli della figura iscritta toccano, o i lati, o gli angoli, o le faccie della figura, nella quale è iscritta.

X X X I I.

La figura solida si dice essere circonscritta intorno alla figura solida, quando co' i suoi angoli, o lati, o faccie, tocca tutti gli angoli di quella figura, intorno alla quale è circonscritta.

Nelle due antecedenti definizioni non è necessario, che tutti gli angoli della figura iscritta tocchino, o tutti gli angoli, o tutti i lati, o tutte le faccie della figura, alla quale è circonscritta; ma basta che alcuni tocchino gli angoli, altri tocchino i lati, ed altri le faccie; e finalmente, pur che gli angoli della figura interna tocchino tutti, non importa, che tocchino lati, o angoli, o faccie della figura esterna.


THEOREMA I. PROPOSITIONE I.

Non è possibile, che parte d'vna linea retta sia

distesa

distesa nel soggetto piano, e parte ne sia eleuata in sublime.

Nel piano DE, se è possibile, sia distesa parte della retta AB, come AC, e parte ne sia eleuata in sublime, come fa la retta CB, in modo, che AC sia totalmente distesa nel piano DE, e la parte CB sia totalmente eleuata. Si ponga nel piano DE la retta CG^a ad angoli retti con




la retta AC, e nel medesimo piano DE, nel punto C, si ponga la retta CF^b ad angoli retti con CG. Perche le rette AC, CF, sono nel medesimo piano DE, e gli angoli GCA, GCF, sono retti, per la 14. del primo, le rette AC, CF, nel piano DE, costituiscono la sola retta linea AF: per il che AC è parte della retta AF: ma, per ipotesi, la medesima AC è parte della retta AB; la retta dunque AC sarà comune parte delle due rette AB, AF, che per l'annotazione dopo la 3. proposizione del 1. al num. 2. è impossibile. Non dunque parte della retta AB è collocata nel soggetto piano DE, e parte eleuata in sublime, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA II. PROPOSITIONE II.

Se due rette linee si segano scambievolmente, sono in vn medesimo piano; ed ogni triangolo è in vn medesimo piano.

Si seghino le rette AB, CD in qualche punto E, e preso nelle rette ED, EB, due qualunque punti F, & G, tirata la retta FG. Dico prima che il triangolo EFG è in vn medesimo piano. Se il triangolo EFG non è in vn medesimo piano, parte di esso ne sarà nel soggetto piano, e parte in sublime; sia nel



soggetto piano la parte EHIG, ed il rimanente FHI sia in sublime, sarà della retta EF la parte EH nel soggetto piano, e la parte HF in sublime, ch'è contro all'antecedente proposizione. Di nuouo, supposto che la parte EFIK sia nel soggetto piano, e la parte IKG in sublime, similmente farà della retta EG la parte EK nel soggetto piano, e la parte KG in sublime, che per l'antecedente proposizione è impossibile. Nell'istesso modo si dimostrerà, che nessun'altra parte del triangolo è in diuerso piano; e perciò tutto il triangolo EFG, è in vn medesimo piano, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

In oltre. Dico che le rette AB, CD sono in vn medesimo piano.


Perche

Perche si è dimostrato, che il triangolo EFG è in vn medesimo piano, i suoi estremi, cioè le rette EF, FG, GE, saranno nel medesimo piano, e tutta la retta GA sarà nel medesimo piano EFG; perche altrimenti la parte EG farebbe nel soggetto piano EFG, e la parte EA farebbe in sublime, il che per l'antecedente propos. è impossibile. Per l'istessa ragione la retta DC è nel medesimo piano EGF. Per la qual cosa le rette AB, CD, che scambievolmente si segano in qualche punto E, sono in vn medesimo piano, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA III. PROPOSITIONE III.

Se due piani si segano scambievolmente, la loro comune sectione è linea retta.

Si seghino scambievolmente i piani AB, CD, e la loro comune sectione sia la linea EF. Dico, che la linea EF è linea retta. Se EF non è linea retta, dal punto E al punto F si tiri vna retta linea; ò quella congrue con la linea E, ed in tal caso la linea EF è retta; ò pure non congrue con EF, e giace in vno de i due piani AB, CD. Sia prima collocata nel piano AB, come fa la linea EGF. Di nuouo dal punto E al punto F, nel piano CD, si tiri vna retta linea, la quale ò congruerà con EF, ed all'hora EF farà retta linea; ò passerà fuori della linea EF, come fa la linea EHF. Perche le linee EGF, EHF, per costruzione, sono linee rette, ed ambedue concorrono ne i punti E, ed F, perciò chiudono figura, il che, per l'annotatione dopo la terza, propos. del primo, al num. 3. è impossibile. Non dunque le linee EGF, EHF sono linee rette, ma la comune sectione EF farà linea retta, ch'era da dimostrarsi.




THEOREMA IV. PROPOSITIONE IV.

Se nella comune intersegtione di due rette linee, che scambievolmente si segano, sia eleuata vna retta linea, che faccia angoli retti con le rette, che si segano; quella sarà perpendicolare al piano, nel quale sono collocate le rette, che scambievolmente si segano.

Si seghino le rette CD, FE, in qualche punto B; e nel punto B cada la retta AB, in modo, che faccia angoli retti con le rette CD, FE; cioè che gli angoli ABD, ABE, ABC, ABF, siano retti. Dico, che la retta AB è perpendicolare al piano CFDE, nel quale si suppongono collocate le rette

CD,

CD, EF. Perche le rette CD, FE, si segano, per ipotesi, nel punto B, saranno per la 2. propos. di questo, in vn medesimo piano: sia quel piano il notato CFDE; dalle rette BE, BF si tagliano le vguale parti BI, BK; e dalle rette BD, BC, si tagliano le vguale parti BH, BG; e si tirino le rette HI, KG. Si considerino i due tri-



goli GBK, IBH. Perche IB, per costruzione, è vguale à BK, ed il lato HB è vguale à BG; i due lati IB, BH, sono vguale à i due lati KB, BG, l'angolo IBH è vguale all'angolo al vertice GBK; b farà la base IH vguale alla base GK; c l'angolo BIH vguale all'angolo BKG. Per il punto B si faccia passare, nel piano CD, qualunque retta MBL, in modo, che seghi le rette GK, IH, come in L, ed M; e si considerino i due triangoli BKL, BIM. Perche l'angolo BKL è dimostrato vguale all'angolo BIM, e l'angolo LBK è vguale all'angolo al vertice IBM; i due angoli LKB, LBK, del triangolo LBK, saranno vguale à i due angoli MIB, MBI, del triangolo MBI; il lato KB, per costruzione, è vguale al lato BI, saranno gli altri due lati BL, LK, d vguale à i due lati BM, MI; cioè il lato BL vguale al lato BM, ed il lato KL vguale al lato IM. Si tirino le rette AG, AL, AK, AH, AM, AI.

E si considerino i due triangoli ABK, ABI. Essendo il lato BK, per costruzione, vguale al lato BI, ed il lato AB è commune, i due lati AB, BK, saranno vguale à i due lati AB, BI; l'angolo ABK, per ipotesi, è vguale all'angolo ABI, stante che l'vno, e l'altro è retto; perciò la base AK è farà vguale alla base AI. Nell'istesso modo, considerando i triangoli ABH, ABG, si dimostrerà, che il lato AH è vguale al lato AG. Si considerino poi i triangoli AKG, AIH, de' quali i due lati AI, IH, per quel che si è dimostrato, sono vguale à i due lati AK, KG, la base AH è dimostrata vguale, alla base AG, e perciò l'angolo AIH f sarà vguale all'angolo AKG. Di più ne' triangoli AKL, AIM, i due lati AK, KL sono stati dimostrati vguale à i due lati AI, IM; l'angolo AKL è dimostrato vguale all'angolo AIM; farà la base AL vguale alla base AI. Finalmente si considerino i due triangoli ABL, ABM. Perche il lato BM è dimostrato vguale al lato BL, ed il lato AB è commune ad ambidue i triangoli; saranno i due lati AB, BM, vguale à i due lati AB, BL; la base AM è dimostrata vguale alla base AL, farà l'angolo ABM h vguale all'angolo ABL; per la qual cosa gli angoli ABM, ABL k sono retti, e la retta AB è perpendicolare alla retta LM. Nell'istesso modo proueremo, che la retta AB è perpendicolare à qualunque altra retta, che passa per il punto B, e giace nel piano CFDE; e perciò la retta AB è perpendicolare à tutte le infinite rette linee, che passano per il punto B, e giacciono nel piano CD; ed in conseguenza farà AB perpendicolare al piano CFDE, che passa per quelle infinite rette linee: ma le rette CD, EF sono nel piano CFDE, farà la retta AB l perpen-

dicolare

a 3. del 1.

b 4. del 1.

c 15. del 1.

d 16. del 1.

e 4. del 1.

f 5. del 1.

g 4. del 1.

h 2. del 1.

k 10. def. del 1.


l 3. def. del 11.

dicolare al piano, nel quale sono discese le rette CD, FE, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA V. PROPOSITIONE V.

Se vna retta linea cadę nella commune intersegtione di tre rette linee, e fà angoli retti con tutte tre quelle; le medesime tre rette linee sono in vn medesimo piano.

Si feghino scambievolmente le tre rette linee EB, DB, CB, in qualche punto B, nel quale cada la retta AB, in modo, che gli angoli ABE, ABD, ABC, siano retti. Dico, che le rette BC, BD, BE, sono in vn medesimo piano. Se non sono in vn medesimo piano, perche due di quelle, prese in qualunque modo, sono in vn medesimo piano; siano le due BD, BC, nel piano FG, e la retta BE, se è possibile, sia in sublime. Perche la retta AB fà angoli retti con le due BD, BC, per l'antecedente propos. la retta AB farà perpendicolare al piano FG, nel quale giacciono le due BD, BC. In oltre le due AB, BE, segandosi in B, ^a sono in vn medesimo piano; sia quel piano il notaro ABEI, il quale continuato passerà per il punto B: e perche il punto B è nel piano FG, perciò il piano ABE, continuato, passando per il punto B, segará il piano FG; sia la commune sectione la linea BH; farà BH ^b linea retta, discesa nel piano FG, e le tre AB, BE, BH sono nel medesimo piano ABH: fù dimostrata la retta AB perpendicolare al piano FG, farà l'angolo ABH ^c retto: ma l'angolo ABE, per ipotesi, è retto, l'angolo dunque ABE farà vguale all'angolo ABH: la parte è vguale al tutto, ch'è impossibile. Non dunque le rette BC, BD, BE sono in diuersi piani, ma sono in vn medesimo piano, ch'era da dimostrarsi.



a. 2. del 1.

b. 3. del 1.

c. 3. def. 11.

THEOREMA VI. PROPOSITIONE VI.

Se due rette linee sono perpendicolari ad vn medesimo piano, quelle sono frà di loro parallele.

Siano le rette AB, CD, perpendicolari al piano EF. Dico, che le rette AB, CD, sono frà di loro parallele. Dal punto D al punto B si tiri la retta BD. Perche i punti B, & D, sono nel piano EF, farà la retta BD nel medesimo piano EF: dal punto D nel piano EF, ^a si tiri la retta DG, in modo, che

a. 1. del 1.

H h h h

l'angolo

b 3. del 1.


c 3. defin.
del 11.

d 4. del 1.

e 8. del 1.

f 8. del 1.

l'angolo GDB, sia retto; si faccia DG^b vguale ad AB, e si tiri la retta BG. Perche le rette AB, CD, per ipotesi, sono perpendicolari al piano EF, e le rette BD, DG, GB, sono nel piano EF, gli angoli CDG, CDB, ABG, ABD, e saranno angoli retti. Si tirino le rette AG, AD; e si considerino i due triangoli GDB, ABD. Perche il lato DG è fatto vguale al lato AB, ed il lato BD è comune, i due lati dunque GD, DB, del triangolo GDB, sono vguali à i due lati AB, BD, del triangolo ABD, l'angolo GDB è vguale all'angolo ABD, stante che sono retti; sarà la base BG^d vguale alla base AD. In oltre si considerino i due triangoli ABG, ADG; essendo il lato AB, per costruzione, vguale al lato GD, ed il lato BG è dimostrato vguale al lato AD; i due lati AD, DG, del triangolo ADG, saranno vguali à i due lati GB, BA, del triangolo GBA; la base AG è comune, sarà l'angolo ABG^e vguale all'angolo ADG: ma l'angolo ABG è dimostrato retto, l'angolo dunque ADG sarà retto. Si considerino le tre rette DC, DA, DB, che si segano nel punto D. Essendosi dimostrati gli angoli GDC, GDA, GDB, retti, le tre rette DC, DA, DB, per l'antecedente propos. sono in vn medesimo piano; ma la retta AB è nel piano del triangolo ABD, cioè nel piano, doue sono distese le rette AD, BD, in conseguenza le rette AB, BD, AD, CD, sono in vn medesimo piano. Finalmente perche le rette AB, CD, sono in vn medesimo piano segate dalla retta BD, & i due angoli interni ABD, CDB, per quel che si è dimostrato, sono retti, saranno le rette AB, CD^f frà di loro parallele, ch'era da dimostrarsi.



THEOREMA VII. PROPOSITIONE VII.


Se frà due punti, presi in due rette parallele, è tirata vna linea retta, quella sarà nel medesimo piano con le proposte parallele.

g 3. del 11.

Siano le due rette parallele AB, CD, nelle quali siano presi due qualunque punti E, ed F, e dal punto E al punto F sia tirata la retta EF. Dico che la retta EF è nel medesimo piano con le parallele AB, CD. Perche le rette AB, CD sono, per ipotesi, parallele, per la 34. defin. del primo, sono in vn medesimo piano; se la retta EF non è nel piano ABCD, sia, se è possibile, in qualche altro piano, fuori del piano ABCD; per li punti E, ed F, si faccia passare vn'altro piano, che seghi il piano ACDB, e la commune sezione sia la linea EGF; sarà la commune sezione EGF^g linea retta: e perche le rette EGF, & EF, concorrono insieme ne i punti E, ed F, perciò

chiudono

chiudono figura, che per l'annotatione dopo la terza del primo lib. num. 3. è impossibile. Non dunque la retta EF è in altro piano, fuori del piano ACDB: ma è nel medesimo piano ACDB, doue sono distese le parallele AB, CD, ch'era da dimostrarfi.




S C O L I O.

Se le rette linee AB, CD, non fossero parallele, se faranno collocate in un medesimo piano, la retta EF, ed ogn'altra, che le congiunge farà ancora nel medesimo piano colle rette AB, CD, e la dimostrazione è la medesima.

THEOREMA VIII. PROPOSITIONE VIII.

Se due rette linee sono frà di loro parallele, ed vna di quelle è perpendicolare ad vn piano; ancora l'altra è perpendicolare al medesimo piano.

Siano le rette AB, CD, frà di loro parallele, e la retta CD sia perpendicolare al piano EF. Dico, che ancora AB è perpendicolare al piano EF. Si continui la retta AB, fin che concorra col piano EF in qualche punto B; dal punto B al punto D si tiri la retta BD: essendo i punti B, & D, nel piano EF, farà la retta BD nel medesimo piano EF; dal punto B nel piano EF si tiri la retta BG, in modo, che l'angolo GBD sia retto; si faccia GB vguale alla retta CD, e si tiri la retta GD. Perchè la retta CD, per ipotesi, è perpendicolare al piano EF, gli angoli CDB, CDG, sono retti. Si tirino le rette CB, CG, e si considerino i due triangoli CDB, GBD.



a 11. del 1.
b 2. del 1.

c 3. defin.
del 11.

d 4. del 1.

Perchè il lato GB, per costruzione, è vguale al lato CD, ed il lato BD è commune; i due lati CD, DB, del triangolo CDB, sono vguaglii i due lati GB, BD, del triangolo GBD; l'angolo CDB è vguale all'angolo GBD, stante che sono retti, farà la base CB vguale alla base GD. Similmente si considerino i due triangoli CDG, CBG, de' quali il lato GB, per costruzione, è vguale al lato CD, il lato

H h h h 2

GD

e 8. del 1.


f 4. del 11.

g 3. defin.
del 11.

h 29. del 1.

K 4. del 11.

GD è dimostrato vguale al lato CB; i due lati dunque CD, DG, sono vguali à i due lati GB, BC; la bafe CG è comune, farà l'angolo CDG e vguale all'angolo CBG: ma l'angolo CDG è dimostrato retto, l'angolo dunque CBG farà retto: per costruzione l'angolo GBD è retto, perciò la retta GB, facendo angoli retti colle due BD, BC, farà ^f perpendicolare al piano BDC, nel quale sono le rette BD, BC. In oltre, perche le rette AB, CD, per ipotesi, sono parallele, e sono segate dalle rette BC, BD, per l'antecedente proposizione, le rette BC, BD, faranno nel medesimo piano con le parallele AB, CD: ma la retta GB è dimostrata perpendicolare al piano CBD; farà dunque GB perpendicolare al piano ABDC, e perciò l'angolo ABG ^g farà retto. Finalmente perche le rette AB, CD sono parallele, segate dalla retta BD, i due angoli ABD, CDB ^h sono vguali à due angoli retti, ma l'angolo CDB è dimostrato retto, farà l'angolo ABD retto. E perche l'angolo ABG fu dimostrato retto, farà la retta AB perpendicolare alle due rette BD, BG: e perciò farà perpendicolare ^k al piano, doue sono le due GB, BD, cioè farà perpendicolare al piano EF, come fu proposto dimostrare.




THEOREMA IX. PROPOSITIONE IX.

Se due rette linee sono parallele ad vn altra retta linea, che non è nel medesimo piano, quelle due sono frà di loro parallele.

Siano le due rette AB, CD parallele alla retta EF, e non siano tutte tre in vn medesimo piano. Dico che le rette AB, CD sono frà di loro parallele. Perche le rette EF, AB sono frà di loro parallele, per la natura delle parallele, le due AB, EF, sono in vn medesimo piano: e per l'istessa ragione le parallele EF, CD sono in vn medesimo piano. Si prenda in EF

a 11. del 1.

b 4. del 11.



qualche punto G, dal quale, nel piano EFBA, si tiri la retta GH, ^a in modo, che faccia angoli retti colla retta EF, e dal medesimo punto G nel piano ECDF, si tiri la retta GI, ad angoli retti con la medesima retta, EF: Si prolunghino le rette GH, GI, fin che concorrano con le due AB, CD come in H, ed I: Essendo per costruzione, gli angoli EGH, EGI, retti, farà la retta EG ^b perpendicolare al piano HGI, doue sono le rette HG, GI; E perche le rette AH, EG, per ipotesi, sono frà loro parallele, e la


retta

retta EG è dimostrata perpendicolare al piano HGI; sarà la retta AH ^e 8. del 11. perpendicolare al medesimo piano HGI. Similmente, perche le rette EG, CI, per ipotesi, sono parallele, e la retta EG è perpendicolare al piano HGI, farà la retta CI ^b 8. del 11. perpendicolare al medesimo piano HGI, dal che le due rette AH, CI sono perpendicolari al medesimo piano HGI, e per la 6. proposizione di questo, le rette AH, CI, cioè le due AB, CD, sono frà di loro parallele, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA X. PROPOSITIONE X.

Se due rette linee, che scambievolmente concorrono, sono parallele à due altre rette linee, che similmente concorrono, e siano collocate in diuersi piani, in modo, che i concorsi si corrispondano dalla medesima parte; quelle rette linee conterranno angoli vguali.

Siano le rette AB, CB, che concorrano scambievolmente in qualche punto B, le quali siano parallele alle due DE, FE, che concorrono nel punto E; cioè AB sia parallela à DE; e la retta CB sia parallela ad FE, in modo, che le




due AB, CB, non siano nel medesimo piano, nel quale sono le due DE, FE, e che i concorsi B, & E siano collocati dalla medesima parte EB. Dico che l'angolo ABC è vguale all'angolo DEF. Si taglino le rette BA, ED ^a 3. del 1. frà di loro vguali, e si faccia EF vguale à BC; si tirino le rette AC, DF, FC, DA, EB. Perche le due BA, ED sono frà di loro vguali, e parallele, faranno le rette EB, DA, ^b 33. del 1. frà di loro vguali, e parallele. Similmente, essendo le due BC, EF, frà di loro vguali; e parallele, faranno le due FC, EB, ^c frà di loro vguali, e parallele. Hor essendo FC vguale, e parallela ad EB, e la retta DA è vguale, e parallela alla medesima EB; le due FC, DA ^d faranno frà di loro vguali, e parallele: dal che le rette DF, AC, che le congiungono, ^e sono frà di loro vguali, e parallele. Si considerino i triangoli ABC, DEF: perche i lati AB, BC, per costruzione, sono vguali à i due lati DE, EF, e la base CA è dimostrata vguale alla base FD, sarà l'angolo CBA ^f vguale all'angolo FED, come fu proposto dimostrare. ^e 33. del 2. ^f 8. del 1.

PROBLEMA I. PROPOSITIONE XI.

Da vn dato punto in sublime far cadere vna retta perpendicolare al soggetto piano.

Sia

Sia A il dato punto in sublime, ed il soggetto piano BC; si vuole dal punto A far cadere vna retta perpendicolare al soggetto piano BC. Si tiri nel piano DC qualunque retta linea DE; per il punto A, e per la retta DE, si concepisca paffare il piano ADE, nel quale dal punto A sia tirata la retta AF, ³ che faccia angoli retti colla retta DE. Se la retta AF




è perpendicolare al piano BC, farà la retta AF quella perpendicolare, che si cerca: ma se AF non è perpendicolare al piano BC, per il punto F, nel piano BC, si faccia passare la retta GFH^b ad angoli retti con la retta DE, e poi, per le rette AF, FH, si concepisca passare il piano AFH, e dal punto A si tirì nel piano AFH la retta AI, ^c ad angoli retti con la retta, FH. Dico che la retta AI è perpendicolare al piano BC. Per il punto I, si faccia passare la retta LK, ^d parallela alla retta DE. Perchè gli angoli DFA, DFH, per costruzione, sono retti, farà la retta DF perpendicolare alle due rette FA, FH; e perciò sarà perpendicolare ^e al piano AFH. In oltre, essendo, per costruzione, la retta KI parallela ad FD, e la retta FD è dimostrata perpendicolare al piano AFH, sarà la retta, KI ^f perpendicolare al medesimo piano AFH: ma la retta AI è nel piano AFH, l'angolo dunque AIK sarà retto; fu fatto, per costruzione, l'angolo AFI retto; sarà la retta AI perpendicolare alle due rette KI, IF, e perciò ^g sarà perpendicolare al piano, doue giacciono le rette KI, IF: ma le rette KI, IF, per costruzione, sono nel piano BC; la retta dunque AI sarà perpendicolare al piano BC, ch'era da farsi, e dimostrarsi.

PROBLEMA II. PROPOSITIONE XII.

Dato vn punto in vn piano, erigere in quel punto vna
retta perpendicolare al dato piano.

Sia il dato punto A nel piano BC, e si voglia nel punto A erigere una retta perpendicolare al dato piano BC. Si prenda qualche punto in lublime, come il punto D, dal quale, per l'antecedente proposizione, si faccia cadere la retta DE perpendicolare al piano BC; se la retta DE cade nel punto A, sarà DE la perpendicolare, che si cerca: ma se non cade nel punto A; dal punto E al punto A, si concepisca passare il piano GA, AF, parallelo alla retta DE. Dico che al piano BC. Perché le rette FA, DE, sono parallele; e la retta DE è perpendicolare perpendicolare al medesimo piano BC;




THEO-

THEOREMA XI. PROPOSITIONE XIII.

Non è possibile, che da vn medesimo punto, preso in vn piano, si possano tirare dalla medesima parte due rette linee perpendicolari all'istesso piano.

Nel piano AB sia preso qualche punto C, nel quale sia eleuata la retta CD perpendicolare al piano AB. Dico essere impossibile, che nel medesimo punto C, e dalla medesima parte DE, si possa eleuare altra retta perpendicolare al medesimo piano AB. Si eleui, se è possibile, nel punto C la retta CE, perpendicolare al piano AB. Perche le rette, DC,



EC, si segano in C, perciò sono ^a in vn medesimo piano; sia quello il piano DCE, il quale continuato segará il piano AB in qualche linea HG; essendo HG comune sezione de i piani FG, AB, farà HG ^b linea retta; E perche la retta DC, per ipotesi, è perpendicolare al piano AB, l'angolo DCG è farà retto. Similmente la retta EC, per la fatta supposizione, è perpendicolare al piano AB, dal che l'angolo ECG ^d sarà retto; ma l'angolo DCG è dimostrato retto, farà l'angolo ECG vguale all'angolo DCG; la parte vguale al tutto, ch'è impossibile. Non dunque dal medesimo punto C si possono tirare dalla medesima parte DE due rette perpendicolari al medesimo piano AB, ch'era da dimostrarsi.

Il medesimo si dimostra più breuemente in questo modo. Si eriggano, s'è possibile, nel medesimo punto C le due rette CD, EF, perpendicolari al piano AB. Perche le due rette DC, EC sono perpendicolari al medesimo piano AB, perciò sono ^c frà di loro parallele; ma, per ipotesi, le rette DC, EC concorrono nel punto C; farebbero parallele, e concorrerebbero, ch'è impossibile. Non dunque &c. ch'era da dimostrarsi.

SCOLIO DEL CLAVIO.

Nel medesimo modo si può dimostrare, che da qual che punto A, in sublime non possono cadere due rette perpendicolari al medesimo piano. Dal medesimo punto A se è possibile, cadano le rette AD, AE perpendicolari al piano BC. Perche le rette AD, AE si segano in A, perciò sono ^e in vn medesimo piano, sia quello il piano FG, il quale continuato seghi il piano BC, e la comune sezione sia ^b la retta HG. Perche le rette AD, AE sono perpendicolari al piano BC, gli angoli ADE, AED ^f sono retti; dal che due angoli d'un triangolo non sono minori di due retti, ch'è contro alla 17. proposizione del primo. Non dunque da vn medesimo punto in sublime può cadere più d'una retta perpendicolare ad vn medesimo piano, ch'era da dimostrarsi.



LEM-


L E M M A.

Se vna retta linea è perpendicolare à due piani, tutte le altre rette, che sono perpendicolari ad vno di quei piani, sono ancora perpendicolari all'altro piano; le dette perpendicolari sono frà di loro vguale; ed ogn'vna è la minima di tutte le altre interposte frà quei piani; e non sono perpendicolari à i medesimi piani.

Sia la retta AB perpendicolare à i piani CD , EF , e preso nel piano EF , qualunque punto G , dal quale sia tirata la retta GH perpendicolare al piano CD . Dico prima che GH è perpendicolare al piano EF . Si tirino le rette AH , BG . Perche le rette GH , BA sono perpendicolari al piano CD , gli angoli GHA , BAH , sono retti, e perciò le rette BA , GH , sono frà di loro parallele; ma AB è supposta perpendicolare al piano EF , sarà la retta HG , che gli è parallela, e perpendicolare al medesimo piano EF . Nell'istesso modo si dimostrerà, che ogn'altra retta linea perpendicolare ad vno de i piani CD , EF , è ancora perpendicolare all'altro piano, ch'era da dimostrarfi nel primo luogo.

Di nuovo. Dico che la perpendicolare GH è vguale ad AB . Perche la retta AB è perpendicolare ad ambidue i piani CD , EF , gli angoli HAB , GBA , sono retti, dal che le rette GB , HA sono frà di loro parallele, ed il quadrilatero $AHGB$ è parallelogrammo; e sarà HG vguale al lato opposto AB . Nell'istesso modo si dimostrerà, che ogn'altra retta interposta frà i piani CD , EF , perpendicolare à i medesimi, è vguale alla perpendicolare AB ; e perciò tutte sono frà di loro vguale, ch'era da dimostrarfi nel secondo luogo.

Finalmente, Dico, che ogn'vna delle perpendicolari, come AB , è la minima di qualunque altra retta interposta frà i piani CD , EF , la quale non sia perpendicolare ad alcuno di essi piani CD , EF . Frà i piani CD , EF , s'interponga qualunque retta IK , non perpendicolare à i piani CD , EF ; dal punto K si tiri la retta KL perpendicolare al piano CD ; per quel che si è dimostrato nella prima parte, sarà KL perpendicolare al piano EF , e per l'antecedente dimostrazione, sarà KL vguale ad AB ; si tiri la retta IL . Effen-



a 3. defin.
del 11.

b a 8. del 1.

c 8. del 11.

d 3. defin.
del 17.
e a 8. del 1.
f 15. defin.
del 8.
g 34. del 1.

h a 1. del 11.

do la retta KL , per costruzione, perpendicolare al piano CD , l'angolo KLI sarà retto; e perciò l'angolo KIL sarà minore dell'angolo KLI , ed il lato KL sarà minore del lato IK : ma la retta KL fu dimostrata uguale ad AB ; sarà la perpendicolare AB minore di KI . Nell'istesso modo si dimostrerà, che AB è minore d'ogn'altra retta interposta fra i piani CD , EF , la quale non sia perpendicolare a i medesimi piani. Per la qual cosa la perpendicolare AB sarà la minima, com'è fu proposto dimostrare.


K 3. defin.
del 1.
l. 17. del 1.
m 19. del 1.

THEOREMA XII. PROPOSITIONE XIV.

Se vna retta linea è perpendicolare a due piani, quei due piani sono fra di loro paralleli.

Sia la retta AB perpendicolare a i piani CD , EF . Dico che i piani CD , EF , sono fra di loro paralleli. Si prenda nel piano EF qualunque punto G , dal quale si tiri la retta GH perpendicolare al piano CD ; sarà GH , per l'antecedente Lemma, perpendicolare al piano EF , e sarà uguale ad AB ; ed ogn'vna delle rette AB , GH , sarà quella, che disegna il minimo intervallo, o distanza fra i piani CD , EF ; se concepiremo continuati i piani CD , EF , da tutte le parti indeterminatamente, e da gl'infiniti punti, che si possono immaginare nel piano EF , cadano rette linee perpendicolari al piano CD , quelle tutte sono perpendicolari al piano EF , ogn'vna disegna il minimo intervallo fra i piani CD , EF , e sono tutte fra di loro uguali: per la qual cosa i piani CD , EF , continuati in infinito, in nessun luogo della loro estensione s'avvicinano, o si scostano, e per la definizione ottava di questo, i piani CD , EF , sono fra di loro paralleli, come fu proposto dimostrare.

211. del 1.




S C O L I O.

La conuersa all'antecedente proposizione, si farà nel seguente modo.

Se due piani sono fra di loro paralleli, la retta, ch'è perpendicolare ad vno di essi, sarà ancora perpendicolare all'altro.

- a 3. del 11. Siano i piani paralleli AB, CD , e la retta EF , interposta frà essi, sia perpendicolare al piano CD . Dico che la medesima retta EF è perpendicolare al piano AB . Per la retta EF si faccia passare il piano $LMNO$, che seghi i piani AB, CD , secondo la loro larghezza, e le comuni sezioni siano ^{a} le rette linee MN, LO . Di nuovo per la retta FE s'intenda passare un altro piano, come $GHIK$, che seghi i piani AB, CD , secondo la loro lunghezza, e le comuni sezioni siano le rette ^{b} IK, HG . Perché la retta EF , per ipotesi, è perpendicolare al piano CD , gli angoli EFG, EFO , e sono retti. In oltre, perché la retta EF fa angoli con le rette EN, EK , se gli angoli FEN, FEK sono retti, la retta FE sarà perpendicolare ^{d} al piano AB , ch'è il nostro proposto. Se poi gli angoli FEN, FEK , non sono ambidue angoli retti, uno di quelli ò sarà minore, ò maggiore del retto. Sia prima l'angolo FEK minore del retto: saranno i due angoli GFE, KEF , minori di due angoli retti, e per lo Scolio dopo la 31. del primo, le rette EK, FG , continuate, concorrono in qualche punto P . Perché la retta EK è nel piano AB , sarà tutta la retta EKP nel medesimo piano AB , altrimenti la parte EK sarebbe nel piano AB , e la parte KP sarebbe in altro piano, ch'è contro alla prima proposizione di questo. Hor essendo la retta EKP tutta nel piano AB , continuato il piano AB , passerà per il punto P . E per l'istessa ragione, continuato il piano CD passerà per il medesimo punto P ; dal che i piani AB, CD , concorreranno insieme nel punto P , ch'è contro all'ipotesi, mentre gli habbiamo supposti paralleli. Non dunque l'angolo FEK è minore del retto. Se l'angolo FEK fosse maggiore del retto, il supplemento, cioè l'angolo FEI , sarebbe minore del retto: e procedendosi come prima, si mostrerà, che i piani AB, CD , continuati concorreranno dalla parte DB . Non dunque gli angoli FEK, FEI , sono ineguali, ma sono angoli retti. Nell'istesso modo si prouerà, che gli angoli FEN, FEM , sono retti; dal che la retta FE è perpendicolare al piano AB , ch'era da dimostrarsi.
- e 1. del 11.
- d 4. del 11.
- c 3. def. del 11.
- b 3. del 11.



Per facilitare i modi del dimostrare, aggiungo il seguente Theorema.

Se due piani non sono paralleli, continuati concorreranno da qualche parte; e se due piani, continuati da tutte le parti, mai concorrono, quelli sono frà di loro paralleli.

Siano


Siano prima i due piani AB, CD , non paralleli. Dico che continuati concorreranno scambievolmente da qualche parte. Si prenda nel piano AB qualche punto E , dal quale cada la retta EF ^a perpendicolare al piano CD , e si faccia la medesima costruzione dell'antecedente Theorema; gli angoli EFG, EFO ^b saranno retti; se gli angoli FEK, FEN sono retti, la retta FE ^c sarà perpendicolare al piano AB ; e per l'antecedente proposizione, i piani AB, CD , sono frà di loro paralleli, ch'è contro all'ipotesi. Non dunque gli angoli FEN, FEK , sono ambidue angoli retti. Non sia dunque uno di quelli retto, come per esempio l'angolo FEK ; sarà l'angolo FEN , o maggiore, ouero minore del retto: e procedendosi come nell'antecedente Theorema, si dimostrerà che i piani concorrono verso P , ouero dalla parte BD . Se poi l'angolo FEN non sarà retto, si dimostrerà nelPistesso modo, che i piani AB, CD , o concorrono dalla parte ON , ouero dalla parte LM . Per la qual cosa i piani non paralleli continuati concorreranno da qualche parte, come fu proposto dimostrare nel primo luogo.

Di nuouo, supposto che i piani AB, CD , continuati da tutte le parti, mai concorrano. Dico che sono frà loro paralleli. Se i piani AB, CD non sono paralleli, per quel che si è dimostrato nella prima parte, continuati concorreranno da qualche parte, ch'è contro all'ipotesi. Se dunque i piani AB, CD , continuati non concorrono insieme da nessuna parte, sono frà di loro paralleli, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA XIII. PROPOSITIONE XV.

Se due rette linee scambievolmente concorrono insieme, e sono parallele à due altre, che similmente concorrono insieme, e non sono nel medesimo piano; i piani, che passano per quelle, sono frà di loro paralleli.

Siano le due rette linee AB, CB , concorrenti in qualche punto B , le quali siano parallele alle due DE, EF , poste in altro piano, e concorrenti in qualche punto E ; cioè AB sia parallela ad ED , e la retta CB sia parallela ad EF . Dico che i piani AC, DF , sono frà di loro paralleli. Dal punto B si tiri la retta BG ^a perpendicolare al piano DF ; dal punto G si tiri la retta GH ^b parallela ad EF ; e la retta GI parallela ad ED . Perche



a 11. del 11.

b 2. defn. 1. del 11.

c 4. del 11.

a 11. del 11.
b 31. del 11.

c 9. del 11.
d 9. del 11.

e 9. del 11.
del 11.

f 29. del 11.

g 25. del 11.

h 4. del 11.

le rette CB, HG sono parallele ad EF, faranno e fra di loro parallele. Similmente, essendo le rette IG, AB, parallele alla retta ED, sarà IG ^a parallela ad AB. In oltre; perche la retta BG, per costruzione, è perpendicolare al piano DF, gli angoli BGH, BGI, e faranno retti. Hor essendo le rette HG, CB fra di loro parallele, segate dalla retta BG, gli angoli interni CBG, HGB, ⁱ sono vguagli a due angoli retti: ma l'angolo HGB è dimostrato retto, l'angolo dunque CBG sarà retto parimente perche le rette GI, AB sono parallele, segate dalla retta BG, i due angoli ABG, IGB, ^s sono vguagli a due angoli retti: ma l'angolo IGB fu mostrato retto, sarà l'angolo ABG ancora retto: dal che la retta GB sarà perpendicolare alle due rette BC, BA, e perciò ^b sarà perpendicolare al piano ABC. E perche la retta BG, per costruzione, è perpendicolare al piano DF; la retta dunque BG è perpendicolare ad ambidue i piani AC, DF, e per l'antecedente proposizione, i piani AC, DF, sono fra di loro paralleli, eh'era da dimostrarsi.

S C O L I O.


Il P. Clauio aggiunge il seguente problema.

Dato vn piano, ed vn punto fuori di esso, per il dato punto far passare vn piano equidistante al dato piano.

Sia dato il piano AC, ed il punto D fuori del dato piano; si vuole per il punto D far passare vn piano, parallelo al piano AC. Dal punto B al punto D si tiri la retta BD, e per le rette AB, BD, si concepisca passare vn piano, come ABDE indeterminato verso DE; e per le due CB, BD, se concepisca passare il piano CBDF, indeterminato verso DF; dal punto D nel piano ABD, si tiri la retta DE, ^a parallela ad AB; e dal medesimo punto D nel piano CBD, si tiri la retta DF ^b parallela alla retta BC. Perche le rette FD, DE, concorrenti nel punto D, sono parallele alle due CB, AB, che concorrono nel punto B; per l'antecedente proposizione, il piano EF, che passa per il punto D, è parallelo al piano AC, eh'era da farsi, e dimostrarsi.

a 1. del 11.

b 31. del 11.




THEOREMA XIV. PROPOSITIONE XVI.

Se due piani paralleli sono segati da qualche piano, le loro comuni sezioni sono parallele.

Siano

Siano i due piani paralleli AB, CD , fegati dal piano $EFGH$, e le comuni sezioni siano le rette EF, HG . Dico, che le rette EF, HG , sono frà di loro parallele. Se le rette EF, GH , non sono parallele, per lo scolio secondo alla 31. proposiz. del primo, continue concorreranno in qualche punto: concorrano, s'è possibile, in qualche punto I . Perche la retta GH è nel piano CD , farà tutta la retta GHI nel medesimo piano CD , altrimenti la parte GH della retta GI , farebbe nel piano CD , e la parte HI in altro piano, che per la prima proposiz. di questo, è impossibile; e perciò tutta la retta GI è nel piano CD ; sì che, continuato il piano CD , quello passerà per il punto I . Nell'istesso modo si dimostrerà, che continuato il piano AB , quello passerà per il medesimo punto I ; per la qual cosa continuati i piani AB, CD concorrono scambievolmente nel punto I , ch'è contro all'ipotesi, mentre habbiamo supposti i piani AB, CD , paralleli. Non dunque continue le rette FE, GH , concorrono: e se non concorrono, per il secondo scolio alla 31. proposiz. del primo, sono parallele, come fu proposto di mostrare.




S C O L I O.

Qui facilmente si può dimostrare il seguente Theorema.

Se due piani, che scambievolmente concorrono, sono fegati da vn'altro piano, e le comuni sezioni sono frà di loro parallele; le medesime saranno parallele alla comune sezione, che fanno quei due piani nel loro concorso.

Siano i due piani $ABCD, DCEF$, i quali concorrano scambievolmente, e la comune sezione sia DC : siano poi fegati i piani $ABCD, DCEF$, dal piano $ABEF$, e le comuni sezioni AB, FE , siano frà di loro parallele. Dico, che le rette AB, FE sono parallele alla retta DC . Si prenda nella retta DC qualunque punto G , dal quale si tiri la retta GH parallela alla retta AD ; e dal medesimo punto G si tiri la retta GI parallela alla retta DF . Perche le rette GH, DA , sono parallele, fegate dalla retta DG , le tre rette HG, GD, DA , sono in vn medesimo piano: ma le due GD, DA sono nel piano $ABCD$, sarà la retta GH nel medesimo



a 31. del 12.

b 9. del 11.

fimo

l'imo piano $ABCD$, e perciò continuata GH
 segnerà la retta AB in qualche punto H .
 Nell'istesso modo si dimostrerà, che la retta
 GI segna la retta FE in qualche punto I . Si
 tirerà la retta HI sarà il triangolo HGI in
 un medesimo piano: e perché le rette HG ,
 GI , sono parallele alle rette AD , DF , sa-
 ranno i piani HGI , ADF , frà di loro pa-
 ralleli; i quali, essendo segati dal piano
 $ABEF$, baueranno le comuni sezioni AF ,
 HI frà di loro parallele: ma si supposta
 la retta AB parallela alla retta FE , il
 quadrilatero $AHIF$ sarà parallelogram-
 mo, e sarà il lato AF uguale ad HI . In
 oltre perché le rette IG , GH , sono paral-
 lele alle due FD , DA , l'angolo IGH sarà
 uguale all'angolo FDA . Similmente perché
 le rette HI , IG sono parallele alle due AF ,
 FD , sarà l'angolo HIG uguale all'ango-
 lo AFD ; ed essendo le due rette IH , HG , parallele alle due FA , AD , l'angolo
 FAD sarà uguale all'angolo IHG ; per la qual cosa i triangoli GIH , $DF A$,
 sono equiangoli, e la proporzione di AF ad FD sarà come quella di HI ad IG :
 fu dimostrata AF uguale ad HI ; sarà FD uguale ad IG . Similmente FA
 ad AD sarà come IH ad HG : ma FA è uguale ad IH , sarà AD uguale
 ad HG . Hor essendo le due AD , HG frà di loro uguali, e parallele, sarà
 AH parallela alla retta DG , cioè AB sarà parallela a DC . Parimente, es-
 sendo FD uguale, e parallela ad IG , sarà FI parallela alla retta DG , cioè
 FE parallela alla retta DC , ch'era da dimostrarsi.



Non sarà inutile aggiungere qui il seguente Theorema.

Quei piani, che sono paralleli ad vn'altro piano, sono frà di loro paralleli.

Siano i piani AB , CD , paralleli al piano EF . Dico, che i piani AB , CD sono frà di loro paralleli.

Si prenda nel piano EF qualunque punto G , per il quale si faccia passare la retta GHI , in modo, che faccia angoli retti col medesimo piano EF , la quale prolungata concorra ne i piani AB , CD , continuati, se bisogna; concorra dunque ne i punti I , ed H . Perché i piani CD , EF , per ipotesi, sono paralleli, e la retta GH è perpendicolare al piano EF , per lo scolio alla 14. propos. di questo, la medesima retta GH sarà perpendicolare al piano CD . In oltre, essendo, per ipotesi, i piani AB , EF , frà di loro paralleli, e la retta IG , per costruzione, è perpendicolare al piano EF , per lo scito




scolio

scolio, la medesima retta IG sarà perpendicolare al piano AB; dal che la retta IH sarà perpendicolare à i due piani AE, CD; e per la 14. propos. di questo, i piani AB, CD, sono frà di loro paralleli, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA XV. PROPOSITIONE XVII.

Se due rette linee sono segate da piani paralleli, le parti interposte frà i piani paralleli sono proportionali.

Siano le rette AB, CD, segate da i piani paralleli EF, GH, IK, ne i punti L, M, N, O, P, Q. Dico che la proportion di LM ad MN è come quella di OP à PQ. Si tirino le rette LO, NQ. Essendo i punti L, O, N, Q ne i piani EF, IK, le rette LO, NQ saranno ne i medesimi piani EF, IK. Si tiri la retta LQ, la quale seghi il piano GH in qualche punto R; dal punto R alli punti P, ed M, si tirino le rette RM, RP: essendo i punti M, R, P nel piano GH, le rette MR, RP saranno nel medesimo piano GH. Perche il triangolo LQN^a è in vn medesimo piano, i piani paralleli GH, IK, faranno segati dal piano LQN; per il che le comuni sezioni MR, NQ^b faranno frà di loro parallele. Similmente il triangolo LOQ^c è in vn medesimo piano, e sega i piani paralleli EF, GH, per la qual cosa le comuni sezioni LO, RP^d sono frà di loro parallele. In oltre perche il triangolo LQN è segato dalla retta MR parallela ad NQ, sarà LM ad MN, e come LR ad RQ; parimente perche il triangolo LOQ è segato dalla retta RP parallela al lato LO, sarà OP à PQ^e come LR ad RQ; ma fu dimostrata LM ad MN, come LR ad RQ, sarà LM ad MN e come OP à PQ, ch'era da dimostrarsi.



a 2. del 11.

b 16. del 11.

c 2. del 11.

d 16. del 11.

e 2. del 6.


fa. del 6.

g u. del 5.

THEOREMA XVI. PROPOSITIONE XVIII.

Se vna retta linea è perpendicolare à qualche piano, tutti i piani, che passano per quella rotta linea, sono perpendicolari al medesimo piano.

Sia la retta linea AB perpendicolare al piano CD. Dico, che tutti i piani, che passano per la retta AB sono perpendicolari al piano CD. Per la retta AB si concepisca passare vn piano, come EF, il quale seghi il piano CD, e la comune sezione sia^a la retta GF, nella quale sia preso qualunque punto H, e dal punto H si tiri la retta HI^b parallela ad AB; le tre



a 3. del 11.

b 31. del 1.

rette

c 7. del 10.


rette IH, AB, HB e sono in vn medesimo piano : ma le due AB, BH sono nel piano EF, farà dunque la retta IH nel medesimo piano EF. Hor perche le due rette IH, AB, sono frà di loro parallele, e la retta AB è supposta

d 8. del 11.

perpendicolare al medesimo piano CD. E perche il punto H è preso ad arbitrio nella retta GF, se da gl'infiniti punti, che possiamo immaginarci nella retta GF, sono tirate rette linee parallele ad AB, tutte saranno nel medesimo piano EF, e saranno perpendicolari al piano CD. Per la qual cosa il piano EF, che passa per quelle infinite rette linee,

e 4. d. fin. del 11.

è farà perpendicolare al piano CD. Il medesimo si dimostrerà di tutti gli altri piani, che passano per la retta AB, e segano il piano CD, secondo altre positioni; e perciò tutti i piani, che passano per la retta AB, sono perpendicolari al piano CD, ch'era da dimostrarli.



S C O L I O.

Da quel che si è detto non sarà difficile dimostrare il seguente Theorema.

Se le comuni sectioni di due piani, perpendicolari ad vn'altro piano, sono frà di loro parallele, quei due piani saranno frà loro paralleli: e se di due piani paralleli vno è perpendicolare ad vn'altro piano, ancora l'altro sarà perpendicolare al medesimo piano..

a 10. del 11.


b 29. del 11.

c 11. del 11.

d 4. definit. del 11.

e 4. del 11.

Siano prima i due piani AB, CD, perpendicolari al piano ED, in modo, che le comuni sectioni EB, FD, siano frà di loro parallele. Dico prima, che i piani AB, CD, sono frà di loro paralleli. Si prenda nella retta EB qualunque punto G, e dal punto G nel piano ED si tiri la retta GH, ad angoli retti con la retta EB. Perche le rette EB, FD, sono, per ipotesi, parallele, sarà l'angolo DHG uguale all'angolo EGH, cioè sarà retto; e la retta GH sarà perpendicolare alla comune sectione FD. In oltre nel piano AB si tiri dal punto G la retta GI, ad angoli retti colla retta EB. Essendo il piano AB, per ipotesi, perpendicolare al piano ED, sarà l'angolo IGH retto; ma l'angolo HGE, per costruzione, è retto, sarà la retta HG perpendicolare al piano AB, nel quale sono le rette GI, GE. Nell'istesso modo si dimostrerà, che la retta GH è perpendico-



lare

lare al piano CD; e per la 14. proposi. di questo, i piani AB, CD, sono frà di loro paralleli.


Di nuovo, suppones che i piani AB, CD siano frà di loro paralleli; ed il piano AB sia perpendicolare al piano ED. Dico, che il piano CD sarà perpendicolare al medesimo piano ED. Perché i piani AB, CD, sono paralleli, segati dal piano ED, le comuni sezioni EB, FD, sono frà di loro parallele. Si supponga fatta la medesima costruzione antecedente, e si dimostri, come in si fece, che la retta HG è perpendicolare al piano AB. E perché i piani AB, CD, sono paralleli, e la retta HG è perpendicolare al piano AB, la medesima retta HG per lo scolio alla 14. prop. di questo, sarà perpendicolare al piano CD; e per l'antecedente propos. il piano ED, che passa per la retta GH, farà angoli retti col piano CD. Per la qual cosa il piano CD è perpendicolare al piano ED, ch'era da dimostrarsi.

16. del II.

THEOREMA XVII. PROPOSITIONE XIX.

Se due piani, che si segano scambievolmente, sono perpendicolari ad vn'altro piano, la loro comune sezione, farà perpendicolare al medesimo piano.

Sia AD la comune sezione de i piani AB, AC, i quali siano perpendicolari al piano EF. Dico, che la comune sezione AD è perpendicolare al medesimo piano EF. Si prendano due qualunque punti ne i piani AB, AC, come per esempio K, ed I, da i quali, ne i piani AC, AB, si tirino le rette KG, IH, ad angoli retti colle rette DC, DB. Perché i piani sono, per ipotesi, perpendicolari al piano EF, le rette HI, GK, che sono perpendicolari alle comuni sezioni BD, DC, faranno perpendicolari al piano EF: per la qual cosa sono frà di loro parallele, ed in conseguenza sono in vn medesimo piano: Sia quel piano il notato GKIH. Perché i piani AK, AI, che concorrono nella retta AD, sono segati dal piano GKIH, e le comuni sezioni GK, HI sono frà di loro parallele, per lo scolio alla 16. propos. di questo, le rette HI, GK, sono parallele alla retta AD. Hor essendo la retta AD parallela ad HI, e la retta HI, per costruzione, è perpendicolare al piano EF, sarà AD perpendicolare al medesimo piano EF, ch'era da dimostrarsi.



a u. del I.

b 4. definie.
del II.
c 6. del II.
d 34. defin.
del I.

e 8. del II.

THEOREMA XVIII. PROPOSITIONE XX.

Se vn'angolo solido è contenuto da tre angoli piani, due di quelli


K k k k

di quelli

di quelli angoli piani, presi in qualunque modo, sono maggiori del terzo.

Sia l'angolo solido A, contenuto da i tre angoli piani DAB, DAC, BAC. Dico, che due di questi angoli, presi in qualunque modo, sono maggiori del terzo. Se questi tre angoli sono frà di loro vguali, sarà manifesto, che due, giunti insieme, sono maggiori del terzo. Se poi due de i detti angoli sono frà loro vguali, ed il terzo sia minore d'ogn'vno de gli vguali, sarà ancora manifesto, che due, presi insieme, sono maggiori del terzo. Se finalmente vno di questi, come l'angolo BAC, è maggiore di ciascuno de gli altri due BAD, DAC. Dico, che i due DAB, DAC, giunti

insieme, sono maggiori del terzo angolo BAC. Nel piano BAC si faccia l'angolo BAE = vguale all'angolo BAD, farà l'angolo BAC maggiore dell'angolo BAE, dal che la retta AE segnerà l'angolo BAC. Nelle rette AB, AC, si prendano due qualunque punti B, & C; si tiri la retta BC. Essendo, per costruzione, la retta AE nel piano BAC, continuata segnerà il lato BC in qual-




che punto E. Si faccia AD^b vguale ad AE, e si tirino le rette BD, DC. Si considerino i due triangoli ADB, ABE, de i quali il lato AD è vguale al lato AE, il lato AB è comune; faranno i due lati DA, AB vguali à i due BA, AE; l'angolo BAE, per costruzione, è vguale all'angolo BAD, farà la base BE^c vguale alla base BD. Nel triangolo DBC, i due lati BD, DC^d sono maggiori del terzo lato BC; leuatone gli vguali lati DB, BE, resta il lato DC maggiore del lato EC. Si considerino i due triangoli ADC, ACE, de' quali il lato AE è vguale al lato AD, il lato AC è comune; faranno i due lati DA, AC vguali à i due CA, AE; la base DC è dimostrata maggiore della base EC, farà l'angolo DAC^e maggiore dell'angolo CAE; se gli aggiungano gli vgnali angoli DAB, BAE, ne vengono i due angoli DAB, DAC, maggiori de i due BAE, EAC: ma i due angoli BAE, EAC, costituiscono tutto l'angolo BAC; i due angoli dunque BAD, DAC, insieme giunti, sono maggiori dell'angolo BAC, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA XIX. PROPOSITIONE XXI.

Tutti gli angoli piani, che contengono vn'angolo solido, giunti insieme, sono minori di quattro angoli retti.

Sia l'angolo solido A contenuto da i tre angoli piani BAD, DAC, BAC.


BAC. Dico, che i tre angoli piani BAD, DAC, BAC, giunti insieme, sono minori di quattro angoli retti. Si tirino le rette BD, DC, CB, e si concepisca il punto A in sublime, ed il piano del triangolo DBC, nel soggetto piano; faranno le rette AB, AD, AC, inclinate al soggetto piano DBC; dal che faranno costituiti ne i punti B, D, C, tre altri angoli solidi, cioè l'angolo solido B sarà contenuto da tre angoli piani, de' quali due sono i superiori, che sono i notati con la lettera X, e l'altro stà di sotto, ch'è l'angolo BDC. Similmente l'angolo solido D è contenuto da i due angoli notati X, che stàno di sopra, e dall'angolo inferiore BDC; e l'angolo solido C è similmente cōtenuto da i due angoli superiori X, e dall'angolo DCB, che stà sotto. Di nouo, considerando l'angolo solido B, i due angoli piani X, per l'antecedente prop. giunti insieme, sono maggiori dell'angolo DBC, che stà sotto. Similmente nell'angolo solido D, i due angoli piani X sono maggiori dell'angolo BDC, che stà di sotto; e nell'angolo solido DCB, i due angoli piani X sono maggiori dell'angolo DCB; dal che i sei angoli notati X sono maggiori de i tre angoli del triangolo DBC: ma i tre angoli del triangolo DBC, ^{a 31. del 1.} sono vguali à due angoli retti, i sei angoli dunque notati X faranno maggiori di due angoli retti. Finalmente, perche tre angoli d'ogni triangolo ^{b 31. del 1.} sono vguali à due angoli retti, i noue angoli de i tre triangoli ABD, ADC, ACB, cioè i sei notati X, co' i tre angoli intorno al punto A, faranno vguali à sei angoli retti: se da questi se ne leuano i sei angoli notati X, che furono dimostrati maggiori di due angoli retti, restaranno i tre angoli DAC, DAB, BAC, minori di quattro angoli retti, ch'era da dimostrarfi.



S C O L I O.

Il medesimo si dimostra se l'angolo solido sarà contenuto da più di tre angoli piani, nel seguente modo.

Sia l'angolo solido A, contenuto da i quattro angoli piani BAC, CAD, DAE, BAE. Dico, che questi quattro angoli sono minori di quattro angoli retti. Perche i due angoli ACB, ACD, e sono maggiori dell'angolo BCD, & i due angoli ADC, ADE, sono maggiori dell'angolo CDE; come ancora i due angoli AED, AEB, sono maggiori dell'angolo BED, & i due ABE, ABC sono maggiori dell'angolo EBC; gli otto




K k k k 2

angoli

c 30. del 11.

b Scol. alla
3^a del 1.
c 31. del 1.


angoli $ACB, ACD, ADC, ADE, AED, AEB, ABE, ABC$, saranno maggiori de i quattro angoli del quadrilatero $BCDE$; ^b ma i quattro angoli del quadrilatero $BCDE$ sono vguali à quattro angoli retti; i sopradetti otto angoli saranno maggiori di quattro angoli retti. E perche i tre angoli di ogni triangolo sono vguali à due angoli retti, i dodici angoli de i quattro triangoli ACD, ADE, AEB, ABC , saranno vguali ad otto angoli retti; leuatone gli otto angoli sopra nominati, che furono dimoſtrati maggiori di quattro angoli retti, i rimanenti quattro angoli che contengono l'angolo ſolido A faranno minori di quattro angoli retti. L'ſteſſo ſi dimoſtrerà ſe l'angolo ſolido è contenuto da più di quattro angoli piani; e perciò tutti gli angoli piani, che contengono l'angolo ſolido, ſono minori di quattro angoli retti, ch'era da dimoſtrarſi.



THEOREMA XX. PROPOSITIONE XXII.

Se faranno tre angoli piani, due de'quali, preſi in qualunque modo, ſiano maggiori del terzo; e ſiano contenuti da rette linee vguali; è poſſibile coſtruire vn triangolo colle tre rette, che congiungono gli eſtremi delle linee vguali.

Siano i tre angoli piani A, B, C , de'quali i due $A, \& B$, ſiano maggiori del terzo C ; i due $B, \& C$ ſiano maggiori dell'angolo A ; & i due $A, \& C$ ſiano maggiori dell'angolo B ; e ſiano contenuti dalle rette vguali AD, AE, BF, BG, CH, CI ; tirate le rette DE, FG, HI . Dico che colle tre rette DE, FG, HI , ſe ne può coſtruire vn triangolo; cioè che due di quelle rette, preſe in qualunque modo, ſono maggiori della terza. Se i tre angoli $A, B, \& C$, ſono frà loro vguali, perche ſono contenuti da lati vguali, faranno le baſi DE, FG, HI , ^a frà di loro vguali; e perciò due, preſe in qualunque modo, ſono maggiori della terza. Se poi due di quegli angoli, come $A, \& B$, ſono frà di loro vguali, ed il terzo C è minore di ciaſcuno de gli vguali $A, \& B$; eſſendo i due angoli $A, \& B$, vguali, e contenuti da rette linee vguali, faranno le baſi DE, FG , ^b frà di loro vguali. In oltre, perche i lati FB, BG ſono vguali à i lati HC, CI , e l'angolo FBG ſi ſuppone mag-



a 4 del 1.

b 4 del 1.

giore

giore dell'angolo C, sarà la base FG, e ouero DE maggiore di HI, e perciò due, prese in qualunque modo, faranno maggiori della terza. Se finalmente vno di quelli, come per esempio, l'angolo FBG, è maggiore dell'angolo A, ed è ancora maggiore dell'angolo C. Dico similmente, che delle tre rette DE, FG, HI, due prese in qualunque modo, sono maggiori della terza. Alla retta BF, nel punto B, si costituisca l'angolo FBK ^d uguale all'angolo A, sarà l'angolo FBG maggiore dell'angolo FBK, e la retta BK passerà frà le rette FB, BG; e fatto centro in B, coll'intervallo BF, ouero BG, si descriva l'arco FKG; si prolunghi la retta BK, sin che concorre coll'arco FKG in qualche punto K. Perche la retta FG ^e cade dentro del circolo FKG; perciò il punto K cade sotto la retta FG; si tirino le rette FK, KG. Nel triangolo FKG i due lati FK, KG ^f sono maggiori del terzo lato FG. Si considerino i due triangoli ADE, BFK. Perche i due lati DA, AE, sono vguali à i due lati FB, BK; e l'angolo FBK, per costruzione è vguale all'angolo A, sarà la base FK ^g vguale alla base DE. E perche i due angoli A, & C, per ipotesi, sono maggiori dell'angolo FBG, se dall'angolo FBG se ne leua l'angolo FBK, ch'è vguale all'angolo A, resta l'angolo KBG minore dell'angolo C. Hor essendo i due lati KB, BG, vguali à i due lati HC, CI, e l'angolo C maggiore dell'angolo KBG; sarà la base HI ^h maggiore della base KG: ma il lato FK fu dimostrato vguale al lato DE; i due lati HI, DE, faranno maggiori de i due lati FK, KG. E perche i due lati FK, KG, ^k sono maggiori del terzo lato FG; i due lati dunque HI, DE, insieme giunti, sono maggiori del terzo lato FG. Per la qual cosa delle tre rette DE, FG, HI, prese due in qualunque modo, quelle giunte insieme, sono maggiori della terza; e per la 22. proposizione del 1. con le tre rette DE, FG, HI, si può descrivere vn triangolo, il che era da dimostrarsi.

c 24. del 1.

d 23. del 1.

e 2. del 3.

f 10. del 1.

g 4. del 1.


h 24. del 1.

K 20. del 1.

PROBLEMA III. PROPOSITIONE XXIII.

Costruire vn angolo solido con tre angoli piani, due de' quali, presi in qualunque modo, siano maggiori del terzo; e che tutti tre, insieme giunti, siano minori di quattro angoli retti.


Siano i tre angoli piani A, B, C, due de' quali, presi in qualunque modo, siano, giunti insieme, maggiori del terzo; e che tutti tre, insieme giunti, siano minori di quattro angoli retti: si vuole costruire vn angolo solido, che gli angoli piani, che lo contengono, siano vguali à gli angoli piani A, B, C. Tutte le rette X che contengono i dati angoli A, B, C, si facciano frà di loro vgnali, e si tirino le rette DE, FG, HI, colle quali, per l'antecedente



a 3. del 1.


propo-

proposizione si può descriuere vn triangolo: sia dunque con le rette DE, FG, HI, b descritto il triangolo KLM; e sia il lato LM vguale al lato HI, il lato LK vguale al lato DE, ed il lato KM vguale al lato FG; intorno al triangolo KLM c si circoscriua il circolo KLM, il di cui centro N ò caderà dentro del triangolo KLM, ò caderà in vn lato, ouero caderà fuori: cada primieramente dentro del triangolo KLM; si tirino le rette NK, NL, NM. Dico che ogn'vna di queste è minore di ciascun lato X. Se ciascuna delle rette NK, NL, non è minore del lato X, ò sarà maggiore, ouero vguale. Supposto prima, che NK, ouero NL, sia vguale ad X. Perche i due lati NK, NL sono vguali à i due AD, AE, e la base KL, per costruzione, è vguale alla base DE, farà l'angolo KNL d vguale all'angolo A. Nell'istesso modo si dimostrerà, che l'angolo KNM è vguale all'angolo B, e che l'angolo LNM è vguale all'angolo C; dal che i tre angoli intorno al centro N sono vguali à i tre angoli A, B, C; si prolunghi K N verso O, i due angoli ONM, MNK e sono vguali à due angoli retti; e similmente i due angoli ONL, LNM, sono vguali à due angoli retti; dal che tutti gli angoli LNM, MNK, KNL, che sono intorno al centro N sono vguali à quattro angoli retti: ma gli angoli intorno al centro N furono mostrati vguali à gli angoli A, B, C; gli angoli dunque A, B, C sono vguali à quattro angoli retti, ch'è contro all'ipotesi. Non dunque ogn'vna delle rette NK, NL, NM, è vguale al lato X. Di nouo sia NK, ouero NL, maggiore del lato X; si facciano le rette NP, NQ, f ogn'vna vguale ad X; e si tiri la retta PQ. Perche LN è vguale ad NK, e la retta QN vguale ad NP, farà LN ad NK, come QN ad NP; e permutando, LN ad NQ e farà come KN ad NP; e diuidendo, LQ à QN h farà come KP à PN; è perciò la retta QP k farà parallela al LK. E perche le parallele LK, QP sono segate dalle rette NK, NL, l'angolo NPQ l sarà vguale all'angolo NKL; e l'angolo NQP vguale all'angolo NLK; dal che i triangoli NPQ, NKL sono equiangoli, e la proportion di NK à KL m farà come quella di NP à PQ; e permutando, KN ad NP n farà come KL à PQ; ma KN è maggiore di NP, farà KL o maggiore di QP; fu fatta, per costruzione KL vguale ad ED, farà ED maggiore di PQ. Si considerino i due triangoli NPQ, ADE, de quali i due lati NP, NQ, per costruzione, sono vguali à i due lati AD, AE, la base DE è maggiore della base PQ; farà l'angolo AP p maggiore dell'angolo PNQ. Nell'istesso modo si dimostrerà che l'angolo B è maggiore dell'angolo KNM, e che l'angolo C è maggiore dell'angolo LNM: per la qual cosa i tre angoli A, B, C sono maggiori de i tre angoli LNM, LNK, KNM: ma questi tre angoli furono dimostrati vguali



à quat-

8. del 1. *considerino i triangoli LMN, CHI; essendo i due lati LN, NM, vguale à i due lati HC, CI, la base LM è vguale alla base HI, sarà l'angolo LNM vguale all'angolo C: ma l'angolo LNM fu dimostrato vguale à i due angoli A, & B, giunti insieme; faranno i due angoli A, & B insieme, vguale all'angolo C, ch'è contro all'ipotesi. Non dunque ogn'vna delle rette NL, NK, NM, è vguale al lato X. Siano di nuovo i due lati NK, NL maggiori de i due lati AD, AE; si facciano le rette NP, ed NO, ogn'vna vguale ad X, e si tiri la retta PQ. Si dimostri, come si fece nella prima parte, che LK è maggiore di QP; essendo LK vguale ad ED, sarà il lato ED maggiore di PQ. Si considerino i triangoli QNP, ADE. Perche i due lati QN, NP, sono vguale à i due lati AD, AE, e la base DE è maggiore di QP, sarà l'angolo A maggiore dell'angolo LNK. Nell'istesso modo, considerando i triangoli KNM, BFG, si dimostrerà, che l'angolo B è maggiore dell'angolo KNM. Si faccia l'angolo KNS vguale all'angolo B, sarà l'angolo KNS maggiore dell'angolo KNM; e perciò la retta NS cade sotto della retta NM. Similmente si faccia l'angolo KNO vguale all'angolo A, sarà l'angolo KNO maggiore dell'angolo KNL; dal che la retta NO caderà sotto alla retta NL. Si facciano le rette NO, NS, ogn'vna vguale al lato X; faranno le rette NO, NQ, NP, NR, NS frà di loro vguale; si tiri la retta OS. Perche le rette QP, PR, per quel che si dimostrò nella prima parte, sono parallele à i lati LK, KM, sarà l'angolo QPR vguale all'angolo LKM. Di nuovo, essendo NP vguale ad NO, il triangolo NPO sarà isoscele, e gli angoli NPO, NOP sono frà di loro vguale. E similmente nel triangolo isoscele NQP, gli angoli NQP, NPQ sono frà di loro vguale; e perche i tre angoli del triangolo NOP sono vguale à i tre angoli del triangolo NQP; da i tre angoli del triangolo NOP, se ne leui l'angolo ONP, e da i tre angoli del triangolo NQP, se ne leui l'angolo QNP; restano i due angoli NOP, NPO, minori de i due angoli NQP, NPQ; ma gli angoli NPO, NOP sono frà di loro vguale, e sono ancora frà loro vguale gli angoli NPQ, NQP; sarà l'angolo NPO minore dell'angolo NPQ. Nell'istesso modo si dimostrerà, che l'angolo NPS è minore dell'angolo NPR; dal che tutto l'angolo OPS, è minore di tutto l'angolo QPR. Si considerino i triangoli NPO, ADE. Perche i due lati NO, NP, sono vguale à i due lati DA, AE, e l'angolo*




PNO è fatto vguale all'angolo A, farà la base PO = vguale alla base DE: ma DE, per costruzione, è vguale ad LK, farà OP vguale ad LK. Nell'istesso modo si dimostrerà che PS è vguale al lato KM. Si considerino i triangoli LKM, OPS. Perche i due lati LK, KM sono vguali à i due lati OP, PS, e l'angolo LKM è dimostrato maggiore dell'angolo OPS, farà la base LM maggiore delle base OS: ma LM, per costruzione, è vguale ad HI, farà HI maggiore di OS. Di più perche i due lati HC, CI, sono vguati à i due lati ON, NS, e la base HI è maggiore della base OS, farà l'angolo C maggiore dell'angolo ONS: ma l'angolo ONS, per costruzione, è vguale à i due angoli A, & B; farà l'angolo C maggiore de i due angoli A, & B, insieme giunti, ch'è contro all'ipotesi. Non dunque ciascuna delle rette NL, NK, NM, è maggiore, ne vguale al lato X; ma ogn'vna è minore, come si disse.

Finalmente essendosi dimostrato, che ciascuna delle rette NM, NK, NL, è minore del lato X, il quadrato del lato NK, ouero NM, ouero NL, sarà minore del quadrato di ciascun lato X: si sottragga dunque il quadrato di NK, ouero NL, ouero NM, dal quadrato del lato X, e quel che resta sia il quadrato della retta Z; sarà il quadrato di NK, ouero NL, ouero NM, col quadrato della retta Z, vguale al quadrato del lato X. Nel punto N si

erigga la retta NV, ^h perpendicolare al piano KLM, e si faccia NV = vguale alla retta Z; si tirino le rette KV, LV, MV. Dico che gli angoli piani LVM, LVK, MVK, che contengono l'angolo solido V, sono vguali à i dati angoli piani A, B, C. Perche la retta VN è perpendicolare al piano KLM, gli angoli VNL, VNK, VNM, sono retti. Hor perche la retta Z è vguale ad NV, farà il quadrato di LN, col quadrato di Z, vguale al quadrato di LN, col quadrato di NV; e perche il quadrato di LN, col quadrato di Z, per quel che si è detto, è vguale al quadrato del lato X; farà il quadrato di LN, col quadrato di NV, vguale al quadrato del lato X: Ma i quadrati de i due lati LN, NV, sono vguali al quadrato di LV; farà il quadrato di LV vguale al quadrato di X, ed il lato LV farà vguale al lato X. Similmente i quadrati de i due lati

KN, NV, sono vguali à i quadrati delle due NK, & Z: ma i quadrati delle due NK, & Z, sono vguali al quadrato del lato X; i quadrati de i lati KN, NV, cioè il quadrato di VK, ⁿ sarà vguale al quadrato di X, ed il lato VK farà vguale al lato X. Nell'istesso modo si dimostrerà, che il lato MV è vguale al lato X. Si considerino i due triangoli VLM, CHI. Perche i due lati VL, VM, sono vguali à i due lati CH, CI, e la base LM è vguale alla base HI; farà l'angolo LVM = vguale all'angolo C. Similmen-



e 4. del 1.

f 24. del 1.

g 25. del 1.

h 12. del 12.

K 3. del 1.

l 3. defin. del 12.

m 47. del 4.

n 47. del 1.


o 8. del 1.

p. 8. del 1.^o
q. 3. del 1.^o
te ne i triangoli VKL, ADE, i due lati VK, VL, sono vguali à i due lati AD, AE, la bafe KL è vguale alla bafe DE, farà l'angolo KVL vguale all'angolo A. E perche ne i triangoli VKM, BFG, i due lati VK, VM, sono vguali à i due lati BF, BG, la bafe KM è vguale alla bafe FG, farà l'angolo KVM vguale all'angolo B, ch'era da farfi, e dimoftrarfi.

THEOREMA XXI. PROPOSITIONE XXIV.

Se vn folido è contenuto da piani paralleli, gli oppofti piani fono parallelogrammi fimili, ed vguali.

a 16. del 11.
Sia il folido ACEG, contenuto da piani paralleli, cioè che il piano BE fia parallelo all'oppofto piano AF, che il piano AC fia parallelo all'oppofto GE, e che il piano BG fia parallelo all'oppofto piano CF. Dico che i piani oppofti BE, AF, ouero i due AC, GE, ouero i due BG, CF, fono parallelogrammi, fimili, ed vguali. Perche i piani paralleli BE, AF, fono fegati dal piano AC, le comuni fectiioni BC, AD, ^a fono frà di loro parallele. Similmente, perche i piani paralleli BG, CF, fono fegati dal piano AC, le comuni fectiioni BA, CD fono frà di loro parallele; dal che il quadrilatero ABCD è parallelogrammo. Nell'ifteffo modo proueremo, che tutti gli altri quadrilateri, che contengono il folido CG, fono parallelogrammi, che era da dimoftrarfi nel primo luogo.



b 20. del 11.
c 34. del 1.
d 4. del 1.
e 34. del 1.
Di nuouo dico che i parallelogrammi oppofti BG, CF fono frà di loro fimili, ed vguali. Perche i lati AB, BH, che concorrono in B, fono paralleli à i lati DC, CE, che concorrono in C, e non fono nel medefimo piano (ftante che fono ne i piani oppofti) farà l'angolo ABH vguale all'angolo DCE. Nell'ifteffo modo fi dimoftrerà, che gli altri angoli del parallelogrammo BG, fono vguali à i corrispondenti angoli del parallelogrammo CF; e perciò i parallelogrammi BG, CF, fono equiangoli. In oltre nel parallelogrammo AC il lato AB è vguale al lato DC, e nel parallelogrammo BE il lato BH è vguale all'oppofto CE, e perciò AB à BH farà come DC à CE: ma AB è vguale à GH, ed il lato CD è vguale ad EF, farà BH ad HG come CE ad EF; e farà HG à GA come EF ad FD: per la qual cofa i lati intorno à gli angoli vguali fono proportionali ed in confequenza i parallelogrammi BG, CF fono frà di loro fimili. Si tirino le rette AH, DE. Perche i due lati AB, BH, fono vguali à i due lati DC, CE, e l'angolo ABH è vguale all'angolo DCE, farà la bafe AH vguale alla bafe DE, ed il triangolo ABH è vguale al triangolo DCE, come ancora il doppio, cioè il parallelogrammo BG, è farà vguale al doppio, cioè al parallelogrammo CF. Nell'ifteffo modo fi dimoftrerà, che gli altri parallelogrammi oppofti fono fimili, ed vguali. E quefto è quel folido, ch'Euc-


elide

clide chiama nella 30. defin. di questo. Parallelepipedo. Se il solido dunque contenuto da piani paralleli &c. ch'era da dimostrarsi.

S C O L I O.

De i parallelepipedi simili, quello, che hà la base maggiore, è maggiore dell'altro, che hà la base minore.

Siano i simili parallelepipedi $ABCD, EFGH$, le di cui basi siano i simili parallelogrammi BK, FM , e sia la base BK maggiore della base FM . Dico che il parallelepipedo $ABCD$ è maggiore del parallelepipedo $EFGH$. Perche i piani BK, FM , sono fra loro simili, e per ipotesi il piano BK è maggiore del piano FM , sarà IK maggiore di LM , ed IB maggiore di LF . Si faccia IN uguale ad LM , e si faccia IO uguale ad LF , e si compisca il parallelogrammo ON . Di nuovo, perche i solidi BD, FH , sono simili, perciò i piani, che contengono il solido BD saranno simili à i piani, che contengono il solido FH , cioè il piano BA sarà simile al piano FE , ed il piano AK simile al piano EM . Hor essendo il piano AB simile al piano EF , sarà BI ad IA come FL ad LE : ma BI è maggiore di FL , sarà AI maggiore di LE . Si faccia IP uguale ad LE , e si compisca il parallelogrammo PO ; co' i lati PI, IN , si compisca il parallelogrammo IR ; si facciano i piani opposti, e sarà descritto il parallelepipedo $POTR$ sopra la base ON . In oltre per la similitudine de i parallelepipedi BD, FH , l'angolo solido I sarà uguale all'angolo solido L , cioè l'angolo PIN sarà uguale all'angolo ELM , l'angolo PIO uguale all'angolo ELF , e l'angolo OIN uguale all'angolo FLM . Hor perche i lati OI, IN sono uguali à i lati FL, LM , sarà OI ad IN come FL ad LM , l'angolo OIN è uguale all'angolo FLM , sarà il parallelogrammo ON simile, ed uguale al parallelogrammo FM . Similmente, essendo i lati OI, IP uguali à i lati FL, LE , e l'angolo OIP uguale all'angolo FLE , il parallelogrammo OP sarà simile, ed uguale al parallelogrammo FE : ed essendo i lati PI, IN , uguali à i lati EL, LM , e l'angolo PIN uguale all'angolo ELM , sarà il parallelogrammo IR simile, ed uguale al parallelogrammo LH : ma per l'antecedente proposizione, gli opposti parallelogrammi sono simili, ed uguali; in conseguenza il parallelepipedo $POTR$ h' sarà uguale al parallelepipedo $EFGH$: ma il parallelepipedo $ABCD$ è maggiore del parallelepipedo $POTR$, stante che lo contiene, sarà il parallelepipedo $ABCD$ maggiore del parallelepipedo $EFGH$, ch'era da dimostrarsi.



a. Sco l. alla

20. del 6.

b. j. del 1.

c. 9. defin. del 11.

d. 1. defin. del 6.

e. 14. del 5. f. j. del 1.

g. 9. defin. del 11.


h. 10. defin. del 11.

L E M M A.

Quando vn piano, segando vn parallelepipedo, è parallelo à i piani opposti, se diuide la base in due parti vguagli, diuide il parallelepipedo in due parallelepipedi simili,

ed vguali; e se diuide la base in due parti ineguali, quel parallelepipedo sarà maggiore, il quale è posto sopra la base maggiore.

Sia il parallelepipedo $ABCD$, segato dal piano EF parallelo al piano CD , ouero AB ed il piano EF seghi prima la base BH in due parti vguali. Dico che i parallelepipedi BE , FD , sono frà di loro vguali. Perche i piani EF , DC sono paralleli, le comuni



a 15. del 11.

b 19. del 1.

c 34. del 1.

d 1. del 6.

e 14. del 5.

f 1. del 6.

g 36. del 1.

h 10. defn.

del 11.

K 10. del 1.

l Scol. alla

15. del 11.

m Scol. alla

16. del 11.

sestioni FI , CH saranno frà di loro parallele, dal che l'angolo BFI sarà vguale all'angolo BCH , e l'angolo KIF , vguale all'angolo KHC ; si che i parallelogrammi BI , FH e saranno equiangoli. E perche i parallelogrammi BI , FH , hanno una medesima altezza, perciò sono e come le basi BF , FC ; ma i parallelogrammi BI , FH , si suppongono vguali, sarà la base BF vguale alla base FC , e la proportion di BF ad FI sarà come quella di FC a CH : per la qual cosa i parallelogrammi BI , FH , sono frà loro simili, ed vguali. In oltre, perche i parallelogrammi BG , GC , hanno le basi vguali BF , FG , e sono frà le medesime parallele LM , BC , perciò sono e frà di loro vguali; e procedendosi, come prima si fece, si dimostrerà, che i parallelogrammi BG , FM , sono frà loro simili, ed vguali. Per la qual cosa i tre parallelogrammi FH , FM , FE , sono simili, ed vguali a i tre parallelogrammi FK , FI , FE . E perche gli opposti sono, per l'antecedente propositione, simili, ed vguali, in conseguenza il parallelepipedo BE sarà simile, ed vguale al parallelepipedo FD , ch'era da dimostrarfi nel primo luogo.


Di nuouo sia segato il parallelepipedo BD dal piano NO , parallelo a i piani AB , DC , in modo, che la base BP sia maggiore della base OH . Dico che il parallelepipedo BN sarà maggiore del parallelepipedo OD . Si diuida BC in due parti vguali in F , e per il punto F si faccia passare il piano FE , parallelo al piano CD , quello sarà parallelo al piano ON , e perciò continuati i piani FE , ON , ma scambievolmente concorreranno; per la qual cosa il piano FE segará i piani BQ , LN , AP , e le comuni settioni FG , GE , EI , IF , caderanno nel luogo interposto frà i piani AB , NO , ed in conseguenza il solido FD sarà maggiore del solido OD : ma, per quel che si è prima dimostrato, il solido BE è simile, ed vguale al solido FD , sarà il solido BE maggiore del solido OD , e tutto il parallelepipedo BN sarà molto maggiore del parallelepipedo OD , ch'era da dimostrarfi.

THEOREMA XXII. PROPOSITIONE XXV.

Se vn solido parallelepipedo è segato da vn piano equidistante

distante à i piani opposti; sarà la base alla base come il solido al solido.

Sia il parallelepipedo ABCD segato dal piano EF, equidistante à i piani opposti BA, CD. Dico che il solido ABFE al solido EFCD, è come la base BG alla base FH. S'intenda, continuato il parallelepipedo ABCD, dall'vna, e l'altra parte, e nella retta FK, si prendano quante parti si vogliano, come BI,



IK, ogn'vna vguale ad FB; e nella retta FN, si prendano quante parti si vogliano, come CL, LM, MN, ogn'vna vguale ad FC; per li punti I, K, L, M, N, si facciano passare i piani KP, IO, LQ, MR, NS, paralleli al piano AB. Perche i solidi ABFE, EFCD, sono contenuti da piani paralleli, perciò sono parallelepipedi, e per l'antecedente proposizione, i loro piani opposti sono parallelogrammi simili, ed vguali. Nell'istesso modo si prouerà, che tutti gli altri solidi BAOI, IOPK, DCLQ, QLMR, RMNS sono parallelepipedi, e che in ogn'vno i piani opposti sono parallelogrammi simili, ed vguali. In oltre perche i parallelogrammi Ke, Id, BG, sono sopra le vguali basi KI, IB, BF, e sono frà le medesime parallele fG, KF, e perciò sono frà di loro vguali; e sono ancora simili, stante che i lati opposti Kf, Id, Bd, sono frà loro vguali, e paralleli, ed i lati KI, IB, BF, per costruzione, sono frà loro vguali; sì che i parallelogrammi Ke, Id, BG, sono equiangoli, ed hanno i lati intorno à gli angoli vguali proporzionali, cioè KI ad Id, è come IB à Bd, ouero come BF ad fG. Similmente i parallelogrammi KX, IV, BT, sono sopra le vguali basi KI, IB, BF, e frà le medesime parallele YT, KF, e perciò sono frà di loro vguali. E procedendosi nel modo antecedente, si dimostrerà, che sono ancora fra loro simili. Et essendo i parallelogrammi KP, IO, BA, frà di loro simili, ed vguali, i tre parallelogrammi BG, BT, BA, del parallelepipedo BE, saranno vguali, e simili à i tre parallelogrammi Id, IV, BA, del parallelepipedo OIBA, e saranno ancora simili, ed vguali à i tre parallelogrammi KE, KX, IO, del parallelepipedo PKIO: ma questi in ogn'vno de i detti parallelepipedi sono vguali, e simili fà gli opposti; perciò i parallelepipedi PKIO, OIBA, ABFE, sono frà di loro vguali. Nell'istesso modo si dimostrerà, che i parallelepipedi EFCD, DCLQ, QLMR, RMNS, sono frà di loro vguali; e sarà il parallelepipedo PKFE multiplice del parallelepipedo ABFE, come la base KG è multiplice della base BG. E similmente tutto il parallelepipedo EFNS sarà multiplice del parallelepipedo EFCD, come la base Fr è multiplice della base FH. Se il lato KF è vguale ad FN, sarà la base KG vguale alla base Fr, e per l'antecedente Lemma, tutto il parallelepipedo PKFE

farà


a 3. del 1.

b Scol. alla
15. del 11.

c 36. del 1.

f 24. del 11.


farà vguale al parallelepipedo EFNS. Se poi KF è minore, ò maggiore di FN, farà la base KG minore, ò maggiore della base Fr, e per l'antecedente Lemma, il parallelepipedo PKFE farà minore, ò maggiore del parallelepipedo EFNS. Si considerino quattro quantità, la prima sia il parallelepipedo ABFE, la seconda il parallelepipedo EFCD, la terza sia la base BG, e la quarta la base FH. Gli vguali multipli della prima, e terza, sono il parallelepipedo PKFE, e la base KG, e gli vguali multipli della seconda, e quarta, sono il parallelepipedo EFNS, e la base Fr. E perchè se il parallelepipedo PKFE, ch'è multiplice della prima ABFE, è vguale al parallelepipedo EFNS, ch'è multiplice della seconda EFCD, ancora la base KG, ch'è multiplice della terza BG, è vguale alla base Fr, ch'è multiplice della quarta FH; e se il parallelepipedo PKFE è maggiore, ò minore del parallelepipedo EFNS, ancora la base KG farà maggiore, ò minore della base Fr, per la 6. definizione del quinto, la prima, cioè il parallelepipedo ABFE, alla seconda, cioè al parallelepipedo EFCD, farà come la terza, cioè la base BG, alla quarta, ch'è la base FH. Per la qual cosa il parallelepipedo ABCD farà diuiso dal piano EF, in modo, che il parallelepipedo ABFE al parallelepipedo EFCD, farà come la base BG alla base FH, ch'era da dimostrarsi.



PROBLEMA IV. PROPOSITIONE XXVI.

Ad vna data retta linea, in vn punto in essa, c costituire vn angolo solido, vguale ad vn angolo solido dato.

Sia data la retta AB, ed il punto in essa A, e sia dato l'angolo solido C, si vuole nel punto A, sopra la retta AB, costituire vn angolo solido, vguale all'angolo solido C. Nella retta CF si prenda qualunque punto F, dal quale si faccia cadere la retta FG perpendicolare al piano DC EG; si tirino le rette GD, GC, GE, FE, FD; poi alla retta AB, nel punto A, si faccia l'angolo BAI vguale all'angolo pia-



a 23. del 12.

b 23. del 2.

no DCE; e nel medesimo punto A, nel piano BAI, si costruisca l'angolo BAK, e vguale all'angolo DCG; farà il rimanente angolo KAI vguale al rimanente angolo GCE. Si faccia AK^d vguale alla retta CG, poi nel punto K si eleui la retta KL e perpendicolare al piano BAIK; si faccia KL f vguale ad FG, si riri la retta LA. Dico che l'angolo solido A, contenuto da gli angoli piani LAB, LAI, BAI, è vguale al dato angolo solido C. Si faccia AH^g vguale alla retta CD, e si tagli AI vguale à CE; dal punto K si tirino le rette KH, KI; e dal punto L si tirino le rette LH, LI; e si considerino i due triangoli HAK, DCG, de' quali i due lati HA, AK, per costruzione, sono vguali à i due lati DC, CG, l'angolo HAK è vguale all'angolo DCG, h farà la base HK vguale alla base DG. Similmente ne i triangoli KAI, GCE, i due lati KA, AI, sono vguali à i due lati GC, CE, l'angolo KAI è dimostrato vguale all'angolo GCE, sarà la base KI vguale alla base GE. In oltre, perche le rette FG, LK, sono perpendicolari à i piani DCEG, HAIK, gli angoli FGD, FGC, FGE, come ancora gli angoli LKH, LKA, LKI, sono retti. Ne i triangoli LKI, FGE, essendo, per costruzione, il lato LK vguale al lato FG, e si è dimostrato il lato KI vguale al lato GE, e l'angolo LKI vguale all'angolo FGE, in conseguenza la base LI farà vguale alla base FE. Similmente ne i triangoli FGC, LKA, i due lati FG, GC, per costruzione sono vguali à i due lati LK, KA, gli angoli FGC, LKA, sono retti, perciò la base LA^a farà vguale alla base FC. Di più ne i triangoli LKH, FGD, i due lati LK, KH, sono vguali à due lati FG, GD, gli angoli LKH, FGD, sono retti; farà la base LH vguale alla base FD. Si considerino poi i triangoli LAI, FCE, de' quali i due lati LA, AI sono vguali à due lati FC, CE; la base LI è dimostrata vguale alla base FE; farà l'angolo LAI^o vguale all'angolo FCE. Finalmente ne i triangoli LAH, FCD, i due lati LA, AH, sono vguali à i due lati FC, CD, la base LH è dimostrata vguale alla base FD, farà l'angolo LAH^p vguale all'angolo FCD: ma l'angolo BAI, per costruzione è vguale all'angolo DCE, i tre angoli piani dunque LAB, LAI, BAI, che contengono l'angolo solido A, sono vguali à i tre angoli piani FCD, FCE, DCE, che contengono l'angolo solido C; e perciò l'angolo solido A è vguale all'angolo solido C, ch'era da farsi, e dimostrarsi.

PROBLEMA V. PROPOSITIONE XXVII.

Sopra vna data retta linea descriuere vn parallelepipedo simile, e similmente posto ad vn dato parallelepipedo.

Sia data la retta linea AB, ed il solido parallelepipedo CDEF, e si voglia sopra la retta AB descriuere vn parallelepipedo simile, e similmente posto, al dato parallelepipedo CDEF. Nel punto A sopra la retta AB, per l'antecedente propositione, si costruisca l'angolo solido A, vguale all'angolo solido D, in modo, che l'angolo LAB sia vguale all'angolo GDE, l'angolo LAM sia vguale all'angolo GDI, e l'angolo MAB sia

vguale

c 23. del 1.

d 3. del 1.

e 12. del 11.

f 3. del 1.

g 3. del 2.

h 4. del 1.

K 4. del 1.

l 3. de fin.

del 11.

m 4. del 1.

n 4. del 1.

o 8. del 1.

p 8. del 1.


a 12. del 6.

b a2. del 5.

e Scol. alla
15. del 12.d 1. defin.
del 6.

e 14. del 11.


vguale all'angolo IDE; poi si faccia come ED à DG, ^a così BA ad AL; e di nuouo si faccia come GD à DI, così LA ad AM; sarà per l'egualità ED à DI ^a come BA ad AM. Co'i due lati LA, AB, si compisca il parallelogrammo AN; co'i due MA, AB, si faccia il parallelogrammo AO; e co'i due LA, AM, si faccia il parallelogrammo AP. Per il punto B si faccia passare il piano BQ ^e parallelo al piano AP; per il punto M si faccia passare il piano MQ parallelo al piano AN; e per il punto P si faccia passare il piano PN parallelo al piano MB; e sarà descritto il parallelepipedo PABQ alla retta AB, quale Dico esser simile, e similmente posto al parallelepipedo dato CDEF. Perche l'angolo LAB è vguale all'angolo GDE, e la proportion di LA ad AB è come quella di GD à DE, sarà il parallelogrammo LB ^e simile, e similmente posto al parallelogrammo GE. Similmente perche l'angolo LAM è vguale all'angolo GDI, e la proportion di LA ad AM è come quella di GD à DI, sarà il parallelogrammo AP simile, e similmente posto al parallelogrammo DC. Ed oltre à ciò, essendo l'angolo BAM vguale all'angolo EDI, e la proportion di ED à DI è come quella di BA ad AM; il parallelogrammo AO sarà simile, e similmente posto al parallelogrammo DK; per la qual cosa i tre parallelogrammi EG, DC, DK, sono simili, e similmente posti à i tre parallelogrammi AN, AP, AO, i loro opposti e sono ancora simili, e perciò i parallelepipedi CDEF, PABQ, faranno simili, e similmente posti, che era da farsi, e dimostrarsi.



THEOREMA XXIII. PROPOSITIONE XXVIII.

Il piano, che sega vn parallelepipedo per le diagonali di due piani opposti, lo diuide in due parti vguali.

Sia il parallelepipedo ABCD, nel quale i piani opposti siano i parallelogrammi ED, BF, si tirino i diametri, ò diagonali, che siano le rette AG, HC. Perche i quadrilateri BG, BA sono parallelogrammi, sarà GC vguale, e parallela ad EB, e la retta AH sarà vguale, e



paral-

parallela alla medesima EB; dal che le rette AH, GC^a sono frà di loro vguali, e parallele; e le rette AG, HC, che le congiungono, ^b sono frà di loro vguali, e parallele; e perciò faranno in vn medesimo piano; ed il quadrilatero AHCG farà parallelogrammo. Dico, che il piano AHCG diuide il parallelepipedo BD in due parti vguali. Perche, gli opposti parallelogrammi ED, BF, sono frà di loro simili, ed vguali, le loro metà faranno ancora ^c simili, ed vguali; e farà il triangolo AEG simile, vguale, e parallelo al triangolo HBC; ed il triangolo AGD sarà simile, vguale, e parallelo al triangolo HCF. Nel parallelogrammo ED i lati opposti, e gli angoli opposti, ^d sono frà di loro vguali, e perciò la proportion di AE ad EG è come quella di GD à DA; sì che i triangoli AEG, ADG sono frà loro equiangoli, hanno i lati intorno à gli angoli ^e vguali proportionali, e perciò sono ^f simili; e farà il triangolo AEG simile, ed vguale al triangolo AGD. Per l'istessa ragione i triangoli HBC, HCF, sono frà loro simili, ed vguali, e tutti quattro i triangoli AEG, AGD, BHC, HCF, sono frà loro simili, ed vguali. Finalmente perche il parallelogrammo AB è simile, ed vguale al parallelogrammo DC, come ancora il parallelogrammo EC è simile, ed vguale al parallelogrammo HD; effendo il parallelogrammo AHCG commune, faranno i tre parallelogrammi AB, EC, AC, simili, ed vguali à i tre parallelogrammi CD, DH, AC; ed i triangoli AEG, HBC, sono simili, ed vguali à i triangoli AGD, HCF; e per la 10. definit. di questo, i prismi AHBG, AHCD, sono frà di loro simili, ed vguali. Per la qual cosa il piano AHCG, che passa per le diagonali AG, HC, diuide il parallelepipedo ABCD in due parti vguali, ch'era da dimostrarfi.

a 9. del 11.
b 33. del 1.

c 20. del 6.
d 34. del 2.

d 34. del 1.

e 4. del 6.

f i. definit.
del 6.

COROLLARIO.

Quando dunque vn piano sega vn parallelepipedo per le diagonali di due piani opposti, lo sega in due prismi di basi triangolari, e perciò ogni prisma di base triangolare è la metà del parallelepipedo, che hà la medesima altezza; la di cui base è il doppio della base triangolare di esso prisma.

THEOREMA XXIV. PROPOSITIONE XXIX.


Se i solidi parallelepipedi hanno vna medesima base, e sono frà i medesimi piani paralleli, ed i lati, che si eleuano sopra la base in ciascuna di due faccie opposte, terminano nella medesima retta linea, quei solidi parallelepipedi sono frà di loro vguali.

Sopra la medesima base ABCD, e frà i medesimi piani paralleli EF, AC, siano collocati i parallelepipedi EBCG, HBCK, ed in ciascuna delle

M m m m

faccie

facce opposte BF, AK, i lati elevati sopra la base cōcorrano nelle medesime rette LF, EK, cioè i lati BL, BM, CN, CF, cōcorrano nella medesima retta LF; ed i lati AE, AH, DG, DK, nella faccia opposta, concorrono colla medesima retta EK. Dico, che i parallelepipedi EBCG, HBCK, sono frà di loro vguali. Perche i parallelogrammi L B C N, M B C F, hanno la medesima base BC, e sono frà le medesime parallele LF, BC, ^a perciò sono frà di loro vguali; detrattone il commune trapetio MBCN, resta il triangolo LBM vguale al triangolo NCF. Nell'istesso modo si prouerà, che il triangolo EAH è vguale al triangolo GDK.



a 35. del 1.

b 34. del 1.

c 34. del 1.

d 34. del 1.

e 4. del 6.

g 34. del 1.

h 4. del 6.

k 36. del 1.

l 39. del 1.

m 34. del 1.

n 24. del 11.

In oltre nel parallelogrammo LC i lati opposti LN, BC, ^b sono frà di loro vguali; e nel parallelogrammo BF il lato MF ^c è vguale all'opposto BC; dal che LN sarà vguale ad MF, e detrattane la commune MN, resta LM vguale ad NF. Nel parallelogrammo EB, i lati opposti EA, LB sono ^d frà di loro vguali, e nel parallelogrammo BH il lato AH è vguale all'opposto BM; come ancora nel parallelogrammo EM i lati opposti EH, LM, sono frà di loro vguali, dal che i tre lati AE, EH, HA del triangolo EAH, sono vguali à i tre lati BL, LM, MB, del triangolo LBM; e per l'8. proposizione del primo, i triangoli AEH, BLM, sono equiangoli, & vguali; e perciò, ^e hanno i lati intorno à gli angoli vguali proportionali, e per la 1. definita, del 6. sono frà di loro simili, ed vguali. Nell'istesso modo si dimostrerà, che i triangoli CNF, DGK, sono frà di loro simili, ed vguali. E perche nel parallelogrammo BF il lato BM ^g è vguale all'opposto CF, e nel parallelogrammo BN il lato BL è vguale all'opposto CN; essendosi dimostrato il lato LM vguale ad NF, i tre lati BL, LM, MB, del triangolo LBM, sono vguali à i tre lati CN, NF, FC del triangolo CNF; e perciò i triangoli LBM, CNF, sono equiangoli, haueranno i lati ^h intorno à gli angoli vguali proportionali; per la qual cosa sono frà di loro similissima furono dimostrati vguali, in conseguenza sono frà loro simili, ed vguali. Nell'istesso modo si dimostrerà, che i triangoli EAH, GDK, sono frà loro simili, ed vguali. I quattro triangoli dunque LBM, EAH, NCF, GDK, sono frà loro simili, ed vguali. Di nuoto perche i parallelogrammi EM, GF, sono sopra le vguali basi LM, NF, e frà le medesime parallele EK, LF, ^k perciò sono frà di loro vguali; & essendo GN parallela ad EL, farà l'angolo ELM ^l vguale all'angolo GNF, e l'angolo NGK vguale all'angolo LEH; si che i parallelogrammi EM, GF, sono equiangoli. E perche il lato EL ^m è vguale all'opposto GN, farà EL ad LM, come GN ad NF: per la qual cosa i parallelogrammi EM, GF sono frà loro simili; furono dimostrati vguali, in conseguenza sono frà loro simili, ed vguali. Nel parallelepipedo EBCG, i piani opposti EB, GC, ⁿ sono frà loro simili, ed vguali: e nel parallelepipedo HBCK, i piani opposti HB, KC, sono simili, ed vguali, dal che i tre paralle-


logrammi

logrammi EB, EM, HB, sono simili, ed vguali à i tre parallelogrammi CG, GF, CK; ed i triangoli BLM, AEH, sono simili, ed vguali à i triàngoli CNF, DGK; e per la 10. definizione di questo, i prismi ABME, DCFG, sono fra di loro vguali, se gli aggiunga vgualmente il solido HBCG, ne viene il parallelepipedo EBCG vguale al parallelepipedo HBCK, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA XXV. PROPOSITIONE XXX.

Se i solidi parallelepipedo hanno vna medesima base, e sono fra i medesimi piani paralleli, ed i lati, che si eleuano sopra la base, in nessuna delle faccie opposte terminano nella medesima retta linea, quei parallelepipedo sono fra di loro vguali.

Sopra la medesima base HBCP, e fra i medesimi piani paralleli AG, HC, siano collocati i parallelepipedo ABCD, EBCF, ed i lati eleuati alla base in nessuna faccia concorrano colla medesima retta linea, cioè, che i lati BK, BI, CR, CG, non siano nel medesimo piano; E similmente i lati HE, PF, non siano nel medesimo piano co' i lati HA, PD; ne i lati BK, HA siano nel medesimo piano co' i lati BI, HE; ne meno i lati CG, PF, siano nel medesimo piano co' i lati CR, PD. Dico, che il parallelepipedo ABCD è vguale al parallelepipedo EBCF. Si prolungino i lati KR, AD, IE fin che si seghino co' i lati GF, A D, còtinuati, come in M, L, ed N; si tirino le rette HN, BO, CL, PM. Nel parallelogrammo EHBI, il lato IE è parallelo all'opposto HB; e nel parallelogrammo AB il lato AK è parallelo al medesimo lato HB; e perciò le rette AK, EI, ouero IN, sono fra di loro parallele: Ma nel parallelogrammo AKRD, il lato KR è parallelo al lato AD, farà il quadrilatero AKON parallelogrammo, e farà AK vguale ad NO: ma il lato AK è vguale al suo opposto HB, farà NO vguale ad HB; e perche fu dimostrata la retta, NO, parallela ad HB, farà NO vguale, e parallela ad HB; per la qual cosa le rette NH, OB, sono fra di loro vguali, e parallele, ed il quadrilatero NHBO è parallelogrammo. Nell'istesso modo si dimostrerà, che il quadrilatero MPCL è parallelogrammo. E perche il piano CF è parallelo al piano EB, farà tutto il piano MC parallelo al piano NB. Similmente, essendo il piano KBCR parallelo al piano AHPD, farà tutto il piano KBCL parallelo al piano AHPM; ed il solido, le di cui faccie opposte fo-



a 9. del 11.

b 35. defin.
del 1.
c 34. del 1.

il 30. defin.
del II.

no i parallelogrammi $NHBO$, $MPCL$, cioè il solido $MNHOLCP$, & farà parallelepipedo. In oltre si considerino i due parallelepipedo, cioè $ABCD$, & $MNHOLCP$, i quali hanno la medesima base $HBCP$, sono frà i medesimi piani paralleli AG , HC , ed i lati elevati sopra la base in ciascuna delle due faccie opposte concorrono in vna medesima retta linea, cioè i lati HA , HN , PD , PM , concorrono nella medesima retta AM ; come anco i lati BK , BO , CR , CL , concorrono nella medesima retta linea KL ; e per l'antecedente propositi. i detti parallelepipedo sono frà di loro vguali. Finalmente i parallelepipedo $EBCF$, $MNHOLCP$, hanno la medesima base HC , sono frà i medesimi piani paralleli AG , HC , ed i lati elevati alla base, cioè HN , HE , BO , BI , concorrono nella medesima retta NI , ed i lati CG , CL , PF , PM , concorrono nella medesima retta MG , perciò sono frà di loro vguali. Per la qual cosa il parallelepipedo $ABCD$ sarà vguale al parallelepipedo $EBCF$, come fu proposto dimostrare.

c. 29. del II.

CONSETTARIO.

Dalle due antecedenti proposizioni è manifesto, che quando due parallelepipedo hanno vna medesima base, e sono frà i medesimi piani paralleli, in qualunque modo siano collocati, sempre sono frà di loro vguali.

S C O L I O.

La conuersa alle due antecedenti proposizioni è chiara da quel, che si è detto, cioè

Se i parallelepipedo vguali sono costituiti sopra d'vna medesima base, e collocati dalla medesima parte, quelli haueranno la medesima altezza.

Perche se non haueranno la medesima altezza, vno di quelli sarà più alto dell'altro, se con vn piano equidistante alla base se ne leui la parte più alta, i rimanenti, che restano frà i piani paralleli, farebbero per quel che si è dimostrato, frà di loro vguali, cbi' è contro all'ipotesi.


THEOREMA XXVI. PROPOSITIONE XXXI.

I solidi parallelepipedo, che hanno vguali basi, e la medesima, ò vguale altezze, sono frà di loro vguali.

Sopra le vguale basi AB , CD , siano costituiti i parallelepipedo AI , CK , i quali habbiano vguale altezze. Dico, che i parallelepipedo AI , CK , sono frà di loro vguali. Supposto prima, che i lati GH , EF , siano perpendicolari alle basi AB , CD , faranno GH , EF , le loro vguale altezze: si prolunghi il

lato

lato CE verso M, e si faccia EM vguale ad LB; nel piano OMP, sopra la retta EM, in punto E, si costituisca l'angolo MEP ^a vguale all'angolo BLA; si faccia EP vguale ad LA, e si compisca il parallelogrammo EQ; poi colle due FE, EP, ^b si faccia il parallelogrammo ER, e colle due FE, EM, si faccia il parallelogrammo ES; e si compisca il parallelepipedo PQTS. Perche i lati ME, EP, per costruzione, sono vguali à i due lati BL, LA, sarà ME ad EP, come BL ad LA; fu fatto l'angolo MEP vguale all'angolo BLA, sarà il parallelogrammo EQ simile, ed vguale al parallelogrammo LG. Similmente, essendo EF, per ipotesi, vguale ad HG, ouero VL, ed il lato EP è fatto vguale ad LA, sarà FE ad EP, come VL ad LA; gli angoli FEP, VLA, sono vguali (stante che le rette FE, VL si suppongono perpendicolari à i piani CD, AB) sarà il parallelogrammo FP simile, ed vguale al parallelogrammo VA. Di più, perche FE è vguale ad VL, e la retta EM è vguale ad LB, sarà FE ad EM, come VL ad LB; gli angoli VLB, FEM, sono retti, sarà il parallelogrammo FM simile, ed vguale al parallelogrammo VB; e così i tre parallelogrammi EQ, FP, FM, sono simili, ed vguali à i corrispondenti tre parallelogrammi LG, VA, VB; gli opposti ^c sono simili, ed vguali, e



perciò i parallelepidi FPQS, VAGI, sono frà di loro vguali. Si cōpica il parallelepido KEMX. Perche le rette CE, EM, per costruzione, fanno vna sola retta linea, sarà il parallelogrammo CS vn solo piano, ed il solido ZCMX sarà vn solo parallelepido; si prolunghino le rette DE, & M, fin che concorrano colla retta PQ, continuata in qualche punto N, ed a, si prolunghino le rette XS, KF, fin che concorrano con RT, come in b, & d; si tirino le rette bN, & da, e sarà costruito il parallelepido FNaS. E perche i parallelepidi FNaS, FPQS, hanno la medesima base ES, e sono frà i medesimi piani paralleli NT, ES, ^d perciò sono frà di loro vguali: ma il parallelepido FPQS fu dimostrato vguale al parallelepido AL, sarà il parallelepido FNaS vguale al parallelepido AI. Di nuouo perche i parallelogrammi PM, NM, hanno la medesima base EM, e sono frà le medesime parallele NQ, EM, perciò sono ^e frà di loro vguali: ma il parallelogrammo PM fu dimostrato vguale al parallelogrammo AB, ouero CD, sarà il parallelogrammo NM vguale al parallelogrammo CD; e, preso il parallelogrammo E&, come terza quantità, sarà il parallelogrammo NM al parallelogrammo E&, ^f come il parallelogrammo CD al medesimo parallelogrammo E&. Si consideri il parallelepido NX, segato dal pia-

no ES

a 23. del 1.

b 3. del 1.

c 34. del 11.

d 29. & 30. del 11.

e 36. del 1.

f 7. del 5.

g. 15. del 11.

h. 11. del 15.

K. 15. del 11.

l. 11. del 15.

m. 9. del 5.

n. 11. del 15.

o. 11. del 15.



no ES equidistante al piano Nd, sarà il parallelepipedo NS al parallelepipedo EX g come la base NM alla base E& ; ma la base NM alla base E& fu dimostrata essere come il parallelogrammo CD al parallelogrammo E& , sarà il parallelepipedo NS al parallelepipedo EX h come il piano CD al piano E& . Di più, essendo il parallelepipedo CX legato dal piano KE, parallelo al piano CZ, sarà il parallelepipedo CK al parallelepipedo EX k come la base CD alla base E& ; ma la base CD alla base E& fu dimostrata essere come il parallelepipedo NS al parallelepipedo EX ; sarà il parallelepipedo NS

al parallelepipedo EX , i come il parallelepipedo CK al medesimo parallelepipedo EX . Per la qual cosa i parallelepipedi NS, CK m sono fra di loro vguali : fu dimostrato il parallelepipedo NS vguale al parallelepipedo AI ; i parallelepipedi dunque AI, CK sono fra di loro vguali .

Siano di nuovo sopra le vguali basi AGBL, OCED, i parallelepipedi VAGI, ZCEK, che habbiano vguali altezze, e non siano i lati GH, EF, perpendicolari alle basi LAGB, OCED . Dico che i parallelepipedi VAGI, ZCEK, sono fra di loro vguali . Da i

punti M, H, I, V, n alla base AB, continuata, si facciano cadere le rette perpendicolari MN, HT, IS, VX, e da punti Z, P, F, K, alla base OCED, continuata, si facciano cadere le perpendicolari ZR, PQ, FY, K& . Perche le altezze de i parallelepipedi sono fra di loro vguali, tutte le dette perpendicolari saranno fra di loro vguali . Si tirino le rette NX, TS, RQ, & Y, e faranno costrutti i due parallelepipedi VNTI, ZQYK, che hanno i lati eleuati perpendicolari alle basi . Hor essendo la base XNTS vguale al piano opposto VMHI, ed il parallelogrammo VMHI o è vguale alla base LAGB, sarà la base LAGB vguale alla base XNTS . Nell'istesso modo si prouerà, che la base & RQY è vguale alla base OCED ; per la qual cosa le basi XNTS, RQY&, sono fra di loro vguali ; i lati PQ, HT, sono perpendicolari alle basi e per quel che si è dimostrato nella prima parte, i parallelepipedi VNTI, ZQYK, sono

frà




frà di loro vguali. Finalmente perche i parallelepipedi VAGI, VNTI, hanno la medesima base VMIL, e sono frà i medesimi piani paralleli MI, AS, e perciò sono frà di loro vguali. Nell'istesso modo si prouerà, che i parallelepipedi ZQYK, ZCEK sono frà di loro vguali; ma i due parallelepipedi VNTI, ZQYK, furono dimostrati vguali, i parallelepipedi dunque VAGI, ZCEK, sono frà di loro vguali, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA XXVII. PROPOSITIONE XXXII.

I solidi parallelepipedi, che hanno vguale altezze, sono frà di loro come le basi.

Siano i due parallelepipedi ABCD, EFGH, i quali habbiano la medesima, o vguale altezze. Dico che il parallelepipedo ABCD al parallelepipedo EFGH, è come la base BK alla base FL. Al lato FM si applichi il parallelogrammo NM, in modo, che l'angolo FMO sia vguale all'angolo GLM; i quali s'aggiunga v-



ualmente l'angolo FML; i due angoli FMO, FML, faranno vguali à i due angoli FML, GLM, ma i due angoli FML, GLM, sono vguali à due angoli retti, faranno i due angoli FML, FMO, vguali à due angoli retti; e le rette OM, ML, e costituiranno la sola retta linea OL; dal che i due parallelogrammi FO, FL, costituiscono il solo piano NL: si compisca il parallelepipedo RNGH, il quale haue- rà la medesima altezza, che hà il parallelepipedo ABCD. E perche la base BK è vguale alla base NM, farà il parallelepipedo ABCD vguale al parallelepipedo RNFE; e farà il parallelepipedo ABCD al parallelepipedo EFGH, e come il parallelepipedo RNFE al medesimo parallelepipedo EFGH: ma i due RNFE, EFGH, sono come le basi NM, FL; farà il parallelepipedo ABCD al parallelepipedo EFGH, come la base NM, ouero BK, alla base FL, ch'era da dimostrarsi.


COROLLARIO I.

Da quel che si è detto è manifesto, che se faranno due Prismi di basi triangolari, i quali haueranno la medesima altezza, il Prisma al Prisma è come la base triangolare dell'vno alla base triangolare dell'altro.

Per esempio siano i Prismi di basi triangolari ABC, DEF, che habbiano

vguale

uguali altezze; co' i lati GH, HA , si faccia il parallelogrammo KH , e co' i lati BC, CI , si faccia il parallelogrammo LC , e si compisca il parallelepipedo KC , hauerà il parallelepipedo KC la medesima altezza, che hà il prisma ABC , e per la proposizione 28. di questo, il parallelepipedo KC , sarà il doppio del prisma ABC . Di nuouo co' i lati MN, ND , si faccia il parallelogrammo ON , e co' i lati EF, FQ si faccia il parallelogrammo PF ; si compisca il parallelepipedo OF : e per le ragioni antedette, il parallelepipedo OF è il doppio del Prisma DEF , ed hà la medesima altezza, che hà il prisma DEF : ma i prismi ABC, DEF , per ipotesi, hanno una medesima altezza; perciò i parallelepipedi KC, OF , haueranno una medesima altezza; e per l'antecedente proposizione, il parallelepipedo KC al parallelepipedo OF è come la base LC alla base PF : ma i parallelepipedi KC, OF , sono come i prismi ABC, DEF (stante che sono il doppio de i prismi ABC, DEF) sarà dunque il prisma ABC al prisma DEF come la base LC alla base PF : ma la base LC alla base PF è come la metà, cioè il triangolo IBC , alla metà, ch'è il triangolo QEF ; sarà il prisma ABC al prisma DEF come la base IBC alla base QEF , ch'è il nostro proposto.



a 15. del 5.


b 17. del 5.

c 11. del 5.

S C O L I O.

Quel che si è detto de i prismi di basi triangolari, si verifica ancora de i prismi, le di cui basi hanno più di tre lati.

Siano i prismi $ABCD, ERGHI$, di basi multilateri, che habbiano uguali altezze. Dico che il prisma $ABCD$ al prisma $ERGH$ è come la base $MBCN$ alla base $ORGHS$. Da gli angoli A, C e a gli angoli opposti de i poligoni $AKLD, EFPQI$, si tirino le rette AL, EP, EQ , e da gli angoli M , ed O , a gli angoli opposti delle basi, si tirino le rette MC, OG, OH . Perche nel prisma $ERGHI$ i piani opposti $EFPQI, ORGHS$, sono frà di loro simili, uguali, e paralleli; tirate le rette EP, EQ, OG, OH , i poligoni $EFPQI, ORGHS$, saranno diuisi in triangoli di numero uguale; ed i triangoli in uno saranno simili a i triangoli corrispondenti dell'altro; e perciò il triangolo EFP sarà simile al triangolo ORG ; il triangolo EPQ sarà simile al triangolo OGH ; ed il tri-



d 13. defin. del 16.

e 20. del 6.

angolo

angolo $E Q I$ sarà simile al triangolo $O H S$. Nell'istesso modo si prouerà, che il triangolo $A L D$ è simile al triangolo $M C N$, ed il triangolo $A K L$ è simile al triangolo $M B C$. In oltre perche i piani $F G, P H, Q S, E S, E R$, e per la natura del prisma, sono parallelogrammi, i lati opposti de quali sono uguali, e paralleli; saranno tutte le rette $F R, P G, Q H, I S, E O$, fra di loro uguali, e parallele; Hor essendo la retta $P G$ uguale e parallela ad $E O$ sarà $E P$ uguale, e parallela ad $O G$, ed il quadrilatero $E P G O$ sarà parallelogrammo. Similmente essendo $Q H$ uguale, e parallela ad $E O$ sarà $E Q$ uguale, e parallela ad $O H$, ed il quadrilatero $E O H Q$ sarà parallelogrammo. E perche i tre lati $E F, F P, P E$, sono uguali a i tre lati $O R, R G, G O$, stante che sono lati opposti de i parallelogrammi $F G, G E, E R$; perciò i triangoli $E F P, O R G$, sono fra loro uguali; furono dimostrati simili, e sono ne i piani paralleli $F I, R S$, perciò sono fra loro simili, uguali, e paralleli. Nell'istesso modo si dimostrerà, che i triangoli $E P Q, O G H$, sono simili, uguali, e paralleli; e che i triangoli $E Q I, O H S$, sono fra loro simili, uguali, e paralleli. Per la qual cosa i solidi $E O G R F P, E O G H Q P, E O S H Q I$, sono prismi di basi triangolari. Nell'istesso modo si dimostrerà, che i solidi $A M B C L K, A M N C L D$, sono prismi di basi triangolari. Si considerino i prismi $E R G O, E G H O$, i quali hanno una medesima altezza, e per il Corollario antecedente, il prisma $E R G O$ al prisma $E G H O$, è come la base $O R G$ alla base $O G H$; e componendo, il prisma $E R G H O$ al prisma $E G H O$, m è come la base $O R G H$ alla base $O G H$: ma il prisma $E G H O$ al prisma $E H S O$, per l'antecedente Corollario, è come la base $O G H$ alla base $O H S$; sarà per l'uguaglianza, il prisma $E R G H O$ al prisma $E H S O$ come la base $O R G H O$ alla base $O H S$; e componendo, tutto il prisma $E R G H S O$ al prisma $E H S O$ è come la base $O R G H S$ alla base $O H S$; ed inuertendo, il prisma $E H S O$ a tutto il prisma $E R G H S O$, p è come la base $O H S$ a tutta la base $O R G H S$. Nell'istesso modo si dimostrerà, che tutto il prisma $A B C D$ al prisma $A C N M$, è come la base $M B C N$ alla base $M C N$: ma il prisma $A C N M$ al prisma $E H S O$ è come la base $M C N$ alla base $O H S$ (stante che per ipotesi, hanno altezze uguali) sarà, per l'uguaglianza, il prisma $A B C D$ al prisma $E H S O$ q come la base $M B C N$ alla base $O H S$; fu dimostrato il prisma $E H S O$ a tutto il prisma $E R G H S O$, come la base $O H S$ a tutta la base $O R G H S$; per l'uguaglianza, r sarà tutto il prisma $A B C D$ al prisma $E R G H S O$, come la base $M B C N$ alla base $O R G H S$, ch'era da dimostrarsi.

f 27. defin.

del 11.

E 34. del 1.

h 33. del 1.

K 33. del 1.

18. e 4. del 1.

m 23. del 5.

n 22. del 5.

o 18. del 5.

p Corol. alla

4. del 5.

q 22. del 5.

r 22. del 5.


COROLLARIO II.

Quindi è che i prismi di uguali basi, se sono fra piani paralleli, sono ancora fra di loro uguali, stante che, essendo fra piani paralleli, sono sotto una medesima altezza, e per quel che si è dimostrato, sono fra loro come le basi: Se dunque le basi sono fra di loro uguali, i prismi faranno ancora fra di loro uguali.

THEOREMA XXVIII. PROPOSITIONE XXXIII.

I simili solidi parallelepipedi hanno triplicata propor-
tione, che i loro lati homologhi.

Siano i simili parallelepipedi ABCD, EFGH. Dico che il parallelepipedo ABCD al simile parallelepipedo EFGH ha triplicata proportione, che il lato homologo BC al lato homologo FG. Si prolunghi il lato BC verso b, e si faccia Cb^a vguale ad FG, ouero KI; Similmente si prolunghi & C verso O, e si faccia CO vguale ad FM; ouero EK; e si continui VC verso P, e si faccia CP vguale ad EM, ouero KF; si compiscano i parallelogrammi Ob, CQ, Pb; e si faccia il parallelepipedo O C R d. Perche i parallelogrammi B&, KH sono simili, stante che i proposti parallelepipedi sono simili, sarà l'angolo BC& vguale all'angolo KIH, ouero KEH;



ma l'angolo BC& è vguale all'angolo OCb, sarà l'angolo OCb vguale all'angolo KEH: E perche i lati bC, CO sono vguali à i lati HE, EK, la proportione di bC à CO sarà come quella di HE ad EK; dalche i parallelogrammi Ob, KH^b sono frà di loro simili, ed vguali. Similmente essendo l'angolo VC& vguale all'angolo KFM, ouero KEM, e l'angolo VC& è vguale all'angolo PCO, sarà l'angolo PCO vguale all'angolo KEM. Nell'istesso modo si prouerà, che l'angolo bCP è vguale all'angolo HEM. E perche i lati OC, CP sono vguali à i lati KE, EM, sarà OC à CP come KE ad EM; dal che i parallelogrammi OP, KM, sono frà loro simili, ed vguali. Nell'istesso modo si dimostrerà, che i parallelogrammi bP, HM, sono frà loro simili, ed vguali; per la qual cosa tutto il parallelepipedo CQRb^c è sarà vguale al parallelepipedo EFGH. Co' i due lati VC, CO, si compisca il parallelogrammo VO. Essendo VP vna sola retta linea, sarà VQ vn solo parallelogrammo, co' i due lati VC, Cb, si compisca il parallelogrammo VCbX, sarà tutto il parallelogrammo PX vn solo piano. Si compisca il parallelepipedo VOdX; sarà tutto il solido VQRX vn solo parallelepipedo. Si compisca il parallelepipedo ABbY. Perche la retta & CO è vna sola retta linea, sarà DO vn solo piano, ed il solido DODY vn solo parallelepipedo.

Perche i parallelepipedi BD, FH, sono, per ipotesi, frà di loro simili, sarà la base B& simile alla base MG, ouero EI; dalche la proportione di BC à C& è sarà come quella di HE ad EK: ma HE ad EK è come BC à CO, sarà BC à C& come bC à CO; e permutando BC à Cb sarà come & C à CO; ma BC à Cb è come il parallelogrammo B& al parallelogram-

mo

a 3. del 1.


b 1. defin.
del 6.c 10. defin.
del 12.d 9. de fig.
del 11.
e 1. defin.
del 6.
fin. del 5.
g 16. del 5.
h 1. del 6.

mo &b, e la proportione di &C à CO, ^K è come il parallelogrammo &b al parallelogrammo Cd, farà il parallelogrammo B& al parallelogrammo &b' come il medesimo parallelogrammo &b al parallelogrammo Cd; e perciò i parallelogrammi B&, &b, Cd, sono continui proporzionali. E perche il parallelepipedo BD al parallelepipedo CY, ^m è come la base B& alla base CZ; ed il parallelepipedo CY al parallelepipedo OX, è come la base &b alla base Cd; essendo le basi B&, &b, Cd, continue proporzionali, faranno i parallelepipedi BD, CY, OX, ⁿ continui proporzionali. Di nouo per la similitudine de i parallelepipedi BD, FH, i parallelogrammi CD, GH, ouero FE, sono simili; ^o e farà VC à C& ^p come ME ad EK, cioè come PC à CO; e permutando, farà VC à CP ^q come &C à CO; ma &C à CO ^r è come il parallelogrammo CD al parallelogrammo CS, e la proportione di VC, à CP è come il parallelogrammo CS al parallelogrammo CQ, farà il parallelogrammo CD al parallelogrammo CS, ^t come il medesimo parallelogrammo CS al parallelogrammo CQ. Per la qual cosa i parallelogrammi DC, CS, CQ, sono continui proporzionali: ma i parallelepipedi CY, OX, CR, ^u sono come le basi DC, CS, CQ, stante che hanno la medesima altezza; essendo le basi CD, CS, CQ, continue proporzionali, faranno i parallelepipedi CY, OX, CR continui proporzionali; e tutti quattro i parallelepipedi BD, CY, OX, CR sono continui proporzionali; ed haueremo quattro quantità, cioè la prima BD, la seconda CY, la terza OX, e la quarta CR, continue proporzionali, e per il Lemma 8. dopo la 18. propositione del 6. la prima BD alla quarta CR hà triplicata proportione di quella, che hà la prima BD alla seconda CY: ma BD à CY è come la base B& alla base CZ, cioè come BC à Cb; hauerà BD à CR triplicata proportione, che BC à Cb. ma Cb è fatta vguale ad FG, ed il parallelepipedo CR è dimostrato vguale al parallelepipedo FH; hauerà il parallelepipedo BD al parallelepipedo FH triplicata proportione di quella, che hà il lato homologo BC al lato homologo FG; ch'era da dimostrarfi.

S C O L I O.

I simili prismi di basi triangolari sono in triplicata proportione de i loro lati homologhi.

Siano i simili prismi AED, GMK le di cui basi siano i triangoli FED LMK. Dico che il prisma AED al simile prisma GMK, hà triplicata proportione, che il lato homologo ED al lato homologo MK. Co i lati AB, BC, si faccia il parallelogrammo BN, e si compisca il parallelepipedo EN. Similmente si compisca il parallelepipedo MO perche i prismi AED, GMK, sono simili, sarà il piano EC ^a simile al piano MI, ed il piano EA simile al piano MG; e parimente il triangolo ABC sarà simile al trian-




golo

K 1. del 6.
l 11. del 5.
m 32. del 11.
n 11. del 5.
o 9. de fin.
del 11.
p 1. de fin.
del 6.
q 16. del 5.
r 1. del 6.
t 11. del 5.
u 32. del 11.

a 9. de fin.
del 11.

golo GHI ; dal che l'angolo ABC è uguale all'angolo GHI ; e la proporzione di AB a BC sarà come quella di GH ad HI ; per la qual cosa i parallelogrammi BN , HO , sono frà loro simili. Hor essendo i piani EC , EA , BN , simili a i piani MI , MG , HO ; e gli opposti sono simili, ed uguali; sarà il parallelepipedo EN simile al parallelepipedo MO ; e per l'antecedente proposizione, il parallelepipedo EN al parallelepipedo MO bauerà triplicata proporzione, che il lato homologo ED al lato homologo MK : ma i parallelepipedi EN , MO , sono come le loro metà, cioè come i prismi AED , $G.MK$; bauerà il prisma AED al prisma $G.MK$ triplicata proporzione, che il lato homologo ED al lato homologo MK , ch'era da dimostrarsi.




b 9. defin.
del 11.

c 15. del 5.

THEOREMA XXIX. PROPOSITIONE XXXIV.


Gli uguali parallelepipedi hanno le basi reciproche all'alttezze; e quei parallelepipedi, che hanno le basi reciproche all'alttezze, sono frà di loro uguali.

Siano prima i parallelepipedi $ABCD$, $EFGH$ frà di loro uguali, le di cui basi siano BI , FK . Dico che la base BI alla base FK , è come l'alttezza del solido FH all'alttezza del solido BD . Supposto prima, che i lati CL , GM , siano perpendicolari alle basi BI , FK ; faranno i lati CL , GM , le alttezze de i solidi BD , FH . Hor se l'alttezza CL , GM , sono uguali, faranno i parallelepipedi BD , FH , come le basi: ma i parallelepipedi BD , FH , sono supposti uguali, perciò le basi BI , FK faranno frà di loro uguali; e sarà la base BI alla base FK , come l'alttezza GM all'alttezza CL .



a 31. del 11.

Se l'alttezze GM , CL , non sono frà di loro uguali, vna delle due sarà maggiore; supposto che l'alttezza GM sia maggiore di CL . Si faccia GN uguale a CL , e dal punto N si faccia passare il piano NO e parallelo alla base GP . Perche i parallelepipedi $ABCD$, $NGFO$, hanno uguali alttezze, perciò sono come le basi BI , GP ; e perche il piano NO è parallelo al



b 3. del 1.

c Sen. l. alla
15. del 1.

d 32. del 11.

piano


piano GP, sarà il parallelepipedo GE al parallelepipedo GO, ^e come il piano GH al piano GQ, cioè ^f come GM à GN. In oltre, perche i solidi parallelepipedi BD, GE, per ipotefi, sono frà di loro vguagli, preso il solido GO come terza quantità, sarà il solido BD al solido GO, ^g come il solido GE al medesimo solido GO: ma il solido GE al solido GO è come GM à GN, sarà il solido BD al solido GO, ^h come GN ad NG: si disse, che il solido BD al solido GO è come la base BI alla base GP; sarà la base BI alla base GP, ⁱ come l'altezza MG all'altezza NG: ma NG è fatta vguale ad LC, sarà la base BI alla base GP, come l'altezza MG all'altezza CL, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

Di nouo, supposto che le basi siano reciproche all'altezze, cioè che la base BI alla base GP sia come l'altezza GM all'altezza CL. Dico che i solidi parallelepipedi DB, GE sono frà di loro vguagli. Se le altezze CL, GM sono frà di loro vguagli, essendo la base BI alla base GP come l'altezza GM all'altezza CL, e l'altezza GM è posta vguale all'altezza CL; sarà la base BI vguale alla base FK, ed il parallelepipedo BD ^m vguale al parallelepipedo FH, ch'era da dimostrarsi.

Se l'altezza non sono vguagli, sia l'altezza GM maggiore dell'altezza CL; si faccia, come prima, CN ⁿ vguale à CL, e dal punto N si faccia passare il piano NO, ^o parallelo alla base GP; sarà il solido GE al solido GO, ^p come GM à GN; ed i parallelepipedi BD, GO, hauendo vguagli altezze, ^q faranno come le basi BI, GP. Perche, per ipotefi, la base BI alla base GP è come l'altezza MG all'altezza LC, ouero NG, e la proporzione di MG ad NG è come il solido GE al solido GO; sarà la base BI alla base GP ^r come il solido GE al solido GO: ma il solido BD al solido GO è come la base BI alla base GP; sarà il solido BD al solido GO, ^t come il solido GE al medesimo solido GO; e perciò ^u i parallelepipedi BD, GE, sono frà di loro vguagli, ch'era da dimostrarsi.

Siano di nouo i parallelepipedi ABCD, EFGH, le cui basi siano OB CI, KGFP, ed i lati eleuati alle basi, cioè CL, GM, non siano perpendicolari alle dette basi. Da i punti A, D, L, Q al piano della base OBCI ^x si facciano cadere le perpendicolari AR, QT, DS, LV, e da i punti H, M, X, E, si facciano cadere le rette MY, HN, E&, XZ, perpendicolari al piano della base KGFP; le perpendicolari LV, MY &c. faranno le altezze de i proposti parallelepipedi ABCD, EFGH. Nel solido ATVD, si tirino le rette TV, RS, TR, VS, e

nel solido HYZE si tirino le rette YZ, Z&, &N, NY, e saranno descritti i parallelepipedi ATVD, HYZE, le cui basi sono TV SR, NYZ&. Nel parallelepipedo ABCD la base OBCI ^y è vguale all'opposto parallelogrammo QD; e



nel

e 25. del 11.
f 11. del 10.e 7. del 5.
h 11. del 5.

i 11. del 5.

m 31. del 11.

n 3. del 11.
o Scol. alla
15. del 11.
p 25. del 11.
q 32. del 11.r 17. del 5.
t 14. del 5.
u 9. del 5.


x 11. del 11.

y 24. del 11.

29. & 30.
del II.

nel parallelepipedo ATVD la base RTVS è vguale al medesimo parallelogrammo opposto QD, e perciò le basi RTVS, OBCI, sono frà di loro vguali. Nell'istesso modo si dimostrerà, che le basi KGFP, NYZ&, sono frà di loro vguali. In oltre, perche i parallelepipedi ABCD, ATVD, hanno la medesima base QD, e sono frà i medesimi piani paralleli, per-

ciò sono frà di loro vguali; per simile ragione i parallelepipedi EFGH, EZYH, sono frà di loro vguali. Se dunque supponiamo il parallelepipedo ABCD vguale al parallelepipedo EFGH, farà il parallelepipedo ATVD vguale al parallelepipedo HYZ E. E perche i lati LV, MY, sono perpendi-



colari alle basi, per quel che si è dimostrato nella prima parte, la base RTVS alla base KGFP, farà come l'altezza MY all'altezza LV: ma la base RTVS è dimostrata vguale alla base OBCI; e la base KGFP fu dimostrata vguale alla base NYZ&, farà la base OBCI alla base KGFP, come l'altezza MY all'altezza LV, e perciò le basi sono reciproche all'altezze, ch'era da dimostrarsi.

Se poi la base OBCI alla base KGFP è come l'altezza MY all'altezza LV. Dico che i parallelepipedi ABCD, EFGH, sono frà di loro vguali. Perche la base OBCI alla base KGFP, è come l'altezza MY all'altezza LV; e la base OBCI è dimostrata vguale alla base RTVS; come ancora la base KGFP è dimostrata vguale alla base NYZ&; farà la base RTVS alla base NYZ&, come l'altezza MY all'altezza LV; e per quel che sopra si è dimostrato, i parallelepipedi ATVD, HYZE, sono frà di loro vguali: ma il parallelepipedo ATVD fu dimostrato vguale al parallelepipedo ABCD; ed il parallelepipedo HYZE fu dimostrato vguale al parallelepipedo EFGH; i parallelepipedi ABCD, EFGH faranno frà di loro vguali, ch'era da dimostrarsi.


S C O L I O.

Se i prismi di basi triangolari sono frà loro vguali, hanno le basi reciproche all'altezze; e se le basi sono reciproche all'altezze, i prismi sono frà di loro vguali.

Stano i prismi ABC, DEF, le di cui basi siano i triangoli BGC, EHF, e siano prima i prismi frà di loro vguali. Dico che la base BGC alla base EHF è come l'altezza del prisma DEF all'altezza del prisma ABC. Si compiscano i parallelepipedi BI, EK. Perche i prismi ABC, DEF, sono frà

loro

loro vguali, i loro dupli, cioè i parallelepipedi BI , EK , a sono fra loro vguali; e sarà la base BL alla base EM , b come l'altezza del parallelepipedo EK all'altezza del parallelepipedo BI : ma la base BL alla base EM è come il triangolo BGC al triangolo EHF , ebe, sono loro metà; ed i parallelepipedi BI , EK , hanno le medesime altezze de i prismi; in conseguenza la base BGC alla base EHF sarà come l'altezza del prisma DEF all'altezza del prisma ABC .



Di nuovo Dico che, se la base BGC alla base EHF è come l'altezza del prisma DEF all'altezza del prisma ABC , i prismi ABC , DEF , sono fra loro vguali. Perche i prismi ABC , DEF , hanno l'istessa altezza de i parallelepipedi BI , EK , ed il triangolo BGC al triangolo EHF è come il doppio al doppio, cioè come il parallelogrammo BL al parallelogrammo EM ; sarà il piano BL al piano EM , come l'altezza del parallelepipedo EK all'altezza del parallelepipedo BI ; e per l'antecedente proposizione, i parallelepipedi BI , EK , sono fra di loro vguali; e le loro metà, cioè i prismi ABC , DEF , sono fra di loro vguali, ch'era da dimostrarsi.


THEOREMA XXX. PROPOSITIONE XXXV.

Se faranno due angoli piani, à i vertici de' quali siano inclinate due rette linee, che facciano i corrispondenti angoli, con quelle, che contengono i proposti angoli piani fra loro vguali; e da due qualunque punti, presi nelle rette inclinate, cadano due perpendicolari à i piani, doue sono gli angoli proposti; e da i punti, doue le perpendicolari cadono, ed i vertici de i proposti angoli, si tirino due rette linee; gli angoli contenuti da queste, e dall'inclinare, sono fra di loro vguali.

Siano gli angoli piani ABC , DEF , ed à i vertici E , & B , siano inclinate le rette BG , EH , in modo, che gli estremi H , & G , siano eleuati in altoe sia l'angolo HED vguale all'angolo GBA , e l'angolo HEF sia vguale all'angolo GBC ; e presi nelle rette EH , BG , due qualunque punti H , & G , da i quali si facciano cadere le rette HK , GI , a perpendicolari à i piani DEF , ABC ; e da i punti L , ed I , à i punti E , & B , siano tirate le rette LE , IB .

Dico,

Dico, che l'angolo HEL è uguale all'angolo GBI. Se la retta HE non è uguale alla retta GB, si tagli dalla maggiore EH ^b la parte EM uguale alla retta GB; dal punto M si tiri la retta ML, ^c parallela ad HK; faranno le rette HK, ML ^d in vn medesimo piano, e perciò, continuata la retta ML con correrà con EK in qualche punto L. Hor essendo ML parallela ad HK, e la retta HK è perpendicolare al piano DEF, farà la retta ML ^e perpendicolare al medesimo piano DEF: dal punto L nel piano DEF si tirino le rette LD, LE, ^f ad angoli retti con le rette ED, EF; e dal punto I nel piano ABC si tirino le rette IA, IC ad angoli retti colle rette AB, BC; e si tirino le rette MD, MF, GA, GC. Perche la retta ML è perpendicolare al piano DEF, gli angoli MLF, MLE, MLD ^g sono retti. Similmente perche la retta GI è perpendicolare al piano ABC, gli angoli GIC, GIB, GIA, sono retti. Nel triangolo rettangolo MLE il quadrato di ME ^h è uguale à i quadrati de i due lati ML, LE: ma il quadrato di LE ^k è uguale à i quadrati delle due ED, DL (stante che l'angolo EDL è retto) farà il quadrato di ME uguale à i quadrati delle tre ML, LD, DE: ma i quadrati delle due ML, LD, sono uguali al quadrato di MD; farà il quadrato di ME uguale à i quadrati de i due lati MD, DE; per la qual cosa l'angolo MDE ⁱ farà retto. Nell'istesso modo si dimostrerà, che l'angolo GAB è retto. Di nuouo perche il quadrato di ME ^m è uguale à i quadrati de i due lati ML, LE, ed il quadrato di LE è uguale à i quadrati de i due lati LF, FE; farà il quadrato di ME uguale à i quadrati delle tre ML, LF, FE: E perche i quadrati delle due ML, LF, ⁿ sono uguali al quadrato di MF, farà il quadrato di ME uguale à i quadrati de i due lati MF, FE; dal che l'angolo MFE ^o farà retto. Nell'istesso modo si dimostrerà, che l'angolo GCB è retto. Si considerino i triangoli MEF, GBC. Perche l'angolo MEF, per ipotesi, è uguale all'angolo GBC, e l'angolo MFE è uguale all'angolo GCB (stante che gli habbiamo dimostrati retti) farà il rimanente angolo EMF ^p uguale al restante angolo BGC; e farà ME ad EF ^q come GB à BC: ma ME è fatta uguale alla retta GB, in conseguenza EF ^r farà uguale à BC. Similmente farà EM ad MF ^s come BG à GC; ma EM è uguale à BG, farà ancora MF ^u uguale a GC. In oltre si considerino i due triangoli MDE, GAB, de i



quali

quali gli angoli MED,GBA, per ipotesi, sono frà di loro vguali; gli angoli MDE,GAB, sono vguali, perche sono retti; faranno i rimanenti angoli DME, AGB x frà di loro vguali; e la proportion di ME ad ED y sarà come quella di GB à BA; fu fatta ME vguale alla retta GB, sarà dunque DE z vguale ad AB. Parimente EM ad MD a è come BG à GA; ma EM è vguale à GB, b sarà MD vguale ad AG. Si considerino i due triangoli DEF, ABC. Perche i due lati DE, EF, sono stati dimostrati vguali a i due lati AB, BC, e l'angolo DEF, per ipotesi, è vguale all'angolo ABC; sarà la base DF c vguale alla base AC; l'angolo EDF sarà vguale all'angolo BAC; e l'angolo EFD vguale all'angolo BCA. Da gli angoli retti EDL,BAI, se ne leuino gli vguali angoli EDF,BAC, restano gli angoli LDF, IAC, frà di loro vguali. Similmente da gli angoli retti LFE, ICB, se ne leuino gli vguali angoli EFD,BCA, resta l'angolo LFD vguale all'angolo ICA. Ne i triangoli LDF,IAC, il lato DF è dimostrato vguale al lato AC, gli angoli LDF,LFD, sono vguali à i due angoli IAC, ICA; sarà il lato LD d vguale al lato IA; e sarà LF vguale ad IC. Ne i triangoli LDE,IAB, perche i due lati LD,DE, sono vguali à i due lati IA, AB; e gli angoli LDE, IAB, sono frà loro vguali, stante che sono retti; sarà la base LE e vguale alla base IB. Oltre a ciò ne i triangoli MLD, GIA, perche gli angoli MLD,GIA, sono retti, sarà il quadrato di MD f vguale à i quadrati de i due lati ML, LD; ed il quadrato di GA, sarà vguale à i quadrati di GI,IA: ma il quadrato di MD è vguale al quadrato di GA, stante che le rette MD, GA, le habbiamo dimostrate vguali; perciò i quadrati delle due ML,LD, saranno vguali à i quadrati de i due lati GI,IA; leuandone i quadrati delle vguali DL,IA, resta il quadrato di ML vguale al quadrato di GI; e la retta ML sarà vguale alla retta GI. Finalmente si considerino i due triangoli MLE, GIB, de' quali il lato ME, per costruzione, è vguale al lato GB, il lato LE è dimostrato vguale al lato IB, faranno i due lati ME,EL, vguali à i due lati GB, BI; la base ML è dimostrata vguale alla base GI, sarà l'angolo MEL g vguale all'angolo GBI, come fu proposto dimostrare.

x 81. del 2.
y 4. del 6.z 14. del 5.
a 4. del 6.
b 14. del 5.

c 4. del 1.

d 26. del 4.

e 4. del 1.
f 47. del 6.

g 8. del 1.

COROLLARIO.

Sarà dunque manifesto, che se ne i vertici di due vguali angoli piani ABC,DEF, faranno inclinate à quel piano due rette linee, come EM, BG, che facciano i corrispondenti angoli con le rette, che contengono l'angolo piano, frà di loro vguali; cioè, che l'angolo MEF sia vguale all'angolo GBC; e l'angolo MED vguale all'angolo GBA; e siano fatte le rette EM, BG, frà di loro vguali; le rette ML, GI, che cadono perpendicolari à i piani DEF,ABC, sono frà di loro vguali.


S C O L I O.

Aggiungo quì il seguente Theorema molto necessario alle cose da dimostrarsi.

Se l'angolo piano ABC è vguale all'angolo piano DEF, & à i vertici B, ed E, siano inclinate le rette GB, HE, in modo, che l'angolo GBC sia vguale all'angolo HEF, e l'angolo GBA sia vguale all'angolo HED; e da i punti B, ed E, ne i piani ABC, DEF, siano tirate le rette BL, EK, in modo, che l'angolo IBC sia vguale all'angolo KEF. Dico, che l'angolo GBI è vguale all'angolo HEK.

Nelle rette eleuate BG, EH si prendano due parti vguali, a come BG, EH, e da i punti G, ed H si facciano cadere rette linee perpendicolari à i piani ABC, DEF: Se quelle cadono nelle rette BL, EK, come fanno le rette GL, HK, per l'antecedente proposizione, gli angoli GBI, HEK, sono frà di loro vguali.

Se poi le perpendicolari cadono fuori delle rette BL, EK, come fanno le rette GL, HM; si tirino le rette LB, ME; sarà, per l'antecedente proposizione, l'angolo GBL vguale all'angolo HEM. Da i punti L, ed M, si tirino le rette LL, LA, MK, MD, ad angoli retti colle rette BL, BA, EK, ED; e si tirino le rette GI, GA, HK, HD. Essendo le rette GL, HM, perpendicolari à i piani ABC, DEF, gli angoli GLB, GLI, GLA, HME, HMK, HMD, sono retti. Si considerino i triangoli rettangoli GLB, HME. Perché gli angoli GBL, HEM, sono frà di loro



vguali, e gli angoli GLB, HME, sono retti; sarà il rimanente angolo BGL vguale al rimanente angolo EHM; dal che i triangoli GLB, HME, sono equiangoli; la proportion di GB à BL sarà come quella di HE ad EM: ma GB è vguale ad HE, sarà BL vguale ad EM. Similmente BG à GL sarà come EH ad HM; ma GB è vguale ad EH, sarà GL vguale ad HM. Si dimostri, come si fece nell'antecedente proposizione, che ED è vguale ad AB, e che DH è vguale ad AG, e si considerino i due triangoli GLA, HMD. Perché gli angoli GLA, HMD, sono retti, sarà il quadrato di GA vguale à i qua-

drati

a3. del 1.
b11. del 11.

c12. del 1.

d3. definit.
del 1.

e32. del 1.

f4. del 6.

g14. del 5.

h4. del 6.

k14. del 5.

l47. del 1.

drati de i lati GL, LA ; ed il quadrato di HD è uguale a i quadrati de i lati HM, MD : ma il quadrato di GA è uguale al quadrato di HD (stante che GA è dimostrata uguale ad HD) i quadrati de i due lati GL, LA , saranno uguali a i quadrati de i due lati HM, MD : se ne leuino i quadrati delle uguali GL, HM , resta il quadrato di LA uguale al quadrato di DM , sed il lato AL sarà uguale ad MD . Ne i triangoli ABL, DEM , i due lati AB, BL , sono stati dimostrati uguali a i due lati DE, EM , la base AL è uguale alla base MD sarà l'angolo ABL uguale all'angolo DEM . In oltre, essendo, per ipotesi, l'angolo DEF uguale all'angolo ABC , e l'angolo FEK uguale all'angolo CBI sarà il rimanente angolo KED uguale al rimanente angolo IBA ; da i quali se ne leuino gli uguali angoli ABL, DEM , resta l'angolo LBI uguale all'angolo MEK . Ne i triangoli MEK, LBI , gli angoli LBI, MEK , per costruzione, sono retti; gli angoli LBI, MEK , sono stati dimostrati uguali, i rimanenti angoli BLI, EMK , sono fra di loro uguali, ed i triangoli LBI, MEK , sono equiangoli; e sarà LB a BI , come ME ad EK : ma LB è dimostrata uguale ad ME sarà BI uguale ad EK . Similmente BL ad LI , sarà come EM ad MK , il lato BL è uguale ad EM sarà LI uguale ad MK . Si considerino i triangoli GLI, HMK , de' quali i due lati GL, LI sono stati dimostrati uguali a i due lati HM, MK , l'angolo GLI è uguale all'angolo HMK , stante che sono retti, sarà la base GI uguale alla base HK . Finalmente, perche i due lati GB, BI , del triangolo GBI sono uguali a i due lati HE, EK , del triangolo HEK ; la base GI è dimostrata uguale alla base HK sarà l'angolo GBI uguale all'angolo HEK , ch'era da dimostrarsi.

m 8. del 1.

n 32. del 1.

o 32. del 7.

p 4. del 6.

q 14. del 5.

r 4. del 6.

t 14. del 5.

u 4. del 1.

x 8. del 1.


THEOREMA XXXI. PROPOSITIONE XXXVI.

Se tre linee rette sono proporzionali, il solido parallelepipedo contenuto da quelle tre rette linee è uguale al parallelepipedo equilatero, che si descrive sopra la media, equiangolo all'altro.

Si costituisca l'angolo solido E , con tre angoli piani, presi ad arbitrio, come sono i tre angoli DEF, DEG, FEG . Si faccia poi ED uguale ad A ; si faccia EG uguale alla media B ; e si faccia EF uguale a C ; si compisca il parallelepipedo $IEDK$, il quale sarà contenuto dalle tre rette ED, EF, EG , uguali alle tre rette A, B, C . Di nuouo si ponga la retta LM ; e nel punto L si costituisca l'angolo solido L , uguale all'angolo solido E , cioè, che l'angolo piano MLO sia uguale all'angolo DEF , l'angolo MLN sia uguale all'angolo DEG , e l'angolo GEF uguale all'angolo

a 3. del 1.

b 33. del 11.



O o o o 2

NLO.

come
A, B,
C,

c 3. del 1.


NLO. Si faccia ogn'vna delle rette LM, LN, LO, e vguale alla media B, e si compisca il parallelepipedo QLMR; il quale sarà equilatero, stante che tutti i lati de i parallelogrammi, che lo contengono, sono vguali frà loro; e sarà equiangolo, per costruzione, al parallelepipedo IEDK. Dico che i parallelepipedi QLMR, IEDK, sono frà di loro vguali. Perche la

proportione di A à B è come quella di B à C, essendo le tre A, B, C, vguali alle tre DE, ML, EF, sarà DE ad ML come ML, ouero LO ad EF: ma, per costruzione, l'angolo FED è vguale all'angolo OLM, i parallelogrammi dunque OM, FD, hanno intorno à gli angoli vguali i lati reciprochi, e perciò sono d frà di loro vguali. Si considerino gli vguali angoli piani OLM, FED, à i vertici de' quali, cioè à i punti L, ed E, sono eleuate le rette vguali NL, GE, e l'angolo GED è vguale

d 14. del 6.

all'angolo NLM; come ancora l'angolo GEF è vguale all'angolo NLO; e per il corollario antecedente, le rette, che da i punti N, & G, cadono perpendicolari à i piani OLM, FED, sono frà di loro vguali; per la qual cosa l'altezza de i parallelepipedi QLMR, IEDK, sono frà di loro vguali: furono dimostrate le basi OM, FD, frà di loro vguali; i parallelepipedi dunque QLMR, IEDK, e sono frà di loro vguali, ch'era da dimostrarli.

c 31. del 11.



S C O L I O.

La conuersa dell' antecedente propositione si dimostra facilmente nel seguente modo

Se il parallelepipedo contenuto da tre rette linee è vguale, ed equiangolo al parallelepipedo equilatero, descritto sopra la linea intermedia, quelle tre rette linee sono proportionali.

a 32. del 11.

b 14. del 7.

Sia il parallelepipedo IEDK contenuto dalle tre rette A, B, C, il quale sia equiangolo, ed vguale al parallelepipedo equilatero QLMR, descritto sopra la media B. Dico, che le tre rette A, B, C, sono proportionali. S'intenda fatta la costruzione dell' antecedente propositione, e si dimostri, come in i si fece, che i parallelepipedi QLMR, IEDK, hanno vguali altezze, dal che il solido LR al solido KE sarà come la base OM alla base FD: ma i solidi RL, KE si suppongono vguali, perciò le basi OM, FD, sono frà di loro vguali. E perche l'angolo OLM è vguale, per ipotesi, all'angolo FED, perciò i parallelogrammi OM,


FD,

FD, c haueranno intorno à gli angoli uguali i lati reciprochi; e sarà FE ad LM, come OL ad ED. Ma OL, per ipotesi, è uguale ad LM, sarà EF ad LM, come la medesima LM ad ED, cioè sarà la retta C alla retta B, come la medesima B ad A, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA XXXII. PROPOSITIONE XXXVII.

Se quattro linee rette sono proporzionali, i parallelepipedi simili, e similmente descritti sopra di esse, sono proporzionali: e se i parallelepipedi simili, e similmente posti, sono proporzionali, i loro lati homologhi sono proporzionali.

Habbia prima AB à CD la medesima proporzione, che hà EF, à GH, ed i parallelepipedi AI, CK, descritti sopra le due AB, CD, siano simili, è similmente posti, cioè che le due AB, CD, siano loro lati homologhi; e sopra le due EF, GH, siano descritti i parallelepipedi EL, GM, simili, e similmente posti. Dico che il parallelepipedo AI al parallelepipedo CK, è come il parallelepipedo EL al parallelepipedo GM. Perche i solidi parallelepipedi AI, CK, sono simili, hauerà il solido AI al solido CK triplicata proporzione di quella, che hà il lato homologo AB al lato homologo



CD: ma, per ipotesi, AB à CD è come EF à GH, hauerà il solido AI al solido CK ^b triplicata proporzione di quella, che hà EF à GH: ma il solido parallelepipedo EL al simile parallelepipedo GM ^c hà la medesima triplicata proporzione di quella, che hà EF, à GH; hauerà il parallelepipedo AI al parallelepipedo CK l'istessa proporzione, che hà il parallelepipedo EL al parallelepipedo GM, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo. Di nuouo, supposto che il parallelepipedo AI al simile parallelepipedo CK sia come il parallelepipedo EL al simile parallelepipedo GM. Dico che AB à CD è come EF à GH. Perche i parallelepipedi AI, CK, si suppongono simili, e similmente posti, hauerà il parallelepipedo AI al parallelepipedo CK ^d triplicata proporzione di quella, che hà il lato homologo AB al lato homologo CD: ma, per ipotesi, il solido AI al solido CK è come il solido EL al solido GM, hauerà il solido EL al solido GM ^e triplicata proporzione di quella, che hà AB à CD. E perche il parallelepipedo EL al simile parallelepipedo GM ^f hà triplicata proporzione di quella, che hà EF à GH; hauerà AB à CD l'istessa proporzione, che L'EF à GH, ch'era da dimostrarsi.

a 33. del 11.

b 11. del 5.

c 33. del 11.

d 33. del 11.


e 11. del 5.

f 33. del 11.

THEOREMA XXXIII. PROPOSITIONE XXXVIII.

Se vn piano è perpendicolare ad vn altro piano, e da qualche punto preso in vno di quei piani si faccia cadere vna retta perpendicolare all'altro piano, quella caderà nella loro commune settione.

Sia il piano AB, perpendicolare al piano CD, e la loro commune settione sia la retta CB; e preso nel piano AB qualunque punto E, dal quale si faccia cadere vna retta perpendicolare al piano CD. Dico che quella cade nella commune settione CB. Se non cade nella commune settione CB, cada fuori, se è possibile, e sia quella la retta EG; dal punto G si tiri la retta GF^a perpendicolare alla retta CB, e si tiri la retta EF. Perche i piani CD, AB, si congiungono ad angoli retti, e la retta GF, ch'è nel piano CD, fa angoli retti colla commune settione CB; per la definizione 4. di questo, la retta GF sarà perpendicolare al piano AB, e perciò l'angolo GFE^b sarà retto. Similmente perche la retta EG è perpendicolare al piano CD, l'angolo EGF^c sarà retto; per la qual cosa, nel triangolo EGF, gli angoli EGF, EFG, non sono minori di due angoli retti, ch'è contro alla 17. proposizione del primo. Non dunque la perpendicolare cade fuori della commune settione CB, ma cade in essa commune settione CB, come fa la retta EF, ch'era da dimostrarsi.



a 29. del 1.

b 3. defin.
del 11.
c 3. defin.
del 11.

THEOREMA XXXIV. PROPOSITIONE XXXIX.

Se i lati di due piani opposti d'un parallelepipedo sono diuisi in due parti vguali, la commune settione de i piani, che passano per le opposte diuisioni, e la diagonale d'esso parallelepipedo, si segano scambieuolmente in due parti vguali.

Sia il parallelepipedo ABCD, la di cui diagonale sia BD, ed i lati de i due piani opposti BE, HD, siano diuisi in due parti vguali ne i punti O, I, N, K, Q, L, P, M; e per le opposte diuisioni passino i piani KMLI, NPQO, i quali si seghino scambieuolmente, e la commune settione sia la retta RS. Dico che la retta RS, e la diagonale BD, si segaranno scambieuolmente in due parti vguali. Si tirino le rette RB, RE, SD, SH. Perche DL è vguale, e papparalela ad MC, farà CD^a vguale, e parallela ad ML. Similmente perche CQ è vguale, e parallela ad HP, fa-

a 33. del 1.


rà

rà PQ^b vguale, e parallela ad HC , e sarà ancora c parallela à GD ; dal che i quadrilateri QM, QL , d sono parallelogrammi, e sarà CQ^c vguale ad MS , e la retta QD vguale ad SL : ma CQ , per ipotesi, è vguale à QD , farà MS vguale ad SL . E perche la retta LD , per ipotesi, è vguale ad MH , i due lati DL, LS , del triangolo DLS , faranno vguali à i due lati HM, MS , del triangolo HMS ; l'angolo $DL S^f$ è

vguale all'angolo HMS (stante che DG è parallela ad HC) farà la base DS vguale alla base HS , e l'angolo LSD vguale all'angolo MSH ; vguilmente se gli aggiunga l'angolo MSD , i due angoli HSM, MSD , faranno vguali à i due angoli MSD, DSL : ma i due angoli MSD, DSL , h sono vguali à due angoli retti; i due angoli dunque HSM, MSD , sono vguali à due angoli retti; e perciò le rette HS, SD , k costituiscono vna sola retta linea. Nell'istesso modo si prouerà, che la retta BR è vguale alla retta RE , e che le due BR, RE costituiscono vna sola retta linea. In oltre perche i lati ED, BH , sono vguali, e paralleli al lato FC ; i due BH, ED , faranno frà di loro vguali, e paralleli: per la qual cosa le rette BE, HD , m che congiungono gli estremi, sono frà di loro vguali, e parallele, e le loro metà BR, SD , sono frà di loro vguali, e parallele. E perche le parallele BE, HD , sono segate dalle rette BD, RS , n perciò sono in vn medesimo piano; ed in cōseguenza le rette BD, RS , si segano scambievolmente in qualche punto T . Di più, essendo le rette BE, HD , parallele, e sono segate dalla retta BD , gli angoli alterni TDS, TBR , o sono frà di loro vguali. Si considerino i triangoli TRB, TSD . Perche l'angolo TDS è vguale all'angolo TBR , e gli angoli al vertice STD, RTB , p sono frà di loro vguali, i due angoli STD, SDT , faranno vguali à i due angoli RTB, RBT ; il lato SD è dimostrato vguale al lato RB ; i due rimanenti lati ST, TD , q faranno vguali à i restanti due lati RT, TB ; cioè ST sarà vguale ad RT , e la retta DT sarà vguale à TB , ch'era da dimostrarsi.

COROLLARIO.

Appare da quel che si è detto, che tutte le diagonali d'un parallelepipedo si segano scambievolmente in due parti vguali in vn sol punto; Come per essemplio nel punto T , doue tutti sono segati dalla commune setzione RS in due parti vguali.



b 33. del 11.
c 30. del 1.

d 35. defin.
del 2.
e 34. del 1.

f 29. del 1.

g 4. del 1.

h 13. del 1.
k 14. del 1.

l 9. del 12.

m 33. del 1.

n 7. del 11.

o 29. del 1.


p 15. del 1.

q 16. del 1.

THEOREMA XXXV. PROPOSITIONE XXXX.

Se due prismi hanno vguale altezze, e di essi vno habbia per base vn parallelogrammo, e l'altro vn triangolo, ed il parallelogrammo sia il doppio del triangolo; quei due prismi faranno frà di loro vguali.

Siano i due prismi vgualmente alti ABCDEF, GHIKLM, il primo de' quali habbia per base il parallelogrammo DCFE, e la base dell'altro sia il triangolo MLK; e sia il parallelogrammo DCFE il doppio del triangolo MLK. Dico che il prisma ABCD EF è vguale al prisma GHI KLM. Co'i due lati BD, DC, si compisca il parallelogrammo DN, ed haueremo i tre parallelogrammi DN, DF, DA. Si facciamo gli opposti, in modo, che si compisca il parallelepipedo DO. Di nouo co'i due lati ML, LK, si faccia il parallelogrammo LQ, e si compisca il parallelepipedo LP; haueranno i parallelepidi CA, LP, le medesime altezze de' prismi, e perciò saranno vgualmente alti. Perche il parallelogrammo LQ è il doppio del triangolo MLK, ed il parallelogrammo CE, per ipotesi, è il doppio del medesimo triangolo MLK; farà il parallelogrammo LQ vguale al parallelogrammo CE; ma le altezze de' proposti parallelepidi, per ipotesi, sono frà loro vguali; i parallelepidi dunque CA, LP, che hanno le basi vguali, e l'altre vguali, b sono frà di loro vguali. E perche il piano BCFA diuide il parallelepipedo AC^c in due parti vguali; ed il piano HMKI diuide il parallelepipedo LP in due parti vguali; si come tutto il parallelepipedo AC è vguale à tutto il parallelepipedo LP, così la metà dell'vno, cioè il prisma ABCDEF, è vguale alla metà dell'altro, cioè al prisma GHIKLM, come fu proposto dimostrare.



a 34. del 11.

b 36. del 11.

c 18. del 11.

Fine del Vndecimo Elemento.

EVCLIDE RESTITVTO

D A

VITALE GIORDANI

ELEMENTO DVODECIMO.




THEOREMA I. PROPOSITIONE I.

I poligoni simili descritti ne i circoli, sono frà di loro, come i quadrati de i diametri.



SI A N O i poligoni simili ABCDE,FGHIK, descritti ne i circoli ABLD, FGMI, i di cui diametri siano AL,FM. Dico che il poligono ABCDE al poligono FGHIK è come il quadrato del diametro AL al quadrato del diametro FM. Perche i poligoni ABCDE,FGHIK, per ipotesi, sono simili, perciò ^a faranno equiangoli, ed i lati intorno à gli angoli vguali sono proporzionali. Sia, dunque l'angolo ABC vguale all'angolo FGH; si tirino le rette AC,FH. Essendo AB à BC, come FG à GH, i triangoli ABC,FGH ^b faranno equiangoli, e farà l'angolo ACB vguale all'angolo FHG. Si tirino le rette BL,GM. Gli angoli BCA,BLA, ^c che sono nella medesima portione BCDA, sono frà di loro vguali; e similmente gli angoli GHF,GMF, nella medesima portione GMKF, sono frà di loro vguali: ma gli angoli BCA,GHF, furono dimostrati vguali; gli angoli dunque BLA, GMF, saranno frà di loro vguali. E perche gli angoli LBA, MGF, ne i semicircoli ABL,FGM, ^d sono frà di loro vguali, stante che sono retti, faranno i due angoli ALB, ABL, del triangolo ALB, vguali à i due angoli FMG, FGM, del triangolo FMG; ed il rimanente angolo BAL ^e farà vguale al restante angolo GFM; dal che i triangoli ABL,FGM, sono equiangoli; e farà AL ad AB ^f come FM ad FG; e permutando, AL ad FM ^g farà come BA ad FG. S'intendano sopra i diametri AL,FM, descritti due quadrati. Perche i quadrati sono poligoni simili, ed i poligoni simili



a 1. defin.
del 6.

b 6. del 6.

c 21. del 3.

d 31. del 3.

e 32. del 1.

f 4. del 6.

g 16. del 5.

P p p p


ABCDE,

h 22. del 6. ABCDE,FGHIK sono descritti sopra i lati homologhi AB,FG, essendo AL ad FM, come AB ad FG, sarà il quadrato del diametro AL al quadrato del diametro FM, ^h come il poligono ABCDE al simile poligono FGHK, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA II. PROPOSITIONE II.

I cerchi hanno l'istessa proportione, che i quadrati de i loro diametri.

Siano i due cerchi ABCD, EFGH, i di cui diametri siano le rette AC, EG. Dico che il quadrato del diametro AC al quadrato del diametro EG è come il circolo ABCD, al circolo EFGH; ouero, che il quadrato del diametro AC al quadrato del diametro EG è come il circolo ABCD ad vna quantità vguale al circolo EFGH.



Se il quadrato del diametro AC al quadrato del diametro EG non è come il circolo ABCD ad vna quantità vguale al circolo EFGH, sia, se è possibile, il quadrato del diametro AC al quadrato del diametro EG, come il circolo ABCD ad vn'altra quantità I, la quale ò sia minore, ouero maggiore del circolo EFGH; e supposto prima che la quantità I sia minore del circolo EFGH, per quanto è il piano K, saranno i due I, & K, insieme giunti, vguale al circolo EFGH.

a 6. del 4. S'iscritta nel circolo EFGH il quadrato EFGH, il quale per lo Scolio alla 9. propositione del 4. farà la metà del quadrato circoscritto intorno al medesimo circolo. Hor perche il quadrato circoscritto è maggiore del circolo, la metà del quadrato circoscritto sarà maggiore della metà del circolo EFGH: ma il quadrato EFGH è la metà del quadrato circoscritto; farà il quadrato EFGH maggiore della metà del circolo EFGH. Si diuidano gli archi FE, EH, HG, GF, ^b in due parti vguale ne i punti L, O, N, M, e si tirino le rette EL, LF, FM, MG, GN, NH, HO, OE; dal centro X al punto L si tiri la retta XL, la quale segnerà la retta FE in qualche punto Y; e nel punto L si ponga la retta VLT, che faccia angoli retti colla retta XL; toccherà la retta VT ^c il circolo nel punto L; si tiri la retta XF. Perche gli archi FL, LE, sono fra di loro vguale, gli angoli LXF, LXE, e faranno fra di loro vguale. E perche i lati EX, XY, sono vguale à i due lati FX, XY, e gli angoli FXY, EXY, sono fra di loro vguale, sarà FY ^d vguale ad EY, e perciò la retta XL ^e sega la retta FE ad angoli retti in Y; per la qual cosa le rette VT, FE, ^f sono fra di loro parallele; e continuata la retta VT, sin che concorra co' i lati GF, HE, prolungati in T, ed V, sarà il quadrilatero VFET ^g parallelogrammo; il quale ^h farà il doppio del triangolo LFE. E perche il parallelogrammo VFET è mag-

b 30. del 3.
c 11. del 1.
d Corol. alla 16. del 3.
e 27. del 3.
f 4. del 1.
g 3. del 3.
h 28. del 1.
K 35. def. n. del 1.
l 41. del 3.

giore

giore della porzione FLE, la metà del parallelogrammo VFET farà maggiore della metà della porzione FLE: ma il triangolo FLE è la metà del parallelogrammo VFET, farà il triangolo LFE maggiore della metà della porzione FLE. Nell'istesso modo si dimostrerà, che tutti gli altri triangoli OEH, NHG, MGF, sono maggiori delle metà delle porzioni EOH, HNG, GMF; e perciò tutti i detti triangoli, insieme giunti, faranno maggiori di tutte le porzioni giunte insieme. Se di nuovo si diuidano gli archi EO, OH, HN &c. in due parti uguali, e si tirino le corde, che sottomettono quei piccioli archi, faranno in quelle picciole porzioni descritti altri triangoli, i quali giunti insieme, dimostreremo come prima si è fatto, che faranno maggiori delle metà delle porzioni, giunte insieme, e cò quest'ordine si proceda nell'altre porzioni, che restano fuori di questi triangoli. Hor dal circolo EFGH se ne detragga il quadrato EFGH, ch'è maggiore della metà; e dalle porzioni, che restano, se ne leuino i triangoli, che sono maggiori della metà di esse porzioni, e dall'altre porzioni, che restano, se ne leuino gli altri triangoli, che sono più della metà di esse porzioni, e con quest'ordine si proceda, fin che tutte le porzioni vltime restate, giunte insieme, s'iano minori della quantità K; e supposto che il tutto sia fatto, e le porzioni restate siano le notate EO, OH, HN, NG, GM, MF, FL, LE, le quali, giunte insieme, s'iano minori della quantità K. Perche le due K, ed I, giunte insieme, sono uguali al circolo EFGH, dalle due K, ed I, se ne leui la quantità K, e dal circolo se ne leuino le dette porzioni EO, OH, HN, NG &c. che sono minori di K, resterà il poligono ELFMGNHO, maggiore della quantità I. S'iscriua nel circolo ABCD il poligono APBQCRDS simile al poligono ELFMGNHO; il che si fa nell'istesso modo, col quale si è iscripto il poligono ELFMGNHO nel circolo EFGH; per l'antecedente proposizione, sarà il poligono APQRS al simile poligono ELMNO, come il quadrato del diametro AC al quadrato del diametro EG; ma il quadrato del diametro AC al quadrato del diametro EG, per ipotesi, è come il circolo ABCD alla quantità I, farà il poligono APQRS al poligono ELMNO, come il circolo ABCD alla quantità I; e permutando, il poligono APQRS al circolo ABCD, sarà come il poligono ELMNO alla quantità I: ma il poligono APQRS è minore del circolo ABCD, farà il poligono ELMNO minore della quantità I; fu dimostrato maggiore, sarà il poligono ELMNO maggiore, è minore della quantità I, ch'è impossibile. Non dunque la quantità I è minore del circolo EFGH; e perciò il quadrato del diametro AC al quadrato del diametro EG non è come il circolo ABCD ad vna quantità minore del circolo EFGH. Nell'istesso modo si dimostrerà, che il quadrato del diametro EG al quadrato del diametro AC, non è come il circolo EFGH ad vna quantità minore del circolo ABCD.

Di nuovo, supposto che la quantità I sia maggiore del circolo EFGH. Si concepisca la quantità I al circolo ABCD essere come il circolo EFGH ad vn'altra quantità, che per esempio sia K; permutando, farà la quantità I al circolo EFGH, come il circolo ABCD alla quantità K: ma la quantità I è posta maggiore del circolo EFGH, farà il circolo ABCD maggiore della quantità K; cioè la quantità K sarà minore del circolo

ma del 10.

n 11. del 5.

o 6. del 5.

p 4. del 5.

fatto


q 16. del 5.

r 24. del 5.

Corollario
4. del 5.

11. del 5.

ABCD. Perche il quadrato del diametro AC al quadrato del diametro EG, per costruzione, è come il circolo ABCD alla quantità I, inuertendo la quantità I al circolo ABCD: farà come il quadrato del diametro EG al quadrato del diametro AC, ma la quantità I al circolo ABCD, per costruzione, è come il circolo EFGH alla quantità K, farà il quadrato del diametro EG al quadrato del diametro AC, come il circolo EFGH alla quantità K, minore del circolo ABCD, ch'è contro à quello, che si è dimostrato antecedentemente. Non dunque la quantità I è maggiore del circolo EFGH, ne meno, per quel che si è dimostrato, è minore, in conseguenza la quantità I sarà vguale al circolo EFGH. Hor essendo il quadrato del diametro AC al quadrato del diametro EG, come il circolo ABCD alla quantità I, e la quantità I è vguale al circolo EFGH, farà il quadrato del diametro AC al quadrato del diametro EG, come il circolo ABCD al circolo EFGH, ch'era da dimostrarsi.



COROLLARIO.

Da quel che si è dimostrato è manifesto, che i circoli sono frà di loro come i simili poligoni iscritti in essi, stante che tanto i circoli, come i poligoni simili, descritti in essi, sono come i quadrati de i diametri.

THEOREMA III. PROPOSITIONE III.

Ogni Piramide di base triangolare si diuide in due Piramidi di basi triangolari, simili, ed vguali frà di loro, e simili à tutta la Piramide; & in due prismi vguali, che giunti insieme, sono maggiori della metà della Piramide.


10. del 1.

Sia la Piramide ABCD, la di cui base triangolare sia DBC, ed il vertice A; si diuidano tutti i lati di essa Piramide in due parti vguali ne i punti E, F, G, K, I, H, e si tirino le rette EF, FG, GE, KI, IH, HK, IG, HG, KE, HE, e farà diuisa la Piramide ABCD, nelle due Piramidi AEFG, GHID, le di cui basi sono i triangoli EFG, HDI, ed i vertici A; & G; e ne i due solidi EGIKBH, FGEKCI, i quali, come dimostreremo, sono prismi, cioè il prisma EGIKBH hà le faccie opposte EBK, GHI triangolari, e la base HBKI è parallelogrammo, e l'altro prisma FGEKCI hà per base il trian-

golo

golo IKC, al quale è opposto il triangolo EGF; e questi due prismi sono separati dal parallelogrammo EGIK, ch'è piano commune dell'vno, e l'altro. Dico che le due Piramidi AEF, GHID, sono frà di loro simili, ed vguali, ed ogn'vna è simile à tutta la Piramide ABCD, e che i due prismi EGIKBH,

FGEKCI, sono frà di loro vguali, e giunti insieme, sono maggiori della metà della Piramide ABCD. Perche i lati AD, AB, sono diuisi in due parti vguali in G, ed E, sarà la proporzione di AG à GD come quella di AE ad EB; per la qual cosa la retta EG sarà parallela al lato BD. Similmente essendo i lati AB, BD, diuisi in due parti vguali in E, & H, per la medesima ragione sarà EH parallela à GD. Parimente essendo i lati DA, DB, DC, diuisi in due parti vguali in G, H, ed I, per le cose dette, la retta HG è parallela ad AB, la retta GI è parallela ad AC, e la retta HI è parallela al lato BC. E finalmente, essendo i lati CD, DB, BC, diuisi in due parti vguali in H, K, ed I, la retta KI sarà parallela à BD, e la retta HK è parallela à DC; e perciò tanto il quadrilatero EHDG, quanto il quadrilatero EBHG, ed il quadrilatero GICE, come il quadrilatero HBKI, è parallelogrammo; e sarà GD vguale ad EH, la retta EG vguale ad HD, EG sarà vguale ad HB, e la retta GH vguale ad EB, ouero AE; e similmente HI sarà vguale à BK, la retta IG vguale ad FC, ouero AF, e la retta GF vguale ad IC, ouero DI. Si considerino i due triangoli AGE, GDH, de' quali i lati AG, GE, sono vguali à i due lati GD, DH, la base AE è vguale alla base GH, sarà il triangolo AGE vguale ed equiangolo al triangolo GDH; dalche i lati intorno à gli angoli vguali sono proporzionali, e perciò sono fra loro simili. Nell'istesso modo si dimostrerà, che i triangoli AGE, GDI, sono frà loro simili, ed vguali. In oltre, perche le rette HD, DI, sono parallele alle due EG, GF, sarà l'angolo HDI vguale all'angolo EGF. Ne i triangoli EGF, HDI, i due lati HD, DI, sono stati dimostrati vguali à i due lati EG, GF, e l'angolo HDI vguale all'angolo EGF, sarà la base HI vguale alla base EF, i rimanenti angoli DHI, DIH, saranno vguali à i restanti angoli GEF, GFE, ed il triangolo DHI vguale al triangolo GEF. E perche i triangoli GEF, DHI, sono equiangoli, haueranno perciò i lati intorno à gli angoli vguali proporzionali, ed in conseguenza si faranno frà loro simili; si che i triangoli GEF, DHI, sono frà loro simili, ed vguali. Si considerino i triangoli AEF, GHI, de' quali i due lati EA, AF, per quel che si è dimostrato, sono vguali,



b2. del 6.

d 54. del 1.

d 5. e 4. del 1.

e 4. del 6.

f 10. del 11.

g 4. del 1.

h 4. del 6.

k 7. del 6.

del 6.

18. e 4. del
7.
m 4. del 6.

n 10. del 10.

o 4. del 4.
p 1. defn.
del 6.

q 9. defn.
del 11.

r 11. del 6.
s 10. del 11.
t 4. del 6.

u 9. defn.
del 11.

x 2. del 6.
y 9. del 11.

z 3. del 11.

a 2. & 4. del
b 4. del 6.
c 1. defn.
del 6.


à i due lati HG, GI , la base EF è vguale alla base HI , sarà il triangolo AEF vguale, ed equiangolo al triangolo GHI , e perciò sono frà loro simili, ed vguali. Hor essendo i quattro triangoli AGE, AGF, AEF, EGF , simili, ed vguali à i quattro triangoli GDH, GDI, GHI, DHI , le piramidi $AEFG, GHID$,

contenute da quelli, sono frà di loro simili, ed vguali. Di più essendo i lati HG, GI, IH , paralleli à i lati BA, AC, CB , sarà l'angolo HGI vguale all'angolo BAC , l'angolo GIH sarà vguale all'angolo ACB , e l'angolo GHI sarà vguale all'angolo ABC ; dal che i triangoli GHI, ABC , sono equiangoli, hanno i lati intorno à gli angoli vguali $\propto$ proporzionali, e perciò sono simili frà loro.

Nel triangolo DAB la retta GH è dimostrata parallela ad AB , e per il Coroll. alla 4. del 6, i triangoli DGH, DAB , sono simili frà loro. Parimente essendo GI parallela ad AC , sarà il triangolo DIG simile al triangolo DCA ; ed essendo HI parallela al lato BC , sarà il triangolo DHI simile al triangolo DBC : sì che i quattro triangoli GHI, GDH, GDI, DHI , sono simili à i quattro triangoli ABC, ADB, ADC, DCB ; e perciò la piramide $GHID$ sarà simile alla piramide $ABCD$. Di più, essendosi dimostrato, che il triangolo DBC è simile al triangolo DHI , e che il triangolo GEF è simile al medesimo triangolo DHI , i triangoli DBC, GEF , faranno frà di loro simili. E perche le rette EG, GF, EF , sono parallele à i lati DB, DC, BC , sarà il triangolo AGE simile al triangolo ADB , il triangolo AGF simile al triangolo ADC , ed il triangolo AEF sarà simile al triangolo ABC ; dal che le piramidi $AEFG, ABDC$ sono simili frà di loro. Per la qual cosa le piramidi $AEFG, GHID$, sono simili, ed vguali frà di loro, ed ogn'una è simile à tutta la piramide $ABCD$, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

Di nuovo, perche i lati BA, BC , sono divisi in due parti vguali in E , & K , sarà BK à KC come BE ad EA , e perciò le rette EK, FC sono frà di loro parallele; sù mostrata GI parallela ad FC , sarà EK parallela ad IG ; e perche le rette EG, GF, EF , furono dimostrate parallele alle tre BD, DC, CB , i quadrilateri $EKIG, GICF, EKCF$ sono parallelogrammi, ed in conseguenza i loro lati opposti sono frà di loro vguali. Per la qual cosa i lati EG, GF, EF , sono vguali, e paralleli à i lati KI, IC, CK , ed i triangoli GEK, IKC , sono frà loro equiangoli, vguali, e paralleli; ed essendo equiangoli, i lati intorno à gli angoli vguali sono proporzionali, e perciò sono frà loro simili. Hor essendo i triangoli EGF, KIC , frà

loro




loro simili, vguali, è paralleli, ed i quadrilateri EKIG, GFCL, FCKE, sono parallelogrammi, per la definizione 13. di questo, il solido EGFCKI è prisma. Similmente essendo i tre lati EB, BK, KE vguali, e paralleli à i tre lati GH, HI, IG, i triangoli EBK, GHI ^d faranno simili, vguali, e paralleli. E perche i quadrilateri EKIG, EBHG, BHIK, furono dimostrati parallelogrammi, per la citata definizione 13. di questo, il solido GEBKIH è ancora prisma, la di cui base è il parallelogrammo HBKI, il quale è ^e il doppio del triangolo HKI, cioè il doppio del triangolo IKC. E perche gli antedetti prisma sono frà i piani paralleli EGF, DBC, cioè hanno vna medesima altezza, essendo la base parallelogramma BI il doppio della base triangolare IKC, sarà il prisma GEBKIH ^f vguale al prisma GEFCIK. Finalmente nel parallelogrammo KD il lato HK ^g è vguale al lato DI, fù dimostrato il lato BK vguale al lato HI, ed il lato BH, per costruzione, è vguale al lato HD, i tre lati dunque BH, HK, KB, sono vguali à i tre lati HD, DI, IH, dal che i triangoli HBK, DHI, ^h sono frà loro equiangoli, ed vguali; ed essendo equiangoli, hanno i lati ^k intorno à gli angoli vguali proportionali, e perciò ⁱ sono simili. Parimente essendo i quadrilateri EBHG, EHDG, parallelogrammi, sarà EB ^m vguale ad HG, ed il lato EH sarà vguale al lato GD: ma BH è vguale ad HD, i tre lati dunque EH, HB, BE, sono vguali à i tre lati GD, DH, HG; e per le ragioni antedette, sarà il triangolo EHB ⁿ simile, ed vguale al triangolo GDH; ed oltre à ciò, essendo i tre lati EH, HK, KE, vguali à i tre lati GD, DI, IG, saranno i triangoli EHK, GDI ^o frà loro simili, ed vguali; e tutta la piramide EHBK ^p sarà simile, ed vguale alla piramide GDHI. E perche il prisma GEBKIH, che hà la base parallelogramma, è maggiore della piramide EBKH, stante che la contiene, sarà il medesimo prisma maggiore della piramide GHID: ma il prisma EGFCKI di base triangolare è vguale al prisma GEBKIH, sarà il prisma di base triangolare EGFCKI maggiore della piramide GHID, cioè maggiore della piramide AEFG. Per la qual cosa i due prismi GEBKIH, GEFCKI, giunti insieme, sono maggiori delle due piramidi GHID, AEFG; ed in conseguenza sono maggiori della metà di tutta la piramide ABCD, il che era da dimostrarfi.

L E M M A.

Se faranno due piramidi di basi triangolari, e d'vguali altezze, ogn'vna delle quali sia diuisa in due piramidi simili, ed vguali frà loro, e simili à tutta la piramide, et in due prismi vguali frà loro, che giunte insieme, siano maggiori della metà della piramide, come si disse nell'antedente propositione; ciascun prisma in vna, al corrispondente prisma nell'altra, sarà come la base di tutta la piramide alla base dell'altra piramide.

Siano le piramidi $ABCD, EFGH$, le di cui basi triangolari siano DBC, HF . Se l'altezza uguale siano le perpendicolari AI, EK , ed ogn'una di esse piramidi sia divisa in due piramidi, e due prismi, secondo le condizioni dell'antecedente proposizione. Dico che il prisma $LMNCRS$ al prisma $OPQGTU$ è come la base della piramide $ABCD$ alla base della piramide $EFGH$; cioè come la base DBC alla base HFG . Perché i piani LMN, BDC , per quel che fu dimostrato nell'antecedente proposizione, sono paralleli, perciò segano le rette AI, AC , ^a proporzionalmente, e sarà AN ad NC come AX ad XI : ma AN , per costruzione, è uguale ad NC , sarà AX uguale ad XI . Nell'istesso modo si prouerà, che ET è uguale ad TK ; e perché tutta l'altezza AI è supposta uguale all'altezza EK , perciò la metà XI sarà uguale alla metà TK ; dal che i prismi $LMNCRS, OPQGTU$, sono ^b come le basi RSC, VTG . Si dimostrerà, come si fece nell'antecedente proposizione, che le rette RS, TV , sono parallele a i lati DB, HF , sarà il triangolo DBC simile al triangolo SRC , ed il triangolo HFG sarà simile al triangolo VTG . In oltre perché i lati BC, FG , sono divisi in due parti uguali in R, T , sarà BC a CR come FG a GT , per la qual cosa il triangolo DBC al simile triangolo SRC sarà come il triangolo FHG al simile triangolo VTG ; e permutando, il triangolo DBC al triangolo HFG è come il triangolo SRC al triangolo VTG : ma il triangolo SRC al triangolo VTG è come il prisma $LMNCRS$ al prisma $OPQGTU$; sarà il prisma $LMNCRS$ al prisma $OPQGTU$, ^c come il triangolo DBC al triangolo HFG : Ma i prismi $LMNCRS, OPQGTU$, sono uguali a i prismi $MLRBZS, PQTUV$, il prisma ancora $MLRBZS$ al prisma $PQTUV$ sarà, come la base BDC alla base FHG , e b'era da dimostrarsi.



a 17. del 11.

b Corol. alla 3^a del 11.

c Corol. alla 4^a del 6^o.

d 12. del 6.
e 15. del 5.

f 11. del 5.


THEOREMA IV. PROPOSITIONE IV.

Se saranno due piramidi di uguali altezze, che habbiano le basi triangolari, ed ogn'una di esse sia divisa in due piramidi simili, ed uguali fra loro, e simili a tutta la piramide, & in due prismi uguali, che, giunti insieme, siano maggiori della metà di tutta la piramide; ed ogn'una di quelle piramidi, che risulta da tal divisione, sia divisa in due altre piramidi, e due prismi, come la prima; e le piramidi, che risultano da questa divisione, siano similmente divise in due piramidi, e due prismi, come prima, e con-

quest'

quest'ordine in infinito; tutti i prismi, che risulteranno da queste diuisioni in vna piramide, giunti insieme, à tutti i prismi nell'altra piramide, sono come la base della piramide alla base dell'altra piramide.

Sopra le basi triangolari DBC, HFG, siano costruire le piramidi ABCD, EFGH, di vguale altezze, ed ogn' vna sia diuisa, come nella terza proposizione, in due piramidi simili, ed vguale, e simile à tutta la piramide, & in due prismi frà loro vguale, che giunti insieme, siano maggiori della metà di tutta la piramide, e le piramidi in vna di esse siano le no-




tate AIKL, LOND, e nell'altra siano EPQR, RVTH; parimente i prismi in vna di esse siano i notati LIBMNO, ILKCMN, e nell'altra siano RPFSTV, PRQGST; e di nouo ogn'vna delle piramidi AIKL, LOND, EPQR, RVTH, sia similmente diuisa in due piramidi, e due prismi, come prima: ed ogn'vna delle piramidi, che risultano da questa diuisione, si diuida parimente in due piramidi, e due prismi, nell'istesso modo di prima, e con quest'ordine si proceda in infinito. Dico che tutti i prismi, che si fanno nella piramide ABCD à tutti i prismi, che si fanno nella piramide EFGH, sono come la base DBC alla base HFG. Perche le piramidi AIKL, LOND sono frà di loro simili, ed vguale, sarà la base ILK a vguale alla base ODN: ma il triangolo ILK è vguale al triangolo MNC, stante che sono le basi opposte del prisma, sarà il triangolo DON vguale al triangolo MNC. Nell'istesso modo si dimostrerà, che il triangolo HVT è vguale al triangolo TSG. Si dimostri come si fece nell'antecedente Lemma, che il triangolo DBC al triangolo HFG è come il triangolo NMC al triangolo TSG, sarà ancora il triangolo DBC al triangolo HFG, come il triangolo LIK al triangolo PRQ, e sarà il triangolo DBC al triangolo HFG come il triangolo DON al triangolo HVT. Di nouo il prisma ILKCMN al prisma PRQGST, per l'antecedente Lemma, è come la base DBC alla base HFG, ed il prisma LIBMNO al prisma RPFSTV è come la base BDC alla base HFG, faranno gli antecedenti insieme, cioè l'aggregato de i due prismi LIBCKD, à i conseguenti insieme, ch'è l'aggregato de gli altri due prismi RPFQGH, e come l'antecedente BDC al conseguente FHG. Nell'istesso modo si dimostrerà, che i prismi nella piramide AIKL, giunti insieme, à i prismi nella piramide EPQR, giunti insieme, sono come la base ILK alla base PRQ, cioè come la base BDC alla base HFG: e similmente tutti i prismi nella piramide LOND à tutti i prismi nella piramide RVTH, e sono come la

a ro. d'efin.
del 11.
b 37. d'efin.
del 11.

e 31. del 5.

d'11. del 5.

basse ODN alla base HVT, cioè come la base BDC alla base FHG. Nell'istesso modo si prouerà, che tutti i prismi in ogn'altra piramide fatta in ABCD à tutti i prismi nella corrispondente piramide fatta in EFGH, essere come la base BDC alla base FHG, e per la 12. propositione del 5. tutti gli antecedenti insieme, che sono i prismi fatti nella piramide ABCD, à tutti i conseguenti insieme, che sono i prismi fatti nella piramide EFGH, faranno come l'antecedente BDC al conseguente FHG. Per la qual cosa tutti i prismi à tutti i prismi sono come la base BDC alla base FHG, ch'era da dimostrarsi.



THEOREMA V. PROPOSITIONE V.

Le piramidi di basi triangolari, che hanno la medesima altezza, sono come le loro basi.

Sopra le basi triangolari DBC, FHG, siano costituite le piramidi d'uguali altezze ABCD, EFGH. Dico, che la base DBC alla base FHG è come le piramidi ABCD alla piramide EFGH, cioè come la piramide ABCD ad una quantità uguale alla piramide EFGH. Se la base BDC alla base FHG non è come la piramide ABCD ad una quantità uguale alla piramide EFGH, s'intenda la base DBC alla base FHG essere come la piramide ABCD alla quantità X, la quale è sarà minore, o maggiore della piramide EFGH. Sia nel primo luogo la quantità X minore della piramide EFGH, per quanto è il solido Z, in modo, che i due solidi X, & Z, giunti insieme, siano uguali alla piramide EFGH. Si diuidi la piramide EFGH nelle due piramidi EPQR, RVTH, simili, ed uguali fra di loro, ed ogn'una simile à tutta la piramide EFGH, e ne i due prismi RPFSTV, PRQGST, uguali fra di loro, e che, giunti insieme, siano maggiori della metà della piramide EFGH, nel modo, che si fece alla terza propositione di questo: E similmente sia diuisa ogn'una delle piramidi EPQR, RVTH, in due piramidi, e due prismi, nel modo fatto alla citata 3. propositione di questo, ed ogn'una di quelle piramidi, che risultano da questa diuisione, si diuidano in due altre piramidi, e due prismi, come prima, e con quell'ordine si proceda fin che le piramidi, che risultano dall'ultima diuisione, giunte insieme, s'iano minori del solido Z: e supposto, che, fatta questa successiua diuisione, le piramidi restate siano EPQR, RVTH,

21. del 10.


le

le quali, giunte insieme, siano minori del solido Z. Perche i due solidi Z ed X, giunti insieme, sono vguali alla piramide EFGH, derratto da i due solidi Z ed X, il solido Z, e dalla piramide EFGH detrattane le piramidi EPQR, RVTH, che sono minori del solido Z, restano i due prismi RPF STV, PRQGST, maggiori del solido X. Sia poi diuisa la piramide ABCD nel modo, ch'è stata diuisa la piramide EFGH, per l'antecedente propositione, i prismi, che sono nella piramide ABCD, à i prismi, che sono nella

piramide EFGH, hanno l'istessa proportion, quale hà la base DBC alla base HFG: ma la base DBC alla base HFG è come la piramide ABCD al solido X, saranno i prismi, fatti nella piramide ABCD, à i prismi fatti nella piramide EFGH, come la piramide ABCD al solido X; e permutando, i prismi nella piramide ABCD alla piramide EFGH, e saranno come i prismi nella piramide EFGH al solido X:

ma i prismi nella piramide ABCD sono minori della medesima piramide ABCD, faranno i prismi nella piramide EFGH ^d minori del solido X: e perche i prismi nella piramide EFGH furono dimostrati maggiori del solido X, farebbero i prismi della piramide EFGH maggiori, e minori del solido X. Non dunque il solido X è minore della piramide EFGH; e perciò la base DBC alla base HFG non è come la piramide ABC ad vna quantità minore della piramide EFGH: Nell'istesso modo si dimostrerà, che la base HFG alla base DBC non è come la piramide EFGH ad vna quantità minore della piramide ABCD.

Di nouo, supposto, che X sia maggiore della piramide EFGH, s'intenda come X alla piramide ABCD, così la piramide EFGH ad vn'altra quantità, che per essemplio sia il solido Z; e permutando, sarà il solido X alla piramide EFGH, e come la piramide ABCD al solido Z: ma il solido X, per suppositione, è maggiore della piramide EFGH, sarà la piramide ABCD ^e maggiore del solido Z, cioè il solido Z farà minore della piramide ABCD. In oltre, perche la base DBC alla base HFG, per ipocriti, è come la piramide ABCD al solido X, inuertendo, sarà il solido X alla piramide ABCD, e come la base HFG alla base DBC; ma il solido X alla piramide ABCD, per costruzione, è come la piramide EFGH al solido Z, sarà la base HFG alla base DBC, ^h come la piramide EFGH al solido Z, ch'è minore della piramide ABCD; il che è contro à quel che si è dimostrato. Non dunque il solido X è maggiore della piramide EFGH, uel meno, per quel che si è dimostrato, è minore, & in conseguenza il solido X



b 11. del 5.

c 16. del 5.

d 14. del 5.

e 16. del 5.

f 14. del 5.

g Coroll. al. 4. del 6.


h 11. del 5.

è vguale alla piramide EFGH . E perche la base DBC alla base HFG è come la piramide ABCD al solido X , essendo il solido X vguale alla piramide EFGH, sarà la base DBC alla base HFG, come la piramide ABCD alla piramide EFGH , eh'era da dimostrarfi.

THEOREMA VI. PROPOSITIONE VI.

Le piramidi di vguali altezze , che hanno le basi poligone , sono frà loro come le basi.

Siano le piramidi d'vguali altezze ABCDEF, GHIKL, le di cui basi FBCDE, LHIK siano di molti lati, cioè di più di tre lati. Dico, che la piramide ABCDEF alla piramide GHIKL è come la base BCDEF, alla base HIKL . Da gli angoli F, ed L, à gli angoli opposti si tirino le rette FC, FD, LI, in modo, che le basi BCDEF, HIKL siano diuise in triangoli, faranno diuise le piramidi ABCDEF, GHIKL, in tante piramidi di basi triangolari, per quanti triangoli sono nelle basi BCDEF, HIKL . Perche le piramidi ABCF, ACDF, di basi triangolari, hanno la medesim' altezza, per l'antecedente propositione, la piramide ABCF alla piramide ACDF, è come la base FBC alla base FCD; e componendo, la piramide ABCDF alla piramide



a 15. del 5.

b 11. del 5.

c 18. del 5.

d Coroll. al
la 4. del 6.

e 22. del 5.


f 12. del 5.

ACDF, sarà come la base BCDF alla base FCD; ma la piramide ACDF alla piramide d'vguale altezza ADEF, è come la base CDF alla base FDE; per l'vgualità, la piramide ABCDF alla piramide ADEF^b sarà come la base BCDF alla base FDE; e componendo, tutta la piramide ABCDEF alla piramide ADEF, c' sarà come la base BCDEF alla base FDE. Nell'istesso modo si prouerà, che la piramide GHIKL alla piramide GIKL è come la base HIKL alla base LIK; ed inuertendo, la piramide GIKL alla piramide GHIKL, d' è come la base LIK alla base HIKL. In oltre, perche la piramide ABCDEF alla piramide ADEF è come la base BCDEF alla base FDE, e la piramide ADEF alla piramide d'vguale altezza GIKL, è come la base FDE alla base LIK per l'vgualità, la piramide ABCDEF alla piramide GIKL, e sarà come la base BCDEF alla base LIK; ma la piramide GIKL alla piramide GHIKL è come la base LIK alla base HIKL; sarà, per l'vgualità, la piramide ABCDEF alla piramide GHIKL, f come la base BCDEF alla base HIKL, eh'era da dimostrarfi.

THEOREMA VII. PROPOSITIONE VII.

Ogni prisma di basi triangolari si diuide in tre vguali piramidi di basi triangolari.

Sia il prisma $ABCDEF$, le di cui basi triangolari siano gli opposti triangoli ABC , FED . Dico, che il prisma $ABCDEF$ si diuide in tre piramidi vguali di basi triangolari. Ne i tre parallelogrammi $BEDC$, $DCAF$, $ABEF$, si tirino le diagonali BD , CF , FB , sarà il triangolo BED ^a vguale al triangolo BDC ; e nel parallelogrammo $AFDC$, il triangolo APC sarà vguale al triangolo CFD . Si considerino le due piramidi, le di cui basi sono i triangoli BED , BDC , ed il vertice F ; cioè le piramidi $FBED$, $FDCB$, le quali hanno vna medesima altezza; e sarà la piramide $FEDB$ alla piramide $FDCB$, ^b come la base BED alla base BDC : ma le basi BED , BDC , sono state dimostrate vguali. Le piramidi dunque $FEDB$, $FDCB$ ^c sono frà di loro vguali. Di nouo si considerino due altre piramidi, le di cui basi sono i triangoli FDC , FCA , ed il vertice B , cioè le piramidi $BD CF$, $BFCA$, le quali hanno vna medesima altezza, sarà la piramide $BFDC$ alla piramide $BFCA$, ^d come la base FDC alla base FCA : ma le basi FDC , FCA , per quel che si è dimostrato, sono frà di loro vguali, in conseguenza le piramidi $BFDC$, $BFCA$, ^e sono frà di loro vguali; ma la piramide $BFDC$ fu dimostrata vguale alla piramide $BFED$; le tre piramidi dunque $BFED$, $BFDC$, $BFCA$, sono frà di loro vguali, ch'era dimostrarfi.



a 34. del 1.

b 5. del 12.

c 14. del 5.

d 5. del 12.

e 14. del 5.

COROLLARIO.


Dall'antecedente proposizione si caua, che ogni piramide è la terza parte del prisma vgualmente alto, e che hà la medesima base.

Sopra la base poligona $BCDE$ sia posta la piramide $ABCDE$, ed il prisma vgualmente alto $ACDH$, ed i piani opposti AG , BD , siano diuisi in triangoli di numero vguale colle rette HF , EC , sarà diuiso il prisma $ACDH$ in tanti prismi di basi triangolari, per quanti sono i triangoli nella base $BCDE$; e sarà diuisa la piramide $ABCDE$ in tante piramidi di basi triangolari, per quanti sono i triangoli in essa base $BCDE$; si tirino le rette DF , EF , se si considerino le due

trian-

f. 5. del 12.
8c. 14. del 3.

piramidi ACDE, FCDE, le quali hanno la medesima base CDE, e sono sotto la medesima altezza, perciò sono fra di loro uguali: ma la piramide FCDE, per l'antecedente proposizione, è la terza parte del prisma FCDGH, sarà la piramide ACDE la terza parte del prisma FCDGH; per la qual cosa la piramide di base triangolare è la terza parte del prisma ugualmente alto, e che ha la medesima base. In oltre, perchè la piramide ABCE, per l'antecedente proposizione, è la terza parte del prisma HAFECB, e la piramide ACDE è la terza parte del prisma FCDGH, sarà tutta la piramide ABCDE la terza parte di tutto il prisma ABCDGH. Il medesimo si dimostrerà se nella base




BCDE faranno più triangoli, poichè in quanti triangoli è divisa la base BCDE, in tanti prismi di basi triangolari sarà diviso il prisma ABCDGH, ed in altrettante piramidi sarà divisa la piramide ABCDE, ogn'una delle quali sarà la terza parte di quel prisma posto sopra la medesima base; e perciò tutta la piramide, composta di quelle piramidi di basi triangolari, sarà la terza parte di tutto il prisma, composto di quei prismi di basi triangolari. D'onde si conclude, che ogni piramide è la terza parte del prisma ugualmente alto, e che ha la medesima base, come si disse. Intendasi però di quei prismi, la di cui base sia uno di quei piani opposti, che nel prisma deueno essere simili, uguali, e paralleli.

THEOREMA VIII. PROPOSITIONE VIII.

Le simili piramidi di basi triangolari sono in triplicata proportion de i loro lati homologhi.

Siano le simili piramidi ABCD, EFGH, le di cui basi siano i triangoli BCD, FGH, e siano le basi BCD, FGH, simili fra loro; per la similitudine delle piramidi, gli altri triangoli in vno faranno simili à gli altri triangoli nell'altro: sia dunque il triangolo ACD simile al triangolo EGH, il triangolo ABC simile al triangolo EGF, ed il triangolo ABD simile al triangolo EFH. Dico, che la piramide ABCD alla piramide EFGH, ha triplicata proportion, che il lato homologa CD al lato homologa GH. Co'i lati AC, CD, si faccia il parallelogrammo CI; co'i



due

a guisa
del 11.

due AC, CB, si faccia il parallelogrammo CL, e co' i due lati BC, CD, si faccia il parallelogrammo CK; si compisca il parallelepipedo LCDM. Nell'istesso modo si compisca il parallelepipedo PGHQ. Si tirino le diagonali LI, PN. Il parallelogrammo LBDI^b divide il parallelepipedo LCDM ne i due prismi LAIDCB, LMIDKB, vguali frà loro, e di bafi triangolari, e farà tutto il parallelepipedo LCDM à tutto il parallelepipedo PGHQ, e come il prisma LAIDCB al prisma PENHGF. E perche la piramide ABCD^d è la terza parte del prisma LAIDCB, e la piramide EFGH è la terza parte del prisma PENHGF, i detti prismi saranno vguali multipli di esse piramidi, e farà il prisma LAIDCB al prisma PENHGF, e come la piramide ABCD, alla piramide EFGH. In oltre, perche i triangoli ACD, EGH, sono frà loro simili, sarà l'angolo ACD uguale all'angolo EGH, e la proportionione di AC à CD, come quella di EG, à GH; per la qual cosa i parallelogrammi CI, GN, sono frà loro simili. Parimente essendo i triangoli ACB, EGF, frà loro simili, per le ragioni antedette, i parallelogrammi CL, GP, sono frà loro simili; ed essendo i triangoli BCD, FGH, frà loro simili, per l'istessa ragione i parallelogrammi CK, GO, sono frà loro simili; dal che i tre parallelogrammi CI, CL, CK, sono simili à i tre corrispondenti parallelogrammi GN, GP, GO; gli opposti sono simili à questi, e perciò il parallelepipedo LCDM sarà simile al parallelepipedo PGHQ; e per la proposizione 33. dell'11. il parallelepipedo LCDM al parallelepipedo PGHQ, hà triplicata proportionione di quella, che hà il lato homologo CD al lato homologo GH: ma il parallelepipedo LCDM al parallelepipedo PGHQ è come il prisma LAIDCB al prisma PENHGF, ed il prisma LAIDCB al prisma PENHGF, è come la piramide ABCD alla piramide EFGH, hauerà la piramide ABCD alla piramide EFGH, triplicata proportionione di quella, che hà il lato homologo CD al lato homologo GH, il che era da dimostrarsi

b 3. del 11.

e 15. del 5.
d 7. del 12.

e 15. del 5.


f 1. definit.
del 6.g 9. definit.
del 11.

h 11. del 5.

S C O L I O.

Coll'antecedente propositione facilmente si dimostra, che le piramidi simili, le di cui bafi siano più di tre lati, sono in triplicata proportionione de i loro lati homologhi.

Siano le piramidi ABCDEF, GHIKLM, simili frà di loro, le di cui bafi siano i simili poligoni BCDEF, HIKLM. Dico, che la piramide ABCDEF alla piramide GHIKLM hà triplicata proportionione di quella, che hà il lato homologo FE al lato homologo LM. Perche i poligoni ABCDEF, HIKLM, sono simili sarà, CD à DE come IK à KL, e sarà DE ad EF come KL ad



LM;


a 1. definit.
del 6.

b 26. del 5. LM ; e permutandosi, sarà CD ad IK , ^b come DE ad KL , e la proporzione di DE ad KL sarà come quella di EF ad LM . Si diuidano i poligoni simili $BCDEF, HIKLM$ ^c in triàngoli di numero uguale, colle rette BD, BE, HK, HL ; sarà il triàngolo BCD simile al triàngolo HIK , il triàngolo BDE sarà simile al triàngolo HKL , ed il triàngolo BEF sarà simile al triàngolo HLM ; e la proporzione di CB ad BD sarà come quella di IH ad HK ; come ancora la proporzione di CD ad DB sarà come quella di IK ad KH . Perche le proposte piramidi sono simili, sarà il triàngolo ABC ^d simile al triàngolo GHI , ed il triàngolo ACD sarà simile al triàngolo GIK ; dal che la proporzione di AB ad BC ^e sarà come quella di GH ad HI ; ma CB ad BD è come IH ad HK , per l'egualità, sarà AB ad BD ^f come GH ad HK .

f 22. del 15. Piramide GK ad KI è come AD ad DC , si mostrata CD ad DB essere come IK ad KH , sarà per l'egualità, AD ad DB ^g come GK ad KH ; ed invertendo BD ad DA ^h sarà come HK ad KG . Hor essendo AB ad BD come GH ad HK , e la proporzione di BD ad DA è come quella di HK ad KG , sarà per l'egualità, AB ad AD ^k come HG ad GK ; dal che i triàngoli ABD, GHK , sono equiangoli, hanno i la-

ti intorno a gli angoli uguali; e perciò ^m sono frà loro simili. E perche i quattro triàngoli ABC, ACD, ADB, BCD , sono simili a i quattro triàngoli GHI, GIK, GKH, HIK , perciò le piramidi $ABCD, GHIK$, ⁿ sono frà loro simili. Nell'istesso modo si prouerà, che la piramide $ABDE$ è simile alla piramide $GHLK$; e che la piramide $ABEF$ è simile alla piramide GML ; ed hauerà la piramide $ABCD$ alla piramide $GHIK$ ^o triplicata propotione, che il lato homologò CD al lato homologò IK : ma CD ad IK è come DE ad KL , hauerà la piramide $ABCD$ alla piramide $GHIK$ ^p triplicata propotione, che il lato DE ad KL ; ma la piramide $ABDE$ alla simile piramide $GHLK$ ^q ha la medesima triplicata propotione, che ha il lato homologò DE al lato homologò KL , sarà la piramide $ABCD$ alla piramide $GHIK$, ^r come la piramide $ABDE$ alla piramide $GHLK$. Nell'istesso modo si prouerà, che la piramide $ABDE$ alla piramide $GHLK$ è come la piramide $ABEF$ alla piramide GML . Per la qual cosa tutti gli antecedenti insieme, che compongono la piramide $ABCDEF$, a tutti i conseguenti insieme, che compongono la piramide $GHIKLM$, sono come uno antecedente, ch'è la piramide $ABEF$, ad un conseguente, ch'è la piramide GML . Ma la piramide $ABEF$ alla simile piramide GML ^v ha triplicata propotione, che il lato homologò FE al lato homologò ML , hauerà tutta la piramide $ABCDEF$ a tutta la piramide $GHIKLM$ ^x triplicata propotione, che il lato homologò FE al lato homologò ML , ch'era da dimostrarfi.

K 22. del 5. ^l 4. del 6. ^m 1. definit. del 6. ⁿ 9. definit. del 11. ^o 8. del 12. ^p 11. del 5. ^q 8. del 12. ^r 11. del 5. ^t 12. del 5. ^u 8. del 12. ^x 11. del 5.



proportionali

COROLLARIO.


Appare da quel che si è detto, che le piramidi simili, di basi poligone, si diuidono in piramidi simili, di numero uguale.

S C O L I O.

Nell'istesso modo si proua, che i prismi simili, di basi poligone, hanno triplicata proportion de i loro lati homologhi.

Siano i simili prismi $ABCDE$, $FGHIK$, di basi poligone. Dico che il prisma $ABCDE$ al prisma $FGHIK$ ha triplicata proportion di quella, che ha il lato homologo DO al lato homologo IQ . Perche i prismi sono frà loro simili, perciò i piani, che contengono uno di essi, sono simili à i corrispondenti piani, che contengono l'altro; per il che le basi $NCDOL$, $PHIQM$, $BRSEA$, $GTVKF$, sono frà loro simili. Si diuidano queste basi colle rette LC , LD , MH , MI , AR , AS , FT , FV , in triangoli di numero uguale, saranno i triangoli nelle basi NO , BE , simili à i corrispondenti triangoli, che sono nelle basi PQ , GK ; ed i triangoli, che sono nelle basi BE , GK , saranno simili à i corrispondenti triangoli delle basi NO , PQ , e sarà l'angolo NCL uguale all'angolo PHM , e l'angolo LCD uguale all'angolo MHI ; ed oltre à ciò la proportion di NC à CL sarà come quella di PH ad HM . In oltre perche i piani CB , CS , sono simili à i corrispondenti piani HG , HV , sarà l'angolo RCN uguale all'angolo THP , e l'angolo RCN uguale all'angolo THI : ma per la similitudine de' poligoni $NCDOL$, $PHIQM$, gli angoli NCD , PHI , sono frà loro uguali, per lo Scolio alla 35. propositione del 11. sarà l'angolo RCL uguale all'angolo THM . Nell'istesso modo si dimostrerà, che l'angolo CRA è uguale all'angolo HTF . E perche le rette RC , AL , come lati de i parallelogrammi CB , BL , sono uguali, e parallele al lato NB : sarà RC uguale, e parallela ad AL ; dal che le due AR , LC , sono l'uguali, e parallele, ed il quadrilatero $ARCL$ è parallelogrammo.

Nell'istesso modo si dimostrerà, che il quadrilatero $FTHM$ è parallelogrammo. Di più, perche i piani CB , HG , sono frà loro simili, sarà RC à CN come TH ad HP : ma NC à CL è come PH ad HM , per l'egualità, sarà RC à CL , come TH ad HM ; l'angolo RCL fu dimostrato uguale all'angolo THM , in conseguenza il parallelogrammo $ARCL$ sarà simile al parallelogrammo $FTHM$. E perche i tre lati AB , BR , RA sono uguali à i tre lati LN , NC , CL , i triangoli ABR , LNC , sono frà loro uguali, furono dimostrati simili.



a 9. defin.
del 11.

b 20. del 6.

c 1. defin.
del 6.

d 1. defin.
del 6.

e 34. del 1.

f 32. del 1.
g 35. defin.
del 1.

h 1. defin.
del 6.

K 22. del 5.
l 1. defin.
del 6.
m 3. c 4. del 1.

n 13. dcin.
del 11.

o 9. defin.
del 11.

p 1. defin.
del 6.
q 16. del 5.
r 16. del 5.

t 11. del 5.
u Scol. alla
33. del 11.


x 11. del 5.

y 12. del 5.

z Scol. alla
33. del 11.

& 11. del 5.

li, in conseguenza sono simili, ed uguali, e sono ancora paralleli, stante che i piani BE, NO, sono paralleli; per la qual cosa il solido $ABRCNL$ è prismà. Nell'istesso modo si dimostrerà, che il solido $EGTHPM$ è prismà, e che tutti gli altri $ACDL$, $ADLO$, $FHIM$, $FIMQ$, sono prismi. E perche i triangoli ABR , LNC , sono simili à i triangoli FGT , MPH , ed i parallelogrammi $ABNL$, $BNCR$, $ARCL$, sono simili à i corrispondenti parallelogrammi $FGPM$, $GPHT$, $FTHM$; sarà il prismà $ABRCNL$ simile al prismà $EGTHPM$. Nell'istesso modo si dimostrerà, che il prismà $ACDL$ è simile al prismà $FHIM$ ed il prismà $ADLO$ è simile al prismà $FIMQ$. Di nouo perche le basi NO , PQ sono simili; sarà NC à CD come PH ad HI ; e permutando, NC à PH sarà come CD ad HI ; Similmente CD à DO sarà come HI ad IQ ; e permutando, CD ad HI sarà come DO ad IQ . Finalmente perche il prismà di basi triangolare $ANLC$ al simile prismà $FPMH$ per lo Scolio alla 33. proposizione dell' 11. hà triplicata proportionè, che il lato homologò NC al lato homologò PH , e la proportionè di NC à PH è come quella di CD ad HI , hauerà il prismà $ANLC$ al prismà $FPMH$ triplicata proportionè di quella, che hà CD ad HI : ma il prismà $ACLD$ al simile prismà $FHIM$ hà la medesima triplicata proportionè, che hà il lato CD al lato HI , sarà il prismà $ANLC$ al prismà $FPMH$, x come il prismà $ACLD$ al prismà $FHMI$. Nell'istesso modo si dimostrerà, che il prismà $ACLD$ al prismà $FHMI$ è come il prismà $ADLO$ al prismà $FIMQ$. Per la qual cosa tutti gli antecedenti insieme, cioè i prismi, che compongono tutto il prismà $ABCDE$, à tutti i conseguenti insieme, che sono i prismi, che compongono tutto il prismà $FGHIK$ y saranno come un' antecedente ad un conseguente, cioè come il prismà $ADLO$ al prismà $FIMQ$. Ma il prismà $ADLO$ al prismà $FIMQ$ hà triplicata proportionè di quella, che hà il lato homologò DO al lato homologò IQ , hauerà tutto il prismà $ABCDE$ à tutto il prismà $FGHIK$, & triplicata proportionè di quella, che hà il lato homologò DO al lato homologò IQ , che era da dimostrarsi.



COROLLARIO.



Appare da quel che si è dimostrato, che i simili prismi di basi poligone, si diuidono in simili prismi di numero uguale.

THEOREMA IX. PROPOSITIONE IX.

Le uguali piramidi di basi triangolari hanno le basi re-

ciproche alle altezze; e quelle piramidi di basi triangolari, delle quali le basi sono reciproche alle altezze, sono frà di loro vguali.

Siano le vguali piramidi, di basi triangolari, $ABCD$, $EFGH$. Dico che la proporzione della base BCD alla base FGH , è come l'altezza della piramide $EFGH$ all'altezza della piramide $ABCD$. Co' i lati AC , CB , si faccia il parallelogrammo CL , co' i lati AC , CD , si faccia il parallelogrammo CK , e co' i lati BC , CD , si faccia il parallelogrammo CL ; e si compisca



il parallelepipedo CM . Nell'istesso modo si compisca il parallelepipedo GQ ; si tirino le rette IK , NO ; ed haueremo ciascuno de i parallelepipedi CM , GQ , diuisi in due prismi di basi triangolari, i quali hanno le medesime altezze delle proposte piramidi. E perche la piramide $ABCD$, per ipotesi, è vguale alla piramide $EFGH$, i loro tripli, ^b cioè i prismi $IBCDKA$, $NFGHOE$, sono frà di loro vguali; & i doppij di questi prismi, cioè i parallelepipedi CM , GQ , e saranno frà di loro vguali: per la qual cosa la base $BCDL$ alla base $FGHP$ ^d farà come l'altezza del parallelepipedo GQ all'altezza del parallelepipedo CM : Ma la base $BCDL$ alla base $FGHP$ ^e è come il triangolo BCD al triangolo FGH , e l'altezza de i parallelepipedi, e delle piramidi sono le medesime; farà dunque il triangolo BCD , ch'è base della piramide $ABCD$, al triangolo FGH , ch'è base della piramide $EFGH$, ^f come l'altezza della piramide $EFGH$ all'altezza della piramide $ABCD$, ch'era da dimostrarli nel primo luogo.

Di nuouo, supposto che la base BCD alla base FGH sia, come l'altezza della piramide $EFGH$ all'altezza della piramide $ABCD$. Dico che le piramidi $ABCD$, $EFGH$, sono frà di loro vguali. S'intenda fatta la medesima costruzione. Perche il triangolo BCD al triangolo FGH ^g è come il parallelogrammo CL al parallelogrammo GP , e per ipotesi, il triangolo BCD al triangolo FGH è come l'altezza della piramide $EFGH$ all'altezza della piramide $ABCD$, farà il parallelogrammo CL al parallelogrammo GP , come l'altezza della piramide $EFGH$ all'altezza della piramide $ABCD$, cioè come l'altezza del parallelepipedo GQ all'altezza del parallelepipedo CM ; per la qual cosa i parallelepipedi GQ , CM , ^h sono frà di loro vguali, e le loro metà, cioè i prismi $IBCDKA$, $NFGH$ ⁱ OE , ^k sono frà di loro vguali. E perche le piramidi ^l sono le terze parti de i prismi, ^m e s'è di i prismi frà di loro vguali, le loro terze parti, cioè le piramidi $ABCD$, $EFGH$, sono frà di loro vguali, che era da dimostrarli.

a 28. del 11.

b 7. del 12.

c 28. del 11.
d 34. del 11.

e 15. del 5.

f 11. del 5.

g 15. del 5.

h 34. del 11.


i 28. del 11.
l 7. del 12.

S C O L I O.

Il medesimo si dimostra nelle piramidi, è ne i prismi, che non hanno le basi triangolari.

Le piramidi vguali, ò prismi vguali, che non hanno le basi triangolari, le loro basi sono reciproche all'altezze; e se le basi sono reciproche all'altezze, quelle piramidi, ouero prismi, sono frà di loro vguali.

Siano $A, \& B$, le basi di due piramidi vguali, ò di due prismi vguali, le di cui altezze siano AC , BD . Dico che la base A alla base B è come l'altezza BD all'altezza AC . Per la 25. proposizione del 6. si faccia il triangolo E uguale alla base A , e si faccia il triangolo F uguale alla base B . Se i piani $A, \& B$, sono basi di due piramidi, sopra la base E , si erigga una piramide ugualmente alta alla piramide A C ; e sopra la base F si erigga una piramide ugualmente alta alla piramide B D ; e se i piani $A, \& B$,



a 31. del 11.
e suo Scol.

b 6. del 12.
& Scol. alla
34. del 11.

sono basi di due prismi, s'intenda eretto sopra la base E un prisma, che habbia l'altezza AC , e sopra la base F s'intenda eretto un prisma, che habbia l'altezza BD , in modo, che i piani verticali siano triangoli simili, vguali, e paralleli alle basi E , ed F . Perche le piramidi, ò prismi eretti alle basi A , ed E , hanno la medesima altezza, la loro proporzione sarà a come quella delle basi: ma le basi A , ed E , per costruzione, sono frà loro vguali, perciò le piramidi, ouero i prismi eretti sopra le basi A , ed E , saranno frà loro vguali. Nell'istesso modo si prouerà, che le piramidi, ò prismi eretti sopra le basi B , ed F , sono frà di loro vguali. Se dunque le piramidi, ò prismi eretti alle basi $A, \& B$, sono frà loro vguali, le piramidi ancora, ò prismi eretti sopra le basi E , ed F sono frà loro vguali: ma le piramidi vguali, e prismi vguali eretti sopra i triangoli E , ed F , hanno le basi reciproche all'altezze, sarà la base E alla base F , come l'altezza FH all'altezza EG . Ma le basi E , ed F sono vguali alle basi $A, \& B$, e l'altezza EG , FH , per costruzione, sono vguali all'altezza AC, BD : sarà la base A alla base B , come l'altezza BD all'altezza AC , che era da dimostrarfi nel primo luogo.

Di nuouo, supposto che la base A alla base B sia come l'altezza BD all'altezza AC . Dico che le piramidi, ouero prismi eretti sopra le basi $A, \& B$, sono frà di loro vguali; cioè le piramidi vguali frà loro, ed i prismi vguali frà loro. S'intenda fatta la medesima costruzione di prima; e si dimostri, come so-

pra


prasi fece, che le piramidi erette alle basi E, F , sono uguali alle piramidi erette alle basi $A, \& B$, e che i prismi eretti alle medesime basi E, F , sono uguali à i prismi eretti alle basi $A, \& B$. Perche la base A alla base B , per ipotesi, è come l'altezza BD all'altezza AC , essendo le basi $A, \& B$, uguali alle basi $E, \& F$, e l'altezza AC, BD , uguali all'altezza EG, FH , sarà la base E alla base F , come l'altezza FH all'altezza EG : per la qual cosa le piramidi erette alle basi triangolari $E, \& F$, come ancora i prismi eretti alle basi triangolari $E, \& F$, sono fra loro uguali. Ma le piramidi erette sopra le basi $E, \& F$, sono dimostrate uguali alle piramidi erette sopra le basi $A, \& B$, ed i prismi eretti alle medesime basi E, F , sono uguali à i prismi eretti sopra le basi $A, \& B$, essendo le piramidi, o prismi eretti sopra le basi $E, \& F$, fra di loro uguali, saranno le piramidi, o prismi eretti sopra le basi $A, \& B$, fra di loro uguali, ch'era da dimostrarsi.

c 9. del 11. 36.
Scol. alla
34. del 12.

THEOREMA X. PROPOSITIONE X.

Ogni cono è la terza parte del cilindro, che hà la medesima base, e la medesima altezza,

Habbia il cono, e cilindro, vna medesima altezza, è la commune base sia il circolo $ABCD$. Dico che il cono è la terza parte del cilindro. Se il cono non è la terza parte del cilindro, ne meno il cilindro sarà il triplo del cono, ma sarà o maggiore, o minore del triplo del cono. Sia prima il cilindro maggiore, che il triplo del cono per quanto è il solido E , sarà il triplo del cono, col solido E , vguale al cilindro. Si descriva a nel proposto circolo il quadrato $ABCD$, ed intorno al medesimo circolo si circoscriua b il quadrato $FGHI$, e per lo Scolio alla 9. propo-



a 6. del 4.

b 7. del 4.

sitione del quarto, il quadrato $ABCD$ sarà la metà del quadrato circoscritto $FGHI$, e presi poi i quadrati $ABCD, FGHI$, come basi di due parallelepipedi, sopra i quali si concepiscano descritti due parallelepipedi, che habbiano la medesim'altezza, quale hà il cono, e cilindro proposto. Perche i parallelepipedi, che hanno la medesim'altezza e sono come le basi, però il parallelepipedo, la di cui base è il quadrato $ABCD$, al parallelepipedo, la di cui base è il quadrato $FGHI$, sarà come la base $ABCD$ alla base $FGHI$: ma il quadrato $ABCD$ è la metà del quadrato $FGHI$, il parallelepipedo dunque descritto sopra il quadrato $ABCD$, sarà la metà del parallelepipedo descritto sopra il quadrato $FGHI$. Hor perche il parallelepipedo sopra la base $FGHI$ è maggiore del cilindro, che hà per base il circolo $ABCD$ (stante che lo contiene) però la metà del paral-

c 32. del 11.


lelepi-

d 30. del 3.

e Corol. alla
17. del 3.f Scolio alla
12. del 11.

g 30. del 3.

lepipedo sopra la base FGHI, sarà maggiore, che la metà del cilindro descritto sopra del circolo ABCD; ma il parallelepipedo sopra la base ABCD è la metà del parallelepipedo sopra la base FGHI, il parallelepipedo dunque sopra il quadrato ABCD sarà maggiore della metà del cilindro, che ha per base il circolo ABCD. Si segghino d'gli archi AB, BC, CD, DA, in due parti vguali, ne i punti K, L, M, N, e si tirino le rette AK, KB, BL, LC, CM, MD, DN, AN; E per il punto K si faccia passare la retta OP in modo, che tocchi il circolo nel punto K, e continuata concorra co' i lati DA, CB, prolungati, come in O, & P, e si dimostri, come si fece nella 2. prop. di questo, che OP è parallela ad AB. Sopra il triangolo AKB, e sopra il rettangolo APOB, si concepiscano descritti due prismi, che ambidue habbiano l'istessa altezza del cono, e cilindro proposto. Perche il triangolo AKB è la metà del rettangolo APOB, il prisma, la di cui base è il triangolo AKB, sarà la metà del prisma descritto sopra la base APOB (stante che i prismi d'vguale altezza sono f come le basi.) E perche il piano APOB contiene la portione AKB del circolo, pertiò il prisma, descritto sopra il piano APOB, sarà maggiore della portione del cilindro descritto sopra la portione AKB; per la qual cosa la metà del prisma, descritto sopra il piano APOB, sarà maggiore della metà della portione del cilindro sopra la portione AKB: ma il prisma descritto sopra il triangolo AKB è la metà del prisma sopra la base APOB; il prisma dunque sopra il triangolo AKB sarà maggiore, che la metà della portione del cilindro descritta sopra la portione AKB. Nell'istesso modo si prouerà, che i prismi descritti sopra i triangoli BLC, CMD, DNA, sono maggiori delle metà delle portioni del cilindro, le di cui basi sono le portioni BLC, CMD, DNA, del circolo, le quali hanno la medesima altezza, che il cono, e cilindro proposto; e per conseguenza tutt' i prismi, descritti sopra i detti triangoli, insieme giunti, sono maggiori della metà di tutte le portioni del cilindro, descritte sopra le dette portioni del circolo. Se di nuouo gli archi AK, KB, BL, LC &c. faranno diuisi in due parti vguali, e da i punti A, K, B, L, C &c. alle diuisioni, siano tirate rette linee, e sopra i triangoli costrutti si concepiscano prismi vguualmente alti col cono, e cilindro proposto, si mostrerà, come prima si fece, che tutti quei prismi di basi triangolari, giunti insieme, sono maggiori delle metà delle portioni del cilindro proposto, le quali hanno per basi le portioni AK, KB, BL, LC, CM, MD, DN, NA del circolo. E con quest' ordine si proceda in infinito. Se dunque dal cilindro descritto sopra del circolo ABCD se ne leua più della metà; cioè se ne leui il parallelepipedo, descritto sopra del quadrato ABCD; e dalle portioni, che restano del cilindro (le quali hanno per base le portioni AKB, BLC, CMD, DNA)




fe

se ne leui vna quantità, che sia più della metà, cioè se ne leuino i prismi descritti sopra i triangoli AKB, BLC, CMD, DNA ; E similmente dalle porzioni del cilindro, che restano, se ne leui più della metà, nel modo, che antedecedentemente si è fatto; e con quest'ordine si prosegue, sempre leuando dalle porzioni restate più della metà; si peruenirà finalmente a tal diminutione, che l'vltime porzioni^h del cilindro restate, giunte insieme, faranno minori del solido E . Supposto che sia fatta questa continua detractione, e le vltime porzioni restate del cilindro siano quelle descritte sopra le porzioni $AK, KB, BL, LC, CM, MD, DN, NA$, le quali, giunte insieme, siano minori del solido E . Perche il triplo del cono, che hà per base il circolo $ABCD$, col solido E , insieme giunti, sono vguali al cilindro, che hà per base il medesimo circolo $ABCD$; se da questo cilindro si leuino le antedette porzioni restate, e dal triplo del cono, col solido E , se ne leui il solido E , ch'è maggiore delle porzioni detratte dal cilindro; resterà il prisma, la di cui base è il poligono $AKBLCMDN$, e che hà la medesima altezza del cono, è cilindro, maggiore del triplo del detto cono. Per la qual cosa il cono, la di cui base è il circolo $ABCD$, sarà minore della terza parte del prisma, che hà per base il poligono $AKBLCMDN$: ma la piramide descritta sopra il medesimo poligono, che hà la medesima altezza col prisma, è la terza parte di esso prisma, come si è mostrato alla 7. propositione, e suo Scolio; la piramide dunque, che hà per base il detto poligono, sarà maggiore del cono di vguale altezza, che hà per base il circolo $ABCD$. Hor perche il circolo $ABCD$ contiene il detto poligono, il cono, che hà per base il circolo $ABCD$, conterrà la piramide della medesima altezza, che hà per base il poligono $AKBLCMDN$: ma si è dimostrato, che questa piramide è maggiore del cono, la parte sarebbe maggiore del tutto, ch'è impossibile. Non dunque il cilindro è maggiore, che il triplo del cono.

Supposto di nouo, che il cilindro sia minore, che il triplo del cono, farà dunque il cono maggiore della terza parte del cilindro. Hor sia il cono maggiore della terza parte del cilindro, per quanto è il solido E ; farà la terza parte del cilindro, col solido E , vguale al cono. Siano descritti i quadrati $ABCD, FGHI$, come prima, e sopra di essi siano descritte due piramidi, che habbiano la medesima altezza, che il cono, e cilindro. Perche le piramidi, che hanno la medesima altezza, per la 6. propositione, sono come le basi; essendo il quadrato $ABCD$ la metà del quadrato $FGHI$, la piramide sopra la base $ABCD$, sarà la metà della piramide sopra la base $FGHI$. In oltre perche il quadrato $FGHI$ contiene il circolo $ABCD$, però la piramide sopra il quadrato $FGHI$ sarà maggiore, che il cono, che hà per base il circolo $ABCD$; e la metà della piramide sopra la base $FGHI$, sarà maggiore della metà del detto cono: ma la piramide, che hà per base il quadrato $ABCD$, è la metà della piramide sopra del quadrato $FGHI$, sarà la piramide, che hà per base il quadrato $ABCD$, maggiore, che la metà del cono sopra del circolo $ABCD$. Si diuidano gli archi AB, BC, CD, DA , e si faccia tutta la constructione di prima: poi sopra il triangolo AKB , e sopra il rettangolo $APOB$, s'intendano erette due piramidi, che habbiano la medesima altezza, che il

cono,

cono, e cilindro proposto, cioè che il detto cono, e questa piramide habbiano vn medesimo vertice . Perche le piramidi , che hanno la medesima altezza, per la propof. 6. sono come le basi, essendo il triangolo AKB la metà del rettangolo APOB, farà la piramide sopra il triangolo AKB la metà della piramide sopra il rettangolo ABOP . Hor perche il rettangolo ABOP è maggiore della portione AKB del circolo; la piramide sopra il rettangolo APOB, che ha la medesima altezza del cono, farà maggiore della portione del cono, che ha per base la portione AKB del circolo; e la metà della piramide sopra APOB, farà maggiore, che la metà della parte del cono sopra la portione AKB del circolo . Ma la piramide sopra AKB è vguale alla metà della piramide sopra APOB; la piramide dunque sopra AKB farà maggiore, che la metà della parte del cono sopra la portione AKB del circolo . Nell' istesso modo si dimostrerà, che l'altre piramidi sopra i triangoli BLC, CMD, DNA, sono maggiori, che le metà delle parti del cono, le quali hanno per basi le portioni BLC, CMD, DNA del circolo; e faranno tutte le dette piramidi di basi triangolari insieme, maggiori delle metà delle parti antedette del cono, insieme giunte . Se di nouo gli archi AK, KB, BL, LC, CM, MD, DN, NA, si diuidano in due parti vguale, e da i punti A, K, B, L, C, M, D, N, alle diuisioni, si tirino rette linee, le piramidi descritte sopra i triangoli costrutti, le quali habbiano la medesima altezza col cono, iusteme giunte, si mostreranno maggiori, che le metà delle parti del cono, le quali hanno per base le portioni AK, KB, BL, LC, CM, MD, DN, NA, insieme giunte . E con quest'ordine si procederà in infinito . Se dunque dal cono, che ha per base il circolo ABCD, se ne leua vna quantità maggiore della metà, cioè se ne leui la piramide descritta sopra il quadrato ABCD; e dalle parti restate del cono, cioè quelle, che hanno per base le portioni AKB, BLC, CMD, DNA, del circolo, se ne leui vna quantità maggiore della metà, cioè se ne leuino le piramidi, che hanno per base i triangoli AKB, BLC, CMD, DNA; e di nouo dalle parti restate del cono, se ne leui vna quantità maggiore della metà, e con quest'ordine, facendo sempre la detrazione dalle parti restate, per vna quantità maggiore della metà, finalmente K resteranno tali portioni di Cono, che insieme giunte, saranno minori del solido E . Supposto, che sia fatta la continua detrazione, e le parti restate del cono siano quelle, che hanno per base le portioni AK, KB, BL, LC, CM, MD, DN, NA, del circolo, le quali, giunte insieme, siano minori del solido E . Hor perche la terza parte del Cilindro, insieme col solido E, è posta vguale al cono, che ha per base il circolo ABCD, se dal cono se ne leuano le dette parti restate; e dalla terza parte del cilindro,



Ki. dal 10.

col


col solido E, se ne leua il solido E, ch'è maggiore delle dette parti detratte dal cono; resterà la piramide, la di cui base è il poligono AKBLCMDN, che hà la medesima altezza, che il cilindro, maggiore della terza parte del cilindro, per la qual cosa il triplo di questa piramide sarà maggiore di tutto il cilindro. E perche il triplo della piramide, per la 7. propos. e suo Scolio, è vguale al prisma, che hà la medesima base, ed altezza con essa piramide; però il prisma, descritto sopra del poligono AKBLCMDN, sarà maggiore, che il cilindro, la di cui base è il circolo ABCD, ed hà la medesima altezza col detto prisma. Ma il poligono, che è base del detto prisma, è contenuto dal circolo ABCD, ch'è base del cilindro, però il prisma, che hà per base il poligono AKBLCMDN, sarà contenuto dal cilindro della medesima altezza, che hà per base il circolo ABCD: per la qual cosa il detto prisma sarà minore del cilindro: ma è stato mostrato maggiore, farebbe maggiore, e minore, ch'è impossibile. Non dunque il Cilindro è maggiore, che il triplo del cono, ne meno, per quel che si è mostrato, è minore, e perciò il cilindro, che hà per base il circolo ABCD, sarà il triplo del cono della medesima altezza, e che hà per base il medesimo circolo ABCD. Per la qual cosa il detto cono farà la terza parte del cilindro, della medesima altezza, e base, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA XI. PROPOSITIONE XI.

I Coni, e Cilindri, che hanno la medesima altezza, sono frà loro come le basi.

Siano esposti i coni, e Cilindri, le di cui basi siano i circoli ABCD, EFGH, e l'altezza vguale IK, LM. Dico che la base ABCD alla base EFGH è come il cono al cono; ed ancora come il cilindro al cilindro; cioè che la base ABCD alla base EFGH, è come il cono, o cilindro KBCDA, ad vna quantità vguale.

al cono, o cilindro MFGHE. Se la base ABCD alla base EFGH non è come il cono, o cilindro KBCDA ad vna quantità vguale, al cono, o cilindro MFGHE, sia la base ABCD alla base EFGH,




Ssss

come

come il cono KBCDA alla quantità N, farà il solido N, ò maggiore, ò minore del cono MFGHE. Supposto prima, che il solido N sia minore

E, per quanto è il solido O, in modo, che i due solidi N, ed O, insieme giunti, siano vguali al cono EFGHM. Nel circolo EFGH si descriva il quadrato EFGH; si diuidano gli archi EF, FG, GH, HE, in due parti vguali ne i punti P, Q, R, S; si tirino le rette EP, PF, FQ, QG, GR, RH, HS, SE; e si dimostri, come



si fece nella seconda parte dell'antecedente proposizione, che se dal cono EFGHM se ne detrae la piramide, che hà per base il quadrato EFGH, e l'altezza LM, e dalle parti restate del cono, se ne detraggono le piramidi, che hanno per base i triangoli EPF, FQG, GRH, HSE, e l'altezza ML; e dall'altre parti restate dal cono se ne detrae similmente più della metà, e con quest'ordine in infinito, finalmente si peruerà à tanta diminutione, che le parti restate del cono, insieme giunte, e saranno minori del solido O. Supposto che sia fatta la continua detrazione, e le parti restate del cono siano quelle, che hanno per base le porzioni EP, PF, FQ, QG, GR, RH, HS, SE, del circolo, le quali, giunte insieme, sono minori del solido O. E perche il cono EFGHM è vguale à i due solidi N, ed O, giunti insieme, se dal cono EFGHM si leuano le antedette parti, restate, e da i solidi N, ed O insieme, si leui il solido O, ch'è maggiore delle parti detratte dal cono, resterà la piramide, che hà per base il poligono EPFQGRHS, e l'altezza LM, maggiore del solido N. Supposto questo.

Si descriva nel circolo ABCD il poligono ATBVCXDY simile al poligono EPFQGRHS, e si tirino i diametri BD, FH. Perche per la 6. proposizione, le piramidi della medesima altezza sono come le basi, però la piramide ATBVCXDYK alla piramide EPFQGRHSM, farà come il poligono ATBVCXDY al poligono EPFQGRHS: ma il poligono al poligono, per il Corollario alla 2. proposizione di questo, è come il circolo ABCD al circolo EFGH; farà la piramide alla piramide, come il circolo ABCD al circolo EFGH. Et essendo, per ipotesi, il circolo ABCD al circolo EFGH, come il cono ABCDK al solido N: la piramide dunque ATBVCXDYK alla piramide EPFQGRHSM, farà come il cono ABCDK al solido N; e permutando, la piramide ATBVCXDYK al co-

ABCDK, e sarà come la piramide EPFQGRHSM al solido N: ma la piramide ATBVXCXYK è minore del cono ABCDK (stante che è contenuta da esso cono nell'istesso modo, che il poligono è contenuto dal circolo,) però sarà *r* minore del solido N: la piramide EPFQGRHSM fu antedecedentemente mostrata maggiore, sarà la piramide EPFQGRHSM maggiore, è minore del solido N, ch'è impossibile, che il circolo ABCD al circolo EFGH sia come il cono ABCDK ad vna quantità minore dell' cono EFGHM. Nell'istesso modo si mostrerà essere impossibile, che il circolo EFGH al circolo ABCD sia come il cono EFGHM ad vn'altra, quantità minore del cono ABCDK.

Sia di nuouo il solido N maggiore del cono EFGHM. S'intenda come il solido N al cono ABCDK, così il cono EFGHM ad vn'altra quantità, che sia il solido O; e permutando, il solido N al cono MFGHE *g* sarà come il cono KBCDA al solido O: ma il solido N è posto maggiore del cono MFGHE, sarà il cono KBCDA *h* maggiore del solido O; cioè il solido O sarà minore del cono KBCDA. In oltre perche il circolo ABCD al circolo EFGH, per ipotesi, è come il cono ABCDK al solido N, inuertendo, il circolo EFGH al circolo ABCD *k* sarà come il solido N al cono ABCDK: ma, per costruzione, il solido N al cono ABCDK è come il cono EFGHM al solido O, sarà il circolo EFGH al circolo ABCD, come il cono EFGHM al solido O: ma il solido O è dimostrato minore del cono ABCDK; il circolo dunque EFGH al circolo ABCD, sarà come il cono EFGHM ad vna quantità minore del cono ABCDK, che è contro quello, che si è concluso nella prima parte. Non dunque il solido N è maggiore del cono EFGHM, ne meno, per quel che si è mostrato, è minore; sarà dunque il solido N vguale al cono EFGHM. Ed essendo il circolo ABCD al circolo EFGH, come il cono ABCDK al solido N, & il solido N è mostrato vguale al cono EFGH; sarà il circolo ABCD al circolo EFGH come il cono ABCDK al cono EFGHM, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

Perche per l'antedecedente propos. il cono è la terza parte del cilindro, che hà la medesima altezza, e base, ne segue il cilindro, che hà per base il circolo ABCD, e l'altezza IK, essere multiplice del cono ABCDK, come il cilindro, che hà per base il circolo EFGH, e l'altezza LM, è multiplice del cono EFGHM; e perciò il cilindro, la di cui base è ABCD, al cilindro, la di cui base è EFGH, *m* sarà come il cono ABCDK al cono EFGHM: ma si è dimostrato, che il cono ABCDK al cono EFGHM è come il circolo ABCD al circolo EFGH; sarà il cilindro, che hà per base il circolo ABCD, e l'altezza IK, al cilindro, la di cui base è il circolo EFGH, e l'altezza LM, come il circolo ABCD al circolo EFGH; cioè come la base alla base. Per la qual cosa i coni, e cilindri, che hanno la medesima altezza, sono come le loro basi, ch'era da dimostrarsi.

c 16. del 5.

f 14. del 5.

g 16. del 5.

h 14. del 5.

K Corol. alla 4. del 5.

i u. del 5.

m 15. del 5.

COROLLARIO.

Perche il cono KABCD al cono MEFGH è come il circolo ABCD al circolo EFGH, ed il cilindro . la di cui base

è il circolo AB

CD, al cilin-

dro, la di cui

basse è il cir-

colo EFGH, è

parimente co-

me il circolo

ABCD al cir-

colo EFGH;

farà il cono

ABCDK al co-

no EFGHM,

come il cilin-

dro, la di cui


basse è il circo-

lo ABCD, e l'altezza IK, al cilindro, la di cui base è il cir-

colo EFGH, e l'altezza LM. D'onde è manifesto, che i ci-

lindri, i quali hanno le medesime basi, che i coni, e le

medesime altezze, sono frà di loro come i coni.




n il del 5.

SCOLIO DEL CLAVIO.

I coni; e cilindri, che sono come le basi, hanno vna medesima altezza.

Habbia il cono ABC al cono DEF, ouero il cilindro GBCH al cilindro IEFK, l'istessa proportion, che hà la base BLCM alla base ENFO. Dico che i coni ABC, DEF, ouero i cilindri GBCH, IEFK, hanno la medesima altezza. Se non hanno la medesima altezza, uno de i due sarà più alto. Supponiamo, che il più alto sia il cono DEF, ouero il cilindro IEFK. Sia segato il cono DEF, o cilindro IEFK,



da

*
parallelo
alla base
ENFO

da qualche piano $PQRS$ talmente, che l'altezza interposta fra i piani $PQRS$, $ENFO$, sia uguale all'altezza del cono ABC , ouero del cilindro $GBCH$. Si considerino i coni, cioè ABC , ed il cono, la di cui base è il circolo $ENFO$, ed il vertice nel piano $PQRS$, i quali hanno le medesime basi, ed altezze co' i cilindri $GBCH$, $PEFR$, e per il Coroll. antecedente il cono ABC al cono interposto fra i piani PR, EF , sarà come il cilindro $GBCH$ al cilindro $PEFR$: ma il cono ABC al cono interposto fra i piani PR, EF , è come la base $BLCM$ alla base $ENFO$ (stante che hanno la medesima altezza) sarà il cilindro $GBCH$ al cilindro $PEFR$,^b come la base BC alla base EF : ma la base BC alla base EF , per ipotesi, è come il cilindro $GBCH$ al cilindro $IEFK$, sarà dunque il cilindro $GBCH$ al cilindro $PEFR$,^c come il medesimo cilindro $GBCH$ al cilindro $IEFK$; imperciocchè i cilindri $PEFR$, $IEFK$,^d sono fra di loro uguali; la parte sarà uguale al tutto, ch'è impossibile. Non dunque il cono DEF è più alto, che il cono ABC , ma hanno la medesima altezza, che era prima da dimostrarsi.

Di nuovo perche i cilindri $GBCH$, $PEFR$, hanno per costruzione, la medesima altezza, per la propos. antecedente, il cilindro $GBCH$ al cilindro $PEFR$ sarà come la base $BLCM$ alla base $ENFO$: ma, per ipotesi, la base $BLCM$ alla base $ENFO$ è come il cilindro $GBCH$ al cilindro $IEFK$; il cilindro dunque $GBCH$ al cilindro $IEFK$ e sarà come il medesimo cilindro $GBCH$ al cilindro $PEFR$; dal che i cilindri $PEFR$, $IEFK$ sono fra di loro uguali, la parte uguale al tutto, ch'è impossibile. Non dunque il cilindro $IEFK$ è più alto, che il cilindro $GBCH$, ma hanno la medesima altezza. Per la qual cosa i coni, e cilindri, che sono come le basi, hanno la medesima altezza, ch'era da dimostrarsi.

COROLLARIO.

Da qui è manifesto, che i coni, o cilindri, i quali hanno la medesima altezza, e le basi uguali, sono fra di loro uguali, stante che i coni, o cilindri, che hanno la medesima altezza, sono come le basi, sì che se le basi sono uguali, quei coni, o cilindri faranno fra di loro uguali.

E ancora manifesto, che gli uguali coni, o cilindri, che hanno uguali basi, o la medesima, haueranno vna medesima altezza.

Nell'antecedente figura siano i coni uguali ABC , DEF , ouero i cilindri uguali $GBCH$, $IEFK$, che habbiano le uguali basi BC, EF . Dico che hanno la medesima altezza. Se non hanno la medesima altezza, vno sarà più alto dell'altro, supposto che il cono DEF , ouero il cilindro $IEFK$, sia il più alto. Si faccia passare il piano PR , che seghi il cono, o cilindro, e sia equidistante alla base EF talmente, che l'altezza interposta fra i piani $PQRS$, $ENFO$, sia uguale all'altezza del cono ABC , o del cilindro $GBCH$; sopra la base EF si concepisca eleuato il cono TEF , il di cui vertice sia nel piano PQR .

Perche

a 11. del 12.

b 11. del 5.

c 11. del 5.
d 9. del 5.

e 11. del 5.
f 9. del 5.

Perche i conì ABC, TEF , ed i cilindri $GBCH$, $PEFR$ hanno una medesima altezza, e per la proposizione antecedente, il cono ABC al cono TEF , ed il cilindro $GBCH$ al cilindro $PEFR$, sarà come la base BC alla base EF : e perche le basi sono frà di loro uguali, perciò il cono ABC sarà uguale al cono TEF , ed il cilindro $GBCH$ uguale al cilindro $PEFR$: ma per ipotesi, il cono ABC è uguale al cono DEF , ed il cilindro $GBCH$ è uguale al cilindro $IEFK$, ne segue il cono TEF essere uguale al cono DEF , ed il cilindro $PEFR$ uguale al cilindro $IEFK$, la parte uguale al tutto, ch'è impossibile. Non dunque il cono DEF è cilindro $IEFK$, e più alto: ma hanno la medesima altezza.

Di più gli uguali conì, e cilindri, che hanno la medesima altezza, hanno le basi uguali, stante che, per l'antecedente proposizione, i conì, e cilindri, che hanno la medesima altezza, sono come le basi. Se dunque i conì sono frà di loro uguali, o i cilindri sono frà di loro uguali, le basi ancora saranno frà di loro uguali.


THEOREMA XII. PROPOSITIONE XII.

I simili conì, e cilindri hanno triplicata proportione, che i diametri delle loro basi.

Siano le basi de i simili conì, e cilindri, i circoli $ABCD$, $EFGH$, le asse IK , LM , & i diametri delle basi siano BD , FH ; e supposto prima, che li proposti conì, e cilindri siano retti. Dico, che il cono al cono, & il cilindro al cilindro, hà triplicata proportione, che il diametro BD al diametro FH . Se il cono al cono, & il cilindro al cilindro, non hà triplicata proportione, che il diametro BD al diametro FH , si prenda qualche solido N talmente, che il cono $ABCDK$ al solido N habbia triplicata proportione, che il diametro BD al diametro FH ; il solido N ò sarà minore, ò maggiore, ò uguale al cono $EFGHM$.


Supposto prima, che il solido N sia minore del cono $EFGHM$, per quanto è il solido O ; sì che i due solidi O , & N , insieme giunti, siano uguali al cono $EFGHM$. Si faccia la medesima costruzione, e dimostrazione, come nell'antecedente proposizione, e si dimostri la piramide, la di cui base è il poligono $EPFQGRHS$, ed il vertice M , essere maggiore del solido N . Si tirino poi le rette BK , TK , PM , FM , i triangoli $KT B$, MPF , faranno due di quelli, che contengono le piramidi $ATBVCXDYK$, $EPFQGRHSM$; si tirino le rette TI , PL . Perche i conì $ABCDK$, $EFGHM$, sono simili, per la 24. definit. dell'11. la proportione dell'asse KI al diametro BD sarà come l'asse ML al diametro FH ; e presa la metà de i consequenti, per lo scolio dopo la propof. 22. del quinto, KI ad IB farà come ML ad LF : ma gli angoli KIB , MLF , sono retti, stante che i conì so-

no sup-



no supposti retti, faranno i triangoli KIB, MLF^a equiangoli, cioè l'angolo KBI vguale all'angolo MFL, e l'angolo BKI vguale all'angolo LMF; e farà KB à BI^b come MF ad FL. Per l'istessa ragione i triangoli KIT, MLP sono simili, e farà KT, à TI come MP à PL. In oltre perche i poligoni ATBVCXDY, EPFQGRHS, per costruzione, sono simili, gli archi TB, PF faranno frà loro simili; e perciò gli angoli TIB, PLF sono frà loro vguali; dal che i triangoli isosceli ITB, LFP, sono frà di loro simili; e la proportion di IB à BT^c farà come quella di LF ad FP, come ancora IT à TB farà come LP à PF. Hor essendosi dimostrato, che KB à BI, è come MF ad FL, e la proportion di BI à BT è come quella di FL ad FP, per l'egualità, farà KB à BT, come MF ad FP. Similmente essendosi dimostrato, che KT à TI è come MP à PL, e la proportion di TI à TB è come quella di PL à PF, per l'egualità, farà KT à TB^e come MP PF; ed inuertendo, BT à TK^f farà come FP à PM. Parimente essendosi dimo-

strato KB à BT, come MF ad FP, ed è BT à TK, come FP à PM. per l'egualità, BK à KT^g farà come MF ad FP, dal che i triangoli KTB, MPF, faranno frà loro^h simili. Nell'istesso modo si dimostrerà, che tutti gli altri triangoli, che circondano la piramide ATBVCXDYK, sono simili à i corrispondenti triangoli, che circondano la piramide EPFQGRHSM. E perche i poligoni, che sono basi di esse piramidi, sono simili per costruzione, i lati di essi poligoni faranno di moltitudine vguale; dal che i triangoli simili, che circondano le dette piramidi, sono di numero vguale, e per la 9. definit. dell' 1. le piramidi faranno frà di loro simili; e per l'8. prop. di questo, faranno in triplicata proportion de i loro lati homologhi, cioè la piramide KBIT alla piramide MLFP hà triplicata proportion, che il lato BT al lato homologho EP. Di più perche i triangoli ITB, LPE, sono simili, farà TB à BI^k come PF ad FL; e permutando, TB à PF^l farà come BI ad FL; ma BI ad FL è come il doppio BD al doppio FH, però TB à PF^m farà come BD ad FH. E perche la piramide alla piramide si disse hauer^c replicata proportion, che TB à PF; e la retta TB à PF è come BD ad FH, hauerà la piramide alla piramide triplicata proportion, che BD ad FH: ma il cono ABCDK al solido N si disse hauer la medesima proportion triplicata, che hà BD ad FH; la piramide dunque ATBVCXDYK alla piramide EPFQGRHSM è come il cono ABCDKⁿ al solido N: e permutando, la piramide ATBVCXDYK al cono ABCDK^o farà come la piramide EPFQGRHSM



26. del 6.

b 4. del 6.

c 1. definit. del 6.

d 22. del 5.

e 22. del 5.

f Corollalla 4. del 5.

g 22. del 5.

h 4. definit. del 6.

K 1. definit. del 6.

l 16. del 5.

m 12. del 5.

n 21. del 5.

o 16. del 5.


al fo-

p 14. del 5

al solido N. Ma la piramide $ATBVCXDYK$ è minore del cono $ABCDK$ (stante, che la base della piramide è contenuta dalla base del cono) sarà la piramide $EPFQGRHSM$ $\propto$ minore del solido N. E perche fu mostrata maggiore, sarebbe maggiore, è minore del solido N, ch'è impossibile. Non dunque il solido N è minore del cono $EFGHM$. Per la qual cosa è impossibile, che il cono $ABCDK$ habbia triplicata proportionione ad vna quantità minore del cono $EFGHM$, di quella, che hà BD ad FH . E nell'istesso modo si dimostrerà essere impossibile, che il cono $EFGHM$, habbia ad vna quantità minore del cono $ABCDK$ triplicata proportionione di quella, che hà FH à BD .

q 1. definit. del o.

Di nuouo, supposto che N sia maggiore del cono $EFGHM$. Perche i triangoli FLP , BIT , sono simili, sarà PF à TB , & come FL à BI , e duplicando gli antecedenti, PF a TB sarà come FH à BD . In oltre, perche il cono $ABCDK$ al solido N hà triplicata proportionione, che BD ad FH , e per quel che si è mostrato la piramide $ATBVCXDYK$ alla piramide $EPFQGRHSM$, hà parimente triplicata proportionione, che BD ad FH , sarà il cono $ABCDK$ al solido N come la piramide $ATBVCXDYK$ alla piramide $EPFQGRHSM$; ed inuertendo, il solido N al cono $ABCDK$, sarà come la piramide $EPFQGRHSM$ alla piramide $ATBVCXDYK$.



e 27. del 5.

ma la piramide $EPFQGRHSM$ alla simile piramide $ATBVCXDYK$, per l'8. propositione, hà triplicata proportionione, che il lato PF al lato homologo TB , hauerà il solido N al cono $ABCDK$ triplicata proportionione, che PF à TB : ma PF à TB è dimostrata essere come FH à BD , ne segua la proportionione del solido N al cono $ABCDK$ essere triplicata della proportionione, che hà FH à BD . Supposto questo. S'intenda come il solido N al cono $ABCDK$, così il cono $EFGHM$ ad vn'altra quantità, che sia il solido O. Se dunque il solido N al cono $ABCDK$ è come il cono $EFGHM$ alla quantità O, & il solido N è posto maggiore del cono $EFGHM$, farà ancora il cono $ABCDK$ maggiore del solido O. Hor essendosi dimostrata la proportionione del solido N al cono $ABCDK$ essere triplicata, che la proportionione di HF è DB , & il solido N al cono $ABCDK$, per costruzione, è come il cono $EFGHM$ al solido O; hauerà il cono $EFGHM$ al solido O triplicata proportionione, che HF à DB : ma il solido O è dimo-

u 14. del 5.

strato

strato minore del cono ABCDK, il cono dunque EFGHM hauerà ad vn solido minore del cono ABCDK triplicata proportione di quella, che hà HF à DB; contro à quello, che s'è concluso nella prima parte. Non dunque il solido N è maggiore del cono EFGHM, ne meno è minore, in conseguenza il solido N sarà vguale al cono EFGHM.


Finalmente perche il cono ABCDK al solido N hà triplicata proportionione, che BD ad FH, & il solido N è vguale al cono EFGHM, hauerà il cono ABCDK al cono EFGHM triplicata proportionione di quella, che hà il diametro BD al diametro FH.

E perche il cono * è la terza parte del cilindro, che hà la medesima base, ed altezza; la proportionione dunque del cono al cono sarà come il cilindro al cilindro: ma si è dimostrata la proportionione del cono al cono essere triplicata, che la proportionione de' i diametri delle basi; ne segue la proportionione del cilindro al cilindro essere triplicata, che la proportionione del diametro della base al diametro della base. Per la qual cosa i cono, & i cilindri simili, sono in triplicata proportionione, che i diametri delle basi, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

Di nuouo si dimostrerà col P. Clauio, che i simili cilindri scaleni, sono in triplicata proportionione de i diametri delle loro basi.

Siano le basi de i simili cono, e cilindri scaleni, i circoli ABC, DEF, e le assi siano GH, IK. Dico, che il cono ABCH al cono DEFK, & il cilindro al cilindro hà triplicata proportionione di quella, che hà il diametro AC al diametro DF. Si concepiscono sopra le medesime basi ABC, DEF, due cono, e cilindri retti, i quali habbiano la medesima altezza co' cono, e cilindri scaleni, le di cui assi siano GL, IM. Si faccia passare vn piano per le rette LG, GH, ed vn'altro per le rette IM, IK, i quali seghino le basi ABC, DEF, per le rette AC, DF; perche i punti G, & I sono i centri de i circoli, però le rette AC, DF, faranno i diametri di essi circoli; & essendo le assi LG, MI perpendicolari à i piani ABC, DEF, i piani, che passano per le rette LG, GH, & ed MI, IK, sono retti, cioè perpendicolari alle basi ABC, DEF; per la qual cosa le perpendicolari, che cadono da i punti H, & K, sopra le basi ABC, DEF, & caderanno nelle comuni sectioni GC, IF, e gli angoli HGC, KIF, faranno le inclinazioni, che fanno le assi alle basi ABC, DEF; e per la similitudine de i cono, e cilindri, gli angoli HGC, KIF faranno frà di loro vguali. Ma gli angoli CGL, FIM, sono ancora frà loro vguali, stante che sono retti; i restanti angoli dunque HGL, KIM, sono * frà di loro vguali. Si tirino le rette LH, MK.

Perche i cono, e cilindri retti, si sono posti hauer la medesima altezza, che i scaleni, però le rette LH, MK, sono parallele à i diametri AC, DF; dal che gli angoli in L, ed M, sono retti, ed i restanti angoli H, & K, sono frà di



T t t

loro

x 10. del 12.


y 19. del 12.

z 38. del 12.

z 32. del 12.

b 31. del 1.
c 4. del 6.
d 16. del 5.
e 1. definit.
del 6.
f 16. del 5.
g 11. del 15.
h 16. del 5.

loro vguali. Si che i triangoli GHL, IKM , ^b sono equiangoli, e la proporzione di GH à GL sarà come ^c quella di IK ad IM ; e permutando, GH ad IK , sarà come ^d GL ad IM . Di nuouo perche i coni, e cilindri scaleni sono supposti simili, la proportion di HG ad AC , ^e sarà come KI à DI ; e permutando, HG ad IK sarà come AC ad FD ; ^f ma GH ad IK è dimostrata essere come LG ad MI , sarà dunque LG ad MI ^g come AC à DF ; e permutando, LG ad AC sarà come MI ad FD . Per la qual cosa i coni, e cilindri retti, le di cui basi ABC, DEF , e le assi LG, MI , faranno frà loro simili, e per quel che si è mostrato nella prima parte, la proportion del cono retto $ABCL$ al cono retto $DEFM$, e del cilindro retto al cilindro retto, sarà triplicata, che la proportion del diametro AC al diametro DF . Hor perche i coni, e cilindri $ABCL, ABCH$, hanno la medesima altezza, e sono sopra la medesima base ABC , per il Coroll. all' 11. propositione di questo, il cono retto $ABCL$ sarà vguale al cono scaleno $ABCH$, ed il cilindro $ABCL$ sarà vguale al cilindro $ABCH$. E per l'istessa ragione il cono $DEFM$ sarà vguale al cono $DEFK$, ed il cilindro $DEFM$ sarà vguale al cilindro $DEFK$. Per la qual cosa il cono $ABCL$ al cono $DEFM$ sarà come il cono $ABCH$ al cono $DEFK$; ed il cilindro $ABCL$ al cilindro $DEFM$, sarà come il cilindro $ABCH$ al cilindro $DEFK$. Ma si è dimostrato il cono, o cilindro $ABCL$, al cono, o cilindro $DEFM$, hauere triplicata proportion di quella, che hà il diametro AC al diametro DF , ne segue il cono $ABCH$ al cono $DEFK$, ed il cilindro $ABCH$ al cilindro $DEFK$, hauere triplicata proportion, che il diametro AC al diametro DF ; e perciò i simili coni, e cilindri, o che siano retti, ouero scaleni, hanno triplicata proportion, che i diametri delle basi, ch'era da dimostrarfi.



THEOREMA XIII. PROPOSITIONE XIII.

Se il cilindro è segato da vn piano equidistante alle basi, il cilindro al cilindro sarà come l'asse all'asse.

Sia il cilindro $ABCD$ segato dal piano GH , parallelo à gli opposti piani AB, CD , il quale segarà ancora l'asse EF in qualche punto I . Dico, che il cilindro $ABHG$ al cilindro $GHCD$ è come l'asse EI all'asse IF . S'intenda continuato il proposto cilindro da ambe due le parti, e con esso sia prolungato il rettangolo $EBCF$; e nell'asse EF siano prese quante parti si vogliano EK, KL , vguali ad EL , e siano ancora prese le parti FM, MN, NO , ciascuna vguale ad IF ; e da i punti L, K, L, M, N, O , ^b si tirino le rette IH, KP, LQ, MT, NV, OX , parallele alla retta EB , ouero FC , le quali tutte ^c saranno vguali, e parallele frà di loro. Si concepisca poi muouersi il rettangolo $LQXO$ intorno all'asse LO , posto immobile, il lato QX nella intiera reuolutione, per la definitione 21. dell' 11. deferuerà le superficie cilindrica, e le rette LQ, KP, IH, MT, NV, OX , per il terzo postulato, descriveranno i circoli QS, PR, HG, TA, VZ, XY ; e per la definit. 21. dell' 11. il


n 3. del 1.

b 31. del 1.
c 34. del 1.

foli-

solido SQXY farà cilindro, e le porzioni, SQPR, RPBA, ABHG, GHCD, DCTa, a IVZ, ZVKY, sono cilindri di basi vguali, stante che i cerchi, che hanno i semidiametri vguali sono frà di loro vguali. E perche le parti LK, KE, EI, per costruzione, sono vguali, ed vgualmente inclinate

à i cerchi SQ, RP, GH, però i cilindri SQPR, RPBA, ABHG, hauerauno vguali altezze; hanno, per quel che si è detto, basi vguali, e per il Coroll. alla propof. 11. sono frà di loro vguali. Nell'istefso modo si dimostrerà, che i cilindri GHCD, DCTa, a TVZ, ZVXY, sono frà di loro vguali. Per la qual cosa la retta LI farà moltiplice di EI, come il cilindro QHGS è moltiplice del cilindro




ABHG. E per l'istefsa ragione la retta IO farà moltiplice di IF, come il cilindro GHXY è moltiplice del cilindro GHCD. Hor se LI è vguale ad IO, i cilindri SQHG, GHXY, hauerauno vguali altezze; sono posti sopra vguali basi, per il Corollario all' 11. propositione, sono frà di loro vguali. Similmente se LI è maggiore di IO, il cilindro SQHG farà maggiore del cilindro GHXY; e se LI è minore di IO, il cilindro SQHG farà minore del cilindro GHXY. Si considerino quattro quantità, la prima sia EI, la seconda IF, la terza il cilindro ABHG, e la quarta il cilindro GHCD. Perche LI, moltiplice della prima, se è maggiore di IO, moltiplice della seconda, ancora il cilindro SQHG, moltiplice della terza, è maggiore del cilindro GHXY, moltiplice della quarta; e se LI è vguale, ò minore di IO, anco il cilindro SQHG farà vguale, ò minore del cilindro GHXY: per la 6. defin. del 3. libro, la proportionione dell'afse EI, prima quantità, all'afse IF, seconda quantità, farà come il cilindro ABHG, terza quantità, al cilindro GHCD, quarta quantità. Per la qual cosa se vn cilindro è segato da vn piano, che sia parallelo alle basi opposte, quello farà segato in due cilindri, talmente, che il cilindro al cilindro farà come l'afse all'afse; ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA XIV. PROPOSITIONE XIV.


I conì, e cilindri posti sopra vguali basi sono come le loro altezze.

Siano prima sopra le basi vguali AB, CD, due conì retti EBA, FDC, e due cilindri retti HABG, KCDI, le di cui assi, ò altezze siano le rette LE, MF. Dico, che il cono EBA al cono FCD, ed il cilindro HABG al cilindro KCDI è come l'altezza LE all'altezza MF. S'intenda continuato il cilindro HABG verso HG, e l'afse LE verso N; e si tagli EN vguale ad MF, ed





33. del 1.

intorno al centro N s'intenda il circolo OP , equidistante al circolo HG , e per la def. 21. il solido $OHGP$ è cilindro. Perchè i circoli HG, CD sono frà di loro vguali, e le affe NE, FM , per costruzione, sono frà di loro vguali, per il Coroll. alla proposizione 11. i cilindri $KCDI, OHGP$, faranno frà di loro vguali; e perciò il cilindro $HABG$ al cilindro $OHGP$, sarà come il medesimo cilindro $HABG$ al cilindro $KCDI$: ma il cilindro $HABG$ al cilindro $OHGP$, per l'antecedente proposizione, è come l'asse LE all'asse EN , farà il cilindro $HABG$ al cilindro $KCDI$, e come l'asse LE all'asse EN , cioè all'asse MF . Finalmente essendo il cono EAB la terza parte ^a del cilindro $HABG$, ed il cono FCD è la terza parte del cilindro $KCDI$, ne segue il cilindro $HABG$ al cilindro $KCDI$, essere e come il cono EAB al cono FCD : ma si è dimostrato, che il cilindro $HABG$ al cilindro $KCDI$, è come l'asse EL all'asse FM , il cono dunque EAB , al cono FCD , è come l'asse LE all'asse FM . Per la qual cosa i coni retti, e cilindri retti, che hanno vguali basi, sono come le loro altezze, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.



Supposto di nuovo, che i coni EAB, FCD , ed i cilindri $HABG, KCDI$, posti sopra le vguali basi AB, CD , siano scaleni; le di cui altezze siano ML, ON . Dico, che il cono EAB al cono FCD , ed il cilindro $HABG$ al cilindro $KCDI$ è come l'altezza ML all'altezza ON . Sopra le basi AB, CD , siano costrutti i coni retti MAB, OCD , ed i cilindri retti $QABP, SCDR$, i quali habbiano le medesime altezze ML, ON , e per quel che si è dimostrato nella prima parte, il cono retto MAB al cono retto OCD , come ancora il cilindro retto $QABP$ al cilindro retto $SCDR$, è come l'altezza ML all'altezza ON . In oltre perchè i cilindri $QABP, HABG$, sono posti sopra la medesima base AB , e hanno la medesima altezza, per il Coroll. all'è proposizione, sono frà di loro vguali; e per l'istessa ragione i cilindri $SCDR, KCDI$, sono frà di loro vguali; dal che il cilindro $QABP$ al cilindro $SCDR$, sarà come il cilindro $HABG$ al cilindro $KCDI$: ma il cilindro $QABP$ al cilindro $SCDR$, per quel che si è dimostrato nella prima parte, è come l'altezza ML all'altezza ON , il cilindro dunque $HABG$ al cilindro $KCDI$, sarà come l'altezza ML all'al-



tezza ON. Di più perchè il cilindro HABG, per la 10. proposiz. di questo, è il triplo del cono EAB, ed il cilindro KC DI è il triplo del cono FCD, sarà il cilindro HABG al cilindro KC DI, come il cono EAB al cono FCD; ma si è dimostrato il cilindro HABG al cilindro KC DI, essere come l'altezza ML all'altezza ON; sarà il cono EAB al cono FCD, come l'altezza ML all'altezza ON. Per la qual cosa i coni, e cilindri, che hanno uguali basi, sono fra di loro come le altezze, ch'era da dimostrarsi.

g. 15. del 5.


h. u. del 5.

S C O L I O.

La conuerfa facilmente la faremo nel seguente modo.

I coni, e cilindri, i quali hanno l'istessa proportionione, che le loro altezze, se non hanno la medesima base, haueranno le basi uguali.

Siano i cilindri ABCD, EFGH, ed i coni TBC, XFG, le di cui altezze siano le rette TI, XP, ed habbia il cilindro ABCD al cilindro EFGH, ouero il cono TBC al cono XFG, l'istessa proportionione, che le loro altezze. Dico che le basi BC, FG sono fra di loro uguali: Se le basi non sono fra di loro uguali, una sarà maggiore dell'altra: supposto che la base FG sia maggiore della base BC, sarà dunque il semidiametro PG maggiore del semidiametro IC. Si tagli PO uguale ad IC; nel piano MFLG, intorno al centro P coll'intervallo PO, si descriva il circolo NVOT, sopra la base NVOT s'intenda eleuato il cilindro QNOR all'altezza XP, e sopra la medesima base NVOT, alla medesima altezza XP, sia descritto il cono XNVOT. Perchè i cilindri ABCD, QNOR sono sopra le uguali basi BC, NO, per l'antecedente proposizione, il cilindro ABCD al cilindro QNOR sarà come l'altezza TI all'altezza XP: ma, per ipotesi, il cilindro ABCD al cilindro EFGH, è come l'altezza TS alla medesima altezza XP; sarà dunque il cilindro ABCD al cilindro QNOR come il medesimo cilindro ABCD al cilindro EFGH; dal che i cilindri QNOR, EFGH sono fra di loro uguali; la parte uguale al tutto, ch'è impossibile. Non dunque la base FG è maggiore della base BC, ma sono fra di loro uguali. Nell'istesso modo si dimostrerà, ch'essendo il cono TBC al cono XFG, come l'altezza TI all'altezza XP, le basi FG, BC, sono fra di loro uguali, ch'era da dimostrarsi.



g. 11. del 5.

b. 9. del 5.


THEOREMA XV. PROPOSITIONE XV.

Gli uguali coni, e cilindri, hanno le basi reciproche.

alle

alle altezze; e quei conì, e cilindri, che hanno le basi reciproche alle altezze, sono frà di loro vguali.

Siano gli vguali conì ABC, DEF , e gli vguali cilindri $GBCH, IEFK$, le di cui basi BC, EF , e le altezze AL, DM . Dico che la base BC alla base EF è come l'altezza DM all'altezza AL . Se le altezze AL, DM , sono frà di loro vguali, faranno i cilindri $GBCH, IEFK$, come le basi: ma i cilindri $GBCH, IEFK$, per ipotesi, sono frà loro vguali, faranno le basi BC, EF frà di loro vguali; per la qual cosa la base BC alla base EF sarà come l'altezza DM all'altezza AL , che era da prouarsi.



Se le altezze AL, DM , sono ineguali; sia la maggiore DM ; si tagli da DM la parte NM , vguale ad AL , e per il punto N si concepisca passare il piano OP , equidistante al piano EF , in modo, che ne risulti il cilindro $OIEFP$, e per la 14. proposizione, il cilindro $IEFK$ al cilindro $OIEFP$, sarà come l'altezza DM all'altezza NM . In oltre perche i cilindri $GBCH, IEFK$, per ipotesi, sono frà di loro vguali, preso il cilindro $OIEFP$, come terza quantità, sarà il cilindro $GBCH$ al cilindro $OIEFP$; come il cilindro $IEFK$ al medesimo cilindro $OIEFP$; ma il cilindro $GBCH$ al cilindro $OIEFP$ è come la base BC alla base EF (stante che le altezze AL, NM sono per costruzione, vguali) il cilindro dunque $IEFK$ al cilindro $OIEFP$, sarà come la base BC alla base EF : ma il cilindro $IEFK$ al cilindro $OIEFP$, è come DM ad NM ; sarà dunque la base BC alla base EF , e come DM ad NM ; la retta NM è vguale ad AL , sarà la base BC alla base EF , come l'altezza DM all'altezza AL ; ch'era da dimostrarsi. Ne i conì, se l'altezza DM è vguale all'altezza AL , essendo i conì ABC, DEF , vguali, per il Corollario all'11. proposizione, le basi BC, EF sono frà loro vguali, e però la base BC alla base EF , sarà come l'altezza DM all'altezza AL .

Se l'altezza DM è maggiore dell'altezza AL , si faccia NM vguale ad AL , e si formi il cono ENF , e per la 14. proposizione, il cono DEF al cono NEF sarà come l'altezza DM all'altezza NM . In oltre perche i conì ABC, DEF , sono supposti vguali, sarà il cono ABC al cono NEF , come il cono DEF al medesimo cono NEF ; ma il cono ABC al cono NEF è come la base BC alla base EF (stante che le altezze NM, AL sono vguali) sarà la base BC alla base EF come il cono DEF al cono NEF : E perche si disse che il cono DEF al cono NEF è come DM ad NM , sarà la base BC alla base EF come l'altezza DM all'altezza NM , ouero AL ch'era da dimostrarsi.

Di nouo sia la base BC alla base EF come l'altezza DM all'altezza AL . Dico che i cilindri $IEFK, GBCH$ sono frà di loro vguali; e similmente i conì DEF, ABC , sono frà di loro vguali. Se le altezze AL, DM ,

sono

p 11. del 12.

a 3. del 12.

b 7. del 5.

c 14. del 12.

d 11. del 5.

e 11. del 5.

f 7. del 5.

g 11. del 12.

h 11. del 5.

k u. del 5.


sono fra di loro vguali, essendo BC ad EF, come DM ad AL, e le rette DM, AL, sono vguali, le basi ancora BC, EF, faranno fra di loro vguali; si che i cilindri GBCH, IEFK, hanno le altezze, e basi vguali, e per il Corollario all'vndecima proposizione di questo, i cilindri GBCH, IEFK, sono fra di loro vguali; e per la medesima ragione i coni ABC, DEF, sono fra di loro vguali. Se l'altezza DM è maggiore di AL, si faccia la costruzione come prima, farà NM vguale ad AL: ma i cilindri, che hanno vguali altezze, per l'vndecima proposizione, sono come le basi; farà la base BC alla base EF, come il cilindro GBCH al cilindro OEFP. Supposto questo. Perche per ipotesi, BC ad EF è come DM ad AL, ed AL, è vguale ad NM, farà BC ad EF, come DM ad NM; ma DM ad NM, per la 14. proposizione, è come il cilindro IEFK al cilindro OEFP, farà il cilindro IEFK al cilindro OEFP, come BC ad EF; si è mostrato BC ad EF essere come il cilindro GBCH al cilindro OEFP; il cilindro dunque IEFK al cilindro OEFP, sarà come il cilindro GBCH al medesimo cilindro OEFP. Per la qual cosa i cilindri GBCH, IEFK, sono fra di loro vguali. Finalmente perche DM è altezza comune del cono DEF, e del cilindro IEFK, ed AL è altezza comune del cono ABC, e del cilindro GBCH, essendosi dimostrato che i cilindri GBCH, IEFK, sono fra di loro vguali, le loro terze parti faranno fra di loro vguali: ma i coni, per la 10. proposizione, sono la terza parte de i cilindri, ne segue i coni ABC, DEF, essere fra di loro vguali. Per la qual cosa i coni, e cilindri de' quali le basi sono reciproche all'altezze, sono fra di loro vguali, ch'era da dimostrarsi.

14. del 5.

11. del 5.

11. del 5.

Il medesimo si dimostra de i coni, e cilindri scaleni. Siano i coni EAB, FCD ed i cilindri HABG, KCDI, le di cui basi AB, CD, le altezze ML, ON. Dico prima, che se il cono EAB è vguale al cono FCD, & il cilindro HABG è vguale al cilindro KCDI, la proportion della base AB alla base CD, sarà come l'altezza ON all'altezza ML. Sopra le basi AB, CD, si costituiscono i coni retti MAB, COD, ed i cilindri retti QABP, SCDR, che habbiano le medesime altezze ML, ON. Perche i coni MAB, EAB, hanno la medesima altezza ML, e sono sopra la medesima base AB, per il Corollario all'11. proposizione, sono fra di loro vguali. E similmente i loro tripli, cioè i cilindri QABP, HABG, sono fra di loro vguali. Per l'istessa ragione il cono OCD è vguale al cono FCD, ed il cilindro SCDR è vguale al cilindro KCDI: ma i coni EAB, FCD sono, per ipotesi, fra di loro vguali, perciò i coni MAB, OCD, sono fra di loro vguali; e similmente i cilindri QABP, SCDR, sono fra di loro vguali; e per quel che si è dimostrato nella prima parte, la base AB alla base




14. del 12.

CD,

CD, sarà come l'altezza NO all'altezza LM, che era prima da dimostrarsi.

Di nuouo, supposto, che AB à CD sia come NO ad LM. Dico che i coni EAB, FCD, sono frà di loro vguali, e parimente i cilindri HABG, KCDI, sono frà di loro vguali. Supposta la medesima costruzione. Ne i




cilindri retti QABP, SCDR, essendo la base AB alla base CD, come l'altezza ON all'altezza ML, per quel che si è dimostrato nella prima parte, i cilindri QABP, SCDR, sono fra di loro vguali, come ancora i coni MAB, OCD sono frà di loro vguali: ma i cilindri QABP, SCDR, sono stati dimostrati vguali à i cilindri HABG, KCDI, ed i coni MAB, OCD, sono stati dimostrati vguali à i coni EAB, FCD, ne segue i cilindri HABG, KCDI, essere frà di loro vguali, come ancora i coni EAB, FCD, sono frà di loro vguali, ch'era da dimostrarsi.

PROBLEMA I. PROPOSITIONE XVI.

Dati due cerchi intorno di vn medesimo centro, descricuere nel maggiore vn poligono equilatero, che i lati siano di numero paro, e non tocchino il circolo minore.

Siano i due cerchi ABCD, EFGH, intorno al medesimo centro I; si vuole nel maggior circolo ABCD descricuere vn poligono equilatero, che i lati siano di numero paro, e che non tocchino il circolo minore EF GH. Per il centro I si tiri il diametro AC, il quale segará la circonferenza del circolo interno ne i punti per essempio E, & G, nel punto G, sopra il diametro AC, si erigga la perpendicolare GK, concorrente colla circonferenza del circolo esterno in qualche punto K; e per il Corollario alla 16. propositione del 3. la retta KG toccherà il circolo FGH nel punto G. Perche l'arco AKC è maggiore dell'arco KC, se ne detragga la metà AB, e dal restante BC, se ne leui la metà BL, e di nuouo dal restante LC se ne leui la metà LM, e con



a 11. del 1.

quest'

quest'ordine in infinito, si peruerà finalmente ^a ad vna quantità minore di KC; supposto che quella sia l'arco MC, si tiri la retta MC. Dico che la retta MC farà vno de i lati di quel poligono, che si è proposto descriuere. Si diuida l'arco BL nelle parti di numero, e quantità vguale alle parti, che sono in LC; e di nuouo l'arco AB, (che è vguale à BC) si diuida nelle parti di numero, e quantità vguale alle parti BC; sicche il semicircolo ABC sarà diuiso in parti vguale, e ciascuna di quelle parti sarà vguale ad MC; si diuida poi l'arco ADC nelle parti di numero, e quantità vguale alle parti, che sono nell'arco ABC; sarà diuisa tutta la circonferenza del circolo ABCD in parti vguale, e di numero paro; si tirino le rette, che sortendono quegli archi, e sarà descritto il poligono equilatero, e di lati di numero paro. Dico finalmente, che i lati di questo poligono non toccano la circonferenza del circolo interno. Dal punto M si faccia cadere ^c la retta MP perpendicolare al diametro AC. Perche gli angoli KGP, MPG sono retti, le rette KG, MP, sono ^d frà di loro parallele; e perche la retta KG tocca il circolo interno nel solo punto G, la retta dunque MP cade totalmente fuori del circolo FGH, ne può mai toccarlo in nessun punto, stante che non può mai concorrere colla retta KN, per la definizione delle parallele. Hor se la retta MO non può mai toccare il circolo FGH, molto meno lo può toccare la retta MC, la quale è più lontana dal circolo FGH di quello, che è la retta LO; e per l'istessa ragione nessun' altro lato del poligono descritto toccherà il detto circolo, stante che il circolo FGH, è vguale distante dal circolo ABCD; per la qual cosa nel circolo maggiore si è descritto il poligono equilatero, di lati di numero paro, il quale non tocca il circolo minore, ch'era da farsi, e dimostrarsi.

b 1. del 10.

c 11. del 1.

d 15. del 1.

COROLLARIO.

Da quel che si è dimostrato è manifesto, che se dall'estremo di quel lato del poligono iscritto, che concorre col diametro, cade vna retta perpendicolare al medesimo diametro, come fa la retta MP, quella in nessun modo può toccare il circolo interno.

L E M M A I.


Se siano due qualunque vguale portioni ABC, DEF, di circoli vguale, e sia l'arco AB vguale all'arco DE, è da i punti B, ed E, cadano le rette BG, EH, perpendicolari alle corde AC, DF. Dico che la retta BG sarà vguale ad EH, la retta AG vguale ad HD, e la retta GC vguale ad HF.

a 29. del 3.

b 27. del 3.

c 29. del 3.
d 30. del 3.

Si tiri la retta AB . Perche gli archi ABC, DEF , per ipotesi, sono uguali, perciò le rette AC, DF , saranno frà di loro uguali. Similmente essendo l'arco ABC uguale all'arco DEF , e gli archi AB, DE , per ipotesi, sono uguali, i restanti archi EC, EF , saranno frà di loro uguali; dal che gli angoli BAC, EDF , opposti à gli uguali archi BC, EF , sono frà di loro uguali. Si considerino i due triangoli BAG, EDH , angoli retti in G , ed H . Essendosi dimostrato gli angoli BAG, EDH frà loro uguali, i due angoli BAG, BGA del triangolo BAG , saranno uguali à i due angoli EDH, EHD del triangolo EDH , il lato BA è uguale al lato ED (stante che si supponono gli archi uguali AB, DE , saranno i restanti due lati BG, GA uguali à i restanti due lati EH, HD , cioè il lato BG è uguale al lato EH , ed il lato AG è uguale al lato DH : ma le rette AC, DF , sono frà di loro uguali, detrattone le parti uguali AG, DH , restano le parti GC, HF , frà di loro uguali, che era da dimostrarsi.



L E M M A I I.

Se nel circolo sia descritto vn quadrilatero, che habbia tre lati uguali, ed il quarto lato sia minore di ciascheduno de' gli uguali, tirate le rette dal centro del circolo à gli angoli del quadrilatero, l'angolo nel centro, opposto ad vno de i lati uguali, sarà ottuso.

a 28. del 3.

b 27. del 3.

c 25. del 1.

d 13. del 1.

Nel circolo $OBKS$, il di cui centro Z , sia iscritto il quadrilatero $OBKS$, del quale i tre lati OB, BK, KS , siano frà loro uguali ed il quarto lato OS sia minore del lato BK . Dico che tirate le rette ZB, ZK, ZS, ZO , l'angolo BZK , opposto al lato OK , sarà ottuso. Perche i lati SK, KB, BO , sono frà loro uguali, perciò gli archi SK, KB, BO , sono frà loro uguali, e gli angoli al centro SZK, KZB, BZO , sono frà di loro uguali. Di nuovo, essendo i lati ZK, ZB , del triangolo ZKB , uguali à i lati ZO, ZS del triangolo ZSO , e la base KB è maggiore della base SO , l'angolo BZK sarà maggiore dell'angolo OZS . E perche gli angoli OZB, BZK, KZS , per quel che si è dimostrato, sono frà di loro uguali: in conseguenza l'angolo OZS sarà minore di ciascuno degli angoli OZB, BZK, KZS : ma i quattro angoli OZB, BZK, KZS, SZO , intorno al centro Z , sono uguali à quattro angoli retti, perciò ciascun'angolo OZB, BZK, KZS , sarà maggiore d'un angolo retto, per la qual cosa l'angolo BZK sarà ottuso, ch'era da dimostrarsi.




PROBLEMA II. PROPOSITIONE XVII:

Date due sfere intorno ad vn medesimo centro, descriuere nella maggior sfera vn solido polliedro, che non tocchi la superficie della minor sfera.

Siano proposte due sfere intorno al medesimo centro A, nella maggiore si vuole iscriuere vn solido polliedro, cioè di molti lati, talmente, che i piani, che contengono il solido polliedro, non tocchino la superficie della minor sfera. Siano segate le proposte sfere da vn piano, che passi per il commune centro A, le comuni sezioni nelle superficie sferiche, come CBED, FGH saranno circonferenze di cerchi massimi, stante che reuoluti quei femicircoli, che descrissero le sfere, le loro circonferenze congruono colle sezioni CBED, FGH, cioè colla circonferenza CBED nella maggior sfera, e con la circonferenza FGH nella minore; le quali, per costruzione, sono intorno al medesimo centro A, ed in vn medesimo piano; si tirino i due diametri DB, CE, che si seghino ad angoli retti nel centro A, e dal

punto G, nel piano CBL si tiri la retta GL ad angoli retti con la retta AB, la quale concorrerà con la circonferenza BLE in qualche punto L, e toccherà il circolo FGH nel punto G; si tiri la retta LB, e dal punto C, nell'arco CB, si addatti la retta CV uguale alla retta LG. Perche LG è perpendicolare ad AB, il triangolo

LGB sarà rettangolo in G, dal che la retta LB, sarà maggiore di LG: ma LG è uguale ad VC, sarà LB maggiore di CV, e l'arco LKB sarà maggiore dell'arco CV; si detragga dal quadrante BLE la sua metà, e dal restante se ne leui la metà, e con quest'ordine si proseguisca fin à tanto, che resti vn arco minore dell'arco CV; e supposto che l'arco restato sia KB; perche KB è minore di CV, e l'arco CV è minore di BL, sarà l'arco BK minore dell'arco BL. E proseguendo come nella propos. antecedente, nel maggior circolo CBED si descriua vn poligono equilatero, che i lati siano pari di numero, e non tocchino la circonferenza FGH del circolo minore; sarà la retta BK vno di quei lati; si addattino i lati KL, LM, ME, ciascuno uguale à BK, & il medesimo si faccia ne gli altri quadranti; si tiri poi la



a 11. del 1.

b Coroll. alla 16. del 6.

d 1. del 4.

e 17. del 11.

f 18. del 3.

g 1. del 10.

e farà la proportionne di $A\&$ ad $\&B$, come quella di AQ à QK ; dal che la retta BK sarà parallela ad $\&Q$. Ma si è dimostrata OS parallela alla medesima $\&Q$; le due BK, OS , faranno $\therefore$ frà di loro parallele, e le rette OB, SK , che le congiungono, faranno $\therefore$ nel medesimo piano, douc sono le parallele OS, BK : per la qual cosa il quadrilatero $OBKS$ farà vna figura piana. Nell'istesso modo si prouerà, che il quadrilatero $POST$ è figura piana, come ancora il quadrilatero $RPTY$, ed il triangolo XRY . Dal centro A si concepiscano tirate rette linee à i punti O, S, P, T, R, Y , e farà fatto il solido $XBKA$, che farà composto di più piramidi, le di cui basi sono i piani $BOSK, POST, PTYR, XRY$ ed hanno per vertice commune il punto A . Se per il centro A , e per li punti L , ed M , si facciano passare altri diametri, per i quali, e per la retta XA , si facciano passare altri piani, che seghino la medesima sfera, que'ti disegnaranno nella superficie della sfera altre circonferenze di circoli massimi, e facendosi in esse il medesimo, che si è fatto ne gli archi XB, XK , e similmente quanto si è fatto nella quarta parte XBE della sfera; si faccia ancor i nell'altre quarte parti XED, XDC, XCB , ed il simile si faccia ne l'emisfero inferiore, e sarà costruito nella maggior sfera il solido polliedro proposto. Dico che i piani, che contengono questo solido polliedro non toccano la superficie della minor sfera GHF .

Perche l'arco BK , per costruzione, è minore dell'arco CV , la retta BK sarà minore della retta CV : ma la retta CV è vguale ad LG , farà dunque LG maggiore della retta BK . Di nouo perche $Q\&$ è parallela al lato BK , i triangoli $ABK, A\&Q$ sono equiangoli, e la proportionne di AB à BK sarà come $A\&$ ad $\&Q$; e permutando, AB ad $A\&$ sarà come BK ad $\&Q$; ma AB è maggiore di $A\&$, farà BK maggiore di $\&Q$. E perche $\&Q$ è vguale ad OS , farà BK maggiore di OS . Dal centro A al piano $OBKS$ si faccia cadere la perpendicolare AZ , e si tirino le rette BZ, KZ . Perche la retta AZ è perpendicolare al piano $OBKS$, farà ancora perpendicolare alle rette BZ, KZ , e perciò gli angoli AZB, AZK , sono retti. Nel triangolo AZB angolo retto in Z , il quadrato dell'ipotenusa AB è vguale à i quadrati de i due lati AZ, ZB . Similmente nel triangolo AZK , angolo retto in Z , il quadrato di AK è vguale à i quadrati de i due lati AZ, ZK : ma le rette AB, AK , sono frà di loro vguali, i quadrati dunque delle due AZ, ZB , saranno vguali à i quadrati delle due AZ, ZK ; se ne leui il quadrato del commun lato AZ , resta il quadrato di ZB vguale al quadrato di ZK , e la retta ZB vguale alla retta ZK . Nell'istesso modo si dimostrerà, che le rette tirate dal punto Z à i punti O , ed S , sono frà di loro vguali, e sono vguali alle due ZB, ZK : per la qual cosa il punto Z è farà il centro di quel circolo, che passa per li punti O, B, K, S , ed il quadrilatero $OBKS$ farà iscritto nel circolo. E perche i lati OB, BK, KS , sono frà di loro vguali (stante che gli archi OB, BK, KS , sono frà di loro vguali) ed il lato BK è mostrato maggiore di OS , per l'antecedente Lemma 2. l'angolo BZK farà ottuso, ed il lato BK sarà maggiore di BZ ; ma la retta GL è dimostrata maggiore di BK , farà la retta GL molto maggiore di BZ . Finalmente nel triangolo AGL , angolo retto in G , il quadrato di AL è vguale à i quadrati de i due AG, GL , e similmente nel triangolo AZB , an-

q 2. del 6.
r 9. del 11.
t 7. del 11.

u 29. del 3.

x 29. & 32.
del 1.
y 4. del 6.
z 15. del 5.
a 14. del 5.
b 21. del 11.

c 3. definit.
del 11.

d 45. del 1.


e 9. del 3.

f 29. del 3.

g 19. del 1.

h 47. del 1.

golo retto in Z, il quadrato di AB è vguale à i quadrati de i due lati AZ, ZB: ma i semidiametri AB, AL, sono trà di loro vguali, faranno i quadrati delle due LG, GA, vguali à i quadrati delle due BZ, ZA; e perche il quadrato di LG è maggiore del quadrato di BZ (stante che LG è dimostrata maggiore di BZ,) se da i quadrati delle due LG, GA, se ne leua il quadrato di LG, e da i quadrati delle due BZ, ZA, se ne leua il quadrato della minore BZ, resta il quadrato di AG minore del quadrato di AZ, e la retta AZ maggiore di AG. E perche la retta AG è semidiametro della minor sfera, sarà AZ maggiore, che il semidiametro della minor sfera, per la qual cosa il punto Z cade lontano dalla superficie della minor sfera; e perciò il piano OBKS non tocca la superficie della minor sfera. Nell' istesso modo si dimostrerà, che nessun piano del solido polliedro descritto, tocca la superficie della sfera minore. Per la qual cosa nella maggior sfera si è iscritto vn solido polliedro di faccie di numero paro, i di cui piani non toccano la superficie della minor sfera, descritta intorno al medesimo centro della maggiore, ch'era da farsi, e dimostrarsi.



S C O L I O.

Se in vn altra sfera, sarà iscritto vn solido polliedro, simile al solido polliedro iscritto nell'antecedente sfera, il solido polliedro, iscritto in vna delle sfere, al simile solido polliedro, iscritto nell'altra sfera, hauerà triplicata proportion, che il diametro dell'vna, al diametro dell'altra sfera.

Perche tirato da i centri delle sfere à tutti gli angoli de i simili polliedri linee rette, quei solidi polliedri saranno risolti in tante piramidi; e perche i solidi polliedri si suppongono simili, però le piramidi dell'vno sono simili alle corrispondenti piramidi dell'altro: ma le piramidi simili, per l'8. propositione, sono in triplicata proportion, che i loro lati homologhi, la piramide dunque ABKSO, dell'antecedente figura, alla corrispondente piramide nell'altro simile polliedro, hauerà triplicata proportion, che il lato homologico AB, ch'è semi-

drame-


diametro della sfera CBE, al lato homologo della corrispondente piramide nell'altro polliedro, che sarà ancora semidiametro di quella sfera, nella quale è iseritto quel polliedro. E nell'istesso modo tutte l'altre piramidi del polliedro descritto nella sfera CBE, alle corrispondenti piramidi dell'altro simile polliedro, haueranno triplicata proportion, che i loro lati homologhi, pigliando quei lati, che sono semidiametri delle sfere; dal che tutte le piramidi del polliedro, descritto nella sfera CBE, prese come antecedenti, à tutte le piramidi del simile polliedro, descritto in altra sfera, prese come conseguenti, ^K saranno come un antecedente ad un conseguente, cioè come la piramide ABKSO alla corrispondente piramide nell'altro polliedro. Ma la piramide ABKSO, alla corrispondente piramide nell'altro polliedro, hà triplicata proportion, che il lato AB, che è semidiametro della sfera CBED, al lato homologo della corrispondente piramide nell'altro polliedro, che è semidiametro dell'altra sfera; cioè la piramide ABKSO alla corrispondente piramide, nell'altro polliedro hauerà triplicata proportion, che il semidiametro AB al semidiametro della sfera, doue è descritto l'altro polliedro; e perciò tutto il polliedro, descritto nella sfera CBED, à tutto il simile polliedro, descritto nell'altra sfera, hauerà triplicata proportion, che il semidiametro AB al semidiametro dell'altra sfera, doue è descritto il simile polliedro. Ma i semidiametri delle sfere sono come i diametri delle medesime, il polliedro dunque descritto nella sfera CBED, al polliedro simile descritto in altra sfera, hauerà triplicata proportion, che il diametro DB, della sfera CBED, al diametro della sfera, nella quale è descritto il simile polliedro, come si disse.

K 12. del 5.

THEOREMA XVI. PROPOSITIONE XVIII.

Le sfere sono frà di loro in triplicata proportion de i loro diametri.


Siano le sfere AB CD, EFGH, i di cui diametri BD, FH. Dico che la sfera AB CD alla sfera EFGH hà triplicata proportion di quella che hà il diametro BD al diametro FH. Se la sfera ABCD alla sfera EFGH non hà la proportion triplicata del diametro BD al diametro FH, habbia la sfera ABCD ad vn altra sfera, la proportion triplicata, che hà il diametro BD al diametro FH; quella ò sarà minore della sfera EFGH, come IKLM, ouero sarà maggiore, come la sfera



ra X.

ra X. Supposto prima, che sia minore, e sia quella la sfera IKLM posta intorno al medesimo centro della sfera EFGH.

Si iscriva nella sfera EFGH, per l'antecedente propos. vn. solido polliedro, che non tocchi la superficie della sfera minore IKLM, e sia quello il solido polliedro ENFOGPHQ. Sia poi iscritto nella sfera ABCD vn solido polliedro, simile al polliedro ENFOGPHQ, per l'antecedente Coroll. il polliedro ARBCTDV, descritto nella sfera ABCD, al simile



solido polliedro ENFOGPHQ descritto nella sfera EFGH, hauerà tripliata propotione di quella, che hà il diametro BD al diametro FH: ma la sfera ABCD alla sfera IKLM, per costruzione, hà la medesima propotione tripliata del diametro BD al diametro FH; la propotione dunque della sfera ABCD alla sfera IKLM, sarà come quella del solido polliedro ARBCTDV al solido polliedro ENFOGPHQ: è permittando, la sfera ABCD al solido polliedro ARBCTDV, sarà come la sfera IKLM al solido polliedro ENFOGPHQ. Ma la sfera ABCD è maggiore del solido polliedro ARBCTDV, sarà la sfera IKLM maggiore del solido polliedro ENFOGPHQ; la parte maggiore del tutto, ch'è impossibile. Non dunque la sfera ABCD alla sfera IKLM hà tripliata propotione, che il diametro BD al diametro FH. D'onde è manifesto essere impossibile, che la sfera ABCD habbia ad vn solido minore della sfera EFGH tripliata propotione di quella, che hà il diametro BD al diametro FH. E nell'istesso modo si dimostrerà essere impossibile, che la sfera EFGH habbia ad vn solido minore della sfera ABCD tripliata propotione di quella, che hà il diametro FH al diametro BD.

Di nuouo, supposto che la sfera ABCD habbia ad vn solido maggiore della sfera EFGH, tripliata propotione di quella, che hà il diametro BD al diametro FH, e sia quel solido la sfera X. Perche la sfera ABCD alla sfera X hà tripliata propotione, che il diametro BD al diametro FH, e per il Corollario antecedente, il polliedro ARBCTDV al polliedro ENFOGPHQ, hà la medesima tripliata propotione, che hà il diametro BD al diametro FH, sarà la sfera ABCD alla sfera X come il polliedro ARBCTDV al polliedro ENFOGPHQ: ed inuertendo, la sfera X alla sfera ABCD sarà come il polliedro ENFOGPHQ al polliedro ARBCTDV: ma per il Coroll. antecedente, il polliedro ENFOGPHQ al polliedro ARBCTDV hà tripliata propotione, che il diametro FH al

diame-

a 16. del 5.

b 14. del 5.

diametro BD, hauerà dunque la sfera X alla sfera ABCD triplicata proportionione, che il diametro FH al diametro BD, Supposto questo.

Si concepisca come la sfera X alla sfera ABCD, così la sfera EFGH ad vn'altra sfera, che sia Y; permutando, la sfera X alla sfera EFGH, sarà e come la sfera ABCD alla sfera Y: ma la sfera X è posta maggiore della sfera EFGH, ne segue la sfera ABCD essere maggiore della sfera Y, cioè la sfera Y sarà minore della sfera ABCD. Di nuouo essendosi dimostrato, che la sfera X alla sfera ABCD hà triplicata proportionione di quella, che hà il diametro FH al diametro BD, e si è fatta la sfera X alla sfera ABCD, come la sfera EFGH alla sfera Y, la sfera dunque EFGH alla sfera Y hauerà triplicata proportionione, che il diametro FH al diametro BD: per la qual cosa la sfera EFGH hauerà ad vn solido minore della sfera ABCD, triplicata portione di quella, che hà il diametro FH al diametro BD, ch'è contro à quello, che si è concluso nella prima parte. Non dunque la sfera ABCD hauerà ad vna sfera maggiore della sfera EFGH, triplicata proportionione, che il diametro BD al diametro FH, ne men, per quel che si è dimostrato nella prima parte, hauerà ad vna sfera minore della sfera EFGH triplicata proportionione, che il diametro BD al diametro FH, ed in consequenza la sfera ABCD alla sfera EFGH hauerà triplicata proportionione di quella, che hà il diametro BD al diametro FH, ch'era da dimostrarfi.

e 16. del 5.

d 14. del 5.

COROLLARIO.

Perche tanto la sfera alla sfera, quanto il polliedro, descritto in vna di esse, al simile polliedro descritto nell'altra, hà triplicata proportionione, che il diametro BD al diametro FH, sarà manifesto, che la sfera alla sfera è come il solido polliedro, al solido polliedro.

APPENDICE.

Della quale si è parlato nel fine del decimo Elemento.

Date due qualunque linee rette, frà loro incommensurabili in lunghezza, ritrouare altre grandezze, come figure piane, ò solide, frà di loro incommensurabili.

Siano esposte le rette A, & B frà di loro incommensurabili in lunghezza. Si troui frà le due A, & B una media proportionale, che sia la retta C. Dico che tutte le figure piane simili descritte sopra le rette A, & C ouero sopra le rette C, & B sono frà di loro incommensurabili, e tutt'i solidi d'uguali altezze, che hanno


A, _____
C, _____
B, _____

e 13. del 6.

XXX

per

per basi le figure piane simili descritte sopra le rette A , E C , ouero C , E B sono fra di loro incommensurabili. Similmente tutti i circoli, di cui diametri sono le rette A , E C , ouero C , E B sono fra di loro incommensurabili, e tutti i coni, e cilindri di uguali altezze, le di cui basi siano i circoli descritti intorno à i diametri A , E C , ouero C , E B sono fra loro incommensurabili.



b 13. del 6.

Perche i piani simili, e similmente posti sopra le rette A , E C hanno duplicata proportionione, che li loro lati homologhi, cioè la figura piana descritta sopra la retta A alla figura simile, e similmente posta alla retta C , E B duplicata proportionione di quella, che hà la retta A alla retta C , mà la prima A alla terza B hà la medesima duplicata proportionione di quella, che hà la retta A alla retta C , sarà la figura piana descritta sopra la retta A alla figura simile, e similmente posta sopra la retta C come la retta A alla retta B , mà la retta A per ipotesi è incommensurabile in lunghezza alla retta B , sarà la figura piana descritta sopra la retta B incommensurabile alla figura simile, e similmente posta sopra la retta C , l'istesso si dimostrerà se le figure simili saranno descritte sopra le rette C , E B . Se dunque sopra le rette A , E C , ouero C , E B , saranno descritte due qualunque figure simili, e similmente poste, quelle saranno fra di loro incommensurabili, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

c Lem. 8.
dopo la 18.
del 6.

d 11. del 5.

e 10. del 10.

Se saranno descritte figure solide di uguali altezze, le di cui basi siano li piani simili, e similmente posti sopra le rette A , E C , ouero C , E B ; perche gli solidi d'uguali altezze sono come le basi, essendo le basi per quel che si è dimostrato incommensurabili fra di loro, saranno ancora i solidi fra di loro incommensurabili, se dunque sopra le rette A , E C , ouero C , E B saranno descritte piani simili, e similmente posti, e sopra quei piani simili saranno descritte piramidi, o prismi, o altre figure solide d'uguali altezze, quelle figure solide saranno fra loro incommensurabili.

f 12. del 11.
g 6. del 12.

g 10. del 11.
h 10. del 6.

Di nuouo, si prese le rette A , E C , come diametri di due circoli, ed intorno alle rette A , E C saranno descritti quei circoli; perche il quadrato della retta A , al quadrato della retta C è come la retta A alla retta B , ed il quadrato del diametro A , al quadrato del diametro C è come il circolo descritto intorno al diametro A , al circolo descritto intorno al diametro C , sarà il circolo descritto intorno al diametro A , al circolo descritto intorno al diametro C , com'è la retta A alla retta B , mà le rette A , E B , per ipotesi sono fra loro incommensurabili.

K 10. del 6.
Lem. 8.
dopo la 18.
del 6.
a. del 11.

bili

bili in lunghezza, in conseguenza i circoli descritti intorno à i diametri A , e C^m sono frà loro incommensurabili, e se sopra quei circoli saranno descritti Coni, ò Cilindri d'uguali altezze; perche li Coni frà di loro, e Cilindri frà di loro sono come le basi, essendo le basi frà loro incommensurabili, saranno ancora li Coni, ò Cilindri d'uguali altezze descritti sopra di essi frà loro incommensurabili. Se dunque intorno a i diametri A , e C , ouero C , e B , si descriueranno circoli, quelli saranno frà loro incommensurabili, E se sopra à quei circoli saranno descritti Coni, ò Cilindri d'uguali altezze, quelli saranno frà loro incommensurabili, il che era da farsi, e dimostrarfi.

m. 10. del 10.

a. 11. del 11.

o. 10. del 10.

Fine del Duodecimo Elemento.



EVCLIDE RESTITVTO

D A

VITALE GIORDANI.

ELEMENTO DECIMOTERZO.



THEOREMA I. PROPOSITIONE I.

Se vna retta linea è diuisa secondo l'estrema, e media proportione, ed alla maggior parte s'aggiunga la metà di tutta la linea; il quadrato della composta è il quintuplo del quadrato di quella metà aggiunta.

a 30. del 6.

b 46. del 14.

c 31. del 1.

d 31. del 1.

e 43. del 1.

f 46. del 1.

g 1. definit.

del 2.

h 3. definit.

del 6.

k 19. del 6.

l 1. del 6.



IA la retta linea AB, ^a diuisa secondo l'estrema, e media proportione in C, ed alla maggior parte CA s'aggiunga la retta AD, vguale alla metà di tutta la retta AB. Dico, che il quadrato della composta DC è il quintuplo del quadrato dell'aggiunta DA. Sopra la retta CD ^b si descriva il quadrato CE, si tiri il diametro DF, e dal punto A si tiri la retta AG e parallela al lato DE, la quale segará il diametro DF in qualche punto H; per il punto H si faccia

passare la retta IK ^c parallela al lato DC, e sarà diuiso il quadrato CE in quattro parallelogrammi, de' quali i due IA, GK, che sono intorno al diametro DF, per il Corollario alla quarta propositione del secondo, sono quadrati, cioè sono i quadrati delle rette DA, AC, & i due AK, IG, sono rettangoli e vguali frà loro. Similmente sopra la retta AB ^d si descriva il quadrato OB, si continui FC sino in Q; il rettangolo QB sarà contenuto da i due lati PB, BC: ma il lato PB è vguale ad AB, il rettangolo PC sarà vguale a quello, ch'è contenuto dalle due AB, BC. Perche la retta AB è diuisa, per ipotesi, secondo l'estrema, e media proportione in C, sarà AB ad AC, ^e come AC à CB; ed il rettangolo contenuto dalle estreme AB, BC, ^f sarà vguale al quadrato della media AC, ma il rettangolo delle due AB, BC, è vguale al rettangolo PC, sarà il rettangolo PC vguale al quadrato di AC, cioè vguale al quadrato KG. In oltre, perche AB, per ipotesi, è il doppio di AD, ed è vguale ad AO, sarà AO il doppio di AD; ma AD (come lato del quadrato AI) è vguale ad AH, sarà OA il doppio di AH. Si considerino i rettangoli OC, AK, i quali hanno vna medesima altezza, ed in consequenza sono, come le basi OA, AH: ma OA è il doppio di AH,

di AH, farà il rettangolo OC il doppio di AK. E perchè il rettangolo AK² è vguale al complemento IG, farà il rettangolo OC vguale à i due complementi CH, HE. Hor à i due complementi CH, HE, s'aggiunga il quadrato KG, ed al rettangolo OC s'aggiunga il rettangolo QB, ne viene tutto il quadrato OB vguale allo gnomone LMN. Finalmente perchè AB è il doppio di AD, per lo Scolio alla quarta proposizione del secondo, il quadrato di AB farà il quadruplo del quadrato di AD, cioè il quadrato OB è il quadruplo del quadrato AI: ma il quadrato OB fu dimostrato vguale allo gnomone LMN, sarà lo gnomone LMN il quadruplo del quadrato AI: se allo gnomone LMN s'aggiunge il quadrato AI, ne viene tutto il quadrato CE il quintuplo del quadrato AI; cioè il quadrato di CD è il quintuplo del quadrato di DA, ch'era da dimostrarsi.



L E M M A.

Se il quadrato d'vna retta linea è il quintuplo del quadrato d'vna sua parte, il doppio di quella parte è maggiore del restante della linea.

Sia il quadrato della retta AB il quintuplo del quadrato della parte AC, e sia la retta D il doppio di AC. Dico, che la retta D è maggiore della retta CB. Perchè la retta D è il doppio di AC, per lo Scolio alla quarta proposizione del secondo, il quadrato della retta D farà il quadruplo del quadrato di AC. In oltre, perchè la retta AB è divisa in C, il quadrato di AB è vguale à i quadrati delle due AC, CB, col doppio rettangolo contenuto dalle medesime AC, CB; ma il quadrato di AB, per ipotesi, è il quintuplo del quadrato di AC, i quadrati delle due AC, CB, col doppio rettangolo contenuto dalle medesime AC, CB, sarà il quintuplo del quadrato di AC; se ne leui il quadrato di AC, resta il quadrato di CB, col doppio rettangolo contenuto dalle due AC, CB; il quadruplo del quadrato di AC: ma il quadrato della retta D è il quadruplo del quadrato di AC, sarà il quadrato della retta D vguale al quadrato di CB, col doppio rettangolo delle due AC, CB. Per la qual cosa il quadrato della retta D è maggiore del quadrato di CB, per quanto è il doppio rettangolo contenuto dalle due AC, CB, e perciò la retta D è maggiore di CB, ch'era da dimostrarsi.



THEOREMA II. PROPOSITIONE II.

Se il quadrato d'vna retta linea è il quintuplo del quadrato d'vna parte della medesima retta, & il doppio di quella parte è diuiso secondo l'estrema, e media proportion, la maggior parte farà vguale al rimanente della linea proposta.

Sia la retta AB diuisa in C, in modo che il quadrato di AB sia il quintuplo del quadrato di AC, e sia fatta CD il doppio di AC, farà CD, per l'antecedente lemma, maggiore di CB. Dico, che la retta CD è diuisa secondo l'estrema, e media proportion, la di cui maggior parte è la retta

CB, ch'è il restante di AB. Sopra la retta

AB^a si descriva il quadrato BE, si tiri il

diametro AF, e dal punto C si tiri la retta

CG^b parallela ad AE la quale segnerà il dia-

metro AF in qualche punto H; per il punto

H^c si faccia passare la retta IK parallela ad

EF; farà diuiso il quadrato BE in quattro

parallelogrammi, de' quali i due CI, KG, in-

torno al diametro AF, per il Coroll. alla 4.

propof. del secondo, sono quadrati, ed i com-

plementi BH, HE, sono rettangoli vguali; si

continui GC verso O, si faccia CO^d vguale

à CD, e si compisca il quadrato CP; si prolun-

ghi FB fino in Q; il rettangolo BP^e farà

contenuto da i due lati PD, DB; ma PD è vguale al lato CD, farà il ret-

tangolo PB vguale à quello, che è contenuto dalle due CD, DB. E per-

che CD è il doppio di AC, farà il quadrato di CD, per lo Scolio alla

quarta propositione del secondo, il quadruplo del quadrato di AC; cioè

il quadrato OD è il quadruplo del quadrato CI. Di nuouo perche il

quadrato di AB è il quintuplo del quadrato di AC, cioè il quadrato BE

è il quintuplo del quadrato IC, leuaron il quadrato IC, resta lo gnomone

LMN il quadruplo del quadrato CI; ma il quadrato OD fu dimostrato

il quadruplo del quadrato CI, farà lo gnomone LMN vguale al quadrato

OD. Finalmente perche DC è il doppio di CA, ed è vguale ad OC, farà

OC il doppio di CA; ma la retta CA è vguale ad HC, farà OC il doppio

di CH. E perche i rettangoli OB, CK, e sono come le basi OC, CH, ef-

sendo OC il doppio di CH, farà il rettangolo OB il doppio del rettan-

golo CK: ma il rettangolo CK^f è vguale al complemento HE, farà il rettan-

golo OB vguale à i due complementi BH, HE, giunti insieme; fu dimo-


strato tutto lo gnomone LMH vguale al quadrato OD, farà il rettangolo

QD vguale al quadrato KG, cioè vguale al quadrato di CB. E perche il

rettangolo QD fu dimostrato vguale al rettangolo contenuto dalle due

CD, DB, il rettangolo dunque contenuto dalle due CD, DB, farà vguale

al qua-



a 46. del 1.

b 31. del 1.

c 31. del 1.

d 3. del 1.

e i. del 6.

f 43. del 1.

al quadrato di CB; e sarà CD a CB *g* come la medesima CB al rimanente BD. Per la qual cosa la retta CD *h* è diuisa secondo l'estrema, e media proportionem nel punto B, e sarà CB la maggior parte, ch'era da dimostrarsi.

g 17. del 6.
h 3. definit.
del 6.

THEOREMA III. PROPOSITIONE III.


Se vna retta linea è diuisa secondo l'estrema, è media proportionem, il quadrato della retta composta della minor parte, e della metà della maggior parte, è il quintuplo del quadrato della metà della maggior parte.

Sia la retta AB diuisa secondo l'estrema, e media proportionem nel punto C, e la maggior parte AC sia diuisa in due parti uguali in D. Dico, che il quadrato della retta DB è il quintuplo del quadrato di DC. Perche AB è diuisa in C, secondo l'estrema, e media proportionem, sarà AB ad AC ² come AC a CB, ed il rettangolo contenuto dall'estreme AB, BC, b

a 3. definit.
del 6.
b 17. del 6.

Scolio alla quarta propositione del 2.

è il quadruplo del quadrato della metà CD, sarà il rettangolo contenuto dalle due AB, BC, il quadruplo del quadrato di CD. Se al rettangolo delle due AB, BC, s'aggiunge il quadrato di CD, il rettangolo contenuto dalle due AB, BC, col quadrato di CD, sarà il quintuplo del quadrato di CD. In oltre, perche la retta AC è diuisa in due parti uguali in D, e se l'è aggiunta la parte CB; il rettangolo contenuto dalle due AB, BC, col quadrato di CD, c



quadrato di DB: ma, per quel che si è dimostrato, il rettangolo contenuto dalle due AB, BC, col quadrato di CD, è il quintuplo del quadrato di CD, sarà il quadrato di DB il quintuplo del quadrato di CD, come fu proposto di mostrare.

c 6. del 2.

S C O L I O.

Il Camparo fa la conuersa nel seguente modo.

Se vna retta linea è diuisa in due parti ineguali, ed il quadrato della retta composta della minor parte, e della metà della maggior parte, sia il quintuplo del quadrato della metà della maggior parte; quella retta linea sarà diuisa secondo l'estrema, e media proportionem.

Sia la retta AB diuisa in due parti ineguali in C, in modo, che diuisa la maggior parte AC in due parti uguali in D, il quadrato di DB sia il quintuplo

del

del quadrato di DC. Dico, che la retta AB è diuisa in C, secondo l'estrema, e media proporzione. Perche la retta AC è diuisa in due parti uguali in D; e se P è aggiunta la retta CB, il rettangolo contenuto dalle due AB, BC, col quadrato di CD, è uguale al quadrato di DB: ma il quadrato di DB, per ipotesi, è il quintuplo del quadrato di CD, sarà il rettangolo contenuto dalle due AB, BC, col quadrato di DC, il quintuplo del quadrato di CD; toltone il quadrato di CD, sarà il rettangolo contenuto dalle due AB, BC, il quadruplo del quadrato di CD. E perche il quadrato della retta AC è il quadruplo del quadrato della metà DC, sarà il rettangolo contenuto dalle due AB, BC, uguale al quadrato di AC: dal che AB ad AC, è come AC a CB; per la qual cosa la retta AB è diuisa in C secondo l'estrema, e media proporzione, ch'era da dimostrarsi.



a 6. del 2.

b Scol. alla

4. del 2.


c 17. del 6.

d 3. definit. del 6.

THEOREMA IV. PROPOSITIONE IV.

Se vna retta linea è diuisa secondo l'estrema, e media proporzione, il quadrato di tutta, col quarto della minor parte, è il triplo del quadrato della parte maggiore.

Sia la retta linea AB diuisa in C secondo l'estrema, e media proporzione. Dico, che il quadrato di tutta AB, col quadrato della minor parte CB, è il triplo del quadrato della maggior parte AC. Perche la retta AB è diuisa in C secondo l'estrema, e media proporzione, sarà AB ad AC, come AC a CB, ed il rettangolo contenuto dall'estreme AB,



a 3. definit. del 6.

b 17. del 6.

BC, sarà uguale al quadrato di AC, e perciò il doppio rettangolo contenuto dalle due AB, BC, sarà il doppio del quadrato di AC. Se al doppio rettangolo contenuto dalle due AB, BC, s'aggiunge il quadrato di AC, il doppio rettangolo contenuto dalle due AB, BC, col quadrato di AC, sarà il triplo del quadrato di AC: ma per la 7. proposizione del secondo, il doppio rettangolo contenuto delle due AB, BC, col quadrato di AC, è uguale a i quadrati delle due AB, BC, i quadrati dunque delle due AB, BC, sono il triplo del quadrato di AC, ch'era da dimostrarsi.

S C O L I O.


Questa ancora si conuerie nel seguente modo.

Se vna retta linea è diuisa in due parti ineguali, in modo, che il quadrato di tutta, col quadrato della minor parte, sia il triplo del quadrato della maggior parte, quella

retta

retta linea farà diuifa secondo l'estrema, e media proportione.

Sia diuifa la retta AB in due parti ineguali in C , in modo, che il quadrato di AB , col quadrato della minor parte CB , sia il triplo del quadrato della maggior parte AC . Dico, che la retta AB è diuifa in C , secondo l'estrema, e media proportione. Perche la retta AB è diuifa in C , per la settima proposizione del secondo, il quadrato di AB , col quadrato di BC , è uguale al doppio rettangolo contenuto dalle due AB , BC , col quadrato di AC ; ma i quadrati delle due AB , BC , per ipotesi, sono il triplo del quadrato di AC ; sarà il doppio rettangolo contenuto dalle due AB , BC , col quadrato di AC , il triplo del quadrato di AC ; se ne leui il quadrato di AC , resta il doppio rettangolo contenuto dalle due AB , BC , uguale al doppio quadrato di AC ; e la metà, cioè il rettangolo contenuto dalle due AB , BC , sarà uguale al quadrato di AC ; dal che AB ad AC ^a sarà come AC a CB . Per la qual cosa la retta AB ^b è diuifa in C , secondo l'estrema, e media proportione, ch'era da dimostrarsi.




a 17. del 6.
b 3. definit.
del 6.

Il Maurolico aggiunge il seguente Theorema.

Se vna retta linea è diuifa secondo l'estrema, e media proportione, alla quale sia aggiunta vna retta uguale alla minor parte, il quadrato della composta è il quintuplo del quadrato della maggior parte; e se vna retta linea è diuifa in due parti ineguali, in modo, che aggiuntale vna retta uguale alla minor parte, il quadrato della composta sia il quintuplo della maggior parte, quella retta linea farà diuifa secondo l'estrema, e media proportione.

Sia prima la retta AB diuifa in C , secondo l'estrema, e media proportione, alla quale sia aggiunta la retta BD , uguale alla minor parte CB . Dico, che il quadrato di AD è il quintuplo del quadrato di AC . Perche la retta AB è diuifa in C , e se P è aggiunta la retta BD , uguale a CB , il quadruplo rettangolo contenuto dalle due AB , BC , col quadrato di AC , è uguale al quadrato di AD . In oltre, perche, AB è diuifa secondo l'estrema, e media proportione in C , sarà AB ad AC ^b come AC a CB : si che il rettangolo contenuto dall'estreme AB , BC , ^c sarà uguale al quadrato della media AC ; ed il quadruplo rettangolo contenuto dalle medesime AB , BC , sarà il quadruplo del quadrato di AC . Se al quadruplo rettangolo contenuto dalle




a 8. del 1.

b 3. definit.
del 6.
c 17. del 6.

due

del qua
drato

d 8. del 2.
 due AB, BC ; s'aggiunge il quadrato di AC , il quadruplo rettangolo contenuto dalle due AB, BC , col quadrato di AC , sarà il quintuplo del quadrato di AC : ma il quadruplo rettangolo contenuto dalle due AB, BC , col quadrato di AC , ^d è uguale al quadrato di AD ; il quadrato dunque di AD è il quintuplo del quadrato di AC , ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.



e 8. del 2.
 Di nuovo sia divisa AB in due parti ineguali in C , in modo che aggiunta ad AB la parte BD , uguale a CB , il quadrato di AD sia il quintuplo del quadrato di AC . Dico, che la retta AB è divisa in C , secondo l'estrema, e media proporzione. Perché il quadrato di AD è il quintuplo del quadrato di AC , ed il quadrato di AD è uguale al quadruplo rettangolo contenuto dalle due AB, BC , col quadrato di AC ; sarà il quadruplo rettangolo contenuto dalle due AB, BC , col quadrato di AC , il quintuplo del quadrato della medesima AC : se ne levi il quadrato di AC , il quadruplo rettangolo contenuto dalle due AB, BC , sarà il quadruplo del quadrato di AC ; ed il solo rettangolo contenuto dalle due AB, BC , sarà uguale al quadrato di AC . Per la qual cosa AB ad AC ¹ sarà come AC a CB , e la retta AB ² sarà divisa in C , secondo l'estrema, e media proporzione, ch'era da dimostrarsi.

f 17. del 6.
 g 3. defn.
 del 6.

THEOREMA V. PROPOSITIONE V.

Se vna retta linea è divisa secondo l'estrema, e media proporzione, alla quale sia aggiunta vna retta uguale alla maggior parte; tutta la composta sarà divisa secondo l'estrema, e media proporzione; e la maggior parte sarà la linea proposta.

Sia la retta linea AB divisa in C , secondo l'estrema, e media proporzione, ed alla retta AB sia aggiunta DA uguale alla maggior parte AC . Dico, che la composta DB è divisa in A , secondo l'estrema, e media proporzione; e la maggior parte sarà AB . Perché AB è divisa in C , secondo l'estrema, e media proporzione, sarà AB ad AC , ^a cioè AB ad AD , come AC a CB ; ed inuertendo, DA ad AB , sarà ^b come BC a CA ; e componendo, DB a BA ^c sarà come BA ad AC , cioè come la medesima BA ad AD ; per la qual cosa la retta AB ^d è divisa in A , secondo l'estrema, e media proporzione, ed AB è la maggior parte, ch'era da dimostrarsi.



a 3. defn.
 del 6.
 b Corol. al-
 la 4. del 5.
 c 18. del 5.
 d 3. defn.
 del 6.

S C O L I O I.

La conuerſa la dimoſtraremo.col Campano nel modo ſequente.

Se vna retta linea è diuiſa ſecondo l'eſtrema, e media proportione,e dalla maggior parte ſe ne detragga vna retta vguale alla minor parte; quella maggior parte ſarà diuiſa ſecondo l'eſtrema,e media proportione; e la maggior parte ſarà vguale à quella, che in tutta era la minore dell'eſtreme.

Sia la retta AB diuiſa ſecondo l'eſtrema, e media proportione in C,e dalla parte maggiore CB ſe ne detragga le retta CD,vguale alla minore AC. Dico, che la retta CB è diuiſa in D, ſecondo l'eſtrema, e media proportione; e la maggior parte ſarà CD, ch'è vguale ad AC. Perche AB è diuiſa in C, ſecondo l'eſtrema, e media proportione, ſarà AB à BC, ^a come la medefima BC ad AC,cioè come BC à CD; e diuidendo, AC à CB ^b ſarà come BD à DC; ed inuertendo, BC à CA, e ouero CD, ſarà come la medefima CD à DB. Per la qual coſa la retta CB ſ'è diuiſa in D, ſecondo l'eſtrema,e media proportione, e la parte maggiore è la retta CD, ch'era da dimoſtrarſi.




a 3. defini.
del 6.
b 17. del 5.
c Coroll. alla
4. del 5.
d 3. defini.
del 6.

S C O L I O II.

Di Pappo propoſit. 44. lib. 5. nel Commento del Commandino, ed Hypſicle 7. prop. del 14. Elemento.

Le parti delle rette diuiſe ſecondo l'eſtrema è media proportione, ſono frà loro proportionali.

Sia diuiſa la retta AB ſecondo l'eſtrema, e media proportione in C, e ſia la maggior parte AC; ſimilmente ſia diuiſa la retta DE, ſecondo l'eſtrema, e media propor-



tionem in F, e ſia DF la maggior parte. Dico che BA ad AC è come ED à DF, e che AC à CB è come DF ad FE. Si prolunghino le rette AB, DE, verſo G, ed H; ſi faccia BG, vguale à CB, e ſi faccia EH vguale ad EF, per Poſtula del ſecondo, il quadruplo rettangolo contenuto dalle due AB, BC, col quadrato di AC, è vguale al quadrato di AG; ed il quadruplo rettangolo contenuto dalle due DE, EF, col quadrato di DF, è vguale al qua-

a 3. del 2.

Y y y

drato

b 3. definit.
del 6.
c 17. del 6.


d 7. del 5.

e 18. del 5.

f 8. del 3.

g 11. del 6.
h 17. del 5.
K Secl. alla
23. del 5.
l 18. del 5.
m coroll. alla
4. del 5.

drato di DH. Perche la retta AB è divisa in C, secondo l'estrema, e media proporzion, sarà BA ad AC^b come AC à CB, ed il rettangolo contenuto dall'estreme AB, BC, sarà uguale al quadrato della media AC. E per l'istessa ragione il rettangolo contenuto dalle due DE, EF, è uguale al quadrato di DF; e perciò il rettangolo contenuto dalle due AB, BC, al quadrato di AC, sarà come il rettangolo contenuto dalle due DE, EF, al quadrato di DF;




quadruplati gli antecedenti, sarà il quadruplo rettangolo contenuto dalle due AB, BC, al quadrato di AC, come il quadruplo rettangolo contenuto dalle due DE, EF, al quadrato di DF; e componendo, sarà il quadruplo rettangolo delle due AB, BC, col quadrato di AC, al quadrato di AC, come il quadruplo rettangolo contenuto dalle due DE, EF, col quadrato di DF, al quadrato di DF: ma il quadruplo rettangolo delle due AB, BC, col quadrato di AC, è uguale al quadrato di AG; ed il quadruplo rettangolo delle due DE, EF, col quadrato di DF, è uguale al quadrato di DH; sarà il quadrato di AG al quadrato di AC, come il quadrato di HD al quadrato di DF, ed il lato GA al lato AC, sarà come HD à DF; e dividendo, GC à CA^b sarà come HF ad FD; e prese le metà dell'antecedenti, sarà EC à CA, come EF ad FD, e componendo BA ad AC^l sarà come ED ad DF. Similmente essendo BC à CA come EF ad FD, invertendo, ^m AC à CB sarà come DF ad FE, ch'era da dimostrarsi.

La conuersa di questa proposizione, la fa il Sig.^o Borelli nel seguente modo.

Se due rette sono diuise proportionalmente; ed vna di quelle è diuisa secondo l'estrema, e media proporzion, ancora l'altra sarà diuisa secondo l'estrema, e media proporzion.

Sia la retta AB diuisa secondo l'estrema e media proporzion in C, e sia AC la maggior parte; la proporzion di BA ad AC, sia come quella di ED à DF. Dico che la retta DE è diuisa secondo l'estrema, e media proporzion,



e la maggior parte sarà la retta DF. Perche BA ad AC è come ED à DF, per la conuersione della proporzion, sarà AB à BC, come DE ad EF; e diuidendo, AC à CB^b sarà come DF ad FE; ma AC à CB è come BA ad AC (stante, che la retta AB è diuisa secondo l'estrema, e media proporzion) sarà DF ad FE, come BA ad AC: ma BA ad AC, per ipotesi, è come ED à DF, sarà ED à DF^d come DF ad FE. Per la qual cosa la retta DE è diuisa in F secondo l'estrema, e media proporzion, e la maggior parte è DF, che era da dimostrarsi.

a coroll. alla
19. del 4.
b 17. del 5.

c 11. del 5.
d 11. del 5.
e 3. definit.
del 6.

Suppo-

Supposto le cose antedette facilmentese si può dimostrare il seguente Theorema.

Se qualunque retta AB è divisa secondo l'estrema, e media proportione in C, la di cui maggior parte sia AC, e preso in AB qualunque punto D, poi divisa la maggior parte AC, in modo, che AE ad EC sia come AD a DB. Dico che la retta AD è divisa secondo l'estrema, e media proportione in E, e la maggior parte sarà la retta AE.

Perche AD a DB è come AE ad EC, inuertendo, ^a sarà BD a DA come CE ad EA, e componendo, BA ad AD ^b sarà come CA ad AE, e permutando BA ad AC e sarà come DE ad AE: ma BA, per ipotesi, è divisa secondo l'estrema, e media proportione in C, per l'amedecedente Theorema, sarà DA divisa secondo l'estrema, e media proportione in E, di cui AE sarà la maggior parte, ch'era da dimostrarsi.



a Coroll. alla 4. del 5.


b 18. del 5.

c 16. del 5.

THEOREMA VI. PROPOSITIONE VI.

Se vna retta linea Rationale è divisa secondo l'estrema, e media proportione, l'vna, e l'altra parte è linea irrationale, ed è quella, che si chiama Apotome,

Sia la retta Rationale AB, divisa secondo l'estrema, e media proportione in C, e sia AC la maggior parte. Dico che ciascuna delle rette AC, CB, è irrationale, e che ambedue, prese separatamente, sono Apotome. Alla parte maggiore AC s'aggiunga la retta AD,



vguale alla metà della Rationale AB, sarà il quadrato di CD, per la prima propositione di questo, il quintuplo del quadrato di AD; per la qual cosa il quadrato di CD al quadrato di AD sarà come numero a numero, cioè come 10. a 2, e perciò i quadrati delle due CD, DA, ^a sono commensurabili, e le rette CD, DA, sono commensurabili almeno in potenza: ma la retta AD è Rationale, ^b stante che è commensurabile al suo doppio, cioè alla Rationale AB: sarà dunque CD, ^c che gli è commensurabile, Rationale. In oltre perche i quadrati delle due CD, DA, ^d non sono come numero quadrato a numero quadrato, stante che sono come 10. a 2, le rette CD, DA, ^e faranno incommensurabili in lunghezza, e perciò saranno Rationali, e commensurabili solamente in potenza. Se dunque dalla Rationale CD, se ne detrae la retta DA, Rationale solamente in potenza, sarà la rimanente AC ^f irrationale, e farà quella, che si chiama Apotome.

a 6. del 10.

b 6. defin. del 10.

c 6. defin. del 10.

d Scollio nel fine del 9.

e 9. del 10.

f 74. del 10.

Yyyy 2


Di

g. 45. del 1.

h. 9. defin.
del 6.

K. 17. del 6.

Di nuovo s'intenda applicato ad AB il rettangolo AE vguale a quello, ch'è contenuto dalle due AB, BC , farà il lato BE vguale alla retta CB . Perchè AB ad AC è come AC à CB , il rettangolo contenuto dalle due AB, BC , cioè il rettangolo AE , sarà vguale al quadrato dell'Apotome AC . Hor perchè il quadrato dell'Apotome AC , cioè il rettangolo AE , è applicato alla Rationale AB , l'altro lato BE , ouero BC , che ne risulta, per la 98. del 10. è Apotome prima, e perciò le due AC, CB , sono linee irrazionali, e sono Apotome, ch'era da dimostrarsi.



S C O L I O.

Si può qui aggiungere il seguente Theorema. del Campano.

Se vna retta linea è diuisa secondo l'estrema, e media proportion, e la parte maggiore è Rationale, la minore sarà Apotome.

Sia la retta AB diuisa secondo l'estrema, e media proportion in C , la di cui maggior parte AC sia Rationale. Dico che la minore CB è Apotome. Si diuida AC in due parti vguali in D , sarà la metà DC Rationale, ed il quadrato di BD sarà il quintuplo del quadrato di DC ; dal che i quadrati delle rette BD, DC , sono come 10. à 2, cioè come numero à numero, e perciò i quadrati delle due BD, DC , sono commensurabili, e le rette BD, DC , sono commensurabili almeno in potenza: ma DC è Rationale, sarà ancora DB , e che gli è commensurabile, Rationale. E perchè i quadrati delle due BD, DC , per lo Scolio nel fine del nono, non sono come numero quadrato à numero quadrato; le due BD, DC saranno incommensurabili in lunghezza, per la qual cosa le medesime BD, DC sono Razionali, commensurabili solamente in potenza; se dunque dalla Rationale DB se ne detrae la Rationale DC , commensurabile solamente in potenza, la rimanente BC è Apotome, ch'era da dimostrarsi.



a. 3. del 13.

b. 6. del 10.

c. 6. defin.
del 10.

d. 9. del 10.

e. 74. del 10.

THEOREMA VII. PROPOSITIONE VII.

Se tre angoli d'un pentagono equilatero, ò contigui, ò non contigui, sono frà loro vguali, quel pentagono sarà equiangolo.

Nel pentagono equilatero $ABCDE$, siano prima i tre angoli contigui A, B, C , frà di loro vguali. Dico che il proposto pentagono $ABCDE$ è equiangolo. A gli vguali angoli A, B, C , siano sottratte le rette DB, CA, BE . Perchè i due lati DC, CB , del triangolo DBC , sono vguali à i due lati BA, AE , del triangolo BAE , l'angolo DCB , per ipotesi, è vguale

all'

all'angolo BAE, sarà la base BD vguale alla base BE, e l'angolo BEA, vguale all'angolo BDC. Hor essendo i lati BD, BE, vguali fra loro, gl'angoli BDE, BED, b faranno fra di loro vguali, à i quali s'aggiungano gli vguali angoli BDC, BEA, farà tutto l'angolo AED, vguale all'angolo CDE. In oltre perche i due lati CB, BA, del triangolo CBA, sono vguali à i due lati EA, AB, del triangolo BAE, e l'angolo CBA, per ipotesi, è vguale all'angolo BAE, sarà la base BE vguale alla base CA, l'angolo CAB vguale all'angolo EBA, e l'angolo BCA vguale all'angolo ABE. Hor essendo gli angoli FAB, FBA, fra di loro vguali, sarà il lato FA vguale al lato FB; dalle vguali rette CA, EB, se ne leuino le vguali rette FA, FB, resta CF vguale ad FE: dal punto F all'angolo opposto D si tiri la retta FD. Essendo il lato DC vguale, per ipotesi, al lato DE, è si è dimostrato il lato EF vguale al lato FC, i due lati DC, CF, del triangolo DCF, sono vguali à i due lati DE, EF, del triangolo DEF, la base DF è commune, sarà l'angolo DCF, vguale all'angolo DEF, à i quali s'aggiungano gli vguali angoli BCA, AEB, tutto l'angolo BCD, sarà vguale à tutto l'angolo AED; ma l'angolo AED è dimostrato vguale all'angolo EDC, e l'angolo DCB è supposto vguale ad ogn'vno degli angoli CBA, BAE; tutti gli angoli dunque del pentagono ABCDE sono fra di loro vguali, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.



Di nuouo, supposto che i tre angoli vguali non siano contigui, come sono i tre angoli A, C, & D. Dico similmente, che il pentagono ABCDE è equiangolo. Considerando i due triangoli BAE, DCB, si dimostri, come prima si fece, che le basi BE, BD, sono fra loro vguali, e che tutto l'angolo AED è vguale all'angolo CDE; ma l'angolo CDE è posto vguale all'angolo BCD; i tre angoli contigui BCD, CDE, DEA, sono fra di loro vguali, e per quel che si è dimostrato nella prima parte, il pentagono ABCDE è equiangolo, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA VIII. PROPOSITIONE VIII.

Se due angoli contigui d'un pentagono equilatero, ed equiangolo, sono sottratti da due rette linee, quelle si segano scambievolmente secondo l'estrema, e media proportion, ed ogn'vna, delle parti maggiori è vguale al lato del pentagono.

Sia il pentagono equilatero, ed equiangolo ABCDE, del quale due cōtiguui angoli vguali, come C, D, siano sottratti dalle rette BD, CE, le quali si segano scambievolmente in qualche punto F. Dico che le rette EC, BD, si segano scambievolmente secondo l'estrema, e media proportion; e ciascuna delle parti maggiori EF, FB, è vguale al lato del pentagono. Intorno

a 14. del 4.

b 18. del 3.

c 33. del 6.

d 17. del 3

e 6. del 1.

f 4. del 1.

g 31. del 1.

h 6. del 1.

K 32. del 1.

l 4. del 6.

m 3. defn.
del 6.

al proposto pentagono α si circoscriua il circolo $ABCDE$. Essendo il pentagono equilatero, ed equiangolo, gli archi AB, BC, CD, DE, EA saranno frà di loro vguali, dal che l'arco BAE sarà il doppio dell'arco ED e l'angolo BCE , opposto all'arco BAE , ϵ sarà il doppio dell'angolo ECD opposto all'arco ED . Similmente essendo gli archi BC, CD, ED , frà di loro vguali, gli angoli opposti CDB, CBD, DEC, DCB , δ sono frà di loro vguali. Hor essendo li angoli FCD, FDC , frà di loro vguali, sarà $CF =$ vguale ad FD . Si considerino i due triangoli BCD, CDE . Perche i due lati BC, CD , per ipotesi, sono vguali à i due lati CD, DE , e l'angolo BCD è vguale all'angolo CDE , sarà la base CE vguale alla base BD ; se ne leuino le vguali FC, FD , resta FB vguale ad FE . Nel triangolo isoscele FCD , continuato il lato DF verso B , l'angolo BFC esterno è vguale à i due angoli FCD, FDC , interni ed opposti: ma i due angoli FCD, FDC , furono dimostrati vguali, sarà l'angolo BFC il doppio dell'angolo FCD ; e perche l'angolo BCF fu dimostrato il doppio del medesimo angolo FCD , sarà l'angolo BFG vguale all'angolo BCF ; dal che il lato BF sarà vguale al lato BC . Finalmente si considerino i triangoli FCD, BCD , de' quali l'angolo DBC è dimostrato vguale all'angolo FCD , e l'angolo FDC è commune, il rimanente angolo CFD sarà vguale al restante angolo BCD ; i triangoli FCD, BCD , sono equiangoli, e la proposizione di BD à DC , sarà come quella di CD à DF : ma CD è vguale al lato CB , ouero BF , sarà BD à BF , come il medesimo lato BF ad FD ; per la qual cosa la retta BD , è diuisa in F secondo l'estrema, e media proportione, e la maggior parte BF è vguale al lato BC . Nell'istesso modo si dimostrerà, che la retta CE è diuisa in F , secondo l'estrema, e media proportione, e la maggior parte FE è vguale al lato del pentagono, come fu proposto dimostrare.



S C O L I O.

Facilmente dimostreremo col P. Clauio, che la retta, la quale sostiene un angolo del pentagono equilatero, ed equiangolo, è parallela al lato opposto à quell'angolo.

Perche antecedentemente si è dimostrato, che gli angoli DEC, DCE sono frà loro vguali, leuati da gli vguali angoli DEA, DCB , resta l'angolo BCE , vguale all'angolo AEC , vgualmente se gli aggiunga l'angolo A , i due angoli BCE, BAE , saranno vguali à i due angoli BAE, CEA : ma nel quadrilatero $BCEA$ iscritto nel circolo, i due angoli opposti BAE, BCE , sono vguali à due angoli retti; i due angoli dunque BAE, CEA , sono vguali à due angoli retti, e perciò le rette BA, CE sono frà di loro parallele, ch'era da dimostrarsi.


a 1. del 3.

b 18. del 1.

THEOREMA IX. PROPOSITIONE IX.

Se al lato dell'esagono s'aggiunge il lato del decagono inscritto nel medesimo circolo, tutta la retta composta sarà diuisa secondo l'estrema, e media proportione, la di cui maggior parte sarà il lato dell'esagono.

Nel circolo ABC sia il lato del decagono iscritto BC, il quale sia continuato verso E; si faccia BE^a vguale al semidiametro del circolo ABC, sarà BE^b il lato dell'esagono iscritto nel circolo ABC. Dico che la retta EC è diuisa secondo l'estrema, e media proportione, in B, la di cui maggior parte è il lato BE dell'esagono. Dal punto C, per il centro D del circolo, si faccia passare il diametro CA, e fittino le rette DE, DB. Perche CB è lato del decagono, perciò sottrenderà la decima parte di tutta la circonferenza del circolo; cioè sot-



a 3. del 2.
b Corollaria
15. del 4.

tenderà la quinta parte dell'arco ABC; per la qual cosa l'arco AB è il quadruplo dell'arco BC, e l'angolo ADB^c sarà il quadruplo dell'angolo BDC. In oltre perche le rette BD, BE, sono frà di loro vguali, sarà l'angolo BED^d vguale all'angolo BDE. Nel triangolo EBD il lato EB è continuato in C, l'angolo esterno CBD^e è vguale à i due angoli BED, BDE, interni, ed opposti: ma i due angoli BED, BDE, sono frà loro vguali, sarà l'angolo DBC il doppio dell'angolo BED. E perche l'angolo DBC è vguale all'angolo DCB, stante che i lati DB, DC, f sono frà loro vguali, l'angolo ancora DCB sarà il doppio dell'angolo BED, e perciò i due angoli DBC, DCB, insieme giunti, sono il quadruplo dell'angolo E. Nel triangolo BDC il lato CD è continuato verso A, dal che l'angolo esterno ADB^f sarà vguale à i due angoli DBC, DCB: ma questi sono il quadruplo dell'angolo E, sarà l'angolo ADB il quadruplo dell'angolo E: fù mostrato l'angolo ADB essere il quadruplo dell'angolo CDB, l'angolo dunque CDB sarà vguale all'angolo E. Si considerino i due triangoli DCB, DCE, de'quali l'angolo CDB è vguale all'angolo E, e l'angolo DCB è commune; i due angoli BCD, BDC, del triangolo BDC, saranno vguali à i due angoli DCE, DEC, del triangolo DCE, ed il rimanente angolo CBD^h sarà vguale al restante angolo CDE, per la qual cosa i triangoli DCB, DCE, sono equiangoli, e la proportione di EC à CD^k sarà come quella di CD à CB; ma CD è vguale alla retta BD, cioè ad EB; sarà dunque EC ad EB come la medesima EB à BC; dal che la retta EC è diuisa secondo l'estrema, e media proportione, e la maggior parte è la retta BE, ch'è lato dell'esagono, come fù proposto dimostrare.

c 33. del 6.

d 5. del 2.
e 32. del 2.

f 5. del 5.

g 32. del 2.

h 32. del 2.
k 4. del 6.

l 3. defin.
del 6.

COROLLARIO I.

Essendosi dimostrato nello Scolio alla 5. propositione, di questo, che se vna retta è diuisa secondo l'estrema, e media proportione, e dalla parte maggiore se ne detrae la minor parte, quella parte maggiore sarà diuisa secondo l'estrema, e media proportione, la di cui maggior parte è quella detratta; sarà manifesto, che se dal lato dell'esagono se ne detragga il lato del decagono, iscritto nel medesimo circolo, il lato dell'esagono sarà diuiso secondo l'estrema, e media proportione, la di cui maggior parte sarà il lato del decagono.

COROLLARIO II.

Appare ancora, che se il lato del esagono è diuiso secondo l'estrema, e media proportione, la maggior parte sarà il lato del decagono iscritto nel medesimo circolo.

Sia AB il lato dell'esagono iscritto in qualche circolo, e la retta AB sia diuisa secondo l'estrema, e media proportione in C, in modo, che AC sia la maggior parte,



ed alla retta AB sia aggiunta la retta AD, uguale ad AC, per la 5. di questo, sarà DB diuisa secondo l'estrema, e media proportione in A, e la maggior parte sarà AB, ch'è lato dell'esagono; e per l'antecedente propositione, la retta AD sarà il lato del decagono: ma AD è posta uguale ad AC, sarà dunque AC il lato del decagono iscritto nel medesimo circolo, ch'è il nostro proposto.

THEOREMA X. PROPOSITIONE X.


Se nel circolo è iscritto vn pentagono equilatero, ed equiangolo, il quadrato del lato del pentagono, è vguale al quadrato del lato dell'esagono, col quadrato del lato del decagono, iscritti nel medesimo circolo.

Nel circolo ACD, il di cui centro F, sia iscritto il pentagono ABCDE equilatero, ed equiangolo. Dico che il quadrato del lato AB è vguale

al

al quadrato del lato del esagono, col quadrato del lato del decagono, iscritto nel medesimo circolo ACD. Dal punto A, per il centro F, si faccia passare il diametro AG del circolo, e si tiri la retta FB; sarà FB vguale al lato dell'esagono iscritto nel medesimo circolo ACD; si diuida l'arco AB in due parti vguali in H, e si tirino le rette FH, HB, HA, la retta FH segnerà AB in qualche punto I. Perche l'arco AB, sorteso dal lato del pentagono, è il doppio dell'arco AH, la retta AH sarà il lato del decagono; si diuida l'arco AH in due parti vguali in K, e si tiri la retta FK, la quale segnerà la retta AH in qualche punto L, e la retta BA in qualche punto M; si tiri la retta HM. Perche l'arco BH è vguale all'arco HA, sarà l'angolo BFH vguale all'angolo HFA. Si considerino i due triangoli FIB, FIA. Perche i due lati BF, FI, sono vguali à i due lati AF, FI, e l'angolo BFI è vguale all'angolo AFI, sarà la base BI vguale alla base AI, e gli angoli in I saranno retti. Similmente essendo l'arco HK vguale all'arco KA, nell'istesso modo si prouerà, che la retta HL è vguale alla retta LA, e che gli angoli in L sono retti. In oltre da gli vguali archi ABCG, AEDG (che sono circonferenze de i mezzi circoli) se ne detraggano gli vguali archi ABC, AED, resta l'arco CG vguale all'arco GD. E perche gli archi AB, CD, sono frà loro vguali, le loro metà, cioè gli archi CG, AH, sono frà di loro vguali; ma l'arco AH, per costruzione, è il doppio dell'arco HK, sarà l'arco CG il doppio dell'arco HK. Similmente perche l'arco AB è il doppio dell'arco BH, sarà l'arco CB il doppio dell'arco BH. Hor essendo l'arco CG il doppio dell'arco HK, e l'arco CB il doppio dell'arco BH, sarà tutto l'arco GB il doppio di tutto l'arco BK, e perciò l'angolo GFB è sarà il doppio dell'angolo BFK. E perche l'angolo GFB al centro è il doppio dell'angolo FAB all'arcuatura, l'angolo dunque FAB sarà vguale all'angolo BFK. Si considerino i due triangoli ABF, FMB, de' quali l'angolo BFM è vguale all'angolo FAB, l'angolo FBM è commune ad ambedue, faranno i due angoli MFB, MBF, del triangolo FMB, vguali à i due angoli FAB, FBA, del triangolo BFA, ed il rimanente angolo FMB sarà vguale al restante angolo BFA; dal che i triangoli FMB, FAB sono equiangoli, e sarà AB à BF come la medesima BF ad MB, ed il rettangolo contenuto dall'estreme AB, BM, K sarà vguale al quadrato della media BF.

Di nouo ne i triangoli ALM, HLM, angoli retti in L: essendo AL vguale ad LH, i due lati AL, LM, faranno vguali à i due lati HL, LM, gli angoli ALM, HLM, sono frà di loro vguali, sarà la base HM vguale alla base AM, e gli angoli MAH, MHA, frà di loro vguali: ma l'angolo HAM è vguale all'angolo HBM (stante che le rette HA, HB, sono frà di loro vguali) sarà l'angolo AHM vguale all'angolo HBA. Si considerino i due triangoli HMA, HBA, de' quali l'angolo HBA è vguale all'



a Corollaria 15. del 4.

b 30. del 5.

c 30. del 3.

f 27. del 3.

d 4. del 1.

e 33. del 6.

f 30. del 3.

g 32. del 1.

h 4. del 6.

K 17. del 6.

l 4. del 1.

m 6. del 1.

Z z z z

ango-


o 32. del 1.

o 4. del 6.

p 17. del 6.

q 1. del 2.

angolo AHM , e l'angolo HAB è commune ad ambedue, farà il rimanente angolo AMH vguale al restante angolo BHA ; i triangoli HBA , HMA , sono equiangoli, e la proporzione di BA ad AH o farà come quella di AH ad AM , dal che il rettangolo contenuto dall'estreme BA , AM , p farà vguale al quadrato della media AH . Ma fu dimostrato il rettangolo contenuto dalle due AB , BM , essere vguale al quadrato di BF , i due rettangoli dunque, contenuti da BA , AM , e dalle due AB , BM , sono vguali à i quadrati delle due BF , HA : ma i rettangoli contenuti da BA , AM , e dalle due AB , BM , sono vguali al quadrato di BA , farà al quadrato di BA vguale à i quadrati delle due BF , HA , cioè il quadrato di AB , lato del pentagono, è vguale al quadrato di BF , lato dell'esagono, col quadrato di HA , ch'è il lato del decagono, come fu proposto dimostrare.



C O R O L L A R I O I.


Appare da quel, che si è dimostrato, che quando vna retta, tirata dal centro d'un circolo, diuide vn arco in due parti vguali, diuiderà ancora la retta, che sottende quell'arco in due parti vguali, & ad angoli retti, stante che si è dimostrato, che la retta FH , la quale diuide l'arco BA in due parti vguali, diuide ancora la retta BA in due parti vguali, & ad angoli retti.

C O R O L L A R I O II.

Essendosi dimostrato, che la retta FG diuide l'arco CD in due parti vguali, per l'antecedente Corollario, diuide la retta CD in due parti vguali, & ad angoli retti. Dond'è manifesto, che il diametro del circolo, tirato da vn angolo del pentagono, diuide il lato opposto in due parti vguali, & ad angoli retti, e diuide l'arco sotteso dal lato opposto in due parti vguali; & il medesimo succede in tutti i poligoni equilateri, ed equiangoli iscritti nel circolo, quando sono di lati di numero disparo, il che tutto si dimostra nel modo sudetto.

d. 6. del 1.
e 47. del 1.
f 17. del 6.
g 3. definit.
del 6.
h 47. del 1.

ta DE è diuisa in due parti uguali in F , e gli è aggiunta la retta GE , il rettangolo contenuto dalle due DG, GE , col quadrato di EF , è uguale al quadrato di FG , cioè uguale al quadrato di FA ; mà il quadrato di FA è uguale a i quadrati de i due lati AE, EF , sarà il rettangolo contenuto dalle due DG, GE , col quadrato di FE , uguale a i quadrati delle due AE, EF ; se ne leui il commune, quadrato di EF , resta il rettangolo contenuto dalle due DG, GE , uguale al quadrato di AE , cioè uguale al quadrato di ED ; e sarà GD a DE , come la medesima DE ad EG ; per la qual cosa la retta DG è diuisa secondo l'estrema, e media proportion, e la maggior parte è il lato dell'esagono DE , e per la prop. 9. sarà EG il lato del decagono. E perche il quadrato di GA è uguale a i quadrati delle due AE, EG , essendo AE uguale al lato dell'esagono, ed EG il lato del decagono, per la proposizione 10. di questo, sarà AG il lato del pentagono, ch'era da farsi, e dimostrarsi.



THEOREMA XI. PROPOSITIONE XI.

Se il diametro d'un circolo è Rationale, il lato del pentagono equilatero, ed equiangolo, iscritto in quel circolo, e linea irrationale, ed è quella, che si chiama minore.

Habbia il circolo ACD il diametro Rationale, e nel circolo ACD , sia iscritto il pentagono equilatero, ed equiangolo $ABCDE$. Dico, che ciasun lato, come AB è linea irrationale, ed è quella, che si chiama minore. Per gli angoli B , ed A , e per il centro F , si facciano passare i diametri AG, BH , e seghi AG il lato CD in qualche punto I , per il secondo Coroll. all'antecedente proposizione, la retta AG diuide l'arco CD in due parti uguali in G , e diuide ancora la retta CD in due parti uguali, & ad angoli retti in I . Dal semidiametro FH se ne tagli la quarta parte FL , e dalla retta CA si tagli la quarta parte CM . Perche il diametro BH , per ipotesi, è Rationale, la sua metà BF , ouero FH , che gli è commensurabile, è Rationale, e la retta FL , ch'è commensurabile ad FH , sarà ancora Rationale; per la qual cosa tutta la composta BL , che è commensurabile all'una, ed all'altra, sarà parimente Rationale.

a 6. definit.
del 10.
b 6. definit.
del 10.
c 16. del 10.

d 18. del 3.

e 18. del 1.
f 4. del 6.

g 16. del 5.

Perche le rette BA, BC , per ipotesi, sono frà loro uguali, sarà l'arco BC uguale all'arco BA , e per il primo Coroll. all'antecedente proposizione, la retta BH sega la retta CA in due parti uguali, & ad angoli retti nel punto K . Si considerino i due triangoli AIC, AKF , angoli retti in I , & K , de quali l'angolo CAI è commune, sarà il rimanente angolo ACI uguale al restante angolo AFK , dal che i triangoli ACI, AKF , sono equiangoli, e la proportion di IC a CA sarà come quella di KF ad FA ; e permutando, sarà IC ad FK ; e come CA ad FA , cioè come CA


ad FH :

ad FH: ma CA ad FH è come la quarta parte di CA alla quarta parte di FH, cioè come CM ad FL, sarà IC ad FK, $\times$ come CM ad FL, e permutando, IC à CM $\times$ sarà come KF ad FL, e perchè IC à CM è come il doppio al doppio, cioè come DC à CK, sarà DC à CK $\times$ come KF ad FL; componendo le due insieme DC, CK, à CK, $\times$ sarà come KL ad LF; ed il quadrato della retta, composta delle due DC, CK, $\times$ al quadrato di CK, sarà come il quadrato di KL al quadrato di LK.

Si tiri la retta BD, la quale segnerà la retta AC in qualche punto O, per l'8. propos. di questo, la retta AC sarà divisa in O secondo l'estrema, e media proporzionale, e la maggior parte OD è sarà vguale al lato CD del pentagono. Hor se alla maggior parte DO, ouero DC, s'aggiunge la metà di DB, cioè la metà di AC, ch'è la retta CK, il quadrato della retta

composta delle due DC, CK, per la 1. propos. di questo, è il quintuplo del quadrato di CK: ma il quadrato della retta composta delle due DC, CK, al quadrato di CK, si è dimostrato essere come il quadrato di KL al quadrato di LF; sarà il quadrato di KL il quintuplo del quadrato di LF; cioè il quadrato di KL al quadrato di LF, sarà come numero à numero, e perciò i quadrati delle rette KL, LF, $\times$ sono commensurabili, ed i loro lati KL, LF, faranno commensurabili almeno in potenza: ma LF fu dimostrata Rationale, sarà la retta KL, $\times$ che gli è commensurabile, Rationale.

In oltre, perchè HF, ouero FB, è il quadruplo di FL, sarà BL il quintuplo di LF: ma il quadrato di KL fu dimostrato il quintuplo del quadrato di LF, sarà il quadrato di KL al quadrato di LF, $\times$ come BL ad LF; ed inuertendo, il quadrato di LF al quadrato di LK $\times$ sarà come LF ad LB. Si considerino tre quantità, la prima sia LF, la seconda LK, e la terza LB. Perchè il quadrato della prima LF al quadrato della seconda LK, è come la prima LF alla terza LK, ed il quadrato di LF al quadrato di LK, $\times$ ha duplicata proporzionale, che la prima LF alla seconda LK; sarà la proporzionale di LF ad LB duplicata di quella, che hà la prima LF alla seconda LK; e perciò le tre quantità LF, LK, LB, sono continue proporzionali; e sarà BL ad LK, come LK ad LF; ed il quadrato di BL al quadrato di LK, $\times$ sarà come il quadrato di KL al quadrato di LF: ma il quadrato di KL è il quintuplo del quadrato di LF, sarà il quadrato di BL il quintuplo del quadrato di LK, e perciò il quadrato di BL al quadrato di LK, per lo Scolio nel fine del 9. non è come numero quadrato à numero quadrato, ed in conseguenza le rette BL, LK, $\times$ sono incommensurabili in lunghezza. E perchè le rette BL, LK, furono dimostrate Razionali, saranno dunque le rette BL, LK, Razionali, commensurabili solamente in potenza. Si che, detratta dalla Rationale BL, la Rationale KL, commensurabile solamente in potenza, la rimanente BK $\times$ sarà irrationale, e sarà quella, che si chiama Apotome, la di cui congruente è la retta KL. Dal quadrato di BL



h. 1. del 5.

K. 6. del 5.

l. 11. del 5.

m. 18. del 5.

n. 22. del 6.

g. 8. del 13.

o. 6. del 10.

p. 6. definit.

del 10.

q. 11. del 5.

r. Corol. al

la 4. del 5.

t. 10. del 6.

u. 22. del 6.

x. 9. del 10.

y. 24. del 10.

a 16. m. do-
po la 14. del
10.

a 6. del 10.

b 6. definit.
del 10.

c 9. del 10.


d 16. del 10.

e 31. del 3.

f 17. del 6.

di BL se ne detragga il quadrato di KL, ^a ed il restante sia il quadrato della retta N. Perche il quadrato di BL è il quintuplo del quadrato di LK, detratto dal quadrato di BL la sua quinta parte, cioè il quadrato di LK, il rimanente, cioè il quadrato della retta N, sarà il quadruplo del quadrato di KL; e perciò di quelle parti, che il quadrato di BL è cinque il quadrato della retta N sarà quattro; ed in conseguenza il quadrato di BL al quadrato di N, sarà come numero à numero: per la qual cosa i quadrati di BL, e di N, ^a sono commensurabili, ed i loro lati BL, ed N, sono commensurabili almeno in potenza. E perche la retta BL fu dimostrata Rationale, sarà ancora la retta N, ^b che gli è commensurabile, Rationale. In oltre, perche il quadrato di BL al quadrato della retta N, è come 5 à 4, per lo Scolio nel fine del 9, i quadrati delle due BL, ed N, non sono come numero quadrato à numero quadrato, e perciò le rette BL, ed N ^c sono incommensurabili in lunghezza: ma furono dimostrate Razionali, saranno le rette BL, ed N, Razionali, commensurabili solamente in potenza. Di più, essendo la Rationale BF commensurabile in lunghezza alla sua quarta parte FL, ^d sarà tutta la composta BL ^d commensurabile in lunghezza ad FB: ma FB è commensurabile in lunghezza al suo doppio BH, sarà BL commensurabile in lunghezza alla Rationale BH. E perche il quadrato della Rationale BL supera il quadrato della congruente LK, per il quadrato della retta N, incommensurabile in lunghezza alla composta BL, essendo BL commensurabile in lunghezza alla Rationale BH, per la 4. delle terze definizioni del 10, la retta BK farà quarta Apotome.

Finalmente, perche l'angolo BAH ^e nel mezzo circolo è retto, e la retta AK è perpendicolare al diametro HB, per il Corollario all'8 del sesto, sarà AB media proportionale fra le due HB, BK, e sarà il quadrato di AB ^f vguale al rettangolo contenuto dalle due HB, BK. Hor essendo il quadrato della retta AB vguale al rettangolo contenuto dalla Rationale BH, e dalla quarta Apotome BK, per la 95 propos. del 10, la retta AB sarà quella retta, che si chiama Minore. Per la qual cosa supposto il diametro BH Rationale, il lato AE del pentagono iscritto nel circolo ABCD; sarà irrationale: ed è quella retta, che si chiama Minore, ch'era da dimostrarsi.




THEOREMA XII. PROPOSITIONE XII.

Il quadrato del lato del triangolo equilatero iscritto nel circolo, è il triplo del quadrato del semidiametro del medesimo circolo.

Nel circolo ABC sia iscritto il triangolo equilatero ABC. Dico che il quadrato-

quadrato del lato AB è il triplo del quadrato del semidiametro del circolo ABC . Dall'angolo A , per il centro D , si faccia passare il diametro AE , il quale, per il Corollario 2. alla 10. propos. di questo, divide l'arco BEC in due parti uguali in E , e divide ancora la retta BC in due parti uguali, & ad angoli retti in F ; si tiri la retta BE . Perchè BC è lato del triangolo equilatero, perciò l'arco BEC , che lo sottende, sarà la terza parte di tutta la circonferenza ABC , e l'arco BE sua metà sarà la sesta parte della medesima circonferenza; per la qual cosa la retta BE , che sottende la sesta parte della circonferenza $ABEC$, sarà il lato dell'esagono; e per il Coroll. alla 15. prop. del quarto, sarà BE uguale al semidiametro ED . E perchè l'angolo ABE , nel semicircolo ABC , è retto, sarà il quadrato di AE uguale ai quadrati de i due lati AB, BE : ma il quadrato di AE , per lo scolio alla 4. del 2. è il quadruplo del quadrato di ED , cioè il quadruplo del quadrato di BE , i quadrati delle due AB, BE , faranno il quadruplo del quadrato di BE . Per la qual cosa il quadrato di AB sarà il triplo del quadrato di BE : ma BE è uguale al semidiametro DE , sarà il quadrato del lato AB il triplo del quadrato del semidiametro DE , ch'era da dimostrarsi.



a 28. del 3.

b 31. del 3.
c 49. del 1.

COROLLARIO I.

Da quel che s'è detto è manifesto, che il quadrato del diametro del circolo è nella proportione sesquitercia al quadrato del lato del triangolo equilatero, iscritto in esso circolo.


Poiche essendosi dimostrato, che il quadrato del lato AB è il triplo quadrato del semidiametro AD , supposto che il quadrato di AB , sia 3, sarà il quadrato di AD 1; ma il quadrato del diametro AE è il quadruplo del quadrato di AD , se il quadrato di AD è 1, sarà il quadrato di AE 4, e perciò il quadrato del diametro AE al quadrato di AB sarà come 4 à 3, cioè nella proportione sesquitercia, come si disse.

COROLLARIO II.

E' ancora manifesto, che il lato BC , del triangolo equilatero ABC , divide il semidiametro DE in due parti uguali in F .

Si

Si tiri la retta DB. Essendosi dimostrato BE essere lato dell'efagono, sarà BE uguale al semidiametro BD; e perché gli angoli in F sono retti, sarà il quadrato di BD uguale a i quadrati de i due lati BF, FD; e similmente il quadrato di BE è uguale a i quadrati de i due lati BF, FE; ma BD è dimostrato uguale allato BE; quadrati de i due lati BF, FD, saranno uguali a i quadrati de i due lati BF, FE; se ne leui il comune quadrato di BF, resta il quadrato di FD uguale al quadrato di FE, e la retta DF sarà uguale alla retta FE, ch'era da dimostrarsi.




PROBLEMA I. PROPOSITIONE XIII.

Costruire il tetraedro, e comprenderlo nella data sfera, e dimostrare, che il quadrato del diametro della data sfera è in proporzione sesquialtera al quadrato del lato del tetraedro costruito.

Sia AB il diametro della data sfera, sopra il quale si descriva il mezzo circolo ACB; si faccia BD uguale alla terza parte di AB, e nel punto D si eleui la retta DC, perpendicolare ad AB, concorrente con la circonferenza in qualche punto C; si tirino le rette AC, CB; si prenda poi la retta HE uguale alla retta CD, e fatto centro in H, coll'intervallo EH, si descriva il circolo EFG; nel quale si scrisua il triangolo equilatero EFG; si tirino le rette HF, HG, sarà HF, ouero HG, uguale ad EH, cioè uguale alla retta CD. Nel punto H si eleui la retta HI, e perpendicolare al piano EFG, gli angoli, IHE, IHF, IHG, saranno retti. Si faccia HI, e uguale ad AD, e si tirino le rette IE, IF, IG. Dico che il solido contenuto da i quattro triangoli IEF, IFG, IGE, EFG, è quella piramide, o tetraedro, che si è proposto fare. Si considerino i due triangoli ADC, IHE. Perche i lati IH, HE, per costruzione, sono uguali a i due lati AD, DC, e gli angoli IHE, ADC, sono fra loro uguali, stante che sono retti, sarà la base AC, uguale alla base IE. Nell'istesso modo, considerando i triangoli ADC, IHF, IHG, si dimostrerà, che ciascuno de' lati IF, IG, è uguale ad AC, e perciò i tre lati IE, IF, IG, sono fra di loro uguali. In oltre per il Coroll. all'8. prop. del 6. la retta CD è media proportionale fra le due AD, DB, e per il Lem. 8. dopo la 18. del 6, la prima AD alla terza DB, hà duplicata proportion

di



di quella, che hà la prima AD alla seconda DC: ma il quadrato di AD al quadrato di CD, hà la medesima duplicata proportionione di quella, che hà AD à DC, sarà il quadrato di AD al quadrato di DC, ^h come AD à DB; e componendo, i quadrati delle due AD, DC, ^k giunti insieme, cioè il quadrato di AC al quadrato di CD sarà come AB à BD: ma AB, per costruzione, è il triplo di BD, sarà il quadrato di AC il triplo del quadrato di CD: fù fatta EH vguale à CD, sarà il quadrato di AC, cioè il quadrato di IE, il triplo del quadrato di EH: ma per l'antecedente propos. il quadrato del lato EF è il triplo del medesimo quadrato di EH, sarà il quadrato di IE vguale al quadrato di EF, e la retta IE vguale alla retta EF: ma le rette IE, IF, IG, sono frà di loro vguali, e sono ancora vguali le tre EF, FG, GE, faranno le rette IE, IF, IG, GE, EF, FG frà di loro vguali; dal che i quattro triangoli IEF, IFG, IGE, EFG, sono equilateri, e frà di loro vguali, ed il solido IEFG per la 26. defin. dell'11, è Tetraedro. Dico che la piramide, ò Tetraedro, IEFG, il di cui vertice I, e la base EFG, è quella, che si comprende nella data sfera; e che il quadrato del diametro AB è sesquialtero al quadrato del lato EF.

Si continui la perpendicolare IH verso K, e si faccia HK ^l vguale alla retta DB; sarà tutta IK vguale ad AB. Perche l'angolo IHE è retto, sarà la retta EH ^m perpendicolare alla retta IK: ma le tre rette IH, HE, HK, per costruzione, sono vguali alle tre rette AD, DC, DB, e queste sono continue proportionali; le tre rette ancora IH, HE, HK, faranno continue proportionali; dal che il rettangolo contenuto dalle due IH, HK, ⁿ sarà vguale al quadrato della perpendicolare HE; e per lo Scolio alla 17. propos. del 6, il punto E è nella circonferenza di quel circolo, del quale IK è diametro. Nell'istesso modo si dimostrerà, che il punto F, come ancora il punto G, è nella circonferenza di quel circolo, del quale IK è diametro. Se dunque si concepisce IK come Assc della sfera, ed intorno ad esso s'intenda circonuoluto il semicircolo, che passa per i punti I, E, K, la circonferenza di quello passerà per i punti G, ed F; e sarà descritta la sfera il di cui diametro IK è vguale al diametro AB della data sfera, per la qual cosa la sfera descritta comprende il costruito Tetraedro.

Finalmente, perche AB, per costruzione, è tripla alla retta BD, di quelle parti, che AB è 3, la retta DB sarà 1, e la retta AD sarà 2, dal che BA ad AD sarà come 3 à 2, cioè sarà nella proportionione sesquialtera: Di più, perche AC, per il Coroll. all'8. propos. del 6, è media proportionale frà le due BA, AD, hauerà la prima BA alla terza AD ^q duplicata proportionione di quella, che hà la prima BA alla seconda AC: ma il quadrato di BA al quadrato di AC ^r hà la medesima duplicata proportionione, che hà BA ad AC, sarà il quadrato di BA al quadrato di AC, ^q come BA ad AD: fù dimostrata BA essere nella proportionione sesquialtera ad AD, sarà il quadrato di AB sesquialtero al quadrato di AC. E perche IK è vguale ad AB, ed il lato EF è dimostrato vguale ad AC, sarà il quadrato di IK sesquialtero al quadrato di EF. Per la qual cosa il quadrato del diametro della data sfera è nella proportionione sesquialtera al quadrato del lato della piramide costrutta IEFG, ch'era da farsi, e dimostrarsi.

g 20. del 6.
h 11. del 5.

K 18. del 5.

l 3. del 1.

m 3. definit.
del 11.


n 17. del 6.

o Lem. 8.
dopo la 18.
del 6.
p 20. del 6.
q 11. del 5.

COROLLARIO I.

Dal quel che si è detto è manifesto, che il quadrato del diametro della detta sfera è nella proporzione quadrupla sesquialtera al semidiametro del circolo circoscritto intorno la base della costrutta piramide.

Poichè essendo il quadrato del diametro IK , ouero AB , nella proporzione sesquialtera al quadrato del lato EF , di quelle parti, che il quadrato di IK è 9, il quadrato di EF sarà 6, ed il quadrato di EH sarà 2, (stante che il quadrato di EF è triplo al quadrato di EH ,) e perciò di quelle parti, che il quadrato di IK , ouero AB , è 9, il quadrato di EH sarà 2: ma la proporzione di 9 a 2 è quadrupla sesquialtera, sarà la proporzione del quadrato di AB al quadrato di EH quadrupla sesquialtera, come si disse.



COROLLARIO II.

Appare ancora, che la retta LD , tirata dal centro della sfera perpendicolare al piano della base della piramide, ch'è quel piano, che passa per la retta DC , e fa angoli retti con AD , è la sesta parte di tutto il diametro AB , cioè la terza parte del semidiametro LB . Perchè AB è tripla alla retta BD , di quelle parti, che AB è 6, la retta BD sarà 2, e la retta BL 3, dal che DL sarà 1, e perciò AB sarà sestupla ad LD , ed LB sarà tripla ad LD , come si disse.

COROLLARIO III.

Dalla costruzione è similmente manifesto, che l'altezza del Tetraedro è due terzi del diametro della sfera, che lo contiene, e di quelle parti, che il quadrato del dia-


metro

metro è 9, il quadrato dell'altezza perpendicolare del detto Tetraedro è 4.

PROBLEMA II. PROPOSITIONE XIV.

Costruire l'Ottaedro, e comprenderlo nella sfera, e dimostrare, che il quadrato del diametro della sfera è il doppio del quadrato del lato dell'Ottaedro costruito.

Sia AB il diametro della data sfera, diviso in due parti uguali in C, e fatto centro in C, coll'intervallo CA, ouero CB, sia descritto il mezzo circolo ADB; nel punto C, sia eleuata la retta CD ^a perpendicolare ad AB, e si tirino le rette DB, DA; poi si esponga la retta EF uguale alla retta DB, e sopra la retta EF ^b si descriva il quadrato EFGH; si tirino le diagonali GE, HF, le quali si segaranno scambievolmente in qualche punto I; se intorno al quadrato HEFG fosse circoscritto vn circolo, le rette IG, IH, IE, IF, farebbero semidiametri di quel circolo, e perciò sono frà di loro uguali. Nel punto I si eleui la retta IK ^c perpendicolare al piano HEFG, la quale si continui sotto al piano HEFG verso L, e tanto IK, come IL ^d si faccia uguale ad IH; si tirino le rette KH, KG, KE, KF, LF, LE, LG, LH. Dico che il solido contenuto da gli otto triangoli KHE, KEF, KFG, KGH, LFE, LFG, LGH, LHE, è l'Ottaedro proposto. Perche i lati GI, IH, del triangolo GIH, sono uguali à i due lati HI, IE, del triangolo HIE, e la base HG è uguale alla base HE, sarà l'angolo GIH uguale all'angolo HIE, e perciò gli angoli GIH, HIE, sono retti. Similmente perche la retta KI è perpendicolare al piano HEFG, gli angoli KIH, KIG, KIF, KIE ^e sono retti. Si considerino i due triangoli HGI, HIK. Perche IK, è uguale ad IH, ouero IG, i due lati HI, IG, faranno uguali à i due lati HI, IK; gli angoli HIG, HIK, sono frà di loro uguali, stante che sono retti, sarà la base HG uguale alla base HK. Nell'istesso modo si dimostrerà, che il medesimo lato HG è uguale al lato GK, per la qual cosa il triangolo KHG è triangolo equilatero. E procedendosi col medesimo ordine, si prouerà, che tutti gli altri triangoli, sopra nominati, sono equilateri; e perche ogn'vno di quei triangoli hà per base vn lato del quadrato EFGH, essendo i lati del quadrato frà di loro



a 11. del 1.

b 46. del 1.

c 12. del 11.

d 3. del 1.

e 8. del 1.

f 3. defin. del 11.

g 4. del 1.

vguali, tutti i lati de i detti triangoli equilateri faranno frà di loro vguali, ed in conseguenza essi triangoli equilateri sono frà di loro vguali: e per la defin. 27. dell'1. il solido contenuto da i detti otto triangoli equilateri, ed vguali, è Ottaedro. Dico che l'Ottaedro costruito si comprende nella sfera, il di cui diametro è AB; e che il quadrato del diametro AB è il doppio del quadrato del lato KH, ouero KG &c.

h 17. del 6.

Perche le tre rette LI, IH, IK, sono, per costruzione, frà loro vguali, farà LI ad IH come IH ad IK, ed il rettangolo contenuto dalle due LI, IK, ^h farà vguale al quadrato di IH: e perche la retta IH fa angoli retti colla retta KL, per lo Scolio alla 17. del 6, il punto H è nella circonferenza di quel circolo, il di cui diametro è la retta KL. Nell'istesso modo si dimostrerà, che gli altri angoli G, F, E, sono nelle circonferenze di quei circoli, che hanno per diametro la retta KL. Intesa dunque la retta KL come asse della sfera, intorno al quale si muoua il mezzo circolo LHK, sin che torni nel luogo d'ond'è partito, la circonferenza di quello passerà per li punti G, F, E; per la qual cosa l'Ottaedro costruito si contiene nella sfera descritta. Si considerino i due triangoli HIG, DCB, angoli retti in I, & C, farà il

K 47. del 1.


quadrato di DB ^K vguale à i quadrati de i lati DC, CB, ed il quadrato di HG è vguale à i quadrati de'lati HI, IG: ma i lati HG, DB, per costruzione, sono frà loro vguali, perciò i quadrati de i lati HI, IG, saranno vguali à i quadrati de i lati DC, CB, e le loro metà, cioè i quadrati delle rette HI, CD, sono frà di loro vguali; ed in conseguenza la retta IH sarà vguale alla retta CD, ouero CB: furono fatte le rette IK, IL, ogn'vna vguale ad IH; farà tutta l'asse KL vguale al dato diametro AB; per la qual cosa l'Ottaedro costruito è iscritto nella data sfera.

l 4. del 1.

m 31. del 3.

n 47. del 1.

Finalmente perche gli angoli in C sono retti, ed i lati CB, BD, sono vguali à i due lati CD, CA, farà la base DB ^l vguale alla base DA. E perche l'angolo ADB ^m nel mezzo circolo è retto, il quadrato di AB ⁿ farà vguale à i quadrati de i due lati DB, DA: ma questi sono frà loro vguali, in conseguenza il quadrato di AB farà il doppio del quadrato di DB. E perche AB è vguale all'asse KL della sfera, ed il lato DB è vguale ad HG, ouero HK, cioè vguale al lato dell'Ottaedro, farà il quadrato di KL, diametro della sfera, il doppio del quadrato del lato HK dell'Ottaedro costruito, ch'era da farsi, e dimostrarsi.



COROLLARIO I.

Perche gli angoli KIH, KIE, HIF, sono, per quel che si è dimostrato, retti, sarà manifesto, che nell'Ottaedro tutte le diagonali si segano scambievolmente ad angoli retti nel centro della sfera, che lo contiene, ed in conseguenza i tre piani HEFG, KELG, KHLF, che passano per quelle diagonali; si segano scambievolmente ad angoli retti, e la loro commune settione sarà la retta KL; ed essendo li angoli LEK, LGK $^{\circ}$ ne i semicircoli, che hanno per diametro EK, faranno perciò retti, ed il quadrilatero KELG (i di cui lati sono i medesimi lati vguali dell'ottaedro) sarà quadrato, e per simile ragione il quadrilatero KHLF è quadrato; d'onde appare, che li tre quadrilateri HEFG, KELG, KHLF, sono figure quadrate vguali frà di loro.

COROLLARIO II.

E ancora manifesto, che ogn'vno di quei quadrati diuide l'Ottaedro in due piramidi di basi quadrangolari, simili, ed vguali.

Poiche il quadrato HEFG diuide l'Ottaedro nelle due piramidi KHEFG, LFGHE, i di cui vertici sono in L, & K, e la base commune è il medesimo quadrato HEFG. Similmente il quadrato KHLF diuide l'ottaedro nelle due piramidi ELFKH, GFLHK, ed il quadrato KELG, lo diuide nelle due piramidi FGKEL, HELGK. E queste piramidi sono frà loro simili, ed vguali, stante che sono contenute da triangoli equilateri, ed vguali, ed hanno per basi vguali figure quadrate.

COROLLARIO III.

Perche dunque i quadrati, de' quali ogn'vno diuide l'ottaedro in due piramidi vguali, sono tre soli, sarà manifesto, che l'ottaedro è diuiso da quei tre quadrati in sei vguali piramidi di basi quadrangolari, due delle quali, prese in qualunque modo, compongono tutto l'ottaedro.

COROLLARIO IV.

Se concepiremo iscritti nella medesima sfera il Tetrae-

dro,

dro, e l'Ottaedro, il quadrato del lato dell'Ottaedro sarà in
 • sesquitertia proportione al quadrato del lato del Tetrae-
 dro.

*Poiche essendo il quadrato del diametro della sfera nella proportion se-
 squaltera al quadrato del lato del Tetraedro, di quelle parti che il quadrato
 del diametro della sfera è 6, il quadrato del lato del Tetraedro sarà 4. Sim-
 milmente perche il quadrato del diametro della sfera è duplo al quadrato del
 lato dell'Ottaedro, di quelle parti, che il quadrato del diametro della sfera
 è 6, il quadrato del lato dell'Ottaedro sarà 3. D'ond'è manifesto, che di quel-
 le parti, delle quali il quadrato del lato del Tetraedro è 4, il quadrato del
 lato dell'Ottaedro sarà 3, e perciò sono nella proportion sesquitertia.*

COROLLARIO V.

Nel quadrato HEFG il lato HG è parallelo all'opposto
 lato EF, e nel quadrato HLFK il lato
 HK è parallelo all'opposto LF, dal che
 i due lati KH, HG, sono paralleli à i
 due lati EF, FL, ed in consequen-
 za il piano KHG è parallelo al piano
 ELF; ed arguendosi nell'istesso mo-
 do per gli altri, sarà manifesto, che
 nell'Ottaedro i piani de i triangoli op-
 posti sono frà loro paralleli.



PROBLEMA III. PROPOSITIONE XV.

Costruire il Cubo, e comprenderlo nella data sfera, e
 dimostrare, che il quadrato del diametro della sfera è triplo
 al quadrato del diametro del Cubo.

Sia AB il diametro della data sfera, intorno al quale sia descritto il
 mezzo circolo ACB. Si faccia BD la terza parte di AB, sarà AD il
 doppio di DB: nel punto D si eleui la retta DC, perpendicolare ad AB,
 e si tirino le rette CB, CA, si esponga poi la retta EF vguale alla retta
 CB; sopra la retta EF^b si descriua il quadrato EFGH; ne i punti E, F,
 G, H, si eriggano le rette HI, EM, FL, GK, e perpendicolari al piano
 EFGH, ed ogn'vna d vguale alla retta CB, saranno frà di loro vguali, e

faran-


a 11. del 1.

b 46. del 1.


c 12. del 11

d 3. del 1.

faranno ancora vguali à i lati del quadrato EFGH; si tirino le rette IK, KL, LM, MI. Perche le rette GKHI, sono perpendicolari al piano EFGH, perciò sono, frà loro parallele, e le rette IK, HG, faranno frà loro vguali, e parallele; si che il quadrilatero IHGK è parallelogrammo, e per la 34. del 1, i lati, ed angoli opposti, sono frà di loro vguali; cioè l'angolo IHG sarà vguale all'angolo IKG, e l'angolo KGH vguale all'angolo KIH: ma gli angoli KGH, IHG, sono retti, gli angoli dunque GKI, HIK, sono retti. Ed essendo i lati KG, GH, HI, frà di loro vguali, ed il lato HG vguale al lato IK, i quattro lati IH, HG, GK, KI, sono frà di loro vguali: gli angoli IHG, HGK, GKI, KIH, sono stati dimostrati retti, e perciò il quadrilatero IHGK è quadrato. Nell'istesso modo si dimostrerà, che tutti gli altri piani EG, EL, LI, IE, KF, che contengono il solido IEFK sono quadrati; E perche sono eretti sopra gli vguali lati HE, EF, FG, GH, perciò sono frà di loro vguali, ed ogn'vno sarà vguale al quadrato IMLK, il quale è simile, ed vguale all'opposto HEFG. Per la qual cosa il solido costruito IEFH è Cubo. Dico che il Cubo IEFK è vguale à quello, che si può iscrivere nella sfera, il di cui diametro è AB. Ne i piani opposti HK, EL, si tirino i diametri HK, IG, EL, MF. Perche le due HE, KL, sono vguali, e parallele alla retta GF, faranno frà loro vguali, e parallele, e perciò le due KH, LE, sono frà loro vguali, e parallele, ed il quadrilatero HELK è parallelogrammo; Nell'istesso modo si dimostrerà, che il quadrilatero IMFG è parallelogrammo. E perche ogn'vno de i piani HELK, IMFG, divide il Cubo IEFK in due parti vguali, perciò ambidue per il Corol. alla 39. prop. del 11. passano per il centro del Cubo IEFK; come per esempio per il punto O, e tirate le diagonali KE, IF, HL, GM, queste, per il citato Corollario si segano scambiuolmente in due parti vguali nel centro O. In oltre ne i quadrati EG, GL, gli angoli GFE, GFL, sono retti, e per ciò la retta GF è perpendicolare al piano EFLM, e l'angolo GFM sarà retto; per la qual cosa il parallelogrammo IMFG è rettangolo. Si considerino i due triangoli GFM, IMF; essendo i due lati GF, FM, vguali à i due lati IM, MF, e gli angoli GFM, IMF retti, cioè vguali, farà la base IF vguale alla base MG, e considerando il rettangolo HELK, nell'istesso modo si dimostrerà, che i diametri KE, HL, sono frà di loro vguali. Di nouo si considerino i triangoli KLE, IMF. Perche il lato EL, come diametro del quadrato MEFL, è vguale ad MF, ed il lato KL è vguale ad IM, i due lati KL, LE, saranno vguali à i due lati IM, MF: li angoli KLE, IMF, sono vguali, stante che sono retti, farà la base IF vguale alla base EK; per la qual cosa i diametri EK, IF, HL, GM, sono frà di loro vguali; E



e 6. del 11.



f 34. del 1.

g 34. del 11.

h 4. del 11.
K 33. del 1.

i 11. del 11.

m 4. del 1.

n 4. del 1.

o 4. del 1.


per

p Scol. alla
17. del 6.

per quel che si è detto, i semidiametri OK, OL, OH, OE, OF, OL, OG, OM, sono frà di loro vguali, ed i punti I, H, M, L, F, G, r sono nelle circonferenze di quei circoli, che hanno per diametro la diagonale EK: si che, presa EK come Assè della sfera, intorno alla quale s'intenda muoversi il mezzo circolo, che hà per diametro la medesima retta EK, fin che ritorna nel luogo d'ond'è partito, la superficie sferica, che descriuerà, passerà per gli angoli H, I, M, L, F, G, ed il Cubo IEFG sarà iscritto nella sfera costrutta.

q 47. del 1.

Di più, perche l'angolo EFL è retto, farà il quadrato di EL vguale à i quadrati de i due lati EF, FL; ma i lati EF, FL, sono frà loro vguali, farà il quadrato di EL, il doppio del quadrato di FL, cioè il doppio del quadrato di LK, dal che i quadrati delle due EL, LK, insieme giunti, sono il triplo del quadrato di LK. Nel triangolo KLE, angolo retto in L, il quadrato di EK r è vguale à i quadrati de i due lati EL, LK: ma i due quadrati di EL, LK, sono il triplo del quadrato di LK, farà il quadrato di EK il triplo del quadrato di LK, cioè il triplo del quadrato di EF: ma EF è vguale alla retta CB, farà il quadrato di EK il triplo del quadrato di CB. Di nuovo perche l'angolo ACB' nel mezzo circolo è retto, per il Corollario all'8. prop. del 6, la retta CB sarà media proporzionale frà le due AB, BD, ed hauerà AB, à BD " duplicata proporzione di quella, che hà AB à BC: ma il quadrato di AB al quadrato di BC, y, hà la medesima duplicata proporzione di quella, che hà AB à BC, farà il quadrato di AB al quadrato di BC y come AB à BD: fu fatta, per costruzione la retta AB il triplo di BD, farà il quadrato di AB il triplo del quadrato di CB: ma per quel che si è dimostrato, il quadrato di EK è il triplo del quadrato della medesima CB, il quadrato dunque di EK sarà vguale al quadrato di AB, e la retta EK sarà vguale alla retta AB. Per la qual cosa la sfera descritta intorno al diametro EK, è vguale alla sfera, che si descriue intorno al dato diametro AB, e perciò il Cubo IEFK è quello, ch'è controuto dalla sfera, il di cui diametro è AB. Finalmente essendosi dimostrato, che il quadrato di EK è il triplo del quadrato di EF, sarà dunque il quadrato del diametro della sfera triplo al quadrato del lato del Cubo iscritto, il che era da farsi, e dimostrarfi.



r 47. del 1.

u Lem. 8. dopo la 18. del 6.
x 30. del 6.
y 18. del 5.

COROLLARIO I.

Essendo la retta PQ cōmune settione de i piani HELK, IMFG, quella, per la 39. prop. dell' 1 r. è diuisa dalla diagonale IF in due parti vguali in O; dal che OP, sarà vguale

ad

ad OQ. E perche i punti P, & Q, sono i centri de i quadrati IHGK, MEFL, perciò la retta QP, che congiunge i centri degli opposti quadrati, passa per il centro del Cubo, dou'è diuisa da i diametri del Cubo in due parti vguagli. Sarà dunque manifesto, che nella figura Cuba la retta, tirata dal centro del quadrato al centro del quadrato opposto, passa per il centro del Cubo, nel quale è diuisa da i diametri di esso Cubo in due parti vguagli, ed oltre à ciò tutt'i diametri del Cubo si diuidono scambievolmente in due parti vguagli nel medesimo centro.

COROLLARIO II.

Da quel che si è dimostrato appare, che il quadrato del diametro della sfera è vguale al quadrato del lato del Tetraedro, col quadrato del lato del Cubo, iscritto nella medesima sfera.

Il che è chiaro, considerand' il mezzo circolo ACB, doue la retta AC, per la costruzione del Tetraedro, è vguale al lato del Tetraedro descritto nella sfera, il di cui diametro sia AB, e la retta CB, per l'antecedente propos. è il lato del Cubo iscritto nella medesima sfera. E perche il quadrato di AB è vguale à i quadrati delle due rette AC, CB, sarà il quadrato del diametro della sfera vguale à i due quadrati, cioè vno è il quadrato del lato del Tetraedro, e l'altro è il quadrato del lato del Cubo iscritto nella medesima sfera.


Oltre à ciò, essendo le rette HE, KL, IM, GF, perpendicolari al piano MEFL, i piani HELK, IMFG, saranno perpendicolari al piano MEFL, e la loro commune sezione PQ^a sarà perpendicolare al medesimo piano MEFL. Nell'istesso modo si prouerà, che la retta OP è perpendicolare al piano IHGK; e perche i punti P, Q, sono i centri de i quadrati IHGK, MEFL, perciò la retta QP, che congiunge i centri degli opposti quadrati, passa per il centro del Cubo, dou'è diuisa da i diametri del Cubo in due parti vguagli. Sarà dunque manifesto, che nella figura Cuba, la retta, che passa per il centro di vno de i quadrati, ed è perpendicolare al medesimo quadrato, continuata concorre col diametro del Cubo nel centro del medesimo Cubo, doue tutti i diametri di esso Cubo si diuidono scambievolmente in due parti vguagli. E perche la retta PQ è vguale, e parallela ad EH, la sua metà OQ, ouero OP, sarà vguale alla metà del lato HE del Cubo; dal che sarà ancora manifesto, che la retta tirata dal centro del Cubo al centro d'vno de i quadrati, è vguale alla metà del lato del Cubo.

a 8. del 11.
b 19. del 11.

PROBLEMA IV. PROPOSITIONE XVI.

Costruire l'Icosaedro, e comprenderlo nella sfera, che contiene le altre figure antedette, e dimostrare, che il lato dell'Icosaedro è linea Irrazionale, ed è quella, che si chiama Minore.

Sia AB il diametro della data sfera, intorno al quale sia descritto il mezzo circolo ACB; si faccia BD la quinta parte di AB, farà AB il quintuplo di BD, nel punto D si eleui la retta DC^a perpendicolare ad AB, e si tiri la retta CB. Sia poi esposto il circolo EFLK, il di cui semidiametro MH, ouero MO, sia vguale alla retta CB; e nel circolo EFLK sia iscritto ^b il pentagono EFGHK equilatero, ed equiangolo; si diuidano gli archi EF, FG, GH, HK, KE, in due parti vguali ne i punti O, P, L, I, N, e si tirino le rette EO, OF, FP, PG, GL, LH, HI, IK, KN, NE. Perche la retta OP è lato del pentagono iscritto, farà l'arco OP la quinta parte di tutta la circonferenza EFGHK, e la metà, cioè l'arco FP, farà la decima parte della medesima circonferenza; per la qual cosa la retta FP farà lato del decagono. Nell'istesso modo si prouerà, che ogn'vna delle rette PG, GL, LH, HI, IK, KN, NE, EO, OF, è lato del decagono. Negli angoli del pentagono iscritto, cioè ne i punti E, F, G, H, K, si erigano le rette EQ, FR, GS, HT, KV, ^d perpendicolari al piano del circolo EFGHK, ciascuna delle quali si faccia vguale al semidiametro MH, del circolo EFGHK, e si tirino le rette QR, RS, ST, TV, VQ. Perche le rette QE, RF, SG, TH, VK, sono perpendicolari al piano EFGHK, perciò sono frà di loro parallele; fu fatta ogn'vna di esse vguale al semidiametro MH, perciò sono frà di loro vguali, e parallele, e per la 33. propos. del 1. quelle, che congiungono gli estremi, sono frà di loro vguali, e parallele; per la qual cosa le rette RQ, QV, VT, TS, SR, sono vguali, e parallele alle corrispondenti FE, EK, KH, HG, GF; e per la 10. propos. del 11, l'angolo QRS è vguale all'angolo EFG, l'angolo RST è vguale all'angolo FGH, l'angolo STV vguale all'angolo GHK, l'angolo TVQ vguale all'angolo HKE, e l'angolo VQR vguale all'angolo KEF: dal che il poligono QRSTV



fata

farà equilatero, ed equiangolo al poligono EFGHK: ma il poligono EFGHK, per costruzione, è pentagono equilatero, ed equiangolo, farà il poligono RSTVQ pentagono equilatero, ed equiangolo. Da i punti O, P, L, I, N, à i punti R, S, T, V, Q, si tirino le rette OQ, OR, PR, PS, LS, LT, IT, IV, NV, NQ. Nel triangolo RFP, angolo retto in F, il quadrato di RP è vguale à i quadrati de due lati RF, FP: ma RF ¹ è vguale al semidiametro MH, cioè è lato dell'esagono iscritto nel circolo EFGHK, e la retta FP, per quel che si è dimostrato, è lato del decagono iscritto nel medesimo circolo; sarà per la 10. propos. di questo, la retta RP il lato del pentagono iscritto nell'istesso circolo EFGHK. Nell'istesso modo, considerando il triangolo RFO, angolo retto in F, del quale RF è lato dell'esagono, ed FO è lato del decagono, si dimostrerà, che il lato RO è lato del pentagono; ed argumentandosi nel medesimo modo, si prouerà, che ogn'vna dell'altre rette PS, LS, LT, IT, IV, NV, NQ, OQ, è lato del pentagono equilatero, ed equiangolo, iscritto nel circolo EFGHK, e perciò sono frà di loro vguali; ed ogn'vna è vguale à ciascun lato del pentagono EFGHK, ed ancora vguale à ciascun lato del pentagono QRSTV; per la qual cosa i dieci triangoli QQR, ROP, RPS, SPL, SLT, TLI, TIV, VIN, NVQ, NQQ, sono equilateri, ed vguali frà loro. Nel centro M si elcui la retta MX ² è perpendicolare al piano EFGHK, la quale si continui verso Z; si faccia MY vguale ad MH, cioè vguale al lato dell'esagono, e si faccia YX, come ancora MZ, vguale al lato del decagono, cioè vguale alla retta FP. Si tirino le rette XT, XS, XR, XQ, XV, VY, TY; e si tirino parimente le rette ZO, ZP, ZL, ZI, ZN, MK, MN. Perche le rette MY, HT, sono perpendicolari al piano EFLK, perciò ³ sono parallele; ma sono ancora vguali, stante che ogn'vna è vguale ad MH, in conseguenza le rette YT, MH, ⁴ che congiungono gli estremi, sono frà loro vguali, e parallele; ed essendo MH lato dell'esagono, sarà ancora YT lato dell'esagono iscritto nel medesimo circolo. In oltre perche YT è parallela ad MH, l'angolo XYT ⁵ sarà vguale all'angolo YMH: ma l'angolo YMH è retto, stante che XM ⁶ è perpendicolare al piano EFLK, l'angolo dunque XYT sarà ancora retto, ed il quadrato di XT ⁷ sarà vguale à i quadrati de i due lati XY, YT: fu dimostrata la retta YT essere lato dell'esagono, e la retta XY, per costruzione, è lato del decagono, per la 10. propos. di questo, XT farà lato del pentagono iscritto nel medesimo circolo. Nell'istesso modo, considerando il triangolo XYV, angolo retto in Y, si dimostrerà, che XV è lato del pentagono. E col medesimo modo d'argumentare, si prouerà, che ciascuna delle rette XQ, XR, XS, è lato del pentagono iscritto nel medesimo circolo EFLK. E perche le rette QR, RS, ST, TV, VQ, sono ancora lati del pentagono iscritto nel circolo QRSTV, ouero EFGH, tutti i lati dunque de i cinque triangoli XQR, XQS, XST, XTV, XVQ, sono frà di loro vguali, ed i detti cinque triangoli sono equilateri, ed vguali. Nell'istesso modo si prouerà, che i cinque triangoli OZP, PZL, ZLI, ZIN, ZNO, sono equilateri, ed vguali. E perche le basi di questi triangoli sono i lati del pentagono EFGHK, e le basi de i triangoli XQR, XRS, XST, XTV, XVQ, sono i lati del pentagono QRSTV; essendosi dimostrati i lati del pentagono QRSTV vguali à i

f 47. del 11.

g 12. del 11.

h 6. del 11.

K 33. del 11.

l 39. del 11.


m 3. definit.

del 11.

n 47. del 11.

lati del pentagono EFGHK, faranno tutti i venti triangoli, che contengono il solido XQZLS, frà di loro vguali, ed equilateri, e per la 19. definit. del 11, il solido XQEZL farà Icofaedro. Dico ch'è quello, che si comprende nella sfera data, e che ciascun lato di esso Icofaedro è linea Irrazionale, ed è quella, che si chiama Minore.

Si tiri la retta XO. Essendo il punto M centro del circolo EF LK, farà MN vguale ad MH, ouero MY, cioè ogn'vna farà il lato dell'esagono; ma YX, per costruzione, è lato del decagono, farà MX composta del lato dell'esagono, e del lato del decagono iscritto nel medesimo circolo; e per la 9. propos. di questo, la retta MX farà diuisa secondo l'estrema, media proportione nel punto Y, la di cui maggior parte sarà MY; dal che XM ad MY^o sarà come MY ad YX; ma MY è vguale ad MN, e la retta MZ è vguale ad YX, farà XM ad MN, come la medesima MN ad MZ; ed il rettangolo contenuto dalle due XM, MZ, p sarà vguale al quadrato della media MN. E perche la retta MN fa angoli retti con XZ, stante che XM è perpendicolare al piano EFLK, per lo Scolio alla 17. proposizione del 6, il punto N è nella circonferenza di quel circolo, che hà per diametro la retta XZ. Similmente essendo ZM lato del decagono, e la retta MY lato dell'esagono, sarà ZY^o diuisa secondo l'estrema, e media proportione, e sarà ZY ad YM, come YM ad MZ. In oltre, perche le rette YM, VK, sono perpendicolari al piano EFLK, perciò sono frà loro parallele: ma sono, per costruzione, vguali, per essere ciascuna vguale ad MH, farà VY^o vguale, e parallela ad MK, e farà l'angolo VYX^x vguale all'angolo KMY; sù dimostrato l'angolo KMY retto, l'angolo dunque VYX sarà retto. E perche MK è lato dell'esagono, farà ancora VY lato del esagono iscritto nel medesimo circolo EFLK; per la qual cosa YV farà vguale ad YM: e perche si è dimostrato, che ZY ad YM è come YM ad MZ, essendo MY vguale ad YV, e la retta MZ vguale ad YX, farà ZY ad YV, come la medesima YV ad YX, ed il rettangolo contenuto dalle due ZY, YX, sarà vguale al quadrato di YV, e per lo Scolio alla 17. del 6, il punto V è nella circonferenza di quel circolo, del quale ZX è diametro. Nell'istesso modo si dimostrerà, che ciascuno degli altri angoli Q, R, S, T, O, P, L, I, è nel-



o 3. definit.
del 6.

p 17. del 6.

q 9. del 13.
r 2. definit.
del 6.

u 6. del 17.

x 29. del 1.

y 17. del 6.

la circonferenza di quel circolo, del quale è diametro la medesima retta ZX. Si che presa ZX come Asse della sfera, intorno al quale si concepisca muoversi il semicircolo, che passa per li punti ZNX, fin che ritornà nel luogo, donde partì, la superficie sferica, che descriverà, passerà per tutti gli angoli del costrutto Icosaedro. Si diuidi MY in due parti vguagli in &. Perche XY è vguale ad MZ, sarà &X vguale ad &Z, dal che XZ alla sua metà X& sarà come MY ad Y&; e permutando, XZ ad YM sarà come X& ad &Y, ed il quadrato di XZ al quadrato di MY, e sarà come il quadrato di X& al quadrato di &Y. In oltre, perche MX è diuisa secondo l'estrema, e media proportioni in Y, e la maggior parte è MY, aggiunta alla minor parte XY la metà della maggior parte YM, ch'è Y&, per la 3. propos. di questo, il quadrato di X& sarà il quintuplo del quadrato di &Y. E perche il quadrato di X& al quadrato di &Y è come il quadrato di XZ al quadrato di MY, essendo il quadrato di X& il quintuplo del quadrato di &Y, sarà il quadrato di XZ il quintuplo del quadrato di MY, ouero di MH, che gli è vguale: ma MH è fatta vguale alla retta CB, sarà il quadrato di XZ il quintuplo del quadrato di CB. Nel triangolo ACB, angolo retto in C, essendo CD perpendicolare ad AB, per il Corollario all'8. del 6, la retta CB è media proportionale fra le due AB, BD, e sarà il quadrato di AB al quadrato di CB, ^d come la prima AB alla terza BD: ma AB, per costruzione, è il quintuplo di BD, sarà il quadrato di AB il quintuplo del quadrato di CB; fu dimostrato il quadrato di XZ essere il quintuplo del quadrato di CB, sarà il quadrato di XZ vguale al quadrato di AB, e la retta ZX vguale alla retta AB; per la qual cosa il costrutto Icosaedro si comprende nella data sfera, cioè è iscritto nella data sfera.

Finalmente dico, che il lato dell'Icosaedro è quella linea irrationale, che si chiama Minore. S'intenda diuiso il diametro XZ della sfera, in quante parti vguagli si vogliono, sarà ZX e quella retta, che chiamiamo Rationale, rispetto alla quale si farà la comparatione del lato dell'Icosaedro. Hor perche il quadrato di XZ è il quintuplo del quadrato di MY, sarà il quadrato di XZ al quadrato di MY, come numero à numero, cioè come 10. à 2, ouero come 25. à 5, e perciò i quadrati di XZ, & YM, sono commensurabili, e le rette XZ, YM, faranno, commensurabili almeno in potenza; ma XZ è supposta Rationale, sarà MY, e che, gli è commensurabile, Rationale: fu fatta MY vguale ad MH, sarà dunque MH Rationale, ed il suo doppio, cioè OH, sarà ancora Rationale. Nel circolo EFLK, il di cui diametro OH Rationale, è iscritto il pentagono equilatero EFGHK, per l'11. propos. di questo, ciascuno de suoi lati è irrationale, ed è quella linea, che si chiama Minore: ma il lato del pentagono iscritto nel circolo EFLK è l'istesso, che il lato del icosaedro costrutto, sarà il lato del costrutto icosaedro linea irrationale, e sarà quella, che si chiama Minore, come tu proposto fare, e dimostrare.

COROLLARIO I.

Da quel che si è dimostrato è manifesto, che il quadra-

z 10. del 1.

a 25. del 5.
b 10. del 5.
c 12. del 6.d Lem. 8. do.
po la 18. del
6. & 20. del
6.e 5. definit.
del 10.f 6. del 10.
g 6. definit.
del 10.


to del diametro della sfera, che comprende l'Icofaedro, è il quintuplo del quadrato del semidiametro di quel circolo, la di cui circonferenza passa per cinque angoli dell'Icofaedro, stante che si è dimostrato, che il quadrato di ZX è il quintuplo del quadrato di MH.

COROLLARIO II.

Appare ancora, che il diametro della sfera, che contiene l'Icofaedro, è composto del lato dell'esagono, e del doppio lato del decagono iscritto nel circolo, la di cui circonferenza passa per cinque angoli di esso Icofaedro.

S C O L I O.

Gli angoli solidi dell'Icofaedro sono dodici, come appare nella costruzione antecedente, e perciò dodici piramidi, di basi pentagonali, si possono considerare nell'Icofaedro, le quali hanno i vertici in essi angoli; come per esempio le piramidi collaterali sono le sei notate ABLGM, FAGEHM, EFGIDH, DEHKCI, CDILBK, BCKMAL, i di cui vertici sono i punti A, F, E, D, C, B, e le basi sono i pentagoni BLGM, AGEHM, FGIDH, EHKCI, DILBK, CKMAL, e dell'altre sei tre riguardano la parte, che si mostra a noi, i di cui vertici sono i punti L, I, G, e le basi sono i pentagoni BCIG, LCDEG, ALIEF, e le altre tre, che sono dalla parte nascosta a noi, hanno i vertici ne i punti M, K, H, e le basi sono i pentagoni ABRHF, BCDHM, DEFMK. E per l'auuenire, quando si dirà il pentagono dell'Icofaedro, douremo intendere uno degli antecedenti pentagoni.




PROBLEMA V. PROPOSITIONE XVII:

Costruire il Dodecaedro, e comprenderlo nella sfera, che contiene l'antedette figure, e dimostrare, che il lato del Dodecaedro è linea Irrazionale, che si chiama Apotome.

Sia il quadrato ABCD vna base del Cubo, che si comprende nella data sfera, e sia perpendicolare all'vguale quadrato BEFC, in modo, che la comune sectione de i piani BD, BF, sia lato commune di ambidue i quadrati BD, BF; si diuidano tutti i lati de i quadrati BD, BF, in due parti vguali ne i punti G, I, H, K, L, M, N, e frà i punti opposti si tirino le rette GH, IK, LN, HM, le quali si segaranno ne i centri, O, & P, de i quadrati BD, BF, come appare nell'8. propos. del 4. Si seghino poi le rette OI, OK, HP, secondo l'estrema, e media proportion, ne i pñti Q, R, S, e le parti maggiori siano le rette PQ, OR, OS; poi ne i punti Q, R, S, fuori del Cubo AEFD, si erigano le rette RT, SV, QX, perpendicolari à i piani BD, BF, in modo, che le perpendicolari RT, SV, cadano di là dal quadrato BD è la perpendicolare QX sotto al quadrato BF, si facciano queste perpendicolari vguali alle parti maggiori PQ, OR, OS, e si tirino le rette TV, TC, CX, XB, BV. Dico prima, che il pentagono VBXCT è vno di quei dodici pentagoni equilateri, ed equiangoli del Dodecaedro da costruirsi. Si tirino le rette SB, SC. Essendo VS perpendicolare al piano BD, gli angoli VSB, VSC, saranno retti. Perche la retta OI è diuisa secondo l'estrema, e media proportion in S, e la parte maggiore è la retta OS, i quadrati delle due OI, IS, sono il triplo del quadrato di OS: ma OI è vguale ad IB, i quadrati dunque delle due BI, IS, sono il triplo del quadrato di SO; fu fatta SV vguale ad OS, saranno i quadrati delle due BI, IS; il triplo del quadrato di SV. E perche nel triangolo BIS, angolo retto in I, il quadrato di BS è vguale à i quadrati delle due BI, IS, in conseguenza il quadrato di BS farà il triplo del quadrato di SV, ed i quadrati delle due BS, SV, giunti insieme, faranno il quadruplo del quadrato di SV. Ma nel triangolo BSV, angolo retto in S, il quadrato di BV è vguale à i quadrati delle due BS, SV, farà il quadrato di BV il quadruplo del quadrato di SV; e per lo Scolio alla 4. del 2, la retta BV è il doppio della retta SV. In oltre, perche le rette VS, TR, sono perpendicolari al piano BD, perciò sono frà di loro parallele; sono ancora vguali frà loro (stante che sono vguali alle vguali rette SO, OR) le rette dunque SV, RT, sono frà loro vguali, e parallele; dal che le rette VT, SR, sono frà loro vguali, e parallele: ma RS è il doppio di SO, cioè di SV, farà VT il doppio di SV; per la qual cosa il lato VT farà vguale ad VB. Nell'istesso modo si dimostrerà, che gli altri lati TC, CX, XB, sono frà loro vguali, ed ogn'vno è vguale ad VT, ouero VB, e perciò il pentagono VBXCT è equilatero.

Di nouo, perche il piano AC, per ipotesi, è perpendicolare al piano



a 10. del 1.

b 30. del 6.

c 12. del 17.

d 9. definit. del 11.

e 4. del 12.

f 47. del 1.

g 47. del 1.

h 6. del 11.

k 33. del 2.

no

l. 4. definit.
del 11.

m. 6. del 11.

n. 4. definit.
del 11.

o. 31. del 11.

p. 8. del 11.

q. 6. del 11.

r. 3. definit.
del 6.

t. 1. del 11.

u. 5. del 11.

x. 47. del 11.

y. 3. definit.
del 11.


z. 47. del 11.

a. Scol. alla
4. del 11.

no BF, perciò la retta OH, ch'è perpendicolare alla retta BC, i farà perpendicolare al piano BF: ma la retta XQ, per costruzione, è perpendicolare al medesimo piano BF, le rette dunque OH, XQ, ^m sono frà di loro parallele. Similmente, perche il piano BF fa angoli retti col piano BD, e la retta MH è perpendicolare alla comune sezione BC, farà la retta MH ⁿ perpendicolare al piano BD. Dal punto O si tiri la retta OZ ^o parallela ad SV, in modo, che cada dietro al quadrato BD, quella concorrerà con VT in qualche punto Z. Essendo la retta SV perpendicolare al piano BD, la retta ZO, ^p che gli è parallela, sarà ancora perpendicolare al piano BD: ma la retta HM, ouero HQ, è dimostrata perpendicolare al medesimo piano BD, perciò le due rette OZ, HQ, ^q sono frà di loro parallele. Si tirino le rette ZH, HX. Perche la retta HP è diuisa in Q, secondo l'estrema, e media proporzion, sarà HP à PQ, ^r come PQ à QH: ma HP è vguale ad OH, e la parte QP, per costruzione, è vguale à QX, ed è ancora vguale ad OZ; farà OH ad OZ, come XQ à QH. Si considerino i due triangoli ZOH, HQX, che si toccano nell'angolo H, la proporzion di XQ à QH è come quella di HO ad OZ, ed i lati homologhi XQ, HO, sono frà loro paralleli; come anco sono paralleli gli homologhi QH, OZ; e per la 32. del 6, gli altri due lati XH, HZ, costituiscono la sola retta linea ZHX. E perche le rette ZX, BC, si segano nel punto H, perciò sono in vn medesimo piano, ed in conseguenza il pentagono equilatero VBXCT è in vn medesimo piano; quale dico ch'è ancora equiangolo.

Si tirino le rette BT, BR. Perche la retta IO è diuisa secondo l'estrema, e media proporzion in S, la di cui maggior parte è OS, ch'è vguale ad OR, sarà IR ^u diuisa secondo l'estrema, e media proporzion in O, e sarà IO la maggior parte, ed OR la minore; per la 4. propos. di questo, i quadrati delle due IR, RO, insieme giunti, sono il triplo del quadrato di IO, cioè il triplo del quadrato di IB: ma per costruzione RT è vguale ad RO, i quadrati dunque delle due IR, RT, sono il triplo del quadrato di IB; ed i quadrati di tutte tre le rette IR, RT, IB, saranno il quadruplo del quadrato di IB. E perche nel triangolo BIR, angolo retto in I; i quadrati delle due BI, IR, ^x sono vguali al quadrato di BR, i quadrati delle due BR, RT, saranno il quadruplo del quadrato di IB. Nel triangolo TRB l'angolo TRB ^y è retto, stante che la retta TR è perpendicolare al piano BD, e perciò il quadrato di BT, ^z è vguale à i quadrati delle due BR, RT; ma i quadrati delle due BR, RT, sono il quadruplo del quadrato di IB; il quadrato dunque di BT sarà il quadruplo del quadrato di IB. E perche il quadrato di AB, ouero BC, ^a è il quadruplo del

mede-



medesimo quadrato di IB , sarà il quadrato di BC vguale al quadrato di BT , e la retta BC sarà vguale alla retta BT . Nell'istesso modo, tirate le rette CS, CV , si dimostrerà, che la retta CV è vguale alla retta CB , dal che le tre rette CV, CB, BT , sono frà di loro vguali. Si considerino i due triangoli BXC, CTV , de quali i due lati BX, XC , sono vguali à i due lati CT, TV , la base BC è dimostrata vguale alla base CV , sarà l'angolo BXC vguale all'angolo CTV : e considerando i triangoli CTV, TVB , nell'istesso modo si dimostrerà, che l'angolo CTV è vguale all'angolo TVB . E perche nel pentagono equilatero $VBXCT$, i tre angoli BXC, CTV, TVB , sono frà loro vguali; per la 7. propos. di questo, il pentagono $VBXCT$ sarà equiangolo. Tutto quello, che si è fatto nel lato BC , del Cubo $EADF$, si faccia in tutti gli altri vndici lati del medesimo Cubo, e sarà fatto vn solido, contenuto da dodici pentagoni equilateri, ed equiangoli, quale douremo comprendere nella data sfera, e dimostrare, che il lato VB del Dodecaedro è linea irrationale, ed è quella, che si chiama Apotome.

Si prolunghi la retta ZO verso Y . Perche la retta OY cade nel centro O perpendicularmente al quadrato BD , ch'è base del Cubo $AEFD$, per il 1. Coroll. alla 15. propos. di questo, continuata concorre col diametro del Cubo nel centro del medesimo Cubo, doue tutti i diametri di esso Cubo si diuidono in due parti vguali. Si faccia OY vguale ad IO , e si tiri la retta YV . Perche OY è vguale ad OI , e fu fatta OZ vguale ad OR , sarà ZY vguale ad IR . E perche fu dimostrato, che i quadrati delle due IR, RO , sono il triplo del quadrato di IO , e la retta IR è vguale ad YZ , saranno i quadrati delle due YZ, OR , il triplo del quadrato di IO : ma OR è vguale ad OS , cioè ad VZ , i quadrati dunque delle due YZ, ZV , saranno il triplo del quadrato di OI . In oltre, essendo le rette RT, VS , vgnali, e parallele, saranno le rette VT, SR , e frà di loro vgnali, e parallele; dal che gli angoli SOZ, VZO , sono vgnali à due angoli retti: ma l'angolo SOZ è retto, stante che ZO è perpendicularare al piano BD , sarà l'angolo VZO ancora retto: e perciò nel triangolo YZV il quadrato di VY è vguale à i quadrati delle due YZ, ZV , ma i quadrati delle due YZ, ZV , sono il triplo del quadrato di IO , sarà il quadrato di VY il triplo del quadrato di IO . E perche il quadrato del diametro della sfera è il triplo del quadrato dell' lato AB del Cubo iscritto nella medesima sfera, sarà il quadrato della metà del diametro della sfera il triplo del quadrato di IB , cioè del quadrato di OI : ma il quadrato di VY è ancora il triplo del quadrato di IO , sarà VY la metà del diametro della sfera, nella quale è iscritto il Cubo $AEFD$, ed il punto Y il centro della medesima sfera; per la qual cosa il punto V è nella superficie della medesima sfera. Nell'istesso modo si dimostrerà, che gli altri angoli B, X, C, T , come ancora i rimanenti angoli del costrutto Dodecaedro, sono nella medesima superficie sferica; e perche il Cubo $AEFD$ si suppone iscritto nella sfera data, in conseguenza il Dodecaedro costruito, sarà compreso, cioè iscritto nella medesima sfera.

Finalmente, Dico che il lato del Dodecaedro è irrationale, ed è quella linea, che si chiama Apotome. Perche il quadrato del diametro della

b 8. del 1.

c 33. del 1.
d 29. del 1.
e 7. definit.
del 11.

f 47. del 1.


g 15. del 13.

h. 6. del 10

K 6. defin.
del 10.13. defin.
del 6.

sfera è triplo al quadrato del lato del Cubo iscritto; perciò il quadrato del diametro della sfera al quadrato del lato del Cubo iscritto, è come numero à numero, cioè come 6. à 25; per la qual cosa il diametro della sfera h è commensurabile in potenza al lato del Cubo. Suppo-

sto dunque il diametro della sfera Rationales, sarà il lato del Cubo K ancora Rationale. Di più, perchè la retta IO è divisa secondo l'estrema, e media proportion, la di cui maggior parte è SO , farà IO ad OS come OS ad SI ; e duplato il tutto, farà IK ad SR , come è SR alla retta composta delle due IS , RK . Se dunque il lato del Cubo, cioè IK , ch'è dimostrato Rationale, si divide secondo l'estrema, e media proportion, la maggior parte farà RS , cioè VT , che gli è vguale; e per la 6. proposi. di questo, il lato VT del Dodecaedro è linea irrationale, che si chiama Apotome, come fu proposto fare, e dimostrare.



COROLLARIO I.

Essendosi dimostrato, che divisa IK secondo l'estrema, e media proportion, la maggior parte è la retta SR , ouero VT , e la minor parte è la composta delle due IS , RK , sarà manifesto, che diuidendosi il lato IK del Cubo, secondo l'estrema, e media proportion, la maggior parte farà il lato VT del Dodecaedro iscritto nella medesima sfera.

COROLLARIO II.

Appare ancora, che il lato del Cubo, cioè BC , sottende l'angolo del pentagono, ch'è base del Dodecaedro iscritto nella medesima sfera. Oltre à ciò, perchè il lato del Cubo, cioè BC , che sottende l'angolo BXC del pentagono, se è diviso secondo l'estrema, e media proportion, la maggior parte è vguale al lato del pentagono, ed aggiungendo alla retta BC la detta maggior parte, tutta la composta sarà divisa secondo l'estrema, e media propor-

tione,

zione, di cui la maggior parte sarà BC, sarà manifesto, che diuisa qualunque retta linea secondo l'estrema, e media proportion, la maggior parte sarà il lato del Cubo, e la minor parte il lato del dodecaedro iscritto nella medesima sfera, dou'è iscritto il Cubo.

PROBLEMA VI. PROPOSITIONE XVIII.

Ritrouare i lati de i cinque corpi regolari, e compararli frà loro.

Sia AB il diametro della sfera diuiso in modo, che BC sia la metà di AB, la retta DB sia la terza parte di AB, e la retta EB la quinta parte della medesima AB: intorno al diametro AB sia descritto il mezzo circolo AFB, ne i punti C, D, E, s' siano eleuate le rette CF, DG, EH, perpendicolari ad AB, e si tirino le rette AF, AG, AH, BF, BG, BH; dalla retta AH se ne tagli la parte HI, vguale al lato del decagono iscritto in quel circolo, del quale BH sia semidiametro, cioè sia lato dell'esagono; si diuida BG secondo l'estrema, e media proportion, come nel punto K, e sia BK la parte maggiore. Dico prima, che AG è il lato della Piramide, o Tetraedro, che AF è il lato dell'Ottaedro, la retta BG è il lato del Cubo, la retta BI è il lato dell'Icosaedro, e la retta BK è il lato del Dodecaedro.



Perche DB è la terza parte di AB, di quelle parti, che il diametro AB è 3, la retta DB sarà 1, ed il rimanente AD 2; e perciò AB ad AD sarà come 3. à 2, cioè nella proportion sesquialtera. In oltre perche l'angolo AGB è retto, e la retta GD è perpendicolare ad AB, per il Corollario alla 8. del 6, sarà AG media proportionale frà le due BA, AD, ed hauerà AB ad AD duplicata proportion di quella, che hà AB ad AG: ma il quadrato di AB al quadrato di AG, hà la medesima duplicata proportion, che AB ad AG, hauerà il quadrato di AB al quadrato di AG: l'istessa proportion, che AB ad AD: ma AB è nella sesquialtera proportion ad AD, sarà il quadrato di AB nella sesquialtera proportion al quadrato di AG. E perche il quadrato del diametro della sfera è nella sesquialtera proportion al quadrato del lato del Tetraedro iscritto nella medesima sfera, essendo AB il diametro della sfera, sarà AG il lato del Tetraedro iscritto.

Di nouo, perche AF è media proportionale frà le due BA, AC, sarà il quadrato di AB al quadrato di AF come AB ad AC; per costruzione AB è il doppio di AC, sarà il quadrato di AB il doppio del quadrato

K 14. del 13.

di AF: ma il quadrato del diametro della sfera K è il doppio del quadrato del lato dell'Ottaedro iscritto, posta AB diametro della sfera, sarà AF il lato dell'Ottaedro iscritto nella medesima sfera.

In oltre, perche BG è media proportionale fra le due AB, BD, sarà il quadrato di AB al quadrato di BG, come AB à BD: ma AB, per costruzione, è tripla à BD, sarà il quadrato di AB triplo al quadrato di BG. E perche il quadrato della sfera I è triplo al quadrato del Cubo iscritto, se AB si prende come diametro della sfera, sarà BG il lato del Cubo iscritto nella medesima sfera.



I 15. del 13.

Parimente, essendo BH media proportionale fra le due AB, BE, sarà AB à BE, come il quadrato di AB al quadrato di BH; ma AB, per costruzione, è il quintuplo di BE, sarà il quadrato di AB il quintuplo del quadrato di BH. E perche il quadrato del diametro della sfera m è quintuplo al quadrato del semidiametro di quel circolo, che circonda il pentagono, sopra il quale è descritto l'Icosaedro, sarà BH il semidiametro, o lato dell'esagono, iscritto nel medesimo circolo: fu fatta la retta HI, per costruzione, lato del decagono iscritto in quel medesimo circolo, i quadrati delle due BH, HI, insieme giunti, saranno vguali al quadrato del lato del detto pentagono: ma il quadrato di BI è vguale à i quadrati delle due BH, HI, sarà BI il lato di quel pentagono; e perche ogni lato di quel pentagono rappresenta vn lato dell'icosaedro, sarà BI il lato dell'icosaedro.

m Coroll. 1.
alla 16. del
13.

Finalmente, perche il lato BG del Cubo è diuiso secondo l'estrema, e media proportione in K, per il primo Coroll. alla 17. propos. di questo, la maggior parte BK sarà il lato del Dodecaedro, e saranno esposti i lati de i cinque corpi regolari iscritti nella medesima sfera, come fu proposto.

Per la comparatione de i lati ritrouati si offerui il seguente modo. Perche s'è dimostrato, che il quadrato del diametro della sfera è sesquialtero al quadrato del lato dell'Tetraedro, ed è duplo al quadrato del lato dell'Ottaedro, e triplo al quadrato del lato del Cubo; di quelle parti, che il quadrato del diametro della sfera è 6, sarà il quadrato del lato del Tetraedro 4, quello dell'Ottaedro 3, e quello del Cubo 2. D'ond'è manifesto, che il quadrato del lato del Tetraedro è nella proportione sesquialtera al quadrato del lato dell'Ottaedro, e dupla à quello del Cubo; ed il quadrato del lato dell'Ottaedro è nella proportione sesquialtera al quadrato del lato del Cubo; e perciò il quadrato del diametro della sfera, ed i quadrati de i lati di esse figure, cioè del Tetraedro, Ottaedro, e Cubo, sono come numero à numero, e perciò sono fra loro commensurabili: per la qual cosa il dia-

86. del 10.

Quadrato del	
Diametro della	
sfera	6
Tetraedro	4
Ottaedro	3
Cubo	2

metro

metro della sfera, ed i lati del Tetraedro, Ottaedro, e Cubo, sono commensurabili in potenza; si che, supposto il diametro della sfera Razionale, i lati delle dette figure, cioè Tetraedro, Ottaedro, e Cubo, sono Razionali. E perche i numeri 4, 3, 2, i quali sono nelle proporzioni de i quadrati de i lati di esse figure, ^b non sono come numero quadrato a numero quadrato, perciò i lati di quelle figure ^c sono solamente commensurabili in potenza: ma furono dimostrate Razionali, perciò sono Razionali, commensurabili solamente in potenza.

b Scolio nel fine del 9.
c 9. del 10.

Del resto i lati dell'Icofaedro, e del Dodecaedro, in verun modo sono frà loro commensurabili; poiche se fossero commensurabili, essendo il lato del Dodecaedro Apotome, sarà ancora ^d il lato dell'Icofaedro Apotome; ed all'incontro essendo il lato dell'Icofaedro quella linea, che si chiama minore, sarebbe ancora ^e il lato del Dodecaedro linea minore, il che è impossibile, mentre l'Apotome, e la linea Minore sono due linee irrazionali e totalmente diuerse.

d 104. del 10.

e 106. del 10.

Benche i lati de i primi tre corpi regolari costrutti siano Razionali, e frà loro commensurabili in potenza, e commensurabili ancora in potenza al diametro della sfera, alla quale s'intendono iscritti, ed i lati dell'altre due, cioè dell'Icofaedro, e del Dodecaedro sono linee irrazionali, ed incommensurabili in lunghezza, e potenza, con tutto ciò ritengono questa disposizione; cioè il lato del Tetraedro è maggiore del lato dell'Ottaedro, il lato dell'Ottaedro è maggiore del lato del Cubo, il lato del Cubo è maggiore del lato dell'Icofaedro, ed il lato dell'Icofaedro è maggiore del lato del Dodecaedro, cioè si superano col medesimo ordine, col quale sono stati costrutti.

f 112. del 10


Il tutto è noto dalla costruzione de i lati, poiche il lato AG del Tetraedro sottende maggior arco di quello, che sottende il lato AF dell'Ottaedro, e perciò AG è maggiore di AF. Di più il lato BF dell'Ottaedro sottende maggior arco di quello, che sottende BG, ch'è lato del Cubo, e perciò il lato dell'Ottaedro è maggiore del lato del Cubo. Che poi il lato BG del Cubo sia maggiore del lato BI del Icofaedro, si dimostra in questo modo.

Si faccia come AB à BD, così BD ad vn altra, che sia M. Perche AB è il triplo di BD, perciò BD sarà il triplo di M, e tutta AB sarà il nonuplo della retta M, ma AB ad M è come il quadrato di AB al quadrato di BD, essendo AB nonupla alla retta M, sarà il quadrato di AB nonuplo al quadrato di BD. Posto dunque il quadrato di BD come vnità, sarà il quadrato di AB 9; e perche il quadrato di AB al quadrato di BG è come AB à BD, sarà il quadrato di AB il triplo del quadrato di BG. Se il quadrato di AB l'intenderemo diuiso in 9 parti vguali, sarà il quadrato di BG 3 di quelle parti, che il quadrato di AB è 9; e perche il quadrato di GB è vguale à i quadrati delle due GD, DB, i quadrati delle due GD, DB, giunti insieme, saranno 3 di quelle parti, che il quadrato di AB è 9. Se dunque se ne leua il quadrato di BD, ch'è vna di quelle 9. parti, resta il quadrato di GD vguale à 2 di quelle 9. parti. In oltre perche il quadrato di AB al quadrato di BH è come AB à BE, essendo, per costruzione, AB il quintuplo di BE, sarà il quadrato di AB

g 47. del 10.

il

il quintuplo del quadrato di BH, cioè sarà come 10. a 2, è perciò di quelle parti, che il quadrato di AB è 10, il quadrato di HB sarà 2: ma di quelle parti, che il medesimo quadrato di AB è 9 il quadrato di GD è 2, essendo ciascuna delle 10. parti del quadrato di AB minori di ciascuna delle 9 parti del medesimo quadrato di AB, farà il quadrato di BH, ch'è 2, di quelle dieci parti, minore del quadrato di GD, ch'è 2 di quelle 9 parti, e perciò la retta GD è maggiore di BH. Di nuovo si faccia IL vguale ad IH. Perchè HB è lato dell'esagono iscritto nel circolo, che circonda quel pentagono, sopra il quale è costruito l'Icosaedro, ed IH è lato del decagono iscritto nel medesimo circolo, farà BH maggiore di HI; si tagli HO vguale ad HI, farà HI la terza parte della retta composta delle due LH, HO, e perciò IH sarà minore della terza parte della retta composta delle due LH, HB: ma la retta composta delle due LH, HB, è composta del lato HB dell'anteditto esagono, e di LH, ch'è il doppio del lato del decagono, farà IH minore della terza parte della retta composta del lato di quell'esagono, e del doppio del lato del decagono: ma per il Corollario secondo alla 16. propos. di questo, il diametro AB è composto del lato BH del detto esagono, e del doppio di HI, farà HI minore della terza parte di AB; fu fatta per costruzione, DB la terza parte di AB, farà IH minore di BD. E perchè HB fu dimostrata minore di GD, le due BH, HI, faranno minori delle due GD, DB, ed i quadrati delle due BH, HI, sono minori, de i quadrati delle due GD, DB: ma il quadrato di IB è vguale à i quadrati delle due BH, HI, ed il quadrato di BG è vguale à i quadrati delle due GD, DB; il quadrato dunque di IB farà minore del quadrato di GB, e la retta GB, ch'è lato del Cubo, è maggiore di IB, ch'è lato dell'icosaedro, come fu proposto dimostrare.



h. 47.dcl s.

K 17. del 6.

§ 2. del 2.

ta l'vna, e l'altra parte, il triplo quadrato di BG, sarà maggiore del sestuplo quadrato di BK. Di nuouo, per quel che si è dimostrato, il quadrato di AB è il triplo del quadrato di BG, ed è il quintuplo del quadrato di BH, e perciò il triplo quadrato di BG sarà vguale al quintuplo quadrato di BH: ma il triplo quadrato di BG è dimostrato maggiore delli sei quadrati di BK; sarà il quintuplo quadrato di BH maggiore delli sei quadrati di BK; dal che vn solo quadrato di BH sarà maggiore d'vn solo quadrato di BK, ed il lato BH sarà maggiore di BK. Nel triangolo BHI, angolo retto in H, sarà l'angolo BIH ^m minore dell'angolo BHI, e perciò il lato BI ⁿ sarà maggiore di BH: ma BH è dimostrato maggiore della retta BK; sarà dunque BI, ch'è lato dell'Icosaedro, molto maggiore di BK, ch'è il lato del Dodecaedro. Abbiamo dunque esposti, e comparati i lati de i cinque corpi regolari, il che era da farsi, e dimostrarli.

m 17. del 1.
n 19. del 1.

S C O L I O.

Spiegata la costruzione de' cinque corpi regolari, e fatta la comparatione de' loro lati, resta che dimostriamo come i corpi regolari non possono essere più di cinque. E nota, che per corpo regolare s'intende quella figura solida contenuta da piani equilateri, equiangoli, ed uguali fra loro. E nota ancora, che per la costituzione dell'angolo solido si ricercano due condizioni, la prima è, che gli angoli piani, i quali contengono l'angolo solido, non siano meno di tre, e la seconda che tutti gli angoli piani, che contengono l'angolo solido, giunti insieme, non siano minori di quattro angoli retti. Supposto questo.

a si defin.
del 11.

b 21. del 11.
c 32. del 1.

Perche l'angolo del triangolo equilatero è la terza parte di due angoli retti, cioè la sesta parte di quattro angoli retti, saranno sei angoli del triangolo equilatero sei seste parti di quattro angoli retti, e perciò sei angoli del triangolo equilatero, giunti insieme, sono uguali a quattro angoli retti; dal che con sei angoli del triangolo equilatero non si può costituire angolo solido: dond'è manifesto, che non più di cinque triangoli equilateri, che concorrono secondo vn' angolo, possono costituire angolo solido, e perche con tre triangoli equilateri, che concorrono secondo vn' angolo, si costituisce l'angolo solido del Tetraedro, con quattro si costituisce l'angolo solido dell'Ottaedro, e con cinque si costituisce quello dell'Icosaedro, perciò co' i triangoli equilateri non si possono costruire altri corpi regolari, che i tre nominati corpi, cioè il Tetraedro, l'Ottaedro, l'Icosaedro.

Di nuouo perche l'angolo del quadrato è la quarta parte di quattro angoli retti, i quattro angoli del quadrato saranno uguali a quattro angoli retti, e perciò non più di tre quadrati, che concorrono secondo vn' angolo, possono costituire angolo solido, per la qual cosa colle figure quadrate non si possono costruire altri corpi regolari, fuor che il Cubo.

d Scol. alla
32. del 1.

In oltre perche l'angolo del pentagono è la quinta parte di sei angoli retti, cioè tre decime parti di quattro angoli retti, saranno quattro angoli del pentagono, giunti insieme, uguali a dodici decime parti di quattro angoli retti; ma i quattro angoli retti sono uguali a dieci decime parti de i medesimi, le dodici decime parti di quattro angoli retti, cioè i quattro angoli del pentagono so-

e Scol. alla
32. del 1.

no maggiori di quattro angoli retti, e perciò con quattro pentagoni, che concorrono secondo un'angolo, non si può costituire angolo solido. Dende appare, che colle figure pentagonali non si può costruire altro corpo regolare, fuorché il Dodecaedro.

f Scol. alla
3a. del L.

Finalmente perché l'angolo dell'esagono ϵ la terza parte di quattro angoli retti; saranno tre angoli dell'esagono uguali à quattro angoli retti, e perciò con tre figure esagonali, che concorrono secondo un'angolo, non si può costituire angolo solido, ne meno si può costituire angolo solido con due soli esagoni, stante che per costituire l'angolo solido non devono esser meno di tre angoli piani; per la qual cosa con le figure esagonali non si può costruire corpo alcuno regolare. Nell'istesso modo si dimostrerà, che con nessun altro poligono regolare si può costruire nessun corpo regolare; e perciò i corpi regolari sono solamente cinque, cioè Tetraedro, Ottaedro, Cubo, Icosaedro, e Dodecaedro, come sù proposto dimostrare.

Fine del Decimoterzo Elemento.



EVCLIDE RESTITVTO

D A

VITALE GIORDANI.

ELEMENTO DECIMOQVARTO.



Concordano tutti gl' Interpreti, che gli antecedenti tredici Elementi sono assolutamente d' Euclide; ma che i due seguenti, cioè decimoquarto, e decimoquinto, siano d' Hypsicle Alessandrino; e perche il tutto è manifesto nella seguente Epistola proemiale presa dal Commandino, stimo superfluo il farci sopra altro discorso.

PROEMIO D'HYPSICLE ALESANDRINO
A PROTARCHO.




ASILIDE Tyrio, ò Protarco, venendo in Alessandria, ed essendo molto caro à nostro padre, per la commune cognitione delle scienze Matematiche, nel tempo del peregrinaggio, praticò lungamente con esso lui, e tal volta esaminando quello, che è stato scritto da Apollonio della comparatione del Dodecaedro, ed Icosaedro, che si descriuono nella medesima sfera, qual proportione habbiano frà loro, giudicarono ciò non essere stato ben trattato da Apollonio, e però hauendolo prima emendato, come mio padre diceua, ne fecero memoria. Ma io poi mi sono abbattuto in vn altro libro, mandato in luce da Apollonio, il quale dirittamente comprende la dimostratione della cosa proposta; e per la inuestigatione del detto problema, ne presi grandissimo piacere. Quello che hà scritto Apollonio, ogn' vno facilmente lo può vedere, essendo nelle mani di tutti. Ma quello che noi habbiamo con gran studio, per quanto si può pensare, composto, ed accomodato, mettendolo in scritto, ci è piaciuto dedicarlo à te, come à quello, che per l'eccellente cognitione di tutte le scienze Matematiche, massimamente della Geometria,

ſci per eſaminare, prudentemente le coſe, che noi diremo, e per l'amicitia grande, che hai hauuto con mio padre, e per l'amor, che mi porti, ſci per aſcoltare volentieri queſto mio libro. Ma è già tempo, che ponendo fine al proemio veniamo alla coſa propoſta.

THEOREMA I. PROPOSITIONE I.

La linea retta, che dal centro del circolo cade perpendicolare allato del pentagono iſcritto nell' iſteſſo circolo, è la metà della retta compoſta del lato dell'eſagono, e del lato del decagono, che ſi iſcriuono nel medefimo circolo.

Nel circolo ABCD, il di cui centro E, ſia BD il lato del pentagono iſcritto, e dal centro E cada la retta EF perpendicolare à BD. Dico che la retta EF è la metà della retta compoſta del lato dell'eſagono, e del lato del decagono, iſcritti nel medefimo circolo ABCD. Si prolunghi la retta EF ſin che concorra con la circonferenza del circolo da ambidue le parti, come in A, & C; ſi faccia FG vguale ad FA, e ſi tirino le rette, DE, DG, DA, AB. Perche la retta EA paſſa per il centro E, e ſega la retta BD ad angoli retti in F, ſarà BF, vguale alla retta FD. Si conſiderino i triangoli DFA, AFB. Perche i due lati AF, FB, e gli angoli in F ſono retti, ſarà la baſe AD^b vguale alla baſe AB, dal che l'arco AD^c è vguale all'arco AB. E perche la retta BD è lato del pentagono iſcritto, ſarà l'arco BAD la quinta parte di tutta la circonferenza ABCD, e l'arco AD la decima parte; per la qual coſa la retta AD ſarà il lato del decagono iſcritto nel medefimo circolo ABCD. Ne i triangoli DFA, DFG, i due lati DF, FG, ſono vguali à i due lati DF, FA, gli angoli in F ſono retti, e perciò la baſe AD^d ſarà vguale alla baſe DG, e gli angoli DGA, DAG, faranno frà di loro vguali. In oltre, perche tutta la circonferenza ABCD è quintupla all'arco BAD, la metà della circonferenza ABCD ſarà quintupla alla metà dell'arco BAD; cioè l'arco CDA è quintuplo all'arco DA; per la qual coſa l'arco CD ſarà quadruplo all'arco DA; ma l'arco CD all'arco DA è come l'angolo CED all'angolo DEA, eſſendo l'arco CD il quadruplo dell'arco DA, ſarà l'angolo CED il quadruplo dell'angolo DEA. E perche l'angolo CED al centro è il doppio dell'angolo CAD alla circonferenza, l'angolo dunque DAE ſarà il doppio dell'angolo DEA; fù moſtrato l'angolo DGA vguale all'angolo DAE, ſarà l'angolo DGA il doppio dell'angolo DEA. Nel triangolo DGE è continuato il lato EG verſo A, ſarà l'angolo DEA eſterno e vguale à i due angoli GED, GDE interni, ed oppoſti; fù dimoſtrato l'angolo DGA, eſſere il doppio dell'angolo GED, l'angolo dunque GED



a 3. del 3.

b 4. del 1.
c 28. del 3.

d 4. del 1.

e 33. del 6.

f 30. del 3.

g 22. del 1.

ſarà

farà vguale all'angolo GDE, ed il lato GD^b farà vguale al lato GE; ma il lato GD fu dimostrato vguale al lato AD, farà il lato AD vguale al lato GE; al lato AD s'aggiunga AF, ed al lato GE s'aggiunga GF, ne viene EF vguale alle due DA, AF, giunte insieme; vgualemente s'aggiunga la retta EF, faranno le due EA, AD, giunte insieme, vguale al doppio di EF; per la qual cosa la retta EF è la metà delle due EA, AD giunte insieme; e perche il semidiametro EA è vguale al lato dell'esagono, ed il lato DA è lato del decagono, ambidue iscritti nel circolo ABCD, in conseguenza la retta EF farà la metà della retta composta del lato dell'esagono, e del lato del decagono iscritti nel medesimo circolo, ch'era da dimostrarsi.


b 6. del 1.

S C O L I O.

Qui facilmente possiamo dimostrare col P. Clauio i due seguenti theoremi.

Il lato dell'esagono al lato del decagono, iscritti nel medesimo circolo, è come la retta, che sottende l'angolo del pentagono equilatero, ed equiangolo, al lato del medesimo pentagono.

Nel circolo ABCDE, il di cui centro F, sia iscritto il pentagono equilatero, ed equiangolo ABCDE, e sia AG il lato del decagono iscritto nel medesimo circolo; si tiri il semidiametro FG, sarà FG, ^a lato dell'esagono. Si tiri la retta BE, che sottende l'angolo BAE del pentagono. Dico che la retta FG alla retta GA, è come la retta EB al lato BA. Perche la retta FG, lato dell'esagono, col lato del decagono GA, compongono una retta diuisa secondo l'estrema, e media proportione, la di cui maggior parte è il lato FG dell'esagono, e la minor parte è il lato GA del decagono, e della retta EB, diuisa secondo l'estrema, e media proportione, in qualche punto H, la maggior parte EH è vguale al lato EA del pentagono, sarà la maggior parte EH alla minor parte HB, ^d come FG à GA; ma EH ad HB è come EB ad EH, sarà EB ad EH = come FG à GA. E perche EH è vguale ad EA, ouero AB, sarà EB à BA, come FG à GA, ch'era da dimostrarsi.

a Corollaria
15. del 4.

b 9. del 13.

c 8. del 9.

d Scolia 5
del 13.
e 11. del 5.

Se la retta, che dal centro del circolo cade perpendicolare al lato del pentagono iscritto nel medesimo circolo, è diuisa secondo l'estrema, e media proportione; la maggior parte è vguale alla retta, che dal medesimo centro cade

D d d d d 2

per-

perpendicolare al lato del triangolo equilatero, e la minor parte è vguale alla metà del lato del decagono iscritto nel medesimo circolo.

Nel circolo $ABCD$ sia la retta BD lato del pentagono iscritto, e diuiso l'arco BAD in due parti uguali in A , tirata la retta AD sarà AD lato del decagono; dal centro E si tiri la retta EA , la quale segnerà BD ad angoli retti in qualche punto G , e sarà EG per la 1. prop. del 14, la metà della retta composta delle due EA , AD , e diuisa poi la retta EG u secondo l'estrema, e media proporzione in F , in modo, che EF sia la maggior parte. Dico che la maggior parte EF è vguale alla retta, che dal centro E cade perpendicolare al lato del triangolo; e che la minor parte FG è la metà della retta AD , ch'è lato del decagono. Perche al lato dell'esagono EA , aggiunto il lato AD del decagono, se ne compone una retta diuisa secondo l'estrema, e media proporzione, di cui la maggior parte è AE , e la minor parte AD , e la retta EG è diuisa ancora secondo l'estrema, e media proporzione in F , la di cui maggior parte è EF , e la minore FG , per lo Scol. 2. alla prop. 5. del 13, sarà la composta delle due EA , AD , ad AE , come è GE ad EF ; e permutando, la composta delle due EA , AD ad EG , ^{k} sarà come AE ad EF ; ma la composta delle due EA , AD , ^{l} è il doppio di EG , sarà la retta AE il doppio di EF . Se dunque per il punto F passa la retta HI ad angoli retti con AE , sarà HI lato del triangolo equilatero iscritto nel circolo $ABCD$, e perciò la retta EF è quella, che dal centro E cade perpendicolare al lato del triangolo; ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

Dico di nouo che FG è la metà di AD . Perche la composta delle due EA , AD ad EA è come GE ad EF , per la conuersione della proporzione, la composta delle due EA , AD ad AD , ^{n} sarà come EG ad GF , e permutando, la composta delle due EA , AD ad EG sarà come AD , ^{o} ad FG ; ma la composta delle due EA , AD , è il doppio di EG , sarà ancora AD il doppio di FG ; e perciò FG è la metà di AD lato del decagono, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA II. PROPOSITIONE II.

Il medesimo circolo comprende il pentagono del Dodecaedro, e il triangolo dell'Icoaedro, iscritti nella medesima sfera.

Sia A il diametro della sfera, nella quale s'intenda iscritto il Dodecaedro, la di cui base sia il pentagono $BCDEF$, e l'Icoaedro, del quale vna delle basi sia il triangolo GHI . Dico che il circolo circoscritto intorno al pentagono $BCDEF$ è vguale al circolo circoscritto intorno al triangolo GHI . Sia esposto il pentagono $KLMNO$ di quell'Icoaedro, del quale vna delle basi sia il triangolo GHC , sarà ciascun lato LK , KO ,

ON,



F r. Corol.
alla 10. del
13.

g. 30 del 6.


h p. del 13.

K 16. del 5.
l 1. del 14.

m Corol. 2.
alla 12. del 13.

n Corol. alla
19. del 5.
o 16. del 5.

ON, NM, ML, vguale: al lato GH, del triangolo equilatero GHI. Intorno al pentagono KLMNO ^a sia circo. scritto il circolo KMN, il di cui centro sia P, si tiri la retta PL, e da i centri R, ed S, si tirino le rette RC, SH, e si seghi la retta PL ^b secondo l'estrema, e media



proportione in Q, e per il 2. Coroll. alla 9. propof. del 13, la maggior parte QP farà il lato del decagono ifcritto nel circolo KLMNO, nel quale il lato dell' efagono è vguale ad LP; fi tiri la retta CF. Perche la retta CF fottende l'angolo CBF del pentagono, per il Corol. 2. alla 17. propof. del 13, farà CF il lato del cubo ifcritto nella medefima ffera, dou'è ifcritto il Dodecadro: e perche il quadrato della retta A, ch'è diametro della ffera, per la 15. prop. del 13, è triplo al quadrato di CF, lato del Cubo, ed il medefimo quadrato della retta A, per il 1. Corol. alla 16. prop. del 13, è quintuplo al quadrato di LP, perciò il triplo quadrato di CF farà vguale al quintuplo quadrato di LP. In oltre fe concepiremo CF, ch'è il lato del detto cubo, diuifo fecondo l'estrema, e media proportione, per il Coroll. 1. alla citata 17. propof. del 13, la maggior parte farà vguale al lato FB del pentagono BCDEF, e per lo Scolio 2. alla 5. propof. del 13, farà CF alla maggior parte FB, come LP à PQ: e permutando, CF ad LP ^c farà come FB à PQ, ed il quadrato di CF al quadrato di LP ^d farà come il quadrato di FB al quadrato di PQ; e triplati gli antecedenti, farà il triplo quadrato di CF al quadrato di LP, come il triplo quadrato di FB al quadrato di PQ; e quintuplati i confequenti, farà il triplo quadrato di CF al quintuplo quadrato di PL, come il triplo quadrato di FB al quintuplo quadrato di PQ: ma, per quel che fi è dimoftrato, il triplo quadrato di CF è vguale al quintuplo quadrato di PL, perciò il triplo quadrato di FB ^e farà vguale al quintuplo quadrato di PQ, e perche il quadrato di ML, lato del pentagono, per la 10. del 13, è vguale al quadrato di PL, lato dell'efagono, col quadrato di PQ, lato del decagono; farà il quintuplo quadrato di ML vguale al quintuplo quadrato di PL, col quintuplo quadrato di PQ: fu dimoftrato il triplo quadrato di CF, vguale al quintuplo quadrato di PL, ed il triplo quadrato di FB vguale al quintuplo quadrato di PQ, farà il quintuplo quadrato di LM vguale al triplo quadrato di CF, più il triplo quadrato di FB. Di nuouo, perche i quadrati delle due CF, FB, per il 1. Scol. alla 10. propof. del 13, fono il quintuplo del quadrato di CR, il triplo quadrato di CF, col triplo quadrato di FB, farà vguale à quindici quadrati di CR: ma il triplo quadrato di CF, col triplo quadrato di FB fu dimoftrato vguale al quintuplo quadrato di LM, farà il quintuplo quadrato di LM vguale à quindici quadrati di CR. E perche il lato LM per quel che fi è detto, è vguale al lato HI, farà il quintuplo quadrato di HI vguale à quindici quadrati di CR. Finalmente petche, per la 12. prop. del

13, il

a 14. del 4.

b 30. del 6.

c 16. del 5.
d 22. del 6.


e 14 del 5.

13, il quadrato di HI è vguale al triplo quadrato di HS, farà il quintuplo quadrato di HI vguale à quindici quadrati di HS: ma il quintuplo quadrato di HI fù dimostrato vguale à quindici quadrati di CR; quindi quindici quadrati dunque di CR sono vguali à i quindici quadrati di HS, D'onde il quadrato di CR farà vguale al quadrato di HS, ed il semidiametro CR vguale al semidiametro HS. Per la qual cosa il circolo BCDEF farà vguale al circolo GHI, come fù proposto dimostrare.

THEOREMA III. PROPOSITIONE III.

Se dal centro del circolo circoscritto al pentagono del Dodecaedro, cade vna retta perpendicolare al lato di esso pentagono, il trentuplicato rettangolo contenuto da quella perpendicolare, e dal lato del detto pentagono, è vguale alla superficie del Dodecaedro.

Sia ABCDE vno de pentagoni del Dodecaedro ifcritto nel circolo ACD, il di cui centro F, dal quale cada la retta FG perpendicolare al lato CD. Dico che il trentuplo rettangolo contenuto dalla retta FG, e dal lato CD, è vguale alla superficie del Dodecaedro. Si tirino le rette FD, FC, e sopra il lato CD, all'altezza FG, si faccia il rettangolo HCDI, il quale sarà il doppio del triangolo FCD; e perche il rettangolo HCDI è contenuto dalle rette HC, CD, e la retta HC è vguale ad FG, farà il rettangolo contenuto dalle due FG, CD, vguale al doppio triangolo FCD, ed il quintuplo rettangolo contenuto dalle due FG, CD, farà decuplo al triangolo FCD, cioè il quintuplo rettangolo contenuto dalle due FG, CD, è vguale à dieci triangoli FCD; cioè vguale à due volte i cinque triàngoli FCD, FDE, FEA, FAB, FBC; e perciò il quintuplo rettangolo contenuto dalle rette FG, CD, è vguale al doppio pentagono ABCDE; e dodecuplicata l'vna, e l'altra parte di questa vguaglià, ne vengono sessanta rettangoli, contenuti dalle rette FG, CD, vguali à 24. pentagoni ABCDE; e presone la metà, ne vengono trenta rettangoli contenuti dalle rette FG, CD, vguali à dodici pentagoni ABCDE; ma i 12. pentagoni ABCDE, sono vguali alla superficie del Dodecaedro; i trenta rettangoli dunque contenuti dalle rette FG, CD, sono vguali alla superficie del Dodecaedro, ch'era da dimostrarli.



a 41. del 1.

S C O L I O I.

Nell'istesso modo si dimostrerà il seguente Theorema.

Se dal centro del circolo circoscritto intorno ad vno
dei

de i triangoli, ch'è base dell'Icoſaedro, cade vna retta perpendicolare ad vn lato; il trentuplo rettangolo contenuto dalla perpendicolare, e dal lato del triangolo, è vguale alla ſuperficie dell'Icoſaedro.

Sia il triangolo equilatero ABC vno di quelli, che contengono l'Icoſaedro, intorno al quale ſia circoscritto il circolo ABC , il di cui centro D , dal quale cada la retta DE perpendicolare al lato BC . Dico che il trentuplo rettangolo contenuto dalle rette DE , BC , è vguale alla ſuperficie dell'Icoſaedro. Si tiri la retta DA , ſarà diuiſo il triangolo ABC ne i tre vguali triangoli DBC , DAC , DAB ; e perche come ſi diſſe nella dimoſtratione antecedente, il rettangolo contenuto dalle rette DE , BC , è il doppio del triangolo DBC , ſarà il triplo rettangolo contenuto dalle due DE , BC , il doppio de i tre triangoli DBC , DCA , DAB ; cioè il triplo rettangolo contenuto dalle rette DE , BC , è vguale al doppio triangolo ABC ; e ventuplicata l'vna, e l'altra parte dell'vguaglià, ne viene il ſeſſantuplo rettangolo, contenuto dalle rette DE , BC , vguale al quarantuplo triangolo ABC ; e preſe le loro metà, ſarà il trentuplo rettangolo contenuto dalle due DE , BC , vguale à venti triangoli ABC ; ma venti triangoli ABC ſono vguali alla ſuperficie dell'Icoſaedro; in conſeſſenza il trentuplo rettangolo contenuto dalle rette DE , BC , ſarà vguale alla ſuperficie dell'Icoſaedro, ch'era da dimoſtrarſi.



a 41. del 12.

COROLLARIO

Quindi è manifeſto, che il rettangolo contenuto da vn lato del pentagono equilatero, ed equiangolo, e dalla retta, che dal centro di eſſo pentagono cade perpendicolare ad vno de i ſuoi lati, al rettangolo contenuto da vn lato del triangolo equilatero, e dalla retta, che dal centro di eſſo triangolo cade perpendicolare ad vno de i ſuoi lati, è come la ſuperficie del Dodecaedro (di cui ciaſcuna baſe è vguale à quel pentagono) alla ſuperficie dell'Icoſaedro, del quale ciaſcuna baſe è vguale al detto triangolo.


Perche nel detto pentagono, eſſendo il trentuplo rettangolo, contenuto dalla perpendicolare, e dal lato di eſſo pentagono, vguale alla ſuperficie del Dodecaedro; ſimilmente nel detto triangolo il trentuplo rettangolo contenuto dalla perpendicolare, e dal lato del triangolo, è vguale alla ſuperficie dell'Icoſaedro; ſarà nel pentagono il trentuplo rettangolo, contenuto dalla detta perpendicolare, e dal lato del pentagono, alla ſuperficie del Dodecaedro, come nel triangolo il trentuplo

rettangolo contenuto dalla detta perpendicolare, e dal lato del triangolo, alla superficie dell'Icoſaedro; e preſa la trentefima parte degli antecedenti, ſarà il rettangolo contenuto dalla perpendicolare, che cade dal centro del pentagono, e dal lato di eſſo pentagono, alla ſuperficie del Dodecaedro, come il rettangolo contenuto dalla perpendicolare, che cade dal centro del triangolo, e dal lato del medefimo triangolo, alla ſuperficie dell'Icoſaedro: e permutando, il rettangolo contenuto dalla detta perpendicolare, e dal lato del pentagono, al rettangolo contenuto dalla perpendicolare, che cade dal centro del triangolo, e dal lato di eſſo triangolo, come la ſuperficie del Dodecaedro alla ſuperficie dell'Icoſaedro.

THEOREMA IV. PROPOSITIONE IV.

La ſuperficie del Dodecaedro alla ſuperficie dell'Icoſaedro, iſcritti nella medefima ſfera, e come il lato del Cubo al lato dell'Icoſaedro.

Nel circolo ABCD, che ſi circoscrive intorno al pentagono del Dodecaedro, ed al triangolo dell'Icoſaedro, ſiano addattate le rette cioè BD lato del triangolo dell'Icoſaedro, e la retta DE lato del pentagono del Dodecaedro; e dal centro F cadano le rette FG perpendicolare al lato BD, ed FH perpendicolare ad ED, e ſia K il lato del Cubo iſcritto nella medefima ſfera, coll'Icoſaedro, e Dodecaedro. Dico, che la ſuperficie del Dodecaedro alla ſuperficie dell'Icoſaedro è come la retta K, ch'è lato del Cubo, al lato BD del triangolo equilatero. Perche ED è lato del Dodecaedro, cioè è lato del pentagono del Dodecaedro, e la retta FH è perpendicolare ad ED, ſe la retta FH ſarà diviſa ſecondo



a Scol. alla
1. del 14.

b 17. del 6.

c 1. del 6.

l'estrema, e media proportione, la maggior parte ^a ſarà vguale ad FG, ch'è la retta, che cade perpendicolare al lato BD del triangolo. Similmente ſe concepiremo diviſo il lato K del Cubo ſecondo l'estrema, e media proportione, per il 2. Coroll. alla 17. propoſ. del 13, la maggior parte ſarà il lato ED del pentagono; e per lo Scolio 2. alla 5. propoſitione del 13, la retta K, ch'è lato del Cubo, alla ſua maggior parte ED ſarà com'è FH alla ſua maggior parte FG, ed il rettangolo contenuto dall'estrema, cioè dalla retta K, e da FG, ſarà vguale ^b al rettangolo contenuto dalle medie ED, FH. Preſe le due K, & BD, come baſi di due rettangoli, e ſia FG altezza commune, ſarà il rettangolo contenuto dalle due K, & FG, al rettangolo contenuto dalle due BD, & FG ^c come la baſe K alla baſe BD; ma il rettangolo contenuto dalle due K, & GF, è dimoſtrato vguale al rettangolo contenuto dalle due ED, FH; ſarà il rettangolo contenuto dalle due ED, FH, al rettangolo contenuto dalle due

BD, FG,

BD, FG, come la retta K al lato BD: ma per l'antecedente Corollario il rettangolo contenuto dalle due ED, FH, al rettangolo contenuto dalle due BD, FG, è come la superficie del Dodecaedro, il di cui lato è la retta ED, alla superficie dell'Icofaedro, il di cui lato è BD, sarà la retta K, ch'è lato del Cubo, alla retta BD, ch'è lato del triangolo dell'Icofaedro, come la superficie del Dodecaedro, il di cui lato è la retta ED, alla superficie dell'Icofaedro, il di cui lato EBD, come fu proposto dimostrare.


S C O L I O.

In aiuto della propos. seguente dimostreremo col P. Clauio il seguente Theorema.

I lati del Cubo à i lati dell'Icofaedro, iscritti nella medesima sfera, sono come i lati del Cubo à i lati dell'Icofaedro, iscritti in qualunque altra sfera.

Sia A il lato del Cubo, e la retta BC il lato dell'Icofaedro iscritti nella medesima sfera; e di nuovo sia D il lato del Cubo, e la retta EF il lato dell'Icofaedro descritti in qualche altra sfera.

Dico che il lato A del Cubo al lato BC dell'Icofaedro è come il lato D del Cubo al lato EF dell'Icofaedro. Si compiscano i triangoli dell'Icofaedri BCG, EFH, intorno à i quali, si circoscrivano i circoli BCG, EFH, ed in essi, si iscrivano i pentagoni equilateri, ed equiangoli BIKLM, ENOPQ; si tirino le rette BK, CK, EO, FO. Perché il medesimo circolo c comprende il penta-



a 5. del 4.
b 11. del 4.

c 2. del 14.

gono del Dodecaedro, ed il triangolo dell'Icofaedro della medesima sfera, essendo BCG, per ipotesi, il triangolo dell'Icofaedro, sarà BIKLM il pentagono del Dodecaedro: ma per il 2. Coroll. alla 17. prop. del 13, la retta BK è il lato del Cubo iscritto nella medesima sfera col Dodecaedro, sarà BK il lato del Cubo iscritto nella medesima sfera col Icofaedro; per ipotesi la retta A è il lato del Cubo iscritto nella medesima sfera col proposto Icofaedro, perciò il lato BK del Cubo sarà uguale al lato A del Cubo proposto. Nell'istesso modo si dimostrerà, che il lato EO del Cubo è uguale al lato D del Cubo proposto. In oltre perché i pentagoni BIKLM, ENOPQ sono equilateri, ed equiangoli, perciò sono fra loro simili, e sarà l'angolo BIK uguale all'angolo ENO: ma gli angoli BIK, BCK, ^d nella medesima porzione sono fra loro uguali. E gli angoli ENO, EFO nella medesima porzione sono fra loro uguali, in conseguenza l'angolo BCK sarà uguale all'angolo EFO. Similmente perché i triangoli BCG, EFH sono equilateri, ed in conseguenza equiangoli, sarà l'angolo BCG uguale all'angolo EHF; ma gli angoli BGC, BKC e nella medesima porzione sono fra di loro uguali, e gli angoli EHF, EOF, nella me-

d 21. del 3.

e 21. del 3.

E e e e e

desima

defima portione, sono frà di loro vguali; saranno gli angoli BKC, EOF frà di loro vguali. Ne i triangoli BKC, EOF, i due angoli, BCK, BKC sono vguali à i due angoli EOF, EFO, e perciò il rimanente angolo KBC sarà vguale al restante angolo OEF; dal che i triangoli BKC, EOF sono equiangoli, e sarà BK à BC e come è EO ad EF; ma BK fù mostrata vguale alla retta A, e la retta EO vguale à D, perciò A lato del Cubo à BC lato dell'Icofaedro, iscritto nella medesima sfera, è come D lato del Cubo ad EF lato dell'Icofaedro iscritti in vn' altra sfera, ch'era da dimostrarfi.

THEOREMA V. PROPOSITIONE V.

Se vna retta linea sarà diuifa secondo l'estrema, e media proportione, la retta, il di cui quadrato è vguale al quadrato di tutta col quadrato della maggior parte, alla retta, il di cui quadrato è vguale al quadrato di tutta col quadrato della minor parte, è come il lato del Cubo al lato dell'Icofaedro, iscritti nella medesima sfera,

Sia esposta qualunque retta AB diuifa secondo l'estrema, e media proportione in C, e sia AC la maggior parte; sia poi D il lato del Cubo, e la retta F il lato dell'Icofaedro iscritto nella medesima sfera col Cubo;

a 11. del 4.


b 2. del 4.

c Corol. 2.
la 15. del 4.d Corol. 2.
alla 9. del 13

e 47. del 2.

f 12. del 13.

g 15. del 5.



dra to

drato di AC, e permutando, il quadrato di BG al quadrato della retta Eⁿ sarà come il quadrato di BA al quadrato di AC. Di nuono perche la retta BK sottende l'angolo BIK del pentagono, se concepiremo BK diuisa fecondo l'estrema, e media proportione, la maggior parte K sarà vguale al lato IB del pentagono, e perciò farà BK à BI come è BA ad AC, ed il quadrato di BK al quadrato di BI^l sarà come il quadrato di BA al quadrato di AC; ma il quadrato di BA al quadrato di AC, per quel che si è dimostrato, è come il quadrato di BG al quadrato della retta E, farà il quadrato di BK al quadrato di BI^m come è il quadrato di BG al quadrato della retta E; e permutando, il quadrato di BK al quadrato di BGⁿ sarà come il quadrato di BI al quadrato della retta E; per la qual cosa la retta BK alla retta BG^o sarà come BI alla retta E; cioè il lato BK del Cubo al lato BG dell'Icosaedro, iscritto nella medesima sfera, è come la retta BI, il di cui quadrato è vguale à i quadrati delle due BA, AC, alla retta E, il di cui quadrato è vguale à i quadrati delle due AB, BC; ma per l'antecedente Scolio, il lato D del Cubo al lato F dell'Icosaedro, iscritti nella medesima sfera, è come il lato BK del Cubo al lato BG dell'Icosaedro; farà il lato D del Cubo al lato F dell'Icosaedro come la retta BI, il di cui quadrato è vguale à i quadrati delle due BA, AC, alla retta E, il di cui quadrato è vguale à i quadrati delle due AB, BC, ch'era da dimostrarfi.

h 16. del 5.

K 8. del 13.

l 22. del 6.

m 21. del 5.

n 16. del 5.


o 22. del 6.

p 21. del 5.

L E M M A I.

Se la sfera è sagata da qualche piano, la commune sezione è circolo.

Sia la sfera ABCD segata dal piano BEDF, e la commune sezione sia BEDFG. Dico che il piano BEDFG è circolo. Passi prima il piano segante per il centro H della sfera. Perche tutte le rette tirate dal centro H della sfera alla superficie



sferica, per la definizione della sfera, sono frà di loro vguali, perciò le rette HE, HF, HG, e tutte le altre tirate nel piano BEDFG, sono frà di loro vguali, e per la definizione del circolo, il piano BEDFG sarà circolo. Se il piano BEDFG non passa per il centro H, dal centro H si faccia cadere la retta HI^a perpendicolare al piano BEDFG, e dal punto I nel piano BEDFG si tirino le rette IF, IE, IG. Essendo HI perpendicolare al piano BEDFG, gli angoli HIE,

a 11. del 11.

Eccccc 2


HIF,

b 3. definit.
de. 11.

c 47. del 1.

d 47. del 1.

$H I F$, $H I G$ saranno retti, e tutte le rette $H E$, $H F$, $H G$, tirate dal centro H alla superficie della sfera, sono fra di loro uguali. Nel triangolo $H I E$, angolo retto in I , il quadrato di $H E$ è uguale a i quadrati delle due $H I$, $I E$; e nel triangolo $H I F$, il quadrato di $H F$ è uguale a i quadrati de i lati $H I$, $I F$; per la qual cosa i quadrati de i due lati $H I$, $I E$, saranno uguali a i quadrati delle due $H I$, $I F$; se ne leui il commune quadrato di $H I$, resta il quadrato di $I E$ uguale al quadrato di $I F$, e la retta $I E$ sarà uguale alla retta $I F$. Nell' istesso modo si dimostrerà, che $I F$ è uguale ad $I G$, ed è uguale a tutte le altre rette tirate dal punto I nel piano $B E D F G$. Per la qual cosa il piano $B E D F G$ è circolo, come s'è proposto dimostrare.



C O R O L L A R I O.

Appare dunque che, se il piano segante passa per il centro della sfera, il circolo, che si fa, hà il medesimo centro colla sfera; e se il piano, che sega, non passa per il centro della sfera, il centro del circolo generato, è fuori del centro della sfera, ed è quel punto doue la retta tirata dal centro della sfera cade perpendicolare al piano segante.

L E M M A I I.

I circoli uguali nella sfera sono ugualmente distanti dal centro della sfera; ed i circoli, che nella sfera sono ugualmente distanti dal centro di essa sfera, sono fra di loro uguali.

Nella sfera $A B C D$, il di cui centro E , siano gli uguali circoli $A B$, $C D$. Dico che i circoli $A B$, $C D$, sono ugualmente distanti dal centro E . Cadano dal centro E a i piani de' cir-

coli

coli AB , CD ,^a le perpendicolari EF , EG , e per l'antecedente Corollario, i punti F , E , G , sono i centri de' circoli AB , CD ; da i centri G , ed F , alle circonferenze de' circoli AB , CD , si tirino le rette GC , FB . Essendo i circoli AB , CD , per ipotesi, frà di loro uguali, i loro semidiametri $F'B$, GC sono frà di loro uguali; si tirino le rette EB , EC , le quali, per la definizione della sfera, sono frà di loro uguali; e perche le rette EG , EF , sono perpendicolari à i piani AB , CD , perciò gli angoli EGC , EFB ^b sono retti. Nel triangolo rettangolo EGC il quadrato di EC ^c è uguale à i quadrati de i due lati EG , GC ; e similmente nel triangolo EFB , angolo retto in F , il quadrato di EB ^d è uguale à i quadrati de i due lati EF , FB : ma il quadrato di EC è uguale al quadrato di EB , i due quadrati de i lati EG , GC , faranno uguali à i due quadrati de i lati EF , FB ; se ne leuino i quadrati delle uguali GC , FB , resta il quadrato di EG uguale al quadrato di EF , e la retta EG sarà uguale alla retta EF . Hor essendo le perpendicolari EG , EF frà di loro uguali, i circoli AB , CD distano ugualmente dal centro E della sfera, ch'era da dimostrarsi nel primo luogo.

Di nouo siano i circoli AB , CD ugualmente distanti dal centro E . Dico che sono frà di loro uguali. Sia fatta la medesima costruzione di prima, e si dimostri che i quadrati delle due EG , GC sono uguali à i quadrati delle due EF , FB , che leuato i quadrati delle uguali perpendicolari EG , EF , resta il quadrato di GC uguale al quadrato di FB , e la retta GC sarà uguale alla retta FB . Hor essendo i semidiametri GC , FB frà di loro uguali, i circoli AC , DC sono frà di loro uguali, ch'era da dimostrarsi.

THEOREMA VI. PROPOSITIONE VI.

Il Dodecaedro all'Icosaedro, iscritti nella medesima sfera, è come il lato del Cubo al lato dell'Icosaedro, iscritti nella medesima sfera.

Nella sfera $ABCD$, il di cui centro E , sia iscritto il Dodecaedro, e di esso vno de i pentagoni sia $FGHIK$; e similmente nella medesima sfera sia iscritto l'Icosaedro, del quale vno de i triangoli sia LMN . Dico

che




fig. del 11.

b 3. definit.
del 11.
c 47. del 1.

d 47. del 1.

che il Dodecaedro, la di cui base è il pentagono FGHIK, all'Icofaedro, la di cui base è il triangolo LMN, è come il lato del Cubo al lato dell'Icofaedro, o iscritti nella sfera ABCD, o pure in altra sfera. S'intendano continuati i piani del pentagono FGHIK, e del triangolo LMN, le sezioni fatte nella sfera ABCD, per il primo degli antecedenti Lemma, saranno i circoli FGHIK, LMN; e perche il pentagono del Dodecaedro, ed il triangolo dell'Icofaedro si iscrivono in vn medesimo circolo, perciò i circoli, ne quali sono iscritti il pentagono FGHIK, ed il triangolo LMN, sono frà di loro vguali; e per il secondo degli antecedenti Lemma, gli vguali circoli FGHIK, LMN, distano vguualmente dal centro E della sfera. Se dunque dal centro E della sfera sono tirate le rette EP, EO, ^b perpendicolari à gli vguali circoli FGHIK, LMN, quelle sono frà di loro vguali, e per il Corollario al primo Lemma, i punti P, O sono i centri de' circoli FGHIK, LMN. Nell'istesso modo si prouerà, che tutte le rette tirate dal centro E della sfera, perpendicolari à gli altri pentagoni del Dodecaedro, ed à gli altri triangoli dell'Icofaedro, sono frà di loro vguali, e cadono ne i centri di quei pentagoni, e triangoli. Se dunque da tutti gli angoli del Dodecaedro, s'intendano tirate linee rette al centro E della sfera, sarà diuiso tutto il Dodecaedro in 12 piramidi di vguali basi, ed vguali altezze, ed in conseguenza vguali frà di loro. E similmente, se da tutti gli angoli dell'Icofaedro al centro E della sfera, s'intendano tirate linee rette, sarà diuiso l'Icofaedro in venti piramidi di vguali basi, & vguali altezze, è perciò frà di loro vguali. E perche l'altezza della piramide del Dodecaedro è dimostrata vguale all'altezza della Piramide dell'Icofaedro, stante che EP è vguale ad EO, sarà la piramide del Dodecaedro alla piramide dell'Icofaedro come la base FGHIK alla base LMN; e Dodecuplicati gli antecedenti, saranno le dodici piramidi del Dodecaedro, cioè tutto il Dodecaedro, alla piramide EMNL dell'Icofaedro, come i dodici pentagoni del Dodecaedro, cioè tutta la superficie del Dodecaedro, al triangolo LMN: e, ventuplicati i conseguenti, sarà tutto il Dodecaedro alle venti piramidi dell'Icofaedro, cioè à tutto l'Icofaedro, come la superficie del Dodecaedro à i venti triangoli LMN dell'Icofaedro, cioè à tutta la superficie dell'Icofaedro: ma la superficie del Dodecaedro alla superficie dell'Icofaedro, per la 4. proposizione di questo, è come il lato del Cubo al lato dell'Icofaedro iscritti l'vno, e l'altro in qualunque altra sfera; il Dodecaedro dunque all'Icofaedro, iscritti nella medesima sfera è come il lato del Cubo al lato dell'Icofaedro, iscritti in qualunque altra sfera, ch'era da dimostrarsi.



a 2. del 14.

b 11. del 12.

c 5. & 6. del 12.

COROL.

COROLLARIO.

Da quel che si è dimostrato, è manifesto, che il Dodecaedro all' Icosaedro, iscritto nella medesima sfera, è come la superficie del Dodecaedro alla superficie del Icosaedro.

Fine del decimoquarto Elemento.



EVCLIDE RESTITVTO

D A

VITALE GIORDANI.

ELEMENTO DECIMOQVINTO.



PROBLEMA I. PROPOSITIONE I.

Nel dato Cubo iscrivere il Tetraedro.



IA il dato Cubo ABCD, nel quale si habbia ad iscrivere il Tetraedro. Da vno degli angoli del dato Cubo, come dall'angolo A, ne i tre piani AB, AE, AF, che lo costituiscono, si tirino le diagonali AB, AE, AF, e per gli estremi F, E, B, di queste diagonali si tirino à gli altri tre piani le diagonali FE, EB, BF. Perche i piani, che che contengono il Cubo ABCD, sono quadrati vguali frà loro, tutti i diametri AE, AF, AB, FE, EB, FB sono frà di loro vguali, stante che il quadrato di ogn'vna delle dette diagonali è il doppio del quadrato del lato del Cubo. Hor essendo tutte le dette diagonali frà di loro vguali, i quattro triangoli ABF, ABE, AEF, FEB, sono equilateri, ed vguali frà loro, per la qual cosa il solido contenuto da questi quattro triangoli sarà Tetraedro; e perche tutti gli angoli del costruito Tetraedro sono collocati negli angoli del Cubo, perciò il costruito Tetraedro è iscritto nel Cubo, ch'era da farsi, e dimostrarsi.




PROBLEMA II. PROPOSITIONE II.

Nella data Piramide iscrivere l'Ottaedro.

Sia la Piramide, ò Tetraedro ABCD, nel quale s'habbia ad iscrivere l'Ottaedro. Si diuidano tutti i lati della proposta piramide in due parti vguali ne i punti E, F, G, H, I, K, e si tirino le dodici rette EH, HG, GE, GK, KI, IE, IF, FK, KH, HI, EF, FG, le quali costituiscono otto triangoli,

cioè

cioè quattro sopra al piano EIKG, e gli altri quattro sono sotto al medesimo piano EIKG, quelli posti sopra al piano EIKG sono i notati FIE, FEG, FGK, FIK, i quali concorrendo nel punto F, costituiscono la Piramide, il di cui vertice F, e la base il piano EIKG; quelli poi posti sotto al piano EIKG sono i notati HEG, HEI, HIK, HKG, i quali concorrono nel medesimo punto H, e costituiscono la Piramide, il di cui vertice H, e la base è il piano EIKG. Dico che il solido contenuto da questi otto triangoli è l'Ottaedro iscritto nella data Piramide. Perchè tutti i lati della Piramide sono divisi in due parti uguali, faranno i lati AG, AH, del triangolo AGH, vguali à i lati AE, AH del triangolo AEH, l'angolo GAH è vguale all'angolo EAH, stante che sono angoli de i triangoli equilateri, perciò la base HG^b sarà vguale alla base HE. Similmente ne i triangoli AEG, AEH, i due lati EA, AG sono vguali à i due lati AE, AH, l'angolo EAG è vguale all'angolo EAH, perciò la base EG^c sarà vguale alla base EH; ma EH è dimostrata vguale ad HG, i tre lati dunque EH, HG, GE sono frà di loro vguali, ed il triangolo EHG è triangolo equilatero. Nell'istesso modo si dimostrerà, che tutti gli otto triangoli sopra nominati sono equilateri. E perchè questi triangoli, presi à due à due, hanno vn lato commune, come la retta EG è lato del triangolo EHG, ed è lato del triangolo EFG, ed il simile s'intende degli altri, perciò tutti gli autedetti otto triangoli sono frà di loro vguali, e per la definizione 27. dell'11, il solido contenuto da quegli otto triangoli è Ottaedro; e perchè tutti gli angoli del detto Ottaedro toccano i lati del Tetraedro, perciò è iscritto nel proposto Tetraedro, come fu proposto fare, e dimostrare.



b 4. del 1.

c 4. del 2.

S C O L I O.

Perche i tre piani EIKG, GHIF, KHEI per il primo Coroll. alla 14. propos. del 13. sono quadrati vguali, che scambievolmente si segano ad angoli retti, ciascuno de' quali divide la piramide ABCD in due parti vguali, stante che ogn'uno divide la piramide ABCD in modo, che da una parte lascia vn prisma, ed vna piramide, e dall'altra lascia l'altro prisma, e l'altra piramide; come per esempio, il quadrato EFKH lascia da vna parte la piramide AEGH, ed il prisma EHGCFK, e dall'altra parte lascia la piramide HIKD, ed il prisma HEBFKI. Similmente il quadrato HIFG lascia da vna parte la piramide AGHE, ed il prisma EHGFB I, e dall'altra parte lascia la piramide HIKD, ed il prisma HGCFIK, ed il quadrato EIKG lascia da vna parte la piramide GFCK, ed il prisma EGFKIB, e dall'altra parte lascia la piramide AEHG, ed il prisma EHGKID, per il che le piramidi sono frà di loro vguali, ed i prismi sono frà di loro vguali, ed il tutto si può ancora dimostrare, come si fece nella 3. propos. del 12; d'onde è manifesto,

Ffff

che


che se sarà iscritto l'Ottaedro nel Tetraedro, i tre uguali quadrati, che scambievolmente si segano ad angoli retti, ed ogn'uno sega l'Ottaedro in due parti uguali, ogn'uno di essi sega ancora la piramide in due parti uguali.

PROBLEMA III. PROPOSITIONE III.

In vn dato Cubo iscriuere l'Ottaedro.

a 10. del 1.

Sia il Cubo ABCD, nel quale s'habbia ad iscriuere l'Ottaedro. Si diuidano i lati del quadrato AEBF^a in due parti vguali ne i punti T, G, H, I; si tirino le rette TH, GI, le quali si segaranno scambievolmente in qualche punto K, sarà K il centro del quadrato AEBF. Nell'istesso modo si trouino i centri degli altri quadrati, che contengono il Cubo ABCD, che siano i punti M, N, P, L, O; si tirino le rette KM, MN, NP, PK; poi dal punto L si tirino le rette LK, LM, LN, LP, e dal punto O si tirino le rette OK, OM, ON, OP; e saranno descritti otto triangoli, cioè quattro sopra il piano KMNP, e quattro altri di sotto; i quattro sopra il piano KMNP, che costituiscono vna piramide, il di cui vertice O, e la base è il piano KMNP, sono i notati OKM, OMN, ONP, OPK, gli altri quattro di sotto, che costituiscono la piramide, il di cui vertice L, e la base il piano KMNP, sono i notati LKM, LMN, LNP, LPK. Dico che il solido contenuto da questi otto triangoli è Ottaedro. Perche FI è vguale, e parallela ad SQ, sarà IS^b vguale, e parallela ad FQ. Nell'istesso modo si dimostrerà, che IG è vguale, e parallela ad AF, e perciò l'angolo SIG è sarà vguale all'angolo QFA: ma l'angolo QFA è retto, sarà l'angolo SIG retto. In oltre perche AQ è quadrato, sarà QF vguale ad FA: ma QF è dimostrata vguale ad SI, e la retta AF vguale ad IG, sarà dunque SI vguale ad IG, e la metà MI vguale ad IK. Nell'istesso modo si dimostrerà, che gli angoli IGV, GVS, ISV, OTK sono retti, e perciò il quadrilatero ISVG è quadrato, e la metà de' lati GK, KI, IM, MS, SN, NV, VP, PG sono frà di loro uguali. Nell'istesso modo si dimostrerà, che tutte le rette tirate da i centri de' quadrati nelle metà de i lati di essi quadrati sono frà di loro uguali, ed ogn'vna è vguale alla metà del lato del quadrato, ed in consequenza i lati OT, TK, IK, IM &c. sono frà di loro uguali. Nel triangolo IMK, perche l'angolo MIK è retto, ed i lati IK, IM, sono frà di loro uguali, perciò ogn'vno degli angoli IMK, IKM, e sarà la metà d'vn angolo retto. Nell'istesso modo si dimostrerà, che ogn'vno degli angoli SMN, SNM, VNP, VPN, GPK, GKP, è la metà d'vn angolo retto, e perciò gli angoli KMN, MNP, NPK, PKM e sono retti; ed essendo i lati KI, IM, uguali a i lati PG, GK, e gli angoli MIK, PGK, retti, sarà la base PK, e vguale alla base KM: per la qual cosa il quadrilatero KMNP è quadrato. Nell'istesso modo si prouerà, che i quadrilateri LMOP,



b 37. del 1.
c 11. del 11.

d 32. del 1.

e 13. del 1.

f 4. del 1.

O KLN

OKLN sono quadrati. Si considerino i triangoli OKM, OKP. Perche i due lati OK, KM, sono vguali à i due lati OK, KP, e la base OM è vguale alla base OP, stante che sono lati del quadrato LMOP, sarà l'angolo OKM vguale all'angolo OKP, e tutto il triangolo OKM vguale al triangolo OKP. Finalmente perche i lati OT, TK, del triangolo OTK, sono vguali à i lati KI, IM del triangolo KIM, e gli angoli OTK, KIM sono retti, sarà la base OK vguale a KM, ed ogni lato del quadrato OKLN sarà vguale à ciascun lato del quadrato KMNP. E nel medesimo modo si prouerà, che ogni lato del quadrato OKLN è vguale à ciascun lato del quadrato LMOP, per la qual cosa tutti gli otto triangoli OKM, OMN, ONP, OPK, LKM, LMN, LNP, LPK, sono equilateri, ed vguali, e per la definit. 17. dell'11, il solido contenuto da i detti otto triangoli è Ottaedro, il quale toccando, per costruzione, con tutti i suoi angoli i quadrati, che contengono il Cubo ne i centri O, K, L, M, N, P, sarà, per la definizione dell'11, iscritto nel Cubo ABCD, ch'era da farsi, e dimostrarsi.

L E M M A.

La retta linea, che tirata da vn'angolo del triangolo equilatero al centro del medesimo triangolo, e continuata concorre col lato opposto, sarà perpendicolare à quel lato; diuide quel lato, e l'angolo del triangolo in due parti vguali, e tutta è tripla della parte interposta frà il centro, ed il lato, al quale cade perpendicolare.

Sia il triangolo equilatero ABC, il di cui centro D, e dall'angolo A al centro D sia tirata la retta AD, la quale continuata concorra col lato BC in qualche punto E. Dico che la retta AE è perpendicolare al lato BC; che diuide BC, e diuide l'angolo BAC in due parti vguali; e che tutta AE è tripla alla retta ED, la quale dal centro D cade perpendicolare al lato BC. Intorno al triangolo ABC, sia circoscritto il circolo ABC, il di cui centro sarà il punto D; si tirino le rette DC, DB. Perche il triangolo ABC è equilatero, sarà l'arco AC vguale all'arco AB, e l'angolo ADC sarà vguale all'angolo ADB, per la qual cosa i supplementi, cioè gli angoli CDE, BDE, sono frà di loro vguali. Si considerino i due triangoli DEC, DEB, de' quali i due lati ED, DC sono vguali à i due lati ED, DB, l'angolo EDC è vguale all'angolo EDB, sarà la base EC vguale alla base EB, e gli angoli DEC, DEB saranno frà di loro vguali, cioè retti, e sarà la retta AE, come ancora DE, perpendicolare al lato BC. Ne i triangoli AEC, AEB, essendo l'angolo ACE vguale all'angolo ABE, e gli angoli in E retti, sarà il rimanente angolo EAC vguale al restante angolo EAB. Si considerino poi i triangoli ADB, BDC. Perche i due lati AD, DB sono vguali à i due



- g. del 1. lati BD, DC , e la base AB è uguale alla base BC , sarà l'angolo ADB è uguale all'angolo BDC , ed il triangolo ADB sarà uguale al triangolo BDC . Nell'istesso modo si dimostrerà, che il triangolo ADB è uguale al triangolo ADC , per il che i tre triangoli ADB, BDC, ADC sono fra di loro uguali, e tutto il triangolo ABC sarà il triplo del triangolo DBC . In oltre, perchè il rettangolo contenuto dalle due AE, BC è il doppio del triangolo ABC , ed il rettangolo contenuto dalle due DE, BC è il doppio del triangolo DBC , sarà il rettangolo contenuto dalle due AE, EB uguale al triangolo ABC ; ed il rettangolo contenuto dalle due DE, EB uguale al triangolo DBC ; e perciò il rettangolo contenuto dalle due AE, EB al triangolo ABC , sarà come il rettangolo contenuto dalle due DE, EB al triangolo DBC : e permutando, il rettangolo contenuto dalle due AE, EB al rettangolo contenuto dalle due DE, EB , sarà come il triangolo ABC al triangolo DBC ; prese AE, ED come basi di due rettangoli, la di cui altezza comune sia BE , sarà il rettangolo contenuto dalle due AE, EB al rettangolo contenuto dalle due DE, EB , come la base AE alla base DE ; e perchè il rettangolo contenuto dalle due AE, EB al rettangolo contenuto dalle due DE, EB , per quel che si è dimostrato, è come il triangolo ABC al triangolo DBC , sarà il triangolo ABC al triangolo DBC come la retta AE alla retta DE : ma il triangolo ABC fu dimostrato essere il triplo del triangolo DBC , la retta dunque AE sarà il triplo della retta DE , ch'era da dimostrarsi.




PROBLEMA IV. PROPOSITIONE IV.

Nel dato Ottaedro iscriuere il Cubo.

- Sia l'Ottaedro $ABCDEFG$, nel quale s'habbia da iscriuere il Cubo. Perchè l'Ottaedro è diuiso dal quadrato in due Piramidi, ogn'vna delle quali è contenuta da quattro triangoli equilateri, ed hà per base il detto quadrato, sia quel quadrato, per esempio, il notato $ABCD$, sopra il quale sia posta la Piramide, il di cui vertice è E , e la base il detto quadrato $ABCD$, ed i quattro triangoli siano i notati EAB, EBC, ECD, EAD ; l'altra Piramide uguale à questa resti sotto al quadrato $ABCD$, la quale hà per vertice F , e per base il medesimo quadrato $ABCD$; e ritornando alla prima Piramide si trouino i centri de' triangoli EAB, EBC, ECD, EAD , che siano i punti G, H, I, K , e si tirino le rette KG, GH, HI, IK ; per li punti K, G, H, I , si facciano passare le rette LM, MN, NO, OL , cioè ML parallela ad AB, MN parallela à BC, NO parallela à CD ; ed LO parallela ad AD ; saranno i triangoli LME, EMN, NEO, OEL , simili à i triangoli equilateri EAB, EBC, ECD, EAD , e perciò i triangoli LME, EMN, NEO, OEL sono equilateri: e perchè ogni due de i detti triangoli hanno vn lato comune, per esempio EM è lato comune de i due triangoli ELM, EMN ; la retta EN è lato comune de i due EMN, ENO , e la retta EO è lato com-

mune

munede i due ENO, EOL, per la qual cosa i triangoli ELM, EMN, ENO, EOL sono frà di loro vguali. Dal punto E al centro K del triangolo equilatero EAD si tiri la retta EK, e si prolunghi in P, per l'antecedente Lemma, EP farà tripla alla retta KP, e perciò EK farà il doppio di KP: ma EK à KP ^d è come EL ad LA, ed ancora come EO ad OD, farà EL il doppio di AL, e la retta EO il doppio di OD. Nell'istesso modo si dimostrerà che EM è il doppio di MB, e che EN è il doppio di NC; ed essendo le rette EA, EB, EC, ED, diuise nella medesima proportionione, le rette ML, MN, NO, OL concorreranno ne i punti delle diuisioni L, M, N, O: e perche i triangoli equilateri ELM, EMN, ENO, EOL furono dimostrati frà loro vguali, perciò i lati LM, MN, NO, OL sono frà di loro vguali. In oltre, perche la retta LO è parallela ad AD, e la retta LM è parallela ad AB, farà l'angolo MLO ^e vguale all'angolo BAD: ma l'angolo BAD è retto; stante che il quadrilatero ABCD, per il 1. Coroll. alla 14. propos. del 13, è quadrato, in conseguenza l'angolo OLM farà retto. Nell'istesso modo si dimostrerà, che gli altri angoli LON, ONM, NML sono retti, e perciò il quadrilatero LMNO è quadrato. Si considerino i due triangoli EKL, EKO. Perche i due lati EK, EL, sono vguali à i due lati EK, EO, e l'angolo KEL, per l'antecedente Lemma, è vguale all'angolo KEO, farà la base LK ^f vguale alla base KO: dal che la retta LO è diuisa in due parti vguali nel pñto K. Col medesimo modo d'arguētare si dimostrerà, che le rette ML, MN, NO sono diuise in due parti vguali ne i punti, G, H, I; per la qual cosa le rette LG, GM, MH, HN, NI, IO, OK, KL, essendo metà dei lati del quadrato LMNO, sono frà di loro vguali; e perche gli angoli KLG, GMH, HNI, IOK sono retti, perciò le rette KG, GH, HI, IK ^g sono frà di loro vguali. Di più perche i lati LK, LG sono frà di loro vguali, e l'angolo KLG è retto, ogn'vno de gli angoli LKG, LGK, h farà la metà d'vn angolo retto. Nell'istesso modo si dimostrerà che ogn'vno degli angoli OKI, OIK, NIH, NHI, MHG, MGH, è la metà d'vn angolo retto, e perciò gli angoli GKI, KIH, IHG, HGK ^k sono retti; per la qual cosa il quadrilatero KGHI è quadrato. Finalmente perche l'Ottaedro, per il 3. Coroll. alla 14. prop. del 13, si diuide in sei vguali piramidi quadrangolari, che due prese in qualunque modo compongono l'Ottaedro, e nella figura antecedente vna di quelle piramidi è la notata EABCD, la di cui base è il quadrato ABCD, ed il vertice E, nella quale si è iscritto il quadrato LMNO, se in ciascuna delle altre cinque piramidi si farà la medesima costruzione, saranno iscritti gli altri cinque quadrati, ogn'vno vguale al quadrato LMNO, i quali tutti haueranno gli angoli ne i centri de i triangoli, che contengono l'Ottaedro, e per la defin. 31. del 11, farà iscritto il Cubo KGRI nell'Ottaedro, come si è proposto fare, è dimostrare.



d 1. del 6.

e 10. del 11.

f 4. del 1.

g 4. del 6.

h 31. del 1.


K 13. del 1.

PRO-

PROBLEMA V. PROPOSITIONE V.

Iscriuere il Dodecaedro nel dato Icofaedro.

Sia ABCDE vno de i dodeci pentagoni , che nell'Icofaedro sono basi delle dodici piramidi , come si spiegaro nel terzo Corollario della 16. prop. di questo, e sopra la base ABCDE s'intenda eretta vna di quelle 12. piramidi dell'Icofaedro, il di cui vertice sia F, e l'angolo solido F sia contenuto da i cinque angoli piani AFB, BFC, CFD, DFE, EFA , ed i centri de' triangoli equilateri AFB, BFC, CFD, DFE, EFA, siano i punti, G, H, I, K, L, i quali si congiungano con le rette, GH, HI, IK, KL, LG. Dal vertice F à i centri G, H, I, K, L, si tirino le rette FG, FH, FI, FK, FL, e si prolunghino sin che seghino i lati del pentagono ne i punti, per esempio M, N, O, P, Q, le rette FM, FN, FO, FP, FQ, per il Lem. dopo la 1. prop. di questo, segheranno i lati del pentagono in due parti vguali, & ad angoli retti in M, N, O, P, Q; si tirino le rette MN, NO, OP, PQ, QM. Perche le rette AQ, AM, sono vguali alle due BM, BN, e gli angoli




74. del 1.

78. del 1.

QAM, MBN, sono frà di loro vguali, perciò la base QM, sarà vguale alla base MN. Nell'istesso modo si prouerà, che le rette QP, PO, ON sono frà loro vguali, e che ogn'vna è vguale ad MQ ouero MN; per la qual cosa il pentagono MNO PQ sarà equilatero. Similmente perche le perpendicolari FQ, FM, FN, FO, FP, sono frà di loro vguali (stante che sono le perpendicolari de' gli vguali triángoli equilateri, che sono basi dell'Icofaedro) e le rette QM, MN, NO, OP, PQ, sono state dimostrare vguali, gli angoli QFM, MFN, NFO, OFP, PFQ, faranno frà di loro vguali. E perche i punti G, H, I, K, L, sono centri de' gli vguali triangoli equilateri, le rette FG, FH, FI, FK, FL faranno frà di loro vguali: ma, per quel che si è dimostrato, contengono angoli vguali, perciò le rette GH, HI, IK, KL, LG sono frà di loro vguali, ed il pentagono GHIKL, è equilatero. Di nuouo essendo i lati AQ, AM, BM, BN, CN, CO, &c. frà di loro vguali, e gli angoli in A, B, C, frà di loro vguali, faranno gli angoli AQM, AMQ, BMN, BNM, CNO &c. frà di loro vguali, e perciò i due angoli AMQ, BMN sono vguali à i due angoli BNM, CNO, e per la 13. del 1, il rimanente angolo QMN sarà vguale al restante angolo MNO. Nell'istesso modo si dimostrerà, che ogn'vno degli angoli MNO, NOP, OPQ, PQM, è vguale all'angolo QMN, ed in consequenza sono frà di loro vguali: dal che il pentagono MNO PQ, ch'è posto nel piano ABCDE, sarà equiangolo, e

perche

perche sopra si è dimostrato il pentagono $MNOPQ$ essere equilatero; sarà perciò il pentagono $MNOPQ$ equilatero, ed equiangolo. Di più perche le perpendicolari FM, FN, FO, FP, FQ , passano per li centri de' triangoli equilateri, per li Lem. dopo la 2. proposizione di questo sono i tripli delle rette GM, HN, IO, KP, LQ ; sarà FG il doppio di GM , e la retta



FH farà il doppio di HN: Per la qual cosa FG è GM e sarà come FH, ad
 ad HN; e per la 2. del 6, la retta HG è parallela ad NM. Nell'istesso mo-
 do si dimostrerà, che le altre rette HI, IG, KL, LG, sono parallele à i lati
 NO, OP, PQ, QM. Hor essendo le due LG, GH parallele alle due QM, MN
 farà l'angolo LGH uguale all'angolo QMN, e per l'istessa ragione gli
 angoli, GHI, HIK, IKL, sono uguali à gli angoli MNO, NOP, OPQ, ed in
 conseguenza gli angoli LGH, GHI, HIK, IKL, KLG, sono fra loro uguali.
 Finalmente perche le rette GH, HI sono parallele alle rette MN, NO, il
 piano, che passa per le rette GH, HI, e farà equidistate al piano MNO. Nel-
 l'istesso modo si prouerà, che il piano, che passa per le rette HI, IK, e pa-
 rallelo al piano NOP, e perche la retta HI è nel piano GHI, ed ancora
 nel piano HIK, li piani GHI, KIH, secondo la detta positura, formano
 vn medesimo piano. Nell'istesso modo si dimostrerà, che il pentagono
 GHIKL è in vn medesimo piano, e per quel che si è dimostrato, il penta-
 gono GHIKL è equilatero, ed equiangolo. Se poi nelle altre vndici pi-
 ramidi dell'Icosaedro si farà la medesima costruzione, congiungendo con
 rette linee i centri de' triangoli equilateri, faranno costrutti dodici pen-
 tagoni equilateri, ed equiangoli, i quali costituiranno il Dodicaedro
 iscritto nel proposto Icosaedro, come fu proposto fare, e dimostrare.

INVENTIONE

Dell'angolo della scambievole inclinazione di due bafi di qualunque corpo regolare ,

DI ISIDORO MAESTRO D'HYPsicLE.


L

Ritrouare l'angolo della scambieuole inclinatione di due contigue bafi del Tetraedro.

Sia il Tetraedro ABCD contenuto da i quattro triangoli equilateri ABC, ACD, ADB, BCD, e sia A il vertice, e la base sia BCD, e si

voglia

voglia ritrovare l'angolo di quanto il piano ABC è inclinato al piano ABD. Si faccia il triangolo equilatero HFG vguale al triangolo equilatero ABC, ouero ABD, dall'angolo H si faccia cadere la retta HI perpendicolare al lato FG, poi sopra la retta FG si costruisca il triangolo isoscele KGF in modo, che ciascun lato KG, KF, sia vguale ad IH. Dico che l'angolo FKG sarà l'inclinazione di quanto il piano ABC è inclinato al piano ABD. Si diuidi il lato AB^u in due parti vguali in E, e si tirino le rette CE, DE. Perche i due lati BE, EC sono vguali à i due lati CE, EA, e la base AC è vguale alla base BC, stante che sono lati del triangolo equilatero ABC, sarà l'angolo CEB^e vguale all'angolo CEA^e, e perciò gli angoli CEB, CEA^d sono retti, e la retta CE è perpendicolare ad AB. Per l'istessa ragione la retta DE è perpendicolare ad AB. Di nouuo perche BC è vguale ad AB, sarà BC il doppio di BE, ed il quadrato di BC^e sarà il quadruplo del quadrato di BE: ma il quadrato di BC^f è vguale à i quadrati de i lati CE, EB, i quadrati de i lati CE, EB, saranno il quadruplo del quadrato di EB: dal che il quadrato di CE sarà il triplo del quadrato di EB, cioè il quadrato di EB sarà la terza parte del quadrato di EC. Di nouuo perche il quadrato di CE è minore del quadrato di CB per quanto è il quadrato di EB, sarà dunque il quadrato di CE minore del quadrato di CB per quanto è vn terzo del medesimo quadrato di CE. Nell'istesso modo si dimostrerà che il quadrato di DE è minore del quadrato di CB per quanto è la terza parte del medesimo quadrato di DE; dal che i quadrati delle due CE, ED, insieme giunti, sono maggiori del quadrato di BC; ma BC è vguale al lato CD, i quadrati delle due CE, ED, saranno maggiori del quadrato di CD; per la qual cosa l'angolo CED^g sarà acuto, e perche le rette CE, ED sono perpendicolari alla retta AB, ch'è commune sectione de' piani ABC, ABD, sarà l'angolo CED l'inclinazione, che fa il piano ABC al piano ABD. Finalmente perche i triangoli equilateri ABC, ABD, HFG sono frà loro vguali, le perpendicolari CE, DE, HI sono frà di loro vguali; fù fatto ciascun lato KC, KF vguale ad HI, saranno i due lati KG, KF, vguali à i due lati CE, ED; la base CD è vguale alla



p. 12. del 2.

p. 10. del 2.

e 8. del 1.

d. 10. defin. del 1.

e Scol. alla 4. del 2. f. 47. del 2.

p. 19. del 2.


base

basse FG, stante che i triangoli BCD, HFG sono equilateri, ed vguagli, l'angolo dunque FKG ^{h 8. del 1.} sarà vguale all'angolo CED, e perciò l'angolo GKF sarà acuto, e farà l'inclinazione di quanto il piano ABC è inclinato al piano ABD, ch'era da farsi, e dimostrarli.

II.

Ritrouare l'angolo della scambieuoie inclinazione di due contigue basi dell'Ottaedro.

Sia l'Ottaedro ABCDEF, la di cui diagonale sia BE, e sia esposto il triangolo equilatero KHI vguale ad vno de' triangoli equilateri, che contiene il proposto Ottaedro, per esempio, sia vguale al triangolo equilatero AEF, ouero AFB, dall'angolo K si faccia cadere la retta KL ⁿ perpendicolare al lato HI: si esponga poi la retta MN vguale alla diagonale BE, e sopra la retta MN si descriva il triangolo isoscele ONM in modo, che ciascuno de' lati ON, OM sia vguale alla perpendicolare KL. Dico che l'angolo MON è vguale alla inclinazione del piano AEF al piano AFB.



K 13. del 1.


122. del 1.

Si diuidi AF in due parti vguali in G, si tirino le rette EG, BG, e si dimostri, come si fece nell'antecedente, che le rette EG, BG sono perpendicolari alla retta AF, per la qual cosa l'angolo BGE sarà la quantità dell'inclinazione, che fa il piano AEF al piano AFB. Perche i triangoli equilateri KHI, ABF, AEF sono frà di loro vguali, le loro perpendicolari KL, EG, BG, sono frà di loro vguali, ma ciascun lato ON, OM è vguale, per costruzione, alla perpendicolare KL, saranno i due lati ON, OM vguali à i due lati GB, GE; la base MN è vguale alla base BE; farà l'angolo MON ^{m 8. del 1.} vguale all'angolo BGE, e perciò l'angolo MON farà la quantità dell'inclinazione, che ha il piano AEF al piano AFB. Dico finalmente che l'angolo MON è ottuso. Nel triangolo EGF, angolo retto in G, il quadrato di EF ^{n 47. del 1.} è vguale à i quadrati de' lati EG, GF, e perciò il quadrato di EF è maggiore del quadrato di EG. Nell'istesso modo si dimostrerà, che il quadrato di BF è maggiore del quadrato di BG: ma nel quadrato BCEF il quadrato di EB è vguale à i due quadrati di EF, FB, farà il quadrato di EB maggiore de i quadrati delle rette EG, GB; dal che l'angolo EGB, cioè MON, è ottuso, ch'era da farsi, e dimostrarli.

III.

Ritrouare l'angolo della scambieuole inclinazione di due contigue bafi del Cubo.


Sia il Cubo ABCD, e si voglia ritrouare l'inclinazione, che fa il piano CD al piano HD. Si prenda nella retta GD qualunque punto I, e dal punto I nel piano CD si tiri la retta IK ad angoli retti con GD. Similmente dal punto I nel piano GA si tiri la retta IL ad angoli retti colla retta GD; farà l'angolo LIK l'inclinazione del piano CD al piano HD. Dico che l'angolo LIK è retto. Perche gli angoli LIG, HGI sono retti, farà HG parallela ad IL. Nell'istesso modo si prouerà, che IK è parallela a CG. Hor essendo le rette LI, IK parallele a i lati HG, GC, farà l'angolo LIK uguale all'angolo HGC: ma l'angolo HGC è retto, farà l'angolo LIK retto; si che, douendosi esporre in qualche piano l'angolo dell'inclinazione di due contigue bafi del Cubo, si faccia in quel piano vn angolo retto, quello rappresenterà l'inclinazione, che si cerca, il che era da farsi, e dimostrarfi.



IV.

Ritrouare l'angolo della scambieuole inclinazione di due contigue bafi dell'Icofaedro.

Sia esposta vna delle dodici piramidi dell'Icofaedro, che sia ABCDEF, la di cui base pentagonale sia BCDEF, ed il vertice A, e si voglia ritrouare l'inclinazione del piano AED al piano AEF. Si diuida il lato AE in due parti uguali in G, e da gli angoli D, ed F, al punto G si tirino le rette DG, FG, e si mostri, come si fece nel Tetraedro, che ne i triangoli equilateri ADE, AFE, le rette DG, FG sono perpendicolari alla commune sectione AE, dal che l'angolo DGF farà l'inclinazione del piano ADE al piano AEF. Si esponga il triangolo equilatero HIK uguale al triangolo equilatero ADE, ouero AEF, e dall'angolo M cada la retta HL perpendicolare al lato IK. Perche i triangoli equilateri ADE, AEF, HIK, sono fra di loro uguali, le perpendi-



pendi-

pendicolari HL, DG, FG sono frà di loro vguali. Si tirino la retta FD, che sottronde l'angolo FED del pentagono, e si faccia la retta MN vguale ad FD; sopra la retta MN si costruisca il triangolo OMN isoscele in modo, che ciascun lato OM, ON sia vguale alla perpendicolare HL; faranno i due lati MO, ON vguali à i due lati DG, GF; la base MN è fatta vguale alla base FD, farà l'angolo MON e vguale all'angolo FGD: ma l'angolo FGD è la quantità dell'inclinazione, che hà il piano ADE al piano AEF, l'angolo dunque MON farà l'inclinazione del piano AED al piano AEF. Dico finalimente che l'angolo MON, ouero FGD, è ottuso. Perche il pentagono FBCDE, per ipotesi, è equilatero, il lato ED farà vguale al lato EF. Si costruisca sopra la base MN il triangolo isoscele PMN in modo, che ciascun lato PM, PN sia vguale ad ED, ouero EF, e si consideri il triangolo DGE, angolo retto in G. Perche il quadrato di DE, e è vguale à i quadrati de i due lati DG, GE, farà il quadrato di ED maggiore del quadrato di GD, ed il lato ED sarà maggiore del lato DG. Nell'istesso modo si dimostrerà, che il lato FE è maggiore del lato FG, dal che i due lati DE, EF sono maggiori de i due lati DG, GF: ma i due lati DG, GF sono vguali à i due NO, OM, perciò i due lati DE, EF, cioè i due NP, PM, sono maggiori de i due lati NO, OM, e per la 21. del 1, l'angolo MON è maggiore dell'angolo NPM. In oltre perche i lati NP, PM, sono vguali à i due lati DE, EF, e la base NM è vguale alla base DF, l'angolo NPM sarà vguale all'angolo DEF; e perche l'angolo DEF (come angolo del pentagono è ottuso) perciò l'angolo MPN, sarà ottuso; fu dimostrato l'angolo NOM maggiore dell'angolo NPM, farà l'angolo NOM più ottuso dell'angolo NPM. Per la qual cosa l'angolo NOM, ouero DGE, che rappresenta l'inclinazione del piano ADE al piano AEF, è ottuso, ch'era da farsi, e dimostrarsi.

b 22. del 1.

c 8. del 1.

d 22. del 1.


e 47. del 1.

f 8. del 1.

V.

Ritrouare l'angolo della scambieuole inclinazione di due contigue basi del Dodecaedro.

Siano esposte quattro basi del Dodecaedro, come sono i notati quattro pentagoni ABCDE, FGHBA, AEIKF, CBHLM, in modo, che i due ABCDE, FGHBA concorrano, secondo il comune lato AB, e gli altri due AEIKF, BHLMC habbiano l'angolo, negli estremi A, & B del lato comune AB; si tirino le rette FE, FH, HC, CE, le quali, perche sottrondono gli angoli EAF, FGH, HBC, CDE, degli




G s s s s 2

vgua-

vguali pentagoni, che sono basi del Dodecaedro, perciò sono frà di loro vguali. In oltre perche i lati DE, DC, GF, GH, sono frà di loro vguali, e gli angoli in D, & G sono frà di loro vguali, sarà l'angolo DEC ^a vguale all'angolo GFH, che detratti dagli vguali angoli DEA, GFA, resta l'angolo HFA vguale all'angolo CEA: ma gli angoli AEF, AFE ^b sono frà di loro vguali (stante che le rette AE, AF sono lati de' i pentagoni vguali) tutto l'angolo dūque CEF sarà vguale à tutto l'angolo HFE. Nell'istesso modo si dimostrerà, che l'angolo FEC è vguale all'angolo HCE, e che l'angolo EFH è vguale all'angolo CHF: per la qual cosa

i quattro angoli del quadrilatero FHCE sono frà di loro vguali. E perche quattro angoli d'un quadrilatero, per lo Scolio alla 32. del 1, sono vguali à quattro angoli retti; essendo i quattro angoli del quadrilatero FHCE, fra di loro vguali, ogn' vno di quelli sarà vn angolo retto, ed il quadrilatero FHCE sarà quadrato. Si diuida AB in due parti vguali in N, e dal punto N nei piani de'



due parti vguali in N, e dal punto N nei piani de'

pentagoni ABCDE, AFGHB, si tirino le rette NP, NO, ^d ad angoli retti col lato AB. Perche le rette EC, FH, che sottraggono gli angoli de' pentagoni, per lo Scolio alla propositione 8. del 13, sono parallele al lato AB, essendo gli angoli PNA, ONA, per costruzione, retti; faranno gli angoli NPE, NOF retti. E perche le rette PN, ON sono ne' piani de' pentagoni ABCDE, AFGHB, e fanno angoli retti colla commune sectione AB, perciò l'angolo ONP sarà la quantità dell'inclinazione, che il piano ABCDE fa al piano AFGHB. Si tiri la retta OP, e si sponga il pentagono QRSTV equilatero, equiangolo, ed vguale al pentagono ABCDE; dal che QR sarà vguale al lato del Dodecaedro esposto; si tiri la retta VS, che sarà vguale ad FE, ouero EC; si diuida QR ^e in due parti vguali in X, e si erigga la retta XY ^g perpendicolare alla retta QR; sopra la retta VS si descriva il triangolo isoscele ZVS ^h in modo, che ciascun lato VZ, ZS, sia vguale ad XY. Dico che l'angolo VZS è vguale all'angolo ONP dell'inclinazione. Si tirino le rette NE, NF, VX. Perche le rette AE, AF, VQ, sono lati degli vguali pentagoni del Dodecaedro, perciò sono frà di loro vguali. Similmente perche le rette AN, QX sono metà degli vguali lati QR, AB, perciò sono frà di loro vguali, si che ne i triangoli FAN, EAN, VOX, i due lati FA, AN, ouero EA, AN, sono vguali à i due lati VQ, QX, gli angoli FAN, EAN, VOX, sono frà di loro vguali, faranno le basi FN, EN, VX ^k frà di loro vguali, e gli angoli FNA, ENA, VXQ sono frà di loro vguali, che detratti dagli an-

goli

a 4. del 1.

b 3. del 1.

c 10. del 1.

d 11. del 1.

f 10. del 1.

g 11. del 1.

h 12. del 1.

K 4. del 1.

goli tetti ANO, ANP, QXY, restano gli angoli FNO, ENP, VXY frà di loro vguali. Si considetino i triángoli FON, EPN, XYV. Perche gli angoli NOF, NPE, VYX, sono retti, e gli angoli FNO, ENP, VXY, per quel che si è dimostrato, sono frà loro vguali, i due angoli FNO, FON, ouero ENP, EPN, sono vguali à i due angoli VYX, VXY; i lati NF, NE, VX sono stati dimostrati vguali, faranno i due lati NO, OF, ouero NP, PE, vgnali à i due lati XY, YV; cioè il lato OF, ouero PE, vgnale ad VY, ed il lato ON, ouero NP, vgnale ad XY: ma per costruzione ciascun lato VZ, ZS è vgnale ad XY, faranno i due lati VZ, ZS, vgnali alle due rette ON, NP. Hor essendo EP vgnale, e parallela ad FO, sarà FE ^m vgnale, e parallela ad OP, fu dimostrata la retta FE vgnale ad VS, sarà OP vgnale alla retta VS: per la qual cosa l'angolo VZS ⁿ è vgnale all'angolo dell'inclinatione ONP. Dico finalmente, che l'angolo VZS, ouero ONP, è ottuso. Dal punto B si tiri la retta B&, parallela ad NO. Perche NB è parallela ad O&, il quadrilatero O&BN sarà parallelogrammo, dal che il lato B& ^p sarà vgnale ad ON. Oltre à ciò perche le rette B&, ON sono parallele, sarà l'angolo B&H ^q effectno vgnale all'angolo NO& interno, ed opposto: ma l'angolo NO& è retto, in conseguenza l'angolo B&H sarà retto. E perche i due angoli BH&, B&H ^r sono minori di due retti, perciò l'angolo B&H sarà maggiore dell'angolo BH&, e la retta BH ^t sarà maggiore di B&: ma B& è vgnale ad ON, ouero NP, sarà la retta BH, ouero BC, maggiore di ON, ouero NP: ma le rette HB, BC, TV, TS, come lati de pentagoni vgnali, ed equilateri, sono frà di loro vgnali; e le rette ON, NP furono dimostrate vgnali alle rette VZ, ZS; le rette dunque VT, TS faranno maggiori delle rette VZ, ZS, e per la 21. propositione del 1, l'angolo VZS è maggiore dell'angolo VTS: ma l'angolo VTS del pentagono, per lo Scolio alla 32. del 1, è maggiore del tetto, perciò l'angolo VZS, ouero ONP, sarà molto maggiore d'un' angolo retto. Per la qual cosa l'angolo dell'inclinatione di due contigue basi del Dodecaedro è ottuso, ch'era da farsi, e dimostrarsi.

COROLLARIO I.


Dalle cose antedette, e da quel che si è dimostrato nella 17. propo^s. del 13, è manifesto il modo da iscriuere il Cubo nel Dodecaedro.

Sia per esempio è sposto il Dodecaedro ABCD, nel quale si habbia ad iscriuere il Cubo. Perche nella costruzione del Dodecaedro, seruendoci de quadrati, che contengono il Cubo, in ciascun lato di quel Cubo si descrive il pentagono del Dodecaedro in modo, che ogni lato del Cubo sostenga l'angolo del pentagono del Dodecaedro; se dunque nel Dodecaedro proposto per ogni pentagono si tirerà una retta, che sostenga un angolo di quel pentagono, sarà iscritto il cubo nel Dodecaedro; come per esempio. Nel pentagono AHIGK è tirata la retta AG, che sostenga l'angolo ARG del detto pentagono; nel pentagono

GIMD

GIMDL è tirata la retta *GM*, che sottende l'angolo *GIM*; nel pentagono *KGLNO* è tirata la retta *GN*, che sottende l'angolo *GLN*; nel pentagono *OPQRN* è tirata la retta *PN*, che sottende l'angolo *PON*; nel pentagono *SPOKA* è tirata la retta *AP*, che sottende l'angolo *ASP*; nel pentagono *LNRFD* è tirata la retta *NF*, che sottende l'angolo *NRF*; e nel pentagono *DMTCF* è tirata la retta *MF*, che sottende l'angolo *MDF*; similmente nel pentagono *FRQEC* è tirata la retta *EF*, che sottende l'angolo *FCE*; di più nel pentagono *HVTMI* è tirata la retta *VM*, che sottende l'angolo *VTM*; nel pentagono

EQPSB è tirata la retta *EP*, che sottende l'angolo *EQP*; nel pentagono *CTVBE* è tirata la retta *EV*, che sottende l'angolo *EBV*; e finalmente nel pentagono *BVHAS* è tirata la retta *VA*, che sottende l'angolo *VHA*; e questi dodici lati, che contengono i sei quadrati *APNG*, *GNFM*, *AGMV*, *APEV*, *PEFN*, *VEFM*, formano il Cubo *AIEFG* iscritto nel proposto Dodecaedro.



COROLLARIO II.

Quindi è manifesto come nel dato Dodecaedro si iscrive il Tetraedro, e l'Ottaedro.

Poiche se nel Dodecaedro si iscriva prima il Cubo, e nel Cubo si iscriva il Tetraedro, ouero l'Ottaedro, sarà iscritto il Tetraedro, e l'Ottaedro nel Dodecaedro.

COROLLARIO III.

Appare ancora il modo da iscrivere il Cubo nell'Icosaedro.

Il che si fa con iscrivere prima il Dodecaedro nell'Icosaedro, come fu insegnato nella 5. prop. di questo, e poi nel Dodecaedro si iscriva il Cubo, come si è detto nel 1. Coroll. e sarà iscritto il Cubo nell'Icosaedro.

COROLLARIO III.


Si può ancora colla medesim' arte iscrivere il Tetraedro nell'Icosaedro.

Il che si farà coll'iscrivere prima il Cubo nell'Icosaedro, e nel Cubo iscrivere il Tetraedro, e sarà iscritto il Tetraedro nell'Icosaedro.

COROLLARIO V.

Dalle cose dette si caua ancora il modo da iscrivere l'Icosaedro nel Dodecaedro.

Sia esposto l'angolo solido A contenuto dalli tre angoli BAC, BAD, DAC , de i tre pentagoni $BACEF, BADHG, DACKI$, che sono basi del Dodecaedro, e da i centri O, L, N , di quei tre pentagoni à i lati intorno alPangolo A si facciano cadere rette perpendicolari, cioè LQ perpendicolare ad AC , la retta LM perpendicolare ad AB , le rette NM, NP perpendicolari à i lati AD, AB , e le rette OQ, OP perpendicolari à i lati AC, AD ; si tirino le rette LN, NO, OL . Perche le rette OQ, QL , sono perpendicolari alla commune sezione AC , l'angolo LQO sarà l'inclinazione del piano $ACEFB$ al piano $DACKI$; e per simile ragione l'angolo LMN è l'inclinazione del piano $BACEF$ al piano $DABGH$; e l'angolo NPO è l'inclinazione del piano $DABGH$ al piano $DACKI$; e perche il Dodecaedro è contenuto da dodeci pentagoni equilateri, equiangoli, ed uguali, gli angoli delle inclinazioni sono frà di loro uguali, e perciò gli angoli OQL, LMN, NPO sono frà di loro uguali. Similmente essendo i tre esposti pentagoni equilateri, equiangoli, ed uguali, le perpendicolari OQ, LQ, LM, MN, NP, PO , sono frà di loro uguali. Hor ne i triangoli LQO, LMN, NPO , essendo i lati LQ, QO, LM, MN, NP, PO frà di loro uguali, e gl'angoli OQL, LMN, NPO , frà di loro uguali saranno le basi LN, NO, OL frà di loro uguali; dal che il triangolo LNO sarà equilatero. Se quanto s'è fatto intorno all'angolo solido A , si farà ancora intorno à gli altri undici angoli solidi del Dodecaedro, sarà iscritto l'Icosaedro nel dodecaedro, come fu proposto fare, e dimostrarare.



a 12. del 1.


b 4. del 1.

ANNOTATIONE.

A questi quindici Elementi Francesco Flussa Candalla aggiunse il decimosesto, nel quale compara scambievolmente i corpi regolari iscritti, à quelli ne quali sono iscritti, e fa ancora varie comparationi de i lati de' medesimi corpi frà loro; e perche il mio istituto è stato di spigare qui solamente li quindici Elementi esposti da Euclide come più necessarij; perciò si è tralasciato tutto il di più aggiunto da altri Autori, e solo si è cercato restituire con chiara spiegatione quel che ne hà scritto il medesimo Euclide, come stimiamo già adempito.

Fine del Decimoquinto, ed vltimo Elemento.





intero nella pittura

